

Subfam. *Axonolaiminae*,

Genus *Conolaimus* FILIPJEV.

Conolaimus longisetosus n. sp. (Abb. 4a—b.)

Körper langgestreckt, filiform, von heller Farbe, nur im vordersten Teil wesentlich verjüngt.

Kutikula glatt.

Vorderrand gerundet.

Mundhöhle sehr tief; sie besteht in der Weise aus zwei Abteilungen, daß sie doppelt trichterförmig aussieht. Der vordere, kürzere Teil der Mundhöhle ist von kräftigen, chitinigen Wänden begrenzt. Der hintere, etwa doppelt längere, von relativ dünneren Wänden begrenzte Teil verjüngt sich allmählich nach hinten und geht direkt in das Oesophageallumen über.

Seitenorgane ziemlich groß, hufeisenförmig, am vorderen Teil der hinteren Mundhöhlenabteilung gelegen.

Nahe dem vorderen Körperrand befinden sich vier lange Submedianborsten. Hinter diesen bemerkt man einige gleich lange latero-submedian angeordnete Borsten. Am übrigen Körper fehlen Borsten.

Schwanz kurz, allmählich verjüngt, an der Dorsalseite, ein Stück vor der Spitze, mit einigen kleinen Borsten versehen.

Das männliche Geschlechtsorgan streckt sich weit nach vorn.

Spikula mäßig schlank, gebogen (Bogenlänge = 30μ), im distalen Teil spitz, im proximalen Teil angeschwollen. Akzessorisches Stück kräftig.

Schalensand bei Flatbonden. Ein Männchen.

Größenverhältnisse: ♂ Länge = 2,0 mm; $\alpha = 50$;
 $\beta = 11,1$; $\gamma = 20$.




Abb. 4. *Conolaimus longisetosus* n. sp. ♂. a) Vorderende. Imm $\frac{1}{16}$, Ok. 5, Tubus eingezogen;
 b) Schwanz, Obj. 7, Komp. Ok. 6, Tubus eingezogen. $\frac{2}{3}$