



<http://www.biodiversitylibrary.org/>

**Acta Academiae scientiarum imperialis petropolitanae.**

Petropoli, Typis Academiae scientiarum, 1778-1786.

<http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/9526>

**1778:pt.1:** <http://www.biodiversitylibrary.org/item/38583>

Article/Chapter Title: Lepechin\_1780

Page(s): Page 247, Page 248, Page 249, Page 250, Text

Contributed by: American Museum of Natural History Library

Sponsored by: Biodiversity Heritage Library

Generated 19 October 2016 4:48 AM

<http://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/056532700038583>

This page intentionally left blank.



TRES

ONISCORVM SPECIES

DESCRIPTAE.

Ab

I. LEPECHIN.

ONISCVS ACVLEATVS.

Tab. VIII.  
Fig. 1.

**O**niscus thorace nudo, dorso tribus ordinibus cuspidum notato.

Descriptio.

Longitudo totius animalculi, exceptis antennis, XI. linearum. Caput hemisphericum, oculi magni, protuberantes, coerulei. Os inferius situm in fouea rotundata pone insertionem antennarum, protuberans denticulis quatuor, quorum duo superiores, maxillam efficientes, validiores sunt, instructum. Antennae IV. per paria dispositae: par inferius magis validum quadriarticulatum: articulus capiti proximus brevissimus, secundus longior crassior que complanatus, tertius brevior secundo et debilior, quartus longissimus setaceus. Thorax femiounatus gibbus, segmentis VI. quorum vnumquodque in medio tuberculo, vix nudo oculo conspicuo, notatur; at in ultimo segmento inferior margo evidentibus cuspidibus armatur; reliquum corpus tribus constat scutis, quorum latera sunt plana in formam femilunae



lunae efficta, in abdomine appendicibus trium parium pediformibus, articulatis, extremo setaceis, instructa; in dorso autem tribus ordinibus cuspidum armata, quorum debiliores medium dorsum, fortiores vero vncinnatae, latera, occupant. Dedes VII. parium, quorum duo anteriora cheiliformia, vncō acuto terminata, breuiora, reliqua longitudine crescunt, ita vt vltimum sit longissimum, quadriarticulatum, femora latiora fere triangularia.

Cauda tribus constat segmentis attenuatis, vbi aculei, ratione ad dorsum habita, sunt debiliores, et tandem in aculeum complanatum, subulatum et firmum exit; reliquam caudam constituunt tria paria appendicum filiformium, quarum extremitates bifidae setaceae. Color totius pulcre cinnabarinus. Locus mare album.

## ONISCVS SCORPIOIDES.

Tab. VIII.

Fig. 2.

Oniscus thorace globoso ouato, glabro; cauda elongata, articulata, spina fetis que bifidis terminata.

### Descriptio.

Curiosum atque singulare animalculum tam ratione structurae suae, quam ratione anomaliae partium. Caput valde exiguum, oculi prominentes approximati. Thorax vndique tegitur scuto globoso ouato transuersis atque semilunaribus rugis notato; ex cuius parte anteriori exeunt appendices duae breues, claudentes caput et antennas, quae sunt IV. breuissimae filiformes. Os inferius situm exiguum, appendiculis IV. setaceis minimis instructum, quae, vti videtur, pro maxillis inseruiunt. Dorsum itidem tegitur scuto, sed



sed molliori in formam conī truncati, cuius vertex caudam, basis vero thoracem respiciunt; lineis circularibus tribus notatum, quae totidem dorsi segmenta repraesentant. Pedes utrinque VII; horum paria anteriora IV validiora, ex tribus articulis confata, apice uncinulo armata, antrosum versa, et quae pro lubitu animalculi sub margine prominente scuti thoracici tanquam in vagina reconduntur; reliqua pedum paria retrorsum spectant. Cauda longitudinem totius corporis adaequat, tenuis, triquetra, constans articulis V. Horum ultimus medio in aculeum, sat firmum exit, ad latera vero setis longis apice bifidis terminatur. Ad ripas maris albi copiosus. Longitudo totius animalculi X linearum.

## ONISCUS CVSPIDATUS.

Tab. VIII  
Fig. 2.

Oniscus thorace articulado, tuberculoso, segmentis dorsalibus VI, cuspidatis.

### Descriptio.

Caput prominulum a thorace distinctum inaequale, oculis distinctis protuberantibus. Antennae IV, quarum bases constant articulis cylindricis brevioribus, apex vero exit in setam longam attenuatam. Os inferne situm, instructum maxillis hamatis evidentibus. Thorax articulatus oblongus, segmentis IV, quorum unumquodque tuberculis III, sat eleuatis, medio oblongiore, notatur, ultimum vero segmentum, praeter tubercula, cuspidibus IV dorsum respicientibus instructum. Dorsum et abdomen constant itidem segmentis IV, quae fulcis profundis atque evidentioribus distinguuntur.



margo inferior anteriorum segmentorum armatur cuspidibus VI, ratione magnitudinis corporis, validis, vltimum vero segmentum, non nisi vnicam cuspidem in medio gerit. Cauda in formam penicilli efformatur ex laminibus attenuatis mollioribus. Pedes VII parium, quatuor articulis constantes. Horum anteriores teneriores, hispidi; vltimi vero validiores, femoribus crassioribus, complanatis, spina notatis; abdomen tegunt tria paria appendicum pediformium, basi solidiore sulcata, apice bifido filiformi. Longitudo totius, exceptis antennis, X linearum; color lateritius; locus, mare album.







Fig. 1.



Fig. 2.





Fig. 3.



C



D



E



F





The following text is generated from uncorrected OCR.

[Begin Page: Page 247]

->^i ) 24-7 ( ^n^"

TRES

ONISCORVM SPECIES

DESCRIPTAE.

Ab

/. LEPECHIN,

ONISCVS ACVLEATVS. ^^^^^

niTcus thorace nnda, dorfo tribus ordinibus cufpidum  
notato.

Defcriptio,

Longitudo totius animalculi, exceptis antennis, XI.

linearum. Caput hemifphericum, oculi magni, protiberan-  
tes, coerulei. Os inferius fitum in fouea rotundata pone in-  
fertionem antennarum, protuberans denticulis quatuor, quo-  
riim duo fuperiores, maxillam efficitentes, yahdiores funt ,  
infrudum. Antennae IV, pcr paria difpofitae: par infe-  
rius magis "validum quadriarticulatum : articulus capiti  
proximus breuiflimus , fecundns longior cr iflior que com-  
planatas, tertius breuior fecundo et debilior , quartus lon-



giffimus fetaceus, Thorax femiouatus gibbus, fegmentis VI.  
quorum vnumquodque in medio tuberculo, tix nudo ocu-  
lo confpicuo, notatur; at in vltimo fegmento infcrior mar-  
go euidentibus cufpidibus armatur; reliquum corpns tribus  
conftat fcutisr, quorum latera fuut plaua iii formam femi-  
  
lunae

**[Begin Page: Page 248]**

">s^.^ ) 248 ( ^<^<-

lunae cffida, in abdomine appendicibus trium parium pedi-  
fonnibus, articulatis, extremo fetaceis, infruda; in dorfQ  
autem tribus ordinibus cufpidum armata, quorum debilio-  
res medium dorfum, fortiores vero vncinnatae, latera, oc-  
cupant. Dedes VII. parium , quorum duo anteriora che-  
liformia, vnco acuto terminata, breuiora, reliqua longitu-  
dine crefcunt , ita vt vltimum fit longiffimum, quadriar-  
ticulatum, femora latiora fere trangularia.

Cauda tribus conftat fegmentis attenuatis, vbi aculei,  
ratione ad dorfum habita, (iint debiliores , et tandem in  
aculeum complanatum, fubulatum et firmum exit; reliquam  
caudam condituunt tria paria appendicum filiformium ,  
quarum cxtremitates bifidae fetaceae. Color totius pulcre  
cinnabarinus. Locus mare album.



ONISCVS SCORPIOIDES.

Tab.VIII

Fig. 2. Oniscus thorace globofo ouato, glabro; cauda elongata-, articulata, fpina fetis que bifidis terminata.

Defcriptio.

Curiofum atque fingulare animalculum tam ratione  
ftrnc^urae fuae , quam ratione anomaliae partium. Caput  
valde cxiguum , oculi prominentes approximati. Thorax  
vndique tegitur fcuto globofo ouato transuerfis atque femi-  
lunaribus rugis notato; ex cuius parte anteriori exeunt  
appendices duae breues, claudentes caput et antennas, quae  
funt IV. breuiffimae filiformes. Os inferius fitum exiguum,  
appendiculis IV. fetaceis minimis infructum, quae, vti vi-  
detur, pro maxillis inferuiunt. Dorfum itidem tegitur fcuto,

fed

**[Begin Page: Page 249]**

fed molliori in formam coni truncati, cuius vertex caudam,  
bafis vero tlioriicem repiciunt; lineis circularibus tribus  
notacnm, quae totidem dorfi fegm.enta repraefentant. Pedes  
\\trinque VII; liorum paria anteriora IV validiora , ex



tribus articulis confiata, apice vncinnulo armata, antrorfuni  
Terfa , et quae pro lubitu animalculi fub raargiue promi-  
nente fcuti- thoracici tanquam in vagiaa reconduuntur; re«  
liqua pedum paria retrorfura fpectant. Cauda longitudi-  
nem totius corporis adaequat, tenuis, triquetra, co.nftans ar- ^

ticulis V. Horum vltimus m.edio in aculeum, fat firmum  
exit, ad latera vero fetis loiigis apice bifidis terminatur,  
Ad ripas maris albi copiofus. Longitudo totius animal-  
culi X linearum.

ONISCVS CVSPIDATVS. TabViit

Onifcus thorace articulado, tuberculofo , fegmcntis '^\* \*''  
dorfalibus VI, cupidatis.

Defcriptio.

Caput prominulum a thorace diftinctum in.iequale,'  
oculis difiindis protubrantibus. Antennae IV, quarum bafes  
conftant articulis cylindricis breuioribus, apex vero exit in  
fetam longam attenuatam. Os inferne lltum , infrudlum  
maxillis hamatis eudentibus. Thorax articulatus obngus,  
fegmentis IV, quorum vnumquodque tubercuUs 111, fat  
eleuatis, medio oblongiore, notatur, vltimum vero fegmen-  
tum, praeter tubercula, cupidibus IV dorfum repicientibus  
indrudlum. Dorfum et abdomen condant itidem fegmentis  
IV, quae fulcis profundis atque eudentioribus diftinguuntur.



**[Begin Page: Page 250]**

margo inferior anteriorum fegmentorum armatur cupidibus

VI, ratione magnitudinis corporis, validis, vltimum vero

fegmentum , non nisi vnicam cupidem in medio gerit.

Cauda in formam penicilli efformatur ex lamiuibus at-

tenuatis mollioribus. Pedes VII parium, quatuor articu-

lis conflantes. Horum anteriores teneriores , hipidi ; vl-

timi vero validiores, femoribus cralFioribus, complanatis ,

fpina notatis ; abdomen tegunt tria paria appendicum pe-

diformium , bafi folidiore fnlcata, apice bifido filiformi.

Longitudo totius, exceptis antennis , X linearum; color

lateritius; locus, mare album.

ANTX-

**[Begin Page: Text]**

,^

c^tmi.

^

Ft^-.l.



T{^}.SL.

' 'w

Tfcr. .^.

D