

Nereicola bipartita Gerstaecker, 1871

(*N. ovata*)

Gerstaecker 1871 Leipzig, p.773

McIntosh 1870 Crust. Parasit., p.39(v)

Grube 1869 Abh. schles. Ges. Vaterl. Cult., p.123,125,129(ii,2)

Claus 1875 Zeitschr. f. Wiss. Zool., 25(4):342

Nereicola concinna T.Scott, 1902

T.Scott 1902 Ann.Rep.Fish.Bd.Scot., 20(3):455(xxv,8-14)

Gooding 1963 Dissertation, p.178

Nereidicola ovata Keferstein, 1863

Keferstein 1863 Zeitschr.f.wiss.Zool.,12:461(xlii,1-4)

Brian 1933 Bull.Trav.St.Aquic.,2:14

Dantaⁿ 1929 Ann.I.O.Monaco.Nlle Sér.,7(4):

Monod 1931 Crustacés de Syrie., 3: 403(2-4)

Stenta 1904 Boll.Soc.Adr.de Sc.Nat.in Trieste,22:

Mcintosh 1870 Quart.Mourn.Micr.Sc.,10:

Claus Zeitschr.f.wiss.Zool., 1875, 25(4): 342, 359, 360
(xxiii, 19-24)

- Ranise 1956 Doriana, 2(67):1(1-6)
- Brian 1932 Bull.Trav.Stat., 32:58
- Carus 1885 Prodrom.Fanna Medit., p.356
- Graeffe 1902 Arb.Zool.Inst.U.Wien, 13(1);43
- T.Scott 1902 Ann.Rep.Fish.Bd.Scot., 20(3):456
- Stenta 1904 Boll.Soc.Adriat.Sci.Trieste, 22:195
- Dantan 1929 Ann.Inst.Oceanogr.Monaco, 7(4)P175(1-10)
- L.-S. 1935 J.mar.biol.Ass., 20(1):47

Nereicola ovata Keferstein, 1863

(cont.)

Gooding 1963 Dissertation, p.175

Laubier 1964 Bull.Mus.Nat.Hist.Natur.,(2)36(5):631(1-4)

Laubier 1966 Proc.1st.internat.congr.parasit.,2:1076

Stock 1966 Crustaceana 10(1):110

Stock 1969 Crustaceana 17(2):220

O'Reilly 1995 BIOMOR 1:64(5.20)