



LIBRARY OF

Dr. Z. P. Metcalf

1885-1956

IO. CHRIST. FABRICII  
PROFESS. HAVNIENS. SOC. REG. NORV. ET  
BEROL. MEMBR.

# SYSTEMA ENTOMOLOGIAE,

SISTENS

INSECTORVM  
CLASSES, ORDINES, GENERA,  
SPECIES,

A D I E C T I S  
YNONYMIS, LOCIS, DESCRIPTIONIBVS,  
OBSERVATIONIBVS.



---

FLENSBURGI ET LIPSIAE  
IN OFFICINA LIBRARIA KORTII

1775.



*O Iehovah, quam magnifica sunt tua opera !  
Vir insipiens non cognoscit ea,  
Et stultus non animadvertis ea.*

DAVID.



LIBRARY  
THE  
ROYAL  
SOCIETY

VIRO EXCELLENTISSIMO  
DOMINO

ADAM GOTTLÖB  
MOLTKE  
COMITI DE BREGENTVED

CONSILIARIO REGIO, ORDINIS ELEPHANTINI  
EQVITI ETC. ETC.

ET

VIRO EXCELLENTISSIMO  
DOMINO

O T T O N I  
COMITI DE TOTT

CONSILIARIO REGIO, ORDINIS ELEPHANTINI  
EQVITI ETC. ETC.

HISTORIAE NATVRALIS FAVTORIBVS  
D. D. D.

Havniae d. xxi. Nov.  
1774.

Tantorum nominum cultor  
devotissimus

I. C. FABRICIVS.

BUCHENWALD



## PROLEGOMENA.

Insectorum historia homini dignissima ad oeconomiam naturae admirandam viam pandit; *quam natura nusquam magis, quam in minimis, tota sit.* Plin. Detondent insecta quotannis vegetabilia, ne alia alia supprimant; auferunt foetida, putrida, ut splendor globi semper fulgeat, tandemque in cibum animalium abeunt.

Insectorum historia oecono<sup>m</sup>o utilissima tam ob usum, quem praestant, quam

## PROLEGOMENA.

ob noxam, quam inferunt. Praestant multa, et praestarent fane plura, si maiori diligentia examinarentur. Experientia vaga insectorum usum docuit, nulla scientia viam monstrante, iuvante hac, plura procul dubio detegentur in oeconomia praestantissima. Noxa insectorum adhuc maior. Rodunt, destruunt, devorant omnia. Parva quidem occultius agunt, at numero infinito foecunditateque immensa parvam corporis molem compensant, vix arcenda. In his desudarunt iam diu agricolae, ut vegetabilia sua conservarent, his operam derunt mercatores, ne merces destruerentur: at perperam, quum partim caussam

damni

## PROLEGOMENA.

damni ignorarent, partim infectorum naturam et historiam spernerent.

Scientia entomologica in incunabilis adhuc tenera iacet. Vix aetatem Caefal-pini Botanices attingit. Veterum scripta de insectis ante Raium perperam leguntur, fabulis miraculisque referta. Praeterea descriptiones specierum vix ullae et figurae partim fictitiae, partim inextricabiles, ita ut specierum cognitio omnino desit. Rarius primus descriptiones infectorum composuit distinctiores, at, nullo suffultus systemate, saepius errores evidentissimos admisit.

## PROLEGOMENA.

Immortalis tandem a Linné, ingenio systematico natus, Entomologiam in sistema redigit. Classes, ordines, genera et species primus introduxit, at fundamento ludicro inaedificans filum ariadneum systematis saepius amisit. Classes ab alis defumtae, quamvis primo intuitu naturales videantur, saepius tamen naturae vim inferunt. Genera characteribus vacillantibus, speciei charactere saepe contrariis, distincta determinationem specierum secundum systema impossibilem reddunt. Perspexit perbene Summus Vir defectum systematis in characteribus genericis, ideoque raffissime nova genera condidit, ne e chara-

cteri-

## PROLEGOMENA.

pteribus hisce vacillantibus accumulatis mai-  
or oriatur confusio.

Successores Linnaei omnes humeris  
eius institerunt. Clases retinuerunt, ge-  
nera et nomina e principio saepius ludicro-  
mutarunt, auxerunt, quo ipso confusio  
maior et specierum determinatio et deno-  
minatio difficilior.

Ad figuras ideo refugerunt entomologi.  
Dederunt accuratissimas, nitidissimas: at  
species ad sua genera et classes systemate  
vacillante redigere haud valuerunt.

Novam ideo viam tentabo, charakte-  
res et classium et generum ex instrumentis  
cibariis defumens. Praebent sane sufficien-

## PROLEGOMENA.

tes, praebent constantes et genera multo naturaliora.

Instrumenta cibaria sunt partes oris, quibus cibos capiunt. Sunt plura et in variis classibus varia omnibusque quaedam.

*Labia* horizontalia os superne inferne-  
que tegentia. *Superius* corneum, clypea-  
tum, rotundatum, quadratum, conicum,  
fornicatum, subulatum, integrum, incraf-  
fatum, ciliatum, crenatum, fissum, emar-  
ginatum, reflexum. *Inferius* corneum,  
membranaceum; vesiculosum, cylindri-  
cum, cordatum, quadratum, orbicula-  
tum, gibbum, obconicum, fornicatum,  
lineare, convolutum, integrum, emargi-  
natum,

## PROLEGOMENA.

natum, ciliatum, fissum, bifidum, 3 - 4  
fidum, crenatum, dentatum, laciniatum,  
incrassatum, truncatum, acuminatum, con-  
natum, elongatum in linguae lacinias in-  
teriores.

*Maxillae transversales*, latera oris in-  
cludentes. *Superiores corneae* inermes,  
dentatae, exsertae, longissimae, obtusae,  
acuminatae, fissae, bifidae, bifurcatae,  
truncatae, denticulatae, unguiculatae, che-  
liferae, rectae, arcuatae, concavae, for-  
nicatae, articulatae, cylindricae, forcipa-  
tae. *Inferiores corneae*, membranaceae,  
integrae, dilatatae, obtusae, fissae, setosae,  
dentatae, unguiculatae, truncatae, com-

pref-

## PROLEGOMENA.

pressae, falcatae, arcuatae, unidentatae, bifidae, galeatae, connatae cum labio, elongatae in linguae lacinias exteriores.

*Palpi* duo, quatuor, sex, aequales, inaequales, rhomboidales, pilosi, filiformes, cuneiformes, moniliformes, clavati, securiformes, truncati, incurvi, cheliferi.

*Lingua spiralis* cornea, membranacea, brevissima, longissima, acuta, truncata.

*Rostrum* vagina articulata setaque unica aut tribus in apice capitis, sub apice, pectorale, canaliculatum, cylindricum, conicum, setaceum, lamellatum, inflexum, arcuatum, fulcatum, obtusum, acutum, subulatum, spinosum.

Pro-

## PROLEGOMENA.

*Proboscis* labiata, retractilis, brevissima, porrecta, cornea, membranacea, inflexa, canaliculata, geniculata.

*Haustellum* breve, porrectum, rectum, inflexum, geniculatum, cylindricum, setaceum, canaliculatum, cultratum, fornicatum, seta unica, duabus, tribus, quatuor, quinque; vagina nulla univalvi, bivalvi.

Instrumenta haec cibaria praebent characteres generum sufficientes, naturales, quum ab ore ad victimum concludere valeamus.

Differentias specificas a coloribus coatus defunsi. Variant colores aetate, variant

## PROLEGOMENA.

riant loco et difficillime distincte traduntur: attamen impossibile videtur differentias specificas demtis coloribus eruere. Omisi tamen, quantum licuit, ut primum hoc scientiae fundamentum firmiori stet talo.

Nomina et generica et trivialia semper retinui. Mutata nunquam usum, saepius confusionem, praebent. Verba enim valent uti nummi praetio distincto, determinato.

Synonyma apposui e systematicis et ichniographis praestantioribus. E primis sumnum Linné, lynceum Geoffroy, accuratissimum Raium; ex ultimis solidissimum Roesel, nitidissimum Sepp et ditissimum

Drury

## PROLEGOMENA.

Drury semper addidi. Veterum vero synonymiam obscuram, semper incertam, plane omisi. Difficillime eruitur, et eruta omnino nil praefstat.

Classes Insectorum sunt octo.

Os maxillis palpisque  
quatuor aut sex.

Maxilla nuda, libera. ELEVTERATA.

Maxilla tecta, galea  
obtusa. - - VLOONATA.

Maxilla connata

cum labio - - SYNISTATA.

Maxilla inferiore nulla. AGONATA.

Os maxillis palpisque  
duobus. Maxilla in-

feriore

PROLEGOMENA.

feriore saepius un-

guiculata. - - VNOGATA.

Os palpis linguaque

spirali. - - GLOSSATA.

Os rostro: vagina ar-

ticulata - - RYNGOTA.

Os haustello: vagina

inarticulata. - - ANTLIATA.



CHA-



# SYSTEMA ENTOMOLOGIAE INSECTORVM.

## I. ELEVTERATA

*Os palpis quatuor aut sex.*

*Maxilla inferior nuda, libera.*

1. LVCANVS. *Penicilli duo sub labio pal-*  
*pigeri.*

*Antennae pectinato fissiles.*

1. L. maxillis exsertis: apice quadridentatis.

*Alces.*

*Petri. Gazoph. tab. 47. fig. 15.*

Habitat in Asia.

Caput magnum atrum utrinque sinuatum, depresso  
fronte retusa. Maxillae exsertae capite longiores,  
apice compressae, quadridentatae et in medio in-  
terior denté validissimo armatae.

Corpus L. Cervo majus, nigrum, glabrum. Thorax  
utrinque bidentatus.

2. L. maxillis exsertis unidentatis apice bifurcatis, labio  
deflexo ruga transversali elevata.

*Cervus.*

Lucanus Cervus scutellatus maxillis exsertis apice bifur-  
catis latere unidentatis. *Linn. Syst. Nat. 11. 559. 1.*  
*Fn. Sv. 405.*

A

Platy-

2 I. ELEVTERATA. Lucanus.

*Platycerus fuscus cornubus duobus mobilibus apice bifurcatis, latere unidentatis, intus ramo denticulisque instructus.* *Geoff. Inf. 1. 61. 1.*

*Scarabaeus maximus platyceros, Taurus nonnullis, aliis Cervus volans dictus.* *Raj. Inf. 74. 2.*

*Cervus volans.* *Monff. Inf. 148.*

*Scarabaeus Cervus.* *Roef. Inf. 2. Scar. 1. tab. 4. 5.*

*Taurus volans Olear. Msc. tab. 16. fig. 5.*

**3.** *Platycerus fuscus, elytris laevibus, capite laevi,* *Geoff. Inf. 1. 60. 2.* *Foemina Roef. Inf. 2. tab. 5. fig. 8.*  
Habitat in ligno quercino putrefasciente Europae.  
*Foeminam multo minorem maxillis haud exsertis*  
*pro distincta specie assument Geoffroy.*

Hanc speciem pro Coslo veterum habet *Roefell.*

*Cornua officinalia sunt maxillae maris.*

Larva obesa albida capite pedibusque ferrugineis.

*Elaphus.* **3.** *L. maxillis exsertis unidentatis apice bifurcatis, labio deflexo conico.*

Habitat in Virginia. *Msf. Brit. Simillimus L. Ceruo,*  
at paulo minor. Dens lateralis pone medium inseritus. Capitis margo posticus valde elevatus, emarginatus.

*Capreolus.* **4.** *L. maxillis exsertis apice tantum bifurcatis, labio ruga transversa elevata interrupto.*

*Lucanus Capreolus scutellatus: maxillis exsertis apice tantum furcatis.* *Linn. Syst. Nat. II. 560. 2. Amoen. Ac. VI. 391. 4. M. L. V. 50.*

Habitat in America boreali. *Simillimus L. Cervo,* at minor. Dens maxillarum lateralis deest.

*Dama.* **5.** *L. maxillis exsertis intus bidentatis longitudine capitidis.*  
Habitat in Virginia.

Pro foemina L. Capreoli habet *Linn. Msf. L. V.* an recte? Corpus totum piceum. Maxillae arcuatae longitudine capitidis apice integrae, in medio denticulis duobus armatae, postico minutissimo. Labium rotundatum. Pedes ferruginei.

*farallele-* **6.** *L. depresso maxillis dente lateralili elevato.* *Linn.*  
*pipedus.* *Syst. Nat. II. 561. 6.*

*Platyceros niger elytris laevibus capitidis puncto duplice prominente.* *Geoff. Inf. 1. 62. 3.*

Scara-

# I. ELEVTERATA. Scarabaeus. 3

Scarabaeus parallelepipedus *Pondoppidan.* *Atlas danic.*

i. 666. Tab. 29. fig. i.

Schaeff. elem. tab. 101. fig. 1.

Habitat in Daniae, Germaniae, Galliae sylvis.

Alter sexus maxillis minoribus punctoque duplice  
capitis prominente.

7. L. exscutellatus antennis arcuatis, corpore oblongo  
depresso, vertice spina recumbente, thorace ab lo-  
mineque remotis. *Linn. Syst. Nat.* ii. 560. 4. *M.*  
*L. V.* 33. interru-  
ptus.

Dermestes *Brown. Jamaic.* 429. tab. 44. fig. 7.

*Petiv. G. zoph.* tab. 27. fig. 7.

Habitat in America.

8. L. coerulescens maxillis lunatis, thorace marginato. caraboi-  
des.  
*Linn. Syst. Nat.* ii. 561. 7. *Fn. Sv.* 407.

Platycerus violaceo-coeruleus elytris laevibus *Geoff.*  
*Inf.* i. 63. 4.

Lucanus caraboides *Scop. Carn.* 2.

Carabus coerulescens *Vddmann. Dis.* 40.

Platyceros *Schaaff. Ic.* tab. 6. fig. 8.

Habitat in Europae locis suffocatis.

Variat colore viridi et coeruleo.

## 2. SCARABAEVS. *Palpi* quatuor filiformes.

*Labium* emarginatum: api-  
cibus elongatis palpi-  
geris.

*Antennae* lamellatae.

\* *Scutellati thorace cornuto.*

1. Sc. scutellatus, thoracis cornu incurvo maximo: sub-  
tus barbato unidentato, capitis recurvato *Linn. Syst.*  
*Nat.* ii. 541. 1. *Mus. Lud. VI.* 3. Hercules.

Scarabaeus maximus indicus nitens piceus *Roef. Inf.* 2.

Scarab. i. tab. A. fig. 1. et Inf. 4. tab. 5. fig. 3.

Taurus volans f. Eruma *Marg. Bruf.* 247. fig. 3.

4 I. ELEVTERATA. Scarabaeus.

Rhinoceros americanus cinereus rostro nigro nitente.

*Petiv. Gazoph.* tab. 70. fig. 1.

*Grew. Mus.* 162.

*Edw. Aui.* tab. 334.

*Drury. Inf.* 1. tab. 30. fig. 1. 2.

*Aub. Miscell.* tab. 41. fig. 2.

Habitat in America.

Thoracis cornu longissimum subtus barbatum apice nudum, emarginatum.

Variat elytris piceis et glaucis nigro punctatis.

Plures associati amplectuntur cornibus ramum Mammeae Americanae, circumvolando corticem perforant, succum exstallantem hauriunt, inebritantur et capiuntur, teste *Grew.* Vix tamen verisimile videtur, quum thoracis cornu subtus barbatum.

*Gideon.* 2. Sc. scutellatus thoracis cornu incurvo maximo apice bifido, capitibus recurvato bifido supra unidentato.

*Linn. Syst. Nat.* 11. 541. 2.

Rhinoceros *Swammerd. Bibl.* tab. 30. fig. 2.

Rhinoceros minor cornibus duobus furcatis. *Roef. Inf.* 2.

Scarab. 1. tab. A. fig. 5.

*Aub. Miscell.* tab. 40. fig. 3.

*Edw. Aui.* tab. 40.

*Gron. Zoophy.* 413.

Habitat in Indiis.

*Oromedon.* 3. Sc. scutellatus thoracis cornu brevi emarginato, capitibus recurvato bifido.

Scarabaeus Oromedon *Drury Inf.* 1. tab. 36. fig. 5.

*Aub. Miscell.* 1. tab. 40. fig. 4.

Habitat in Indiis.

Statuta nasicornis totus glaber piceus. Capitis clypeus dentatus. Antennarum basis pilis parvis obvallata. Capitis cornu breve compressum apice bifidum laciniis aequalibus. Cornu thoracis breve emarginatum. Pedes dentati.

*Aegaeon.* 4. Sc. scutellatus rufus, thoracis cornu brevi incurvo, subtus barbato, capitibus recurvo subulato.

Scarabaeus Aegeon *Drury Inf.* 2. tab. 30. fig. 5.

Habitat in Indiis.

Parvus

**Parvus** in hac familia. Caput nigrum clypeo emarginato. Cornu magnum recurvum subulatum. Thorax elytris angustior ferrugineus macula utrinque margineque tenuissime nigris. Cornu breve incurvum subtus, canaliculatum barbatum, elytra ferruginea, scutello, sutura margineque nigris.

5. Sc. scutellatus thoracis cornu incurvo: basi crassissima, *Chorinaeus*-  
apice bifido, capitibus longiori recurvo bifido. *mus.*

Habitat in Brasilia *Muf. Dom. Tunstall.*

Affinis Sc. Pan. Capitis Clypeus utrinque unidentatus. Cornu elongatum recurvum inerme apice bifidum. Thorax lateribus rugosus in medio nitens glaber elevatus, definens in cornu incurvum, breve apice bifidum. Elytra stria, unica, ad suturam lateribus scabris margine reflexo.

An varietas S. Pan?

6. Sc. scutellatus, thorace cornu bidentato, capite *dichotomio*-  
cornu dichotomo, elytris rufis. *Linn. Mant. I. 529. mus.*

*Aub. Miscell. tab. 40. fig. 5.*

*Voigt. Scarab. 107, tab. 14. fig. 107.*

Habitat in Indiis.

Magnus rufus.

7. Sc. scutellatus rufus, thorace cornu elevato, capite *claviger*.  
cornu subulato recurvo. *Linn. Mant. I. 529.*

*Aub. Miscell. I. tab. 40. I.*

*Voigt. Scarab. 108, tab. 14. fig. 108.*

Habitat in Indiis.

8. Sc. scutellatus thoracis cornu incurvo: basi crassissima, *Pan.*  
apice bifido, capitibus recurvo unidentato.

Habitat in Indiis, *Dom. Drury.* Statura praecedentium niger. Clypeus utrinque unidentatus, cornu recurvo, magno medio interiori dente valido notato. Thorax lateribus scaber, medio glaber, elevatus crassissimus, definens in cornu incurvum apice bifidum. Elytra glabra stria unica ad suturam.

*bilobus.* 9. Sc. scutellatus thorace prominente bilobo, capitis cornu simplici, elytris striatis.

Scarabaeus bilobus scutellatus thorace prominente bilobo, capitis cornu simplici, elytris striatis. *Linn.* *Syst. N. s.* II. 544. 12.

*Euv. Au.* 105. tab. 105. fig. e.

*Gronou. Grzoph.* 414. tab. 14. fig. 1. 2.

*Aub. miscell.* tab. 15. fig. 3.

Habitat in Europa australi.

Simillimus S. Jafoni at paullo minor. Clypeus rotundatus, sexdentatus. Capitis cornu recurvum, dente parvo intus notatum. Thorax lateribus scaber dorso plano, desinit apice in cornu crassissimum valde planum late emarginatum, laciis rotundatis, obtusis. Foueola marginalis utrinque excavata. Elytra picea punctato striata. Tibiae posticae bidentatae.

*Jafon.* 10. Sc. scutellatus thoracis cornu crassissimo: apice emarginato, capitis unidentato bifido.

Rhinoceros Swammerd *Bibl.* tab. 30. fig. 5.

Habitat in China. *Mus. Brit.* Oblongus ater glaber.

Capitis cornu recurvum intus canaliculatum apice bifidum.

Thorax lateribus rugis elevatis exasperatus in medio protrahitur in cornu crassissimum, apice late emarginatum, laciis validis distantibus, incurvis. Elytra ad futuram unifasciata.

Affinis S. bilobo, at capitis cornu bifidum.

*validus.* 11. Sc. scutellatus, thorace antice retuso, cornu conico brevissimo, capite bituberculato.

Habitat in Brasilia *Dom. Bancks.*

Magnitudo S. Rhinocerotis. Capitis clypeus obtusus, truncatus, in medio tuberculis duobus erectis acutis. Thorax antice rugosus retusus, cornu brevissimo conico, postice glaber. Elytra glabra picea.

*truncatus.* 12. Sc. scutellatus, thorace retuso cornu brevi truncato, capite mutico.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Bancks.*

Statura et magnitudo S. nasicornis, supra niger subtus piceus. Caput truncatum muticum. Thorax retu-

retusus glaber laevis antice cornu brevi, erecto,  
truncato. Elytra glabra. Femora crassissima.

13. Sc. scutellatus thorace antice retuso, cornu brevi in- *Eurytus.*  
cumbente emarginato, capite mutico.

Habitat in America *Mus. Dr. Hunter.*

Medius capitis clypeus integer linea media transver-  
sali elevata. Thorax rotundatus glaber, antice re-  
tusus cornu incumbente brevi emarginato. Elytra  
laevia, stria unica ad futuram.

14. Sc. scutellatus glaber thorace bicorni, capitis cornu *Actaeon.*  
unidentato: apice bifido, elytris laevibus. *Linn. Syst.*

*Nat. II. 541. 3. Mus. Lud. VI. 4.*

*Aub. Miscell. tab. 15. fig. infer.*

Rhinoceros maximus tricornis *Roef. Ins. 2. Scarab. I.*  
tab. A. fig. 2.

Enema *Marggr. Bras. 246.*

Rhinoceros *Swamm. Bibl. tab. A. fig. 2.*

*Gren. Mus. p. 161.*

*Petiverii Gaz. tab. 15. fig. 12.*

Habitat in America, Brasilia.

15. Sc. scutellatus thorace bicorni, capitis cornu apice *Simson.*  
bifido, labio denticulato.

Scarabaeus Simson scutellatus thorace bicorni, capitis  
cornu apice tantum bifurcato, labio denticulato.

*Linn. Syst. Nat. II. 542. 4. Mus. Lud. V. 5.*

Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*

Affinis videtur S. Actaeoni.

Synonyma a Linnaeo citata nullo modo hue per-  
tinent. Certe figura *Stounei* ad Charonem  
spectat.

16. Sc. scutellatus villosus thorace, gibbo bicorni, capitis *Elephas.*  
cornu unidentato apiceque bifido. *Olear. Mus.*  
tab. 16. fig. 2.

Habitat in Guinea. *Mus. Brit.*

Magnitudo et summa affinitas cum S. Actaeone. Totus  
nigricans, at pilis ferrugineo griseis undique tectus.  
Capitis cornu porrectum, glabrum laeve, atrum,  
basi interno dente valido, incurvo, villoso armatum.  
Thorax in medio gibbus utrinque cornu valido  
porrecto. Elytra vase punctata.

- Boas.* 17. Sc. scutellatus thorace retuso excavato bidentato, capitis cornu recurvo simplici.  
*Habitat* ad Sierra Leon. *Dom. Drury.*  
*Statura et magnitudo* S. Rhinocerotis. Capitis Clypeus emarginatus cornu magno recurvo. Thorax niger glaber antice excavato retusus bidentatus, pilis ferrugineis erectis. Elytra picea linea punctata unica ad suturam.
- Tityus.* 18. Sc. scutellatus glaucus thorace tricorni: lateralibus brevissimis subulatis, medio subtus barbato, capitis cornu recurvo.  
*Scarabaeus Tityus* scutellatus thorace tricorni: intermedio maximo simplicissimo, capitis cornu recurvato simplicissimo *Linn. Syst. Nat. II. 542. 5. Amben. Acad. 6. 291. 1.*  
*Scarabaeus* thorace tricorni laevi: Intermedio maximo incurvo subtus barbato; capitis cornu maximo recurvo. *Gron. Zool. tab. 14. fig. 8.*  
*Aub. miscell. I. tab. 40. fig. 2.*  
*Habitat* in America.  
*Variat* colore elytrorum nigro griseo maculato et griseo nigro maculato.
- Centaurus.* 19. Sc. scutellatus niger thorace tricorni lateralibus brevissimis subulatis, capitis recurvo unidentato.  
*Habitat* in India Orientali. *Mys. Brit.*  
*Magnitudo* S. Tityi, totus niger, glaber. Capitis cornu recurvum, compressum versus apicem interne dente valido armatum. Apex ipse integer. Thorax niger cornubus tribus intermedio longissimo glabro apice emarginato, lateralibus brevissimis. Elytra picea, stria unica ad suturam.
- Atlas.* 20. Sc. scutellatus thorace tricorni, intermedio brevissimo, capitis cornu recurvo.  
*Scarabaeus Atlas* scutellatus thorace tricorni: antico brevissimo, capitis cornu adscendente. *Linn. Syst. Nat. II. 542. 6. Mys. Lud. Vlr. 6.*  
*Elm. Av. 105. tab. 105. fig. 1.*  
*Rhinoceros Swammerd. Bibl. tab. 30. fig. 3.*  
*Margraf. Bras. 247. fig. 1.*  
*Clear. Mus. tab. 16. fig. 3.*

Habi-

# I. ELEVTERATA. Scarabaeus.

9

Habitat in America.

Thoracis cornua lateralia elongata, incurva; intermedio vel anteriori brevissimo conico. Cornu capitis elongatum recurvum intus tridentatum, dente antico validiori.

21. Sc. scutellatus, thorace excavato tricorni: lateralibus **Geryon.** compressis unidentatis, capitis recurvo simplici.

Scarabaeus Geryon: *Drury. Inf.* 2. tab. 30. fig. 6.

Habitat in Indiis.

Statura singularis, magnitudo S. nasicornis. Capitis clypeus integer cornu magno seabo, recurvo. Thorax valde excavatus tricornis niger. Cornua lateralia compressa lata, antice dente valido armata. Cornu medium erectum, subulatum, basi postice dilatatum, scutellum tegens, emarginatum. Elytra picea, stria ad suturam. Femora crassissima. Tibiae anticae dentatae, posticae quatuor terminantur lobo semicirculari, ciliato, laminisque duabus longioribus.

22. Sc. scutellatus thorace tricorni intermedio longiori **Alocus.** simplici, capite submutico, elytris unistriatis. *Linn.*  
*Syst. Nat.* 11. 542, 7. *Mus. Lud. Vlr.* 7.

Scarabaeus tricornis capite mutico. *Rösel. Inf.* 2.  
*Scarab.* 1. Tab. A. fig. 6.

Nasicornis Taurocerus Marianus castanei coloris. *Petiverii Gaz.* tab. 24. fig. 10.

*Aub. Miscell.* tab. 15. fig. 1.

Habitat in America. Dentes duo breves interdum in fronte maris.

23. Sc. scutellatus thorace tricorni intermedio longiori **Antaeus.** simplici, capite mutico, elytris laevissimis.

Scarabaeus Antaeus *Drury. Inf.* Tom. 1. tab. 34. fig. 3.  
Habitat in America.

Simillimus statura et Magnitudine Charoni, at cornua omnia simplicia et elytra stria omnino nulla exarata Ab. S. Alocus et magnitudine et statura omnino differt. Foemina ingermis.

24. Sc. scutellatus thorace tricorni intermedio longiori **Syphax.** simplici, capite mutico, elytris punctatis.

Habitat in America. *Mus. Banks.*

Nimis affinis S. Antaeo, à quo tamen differt cornubus lateralibus minoribus elytrisque punctatis.

**Maimon.** 25. Sc. scutellatus thorace tricorni: cornubus aequalibus brevissimis, elytris laeibus.

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis praecedenti, at minor, et cornua brevissima.

Thorax utrinque retusus. Caput muticum.

**Typhocus.** 26. Sc. scutellatus thorace tricorni: intermedio minori, lateralibus porrectis longitudine capitis mutici. *Linn.*

*Syst. Nat.* II. 543. 9. *Mus. Lud. Vir.* 8.

**Copris niger**, elytris striatis, thorace antrorsum tricorni. *Geoff. Ins.* I. 72. tab. I. fig. 3.

**Scarabaeus ovinus** 2. *Raj. Ins.* 103.

**Scarabaeus thorace cornuto.** *Frisch. Ins.* 4. pag. 16. tab. 8.

**Taurocerus Monfet.** *Ins.* 152. fig. 2.

Habitat sub stercore bovino in terra cuniculos fodientis et nidulans profunde.

Variat cornubus capite aequalibus et duplo longioribus.

**Titanus.** 27. Sc. scutellatus thorace tricorni: intermedio longiori, apice bifido; lateralibus subarcuatis acutis, capite mutico.

**Scarabaeus Simson.** *Drury. Ins.* I. tab. 36. fig. 2. 4.

**Scarabaeus major niger tricornis.** *Sloan. Jam.* II. pag. 205. tab. 237. fig. 4. 5.

Habitat in America. *Mus. Brit.* Statura et magnitudo

S. nasicornis, totus ater. Caput omnino muticum.

Thorax valde retusus tricornis, cornubus lateralibus subarcuatis, intermedio multo majori, recurvo, apice parum dilatato, bifido, lacinis distantibus, aequalibus. Elytra ad futuram unistriata. Subtus abdomen pilis rufis hirtum.

**Aenobarbus.** 28. Sc. scutellatus thorace tricorni: medio longiori emarginato: lateralibus obtusis, capite bituberculato.

Habitat in America. *Mus. Dr. Hunter.*

Statura S. Titani at minor. Clypeus obtusus in medio tuberculis duobus obtusis parvis. Thorax ater nitens utrinque puncto ferrugineo. Cornua tria, antico recurvo longiori emarginato, posticis brevibus obtusis et potius tuberculis. Elytra nigra. Abdomen pilosum.

29. Sc. scutellatus thorace prominentia triplici, capitis *nasicornis*. cornu recurvo, elytris laeuiibus.

Scarabaeus nasicornis sentellatus thorace prominentia triplici, capitis cornu incurvato, antennis heptaphyllis. *Linn. Syst. Nat.* II. 544. 15. *Fn. Sv.* 378.

Scarabaeus capite unicorni recurvo, thorace gibbo, ab domine hirsuto. *Geoff. Ins.* I. 68. 1.

Scarabaeus nasicornis. *Frisib. Ins.* 3. pag. 6. tab. 3. fig. 4. *O'earii Mus.* 27. tab. 16. fig. 4.

Rhinoceros *Roef. Ins.* 2. Scarab. I. tab. 6. 7.

*Drury. Ins.* I. tab. 34. fig. 7. 8.

Scarabaeus excavatus. *Foster. Cent. Ins.* I.

Habitat in Europae vaporariis fumetis.

Larva grisea capite, pedibus spiraculisque rufis, delectatur fimo sed acidulo et subadstringenti.

Inventor speciei *Clusius*, qui illam *Moffeto* communicavit.

30. Sc. scutellatus thorace retuso prominentia triplici: *Sylvanus*. intermedia obsoleta, capitis cornu recurvo.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo S. nasicornis niger. Capitis clypeus vix emarginatus cornuque medio recurvo. Thorax valde retusus prominentia triplici, anteriore minutissima. Elytra punctato striata fere picea.

31. Sc. scutellatus thorace trituberculato, capitis cornu *Lazarus*. brevi emarginato.

Habitat in New Jork Americae. *Dr. Yeats.*

Parvus statuta S. mobilicornis. Capitis clypeus margine elevato, emarginatus utrinque sinuatus. Cornu parvum erectum emarginatum. Thorax fuscescens, canaliculatus tuberculis tribus, medio transverso. Elytra striata rufa.

32. Sc. scutellatus thorace quadridentato, capitis cornu *mobilicornis*. recurvo mobili.

Habitat Herfordiae Anglorum. *D. Drury.*

Parvus statuta S. testacei. Antennae lamellatae, clava ferruginea. Capitis cornu compressum, recurvum thorace brevius basi articulo mobili. Thorax punctatus, elevatus, canaliculatus, lateribus utrinque dente compresso elevato recurvo apice flexuoso. Pone hunc

hunc fovea parva orbiculata excavata. In medio dentes duo reliqui erecti brevissimi. Scutellum rotundatum. Elytra striata subferruginea. Pedes et abdomen pubescentia ferruginea.

*cylindri-* 33. Sc. scutellatus thorace antice truncato quinqnedentato, capite antice cornu eretto, corpore cylindrico.

*Linn. Syst. Nat. II. 544. II. Fn. Sv 380.*

Habitat in Pruni Cerasi truncis Europae septentrionalis.

\* \* *Scutellati thorace inermi, capite cornuto.*

*Rhinoce-* 34. Sc. scutellatus thorace retuso subbituberculato, capite cornu simplici, clypeo bifido, elytris punctatis. *Linn. Syst. Nat. II. 544. I4. Mus. L. VI. 10.*

Rhinoceros Laconensis nigricans capite vaginisque punctulatis. *Petiver. Gazoph tab. 44. fig. 9. et tab. 100. fig. 3.*

Rhinoceros cornu unico. *Roef. Ins. 2. Scarab. 1. tab. A. fig. 7.*

*Barvil. Icon. tab. 163.*

Habitat in Asia.

*Barba-* 35. Sc. scutellatus thorace inermi: antice scabro, capitis cornu recurvo brevi.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo S. Rhinocerotis, at latior. Capitis Clypeus antice elongatus, subemarginatus, cornu recurvo subulato longitudine capitis. Oculi testacei. Thorax rotundatus antice scaber, postice glaber. Elytra picea punctato striata. Abdomen piceum. Tibiae anticae quadridentatae.

*Satyrus,* 36. Sc. scutellatus thorace inermi: antice truncato, capitis cornu recurvo, capite longiori.

Habitat in America septentrionali *Dom. Banks.* Major S. nasicorni. Clypeus emarginatus dentibus acutis divergentibus. Cornu capite triplo longius. Thorax antice valde truncatus, glaber, laevis, ater. Elytra striata. Subtus ferrugineus, hirsutus. Tibiae omnes dentatae.

Foemina clypeo tuberculato, thorace plano.

37. Sc. scutellatus thorace inermi: antice retuso, capitis cornu recurvo, elytris substriatis. *iamaicensis.*  
*Scarabaeus iamaicensis. Drury. Inf. 1. tab. 34. fig. 1. 2.*  
*Habitat in Indiis. Mus. Brit.*  
*Capitis clypeus emarginatus in medio cornu porrecto recurvo & fere recumbente. Thorax rotundatus antice valde retusus. Elytra obsolete punctata striataque.*  
*Foemina mutica.*
38. Sc. scutellatus thorace inermi: antice excavato, capitis cornu recurvo, elytris laevissimis. *Silenus.*  
*Habitat in Gallo provincia.*  
*Statura et summa affinitas S. nasicornis, at duplo minor, totus piceus. Capitis cornu parvum subulatum valde recurvum. Thorax antice valde excavatus. Elytra laevia.*
39. Sc. scutellatus, thorace inermi rotundato, capitis cornu recurvo. *Syrichtus.*  
*Habitat in America. Mus. Dom. Banks.*  
*Statura praecedentis, at thorax rotundatus, nec retusus, nec excavatus.*
40. Sc. scutellatus depresso thorace fossula exarato, capite tricuspidi, elytris striatis. *Linn. Syst. Nat. II. 545. 19. Mus. Lud. Vlr. 14.*  
*Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 7.*  
*Habitat in America.*  
*Magnitudo L. Cervi staturaque ejus depresso ab hoc genere distingue videtur.*  
*Alter sexus in antico thoracis mucrone parvo elevato armatus.*
41. Sc. scutellatus thorace inermi, clypeo bifureo. *goliatus*  
*Scarabaeus goliatus scutellatus thorace inermi, capite rostro bifurco. Linn. Mant. 530.*  
*Drury. Inf. 1. tab.*  
*Habitat in Africa. Mus. Dr. Hunter.*
42. Sc. scutellatus thorace inermi scabro, capite linea transversa carinata, clypeo bidentato. *Hircus.*  
*Habitat Tranquebariae. Koenig. Magnitudo et statura S. Nasicornis. Capitis clypeus emarginatus dentibus duobus*

duobus elevatis erectis. In medio linea transversa valde elevata carinata. Thorax scaber. Elytra substriata. Corpus nigrum subtus tomento ferrugineo tectum.

*fasciatus.* 43. Sc. scutellatus brunneus capite subbicomi, elytris punctato striatis: apice nigris.

Habitat in Pensylvania. *Mus. Brit.*

Statura et magnitudo S. vernalis. Capitis clypeus ferrugineus quasi è squamis tribus imbricatis compositus, inferiori emarginata, reliquis duobus dente elevato, acuto, brevi, posteriori paulo majori armatis. Thorax gibbus, ciliatus, ferrugineus margine postico nigro. Antice ruga transversalis, abbreviata. Scutellum nigrum. Elytra punctato striata, brunnea, apice nigra, macula parva brunnea.

*piceus.* 44. Sc. scutellatus piceus thorace inermi glabro, capite subbicomi, elytris striatis.

Habitat in Indiis. *Dom. Drury.*

Parvus statura S. Fossoris. Clypeus apice emarginatus et in medio cornubus duobus brevissimis approximatis. Thorax glaber laevis. Elytra punctato striata.

*Sphinx.* 45. Sc. scutellatus thorace inermi quadripunctato, capite tuberculato, tarsis anticis nullis.

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Dom. Banks.*

Medium Caput virescens tuberculis quatuor elevatis, transversalibus. Thorax aeneus, puncto utrinque unico et duobus dorsalibus ad marginem posticum impressis. Elytra obscura nigra striata. Femora compressa dentata. Tibiae anticae arcuatae dentatae acutae, absque tarsis, reliquæ clavatae.

*subterra-* 46. Sc. scutellatus thorace inermi, capite tuberculis tribus, *nensis.* elytris striis crenatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 548. 28.

*Fn. Sv.* 382.

Habitat in Europæ stercore.

Affinis Sc. Fossori, at minor.

*Fosfor.* 47. Sc. scutellatus thorace inermi retuso, capite tuberculis tribus: medio subcornuto. *Linn. Syst. Nat.* II. 548. 31. *Fn. Sv.* 384.

Scara-

**Scarabaeus totus niger spinulis tribus transversim positis** *Geoff. Hist. I. 82. 20.*

Habitat in Europae fabulosis, stercoratis.

Magnitudine variat.

48. Sc. scutellatus thorace inermi, capite tuberculis tribus *terrestris.* aequalibus, elytris substriatis.

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis Sc. Fossori at triplo minor. Tubercula capitis minora, breviora, obtusiora. Elytra striata.

49. Sc. scutellatus thorace inermi, capite mucronibus tribus, corpore violaceo, abdomine testaceo. *Linn. Syst. Nat. II. 548. 304.* *maurus.*

Habitat in Mauritania.

Oblongus viride coeruleus: abdomine villoso lute-scente.

50. Sc. scutellatus testaceus capite bituberculato, elytris *testaceus.* punctato striatis.

Habitat in Anglia. *Dr. Lee.*

Statura S. vernalis at triplo minor, totus pallide testaceus. Tubercula duo parva in fronte. Thorax convexus punctis vagis plurimi adspersus. Elytra striata striis punctatis. Subtus hirtus.

51. Sc. scutellatus ater thorace inermi, capite tuberculato, *fimetarius.* elytris rubris. *Linn. Syst. Nat. II. 548. 32. Fn. Sv. 385. rius.*

Scarabaeus capite thoraceque nigro antennis elytrisque rubris. *Geoff. Hist. I. 81. 18.*

Scarabaeus fimetarius *Scopoli Ent. 20.*

Scarabaeus pillularius nonus. *Raj. Inf. 106. n. 9.*

Scarabaeus equinus medius coleoptris nigris, collaris nigro. *Frisch. Inf. 4. pag. 55. tab. 19. fig. 3.*

Habitat frequens in Europae stercoribus.

Tubercula capitis tria.

51. Sc. scutellatus thorace subinermi, capite tubculo unico, elytris nigris, abdomine rufo. *bicolor.*

Habitat in Germania *D. de Haffort:* corpus parvum ovatum gibbum. Caput nigrum, ore antennisque rufis. Clypeus subrotundus, integer, in medio tubculo elevato, reflexo. Thorax ater, glaber, punctatus;

status; In medio canaliculatus, utrinque puncto paruo prominulo. Elytra atra striata. Subtus uti et pedes rufi.

*erraticus.* 53. Sc. scutellatus thorace inermi laevi, capite tuberculo unico, elytris fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 548. 29. *Fn. Sv.* 383.

Habitat in Europae stercoribus, viis.

*confusus.* 54. Sc. scutellatus thorace inermi marginibus lateralibus albidis, capite tuberculato, elytris griseis maculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 549. 34. *Fn. Sv.* 387.

Scarabaeus capite thoraceque nigro glabro, elytris griseis, pedibus pallidis. *Geoff. Ins.* I. 82. 19.

Scarabaeus pillularius decimus. *Raj. Ins.* 108.

Habitat cum congeneribus.

Affinis sordido, at minor.

*sordidus.* 55. Sc. scutellatus capite tuberculato, thorace nigro a margine pallido, puncto nigro, elytris griseis.

Habitat in Anglia.

Statura S. confusati, at paulo maior. Clypeus rotundatus, integer, niger macula utrinque pallida tuberculisque tribus, intermedio subcornuto. Thorax laevis, glaber, ater, margine omni pallido: punctum utrinque nigrum in margine pallido. Elytra striata grisea sutura obscuriori. Subtus nigro griseo-que variegatus pedibus pallidis.

*granarius.* 56. Sc. scutellatus niger thorace inermi, clypeo tuberculo solitario, elytris postice testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 547. 23.

B. Scarabaeus haemorrhoidalis scutellatus thorace inermi, capite tuberculato, elytris apice rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 548. 33. *Fn. Sv.* 386.

Habitat in Europae suffocatis. Elytra postice ultra dimidium testacea.

*marijanus.* 57. Sc. scutellatus capite tuberculato, elytris laevibus glaucis fusco punctatis. *Linn. Syst. Nat.* 549. 35.

Habitat in America.

Magnitudo S. Aloei. Abdomen et femora ferruginea.

An foemina inerinis Sc. Herculis?

\*\*\* *Scut-*

\*\*\* *Scutellati, mutici capite et thorace inermi.*

58. Sc. scutellatus, clypei centro prominulo, elytris antice *scaber.*  
scabris.

Scarabaeus *scaber* *scutellatus* *muticus* *thorace elytrisque*  
*antice scabris.* *Linn. Syst. Nat.* II. 549. 37. *Mus. Lud.*  
*V/r. 17.*

Habitat in Indiis.

Elytra apice glauca. Clypeus in medio prominet.

59. Sc. scutellatus *mutiens* *pedibus anticis arcuatis longis-*  
*simis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 549. 39. *Mus. Lud. V/r. 18.* *longiman-*  
*nus.*

*Aub. Miscell. tab. 41. fig. 1.*

Habitat in India.

Femora antice dente valido armata.

60. Sc. scutellatus *muticus ater*, clypeo rhombeo: vertice *stercora-*  
 *prominulo elytris sulcatis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 551. 42. *rius.*  
*Fn. Sv. 388.*

Scarabaeus *ater* dorso glabro, elytris sulcatis, capitis  
clypeo rhomboide centro prominulo. *Geoff. Ins.* I.  
pag. 75. n. 9.

Scarabaeus *magnus niger vulgatissimus*, antennis arti-  
culatis. *Raj. Ins.* p. 74. n. 1.

Scarabaeus *magnus e purpura niger*, tibiis omnium  
pedum serratis. *Lst. Scar. Angl.* 380. n. 4.

Scarabaeus *stercorarius niger major.* *Frisch. Ins.* 4. pag. 13.  
tab. 6.

Scarabaeus *stercorarius vel simanus Merret.* pin.  
pag. 201.

Habitat in Europa sub stercore.

Ab Ægyptiis sole consecratur, qui semper marem  
credebant absque copula ova ponentem.

Vesperi circumvolitat ingenti cum susurro, serenum  
diem annuntians. Infestatur acaris, Ichneumone.  
Varietatem vidimus elytris obscure rufis.

61. Sc. scutellatus *muticus elytris glabris laevissimis, cly-*  
*peo rhombeo, vertice prominulo.* *Linn. Syst. Nat.* II.  
*551. 43. Fn. Sv. 389.* *vernalis.*

Scarabaeus *coeruleuscens*, dorso elytrisque glabris lae-  
vissimisque capitis clypeo rhomboide, centro pro-  
minulo. *Geoff. Hist.* 77. 10.

18 I. ELEVTERATA. Scarabaeus.

*Scarabaeus vernalis. Scopoli Ent. 27.*

Habitat sub stercore Europae.

Praecedenti simillimus, et forte ejus varietas.

*invencus.* 62. Sc. scutellatus muticus thorace antice impresso mucronato.

Habitat in America. *Dom. Banks.*

Statura et magnitudo Sc. stercorarii. Capitis clypeus rotundatus, submarginatus, striga media transversa, elevata. Thorax rotundatus, punctatus, ater antice puncto parvo impresso, et sub hoc prominet mucro brevissimus. Elytra picea crenato striata. Subtus piceus, hirtus.

*splendidus.* 63. Sc. scutellatus muticus viridi nitens, elytris striatis.

Habitat in America. *D. Drury.*

Statura S. stercorarii, at triplo minor totus viridi nitens, immaculatus. Capitis clypeus emarginatus. Thorax rotundatus, laevis puncto lateral i utrinque impresso. Scutellum triangulare antice subelevatum. Elytra crenato striata. Tibiae dentatae.

*Cephus.* 64. Sc. scutellatus rufus elytrorum sutura apicibusque nigris.

Habitat - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Statura exacte Sc. vernalis. Caput fuscum antennarum clava valida verticeque prominulo transverso. Thorax rotundatus, ciliatus, rufus, postice rotundatus margine punctoque lateral i nigris. Scutellum nigrum. Elytra striata rufa, sutura apicibusque nigris.

*Laborator* 65. Sc. scutellatus muticus ater, thorace punctato, elytris striatis, clypeo emarginato.

Habitat in stercore bovino Brasiliae. *D. Banks.*

Statura exacte Sc. aratoris, at duplo maior totus ater. Clypeus emarginatus. Thorax vage punctatus. Elytra striata. Pedes nigri.

*Arator.* 66. Sc. scutellatus muticus niger: thorace laevi, elytris punctato striatis.

Habitat ad Cap. B. S.

Statura et magnitudo S. Fosforis. Capitis clypeus integer subscaber. Antennae ferruginea. Thorax glaber, laevis. Elytra striato punctata. Femora antica ferruginea.

67. Sc. scutellatus muticus laevis niger ano barbato. *barbatus.*  
 Habitat in India. *Mus. Tortianum.*  
 Statura S. Fosforis, totus laevis glaber nitens. Ultimum abdominis segmentum ultra elytra prominet, pilis longioribus ferrugineis barbatum.
68. Sc. scutellatus muticus ater: thorace glabro nitido, *rufipes.* elytris striatis.  
 Scarabaeus rufipes muticus ater, antennis pallidis, elytris laevibus. *Linn. Syst. Nat. II. 559. 85. Fn. Sv. 403.*  
 Habitat in stercore.  
 Varietas duplo minor pedibus nigris vix differt.
69. Sc. scutellatus muticus ater, elytris griseis nigro *luridus.* striatis.  
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*  
 Caput et thorax atra, nitida, mutica. Elytra striata grisea lineolis maculisque nigris.
70. Sc. scutellatus muticus oblongus niger, elytris maculis *4 macula-* duabus rubris *tus.* *Linn. Syst. Nat. II. 558. 84. Fn. Sv. 398.*  
 Habitat in Anglia.  
 Magnitudo et statura omnino S. subterranei. Thorax glaber, nitens, immaculatus. Elytra obsolete striata maculis duabus rubris.
71. Sc. scutellatus muticus niger, elytris plaga rufescente. *plagiatus.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 539. 85.*  
 Habitat Upfaliae.  
 Affinis Sc. subterraneo.
72. Sc. scutellatus muticus niger elytris sulcatis piceis fer- *testudina-* rugineo punctatis. *rinus.*  
 Habitat in Anglia. *D. Solander.*  
 Parvus statura Sc. sulcati. Capitis clypeus rotundatus, emarginatus vix tuberculatus. Thorax scaber ater. Elytra profunde sulcata picea punctis ferrugineis per paria distributis adspersa. Pedes picei.
73. Sc. scutellatus muticus ater, elytris testaceis futura *merdarius* nigra.  
 Habitat in Europae stercore.  
 Latera thoracis subtestacea. Affinis Sc. quisquilio, at futura elytrorum nigra.

- quisqui-* 74. Sc. scutellatus muticus ater elytris lividis.  
*tius.* Scarabaeus quisquilius exscutellatus ater glaber, elytris  
 lividis testaceis. *Linn. Syst. Nat. 11. 558. 83. Fn. Sv. 397.*  
 Scarabaeus minimus. *Scopoli Ent. 29.*  
 Habitat in Europae stercore.  
 Scutellum parvum nigrum.
- porcatus.* 75. Sc. scutellatus muticus fuscus, elytris porcatis.  
 Habitat in stercore Lipsiae.  
 Statura et magnitudo S. asperi totus obscure fuscus.  
 Elytra porcata vel profunde sulcata sulcis transversim  
 striatis.
- Stercora-* 76. Sc. scutellatus muticus ater laevis, elytris striato  
 crenatis, clypeo emarginato.  
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*  
 Statura et magnitudo S. subterranei. Clypeus niger  
 laevis antice emarginatus. Thorax laevis muticus  
 ater, margine antico tenuissime pallescidente. Elytra  
 atra sulcata sulcis crenulatis.
- asper.* 77. Sc. scutellatus muticus capite thoraceque transversim  
 sulcatis, elytris striatis.  
 Habitat in plantis putridis Europae.  
 Magnitudo et statura Sc. testudinarii. Capitis clypeus  
 emarginatus. Pedes rufescentes.
- unipuncta-* 78. Sc. scutellatus muticus ater coleoptris flavescentibus  
*tus.* puncto communi nigro.  
 Coccinella unipunctata coleoptris flavescentibus puncto  
 communi nigro. *Linn. Syst. Nat. 11. 579. 6. Fn. Sv. 470.*  
 Habitat in Europa.  
 Tempore sereno per aera volitat.
- \* \* \* \* *Exscutellati thorace cornuto.*
- Facchus.* 79. Sc. exscutellatus thorace prominente bilobo, capit is  
 cornu recurvo simplici.  
 Habitat ad Cap. B. S. *Mus. Dom. Banks.*  
 S. Molosso minor niger. Capitis clypeus rotundatus,  
 margine reflexo apice emarginato. Cornu elonga-  
 tum erectum apice recurvum. Thorax subpunctatus  
 utrinque retusus dorso prominente bilobo. Lineolae  
 duae elevatae utrinque ad marginem.

Foemina

Foemina capitis cornu brevissimo truncato thoracisque tuberculo antico transverso elevato.

80. Sc. exscutellatus thoracis cornu plano: subtus dentato capitis truncato tridentato. *Oedipus.*

Habitat at Cap. P. S. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo praecedentis. Clypeus rotundatus emarginatus. Capitis cornu compressum erectum, breve, apice truncatum denticulis tribus, intermedio paulo longiore. Thorax postice rotundatus, lateribus puncto impresso. Cornu brevissimum, planum fere fornicatum, apice rotundatum, subtus unidentatum. Elytra substriata.

81. Sc. exscutellatus thorace bicorni, cornubus brevissimis, capitis cornu erecto subulato. *Pithecius.*

Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*

Magnitudo S. stercorarii totus ferrugineus. Capitis Clypeus rotundatus integer cornu erecto, subulato, simplicissimo. Thorax rotundatus in medio cornubus duobus erectis brevissimis. Elytra striata.

82. Sc. exscutellatus thorace antice bicorni, postice elevato tricorni, capitis cornu compresso serrato. *Rosaliss.*

Habitat in America. *Dom. Baker.*

83. Sc. exscutellatus, thorace tridentato, capitis cornu recurvo, elytris striatis. *Silenus.*

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

Parvus capitis clypeus rotundatus emarginatus in medio cornu porrecto, acuto, recurvo. Thorax glaber dentibus tribus intermedio majori, transverso. Elytra crenato striata.

84. Sc. exscutellatus thorace tricorni, clypeo sinuato bicorni. *Midas.*

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo Molossi. Capitis clypeus porrectus, rugosus, in medio fovea lata excavatus, margine sinibus tribus erosus, denteque utrinque laterali valido recurvo armatus. Cornua duo brevia, erecta, subulata in anteriore clypei parte denticuli-

que duo in medio. Thorax punctatus, antice retusus pilisque ferrugineis vestitus, tricornis cornibus depresso, planis, lateribus, crenatis acutiusculis, intermedio latiori emarginato. Elytra striata.

*Hama-  
dryas.*

85. Sc. exscutellatus thorace tricorni: intermedio plano, acuto bidentato, clypeo reflexo bicorni.

Habitat ad Cap. B. S. *Mus. Dom. Banks.*

Statura S. Midas, at paulo major. Clypeus reflexus rotundatus subinteger, in medio elevatus cornubus duobus erectis brevibus obtusis. Thorax antice retusus utrinque fovea magna impressus. Cornua tria brevia plana, acuta intermedio majori bidentato. Elytra striata basi denticulis tribus elevatis brevibus.

*lunaris.* 86. Sc. exscutellatus thorace tricorni: intermedio obtuso bifido, capitis cornu erecto, clypeo emarginato. *Linn. Syst. Nat. II. 543. 10. Fn. Sv. 379.*

Copris capitis clypeo lunulato, margine elevato corniculo denticulato. *Geoff. Inf. I. 88. 1.*

Scarabaeus lunaris. *Scop. Ent. 22.*

Scarabaeus ovinus tertius s. capite operculato. *Raj. Inf. pag. 103.*

Scarabaeus nasicornis medius. *Frisch. Inf. 4. pag. 25. tab. 7.*

Habitat in Europae stercoratis.

Clypeus in utroque sexu cornutus, at foemina thorace mutico.

*Rhada-  
mistrus.*

87. Sc. exscutellatus thorace late foveolato antice cornu recurvo, capite inermi, elytris rufis sutura punctisque duobus nigris.

Habitat Tranquebariae Koenig: Parvus. Capitis clypeus rotundatus integer aeneus antice albicans argenteo nitens. Thorax magnus elytris longior dorso valde excavato, margine foveae elevato et antice cornu parvo recurvo. Color aeneus, lateribus pallidis puncto parvo aeneo. Elytra striata rufa sutura punctisque duobus nigris. Subtus nigricans margine pallecente. Pedes nigri femoribus pallidis.

88. Sc. exscutellatus thorace prominentia triplici, capite *Belzebul.*  
tricorni: intermedio majori.

Habitat in America. *Drury.*

Statura S. Carolini, at duplo minor. Capitis clypeus rotundatus, vix emarginatus. Capitis cornu breve, simplex, basi corniculis duobus minoribus armatum. Thorax antice prominentiis tribus, intermedio multo latiore. Elytra striata. Tibiae intermediae elevatae, dentatae.

89. Sc. exscutellatus thorace quadricorni, intermediis brevissimis, capitis cornu recurvo, ferrato. *Faunus.*

Habitat Cayennae. *D. Mauduit.*

Statura S. Molossi. Capitis clypeus rotundatus, integer. Cornu longitudine fere thoracis recurvum, intus obtuse serratum. Thorax elevatus, gibbus lateribus valde retusis, postice loco scutelli rotundatus punctis duobus parvis impressis. Cornua quatuor lateralibus longioribus subarcuatis, crassis, compressis, apice truncatis; intermediis brevissimis, conicis. Elytra sulcata. Pedes omnes dentati.

Foemina similis, at cornubus minoribus lateralibus haud truncatis, sed acutis, conicis.

\*\*\*\*\* *Exscutellati, thorace inermi, capite cornuto.*

90. Sc. exscutellatus thorace prominentia duplici, capite *Bonafus.*  
tricorni, lateralibus majoribus, arcuatis.

Habitat Tranquebariae. *Koenig.*

Statura S. Vaccae. Capitis clypeus aeneus antice rotundatus margine elevato, postice cornubus tribus, intermedio brevissimo erecto subulato, lateralibus longioribus arcuatis. Thorax aeneus antice subcanaliculatus prominentia duplici, postice rotundatus. Elytra obscura. Subtus niger pedibus fuscis.

91. Sc. exscutellatus thorace antice mucronato, capite *Bison.*  
cornubus duobus lunaribus. *Linn. Syst. Nat. II.*  
547. 27.

Habitat in Hispania.

Totus ater. Thorax antice prominent mucrone exerto,  
obtuso, postice puncta duo impressa.

Foemina thoracis margine antico carinato elevato mucroneque capitis parvo distincta.

*Sagitta*. 92. Sc. exscutellatus, thorace antice mucronato, capitis cornu solitario, erecto.

Habitat ad Cap. E. S. *Mus. Dom. Banks.*

Statura S. Nuchicornis. Capitis clypeus rotundatus, integer niger, cornu erecto valido clypei longitudo. Antennarum clava pallida. Thorax laevis niger margine pallescente, antice mucronatus in spinam prominentem validam. Elytra striata grisea. Pedes antici atri macula baseos aurea, reliqui variegati.

*Bucephala*. 93. Sc. exscutellatus thorace retuso, quadridentato, capitis clypeo angulato unicorni.

Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*

Statura S. Molossi, at duplo major. Totus ater. Capitis clypeus porrectus, cornu brevi recurvo. Thorax scaber antice retusus quadridentatus dentibus lateralibus sublongioribus. Elytra striata.

*Molossus*. 94. Sc. exscutellatus thorace retuso bidentato utrinque impresso clypeo unicorni lunato integro, elytris laevibus. *Linn. Syst. Nat. II. 543. 8. Mus. Lud. Vlr. II. Amoen. Acad. VI. 391.*

*Drury. Ins. Tom. I. tab. 32. fig. 2.*

Habitat in China, officinalis.

*Lancifer*. 95. Sc. exscutellatus violaceus capite cornu angulato, thorace dentato, elytris sulcatis.

Scarabaeus lancifer exscutellatus violaceus, capite cornu angulato, thorace inaequali, elytris sulcatis. *Linn. Syst. Nat. II. 544. 13.*

Lancifer violaceus. *Voet. colioper. 2. tab. I.. fig. 1. 2.*

Taurus. *Margr. brasili. 247.*

Habitat in Indiis.

Statura S. Mimas, at multo major totus violaceus.

*Paniscus*. 96. Sc. exscutellatus thorace retuso, elevato, capitis cornu recurvo, clypeo fisso.

Scarabaeus valgus thorace mutico capite cornuto femoribus secundi paris remotis. *Linn. Syst. Nat. II. 546. 20. Mus. Lud. Vlr. 15. 2.*

*Scarabaeus Marianus.* Pet. Gaz. tab. 27. fig. 8.

Habitat in America. Mus. Brit.

Statura S. Molossi, at paulo minor, totus ater. Capitis clypeus rotundatus prominens apice fissus, cornuque medio porrecto, recurvo. Thorax antice valde retusus, in medio elevatus, margine acuto subdentato. Elytra striata.

97. Sc. exscutellatus capitis cornu erecto brevissimo, *carolinus.* clypeo integro, elytris sulcatis.

*Scarabaeus carolinus exscutellatus*, thorace retuso capite ovali integro unicorni, elytris striatis. Linn. Syst. Nat. II. 545. 16.

*Scarabaeus carolinus*, Drury. Inf. I. tab. 35. fig. 2.

Habitat in America.

Simillimus praecedenti, at capitis cornu multo minus. Clypeus integer. Elytra profunde sulcata, quorum sulci quatuor interiores postice profundiores, tométo cinereo repleti. Subtus pilis ferrugineis adspersus.

98. Sc. exscutellatus thorace inermi punctis quatuor impressis, capitis cornu recurvo bidentato. Tarsis anticis nullis. *Sphinzi.*

*Scarabaeus spinipes*, Drury. Inf. I. tab. 35. fig. 8.

Habitat in America.

Statura et magnitudo Sc. Bisonis totus depresso niger aeneo nitens. Clypeus rotundatus integer in medio cornu recurvo brevi acuto basi utrinque unidentato. Thorax glaber, laevis basi rotundatus in medio utrinque puncto unico et postice duobus approximatim impressis. Scutellum minimum. Elytra striata. Pedes antici constant duabus tantum articulis, femore crasso, compresso, et tibia porrecta, arcuata, dentata apice acuta. Pedes secundi paris femoribus incrassatis tibiis clavatis dentatis, tarsis brevissimis. Foemina capitis clypeo tuberculato.

99. Sc. exscutellatus thorace inermi retuso angulato, capite obsolete bicorni, elytris inauratis striatis *Linn.* *Mimas.* Syst. Nat. II. 545. 17. M. L. V. 9.

*Copris viridis splendens* Voit. coeoptir. 4. tab. I. fig. 4.

*Scarabaeus inaequalis*, farctus, viridi nitens capite bicorni *Roef. Inf. 2.* *Scarab. 1. tab. B. fig. 1.*

Habitat in America meridionali. Clypeus integer.

**Taurus.** 100. Sc. exscutellatus thorace inermi, occipite cornubus binis reclinatis arcuatiss *Linn. Syst. Nat. 11. 547. 26.*

*Scarabaeus illyricus*, *Scopoli Ent. 25.*

*Scarabaeus ovinus* 2. *Raj. Inf. 103. n. 2.*

*Copris niger* capite pone bicorni, corniculis tenuibus arcuatiss longitudine thoracis, thorace utrinque sinuato. *Geoff. Inf. 1. 92.*

*Scarabaeus Taurus* capite cornubus duobus lunatis lateribus. *Schreb. Inf. fig. 6. 7.*

Habitat in Germania, Gallia.

**Vacca.** 101. Sc. exscutellatus, thorace inermi retuso, occipite spina erecta gemina. *Linn. Syst. Nat. 11. 547. 25.*

*Copris obscure aeneus*, capite pone bicorni, thorace antice prominente, elytris rufis nigro maculatis. *Geoff. Inf. 1. 90. n. 5.*

Habitat in arvis Brandenburgicis.

**Carnifex.** 102. Sc. exscutellatus thorace inermi angulato, capitis cornu erecto, corpore aeneo.

*Scarabaeus Carnifex* exscutellatus thorace inermi plano angulato, capitis cornu reflexo, corpore aeneo. *Linn. Syst. Nat. 11. 546. 22.*

*Scarabaeus Carnifex*. *Drury. Inf. 1. tab. 35. fig. 3. 45.*

Habitat in America.

Synonyma pleraque, a *Linnaeo* numerata, falsa.

**bispinus.** 103. Sc. exscutellatus thorace inermi, clypeo cornuto emarginato, elytris striatis. *Linn. Syst. Nat. 11. 546. 21.* *M. L. V. 12.*

*Rhinoceros lusitanicus* niger splendens vaginis striatis.

*Petiv. Gazoph. tab. 8. fig. 4.*

*Roef. Inf. 2. tab. B. fig. 2.*

Habitat in Europa Australi.

**nuchicor-** 104. Sc. exscutellatus thorace rotundato inermi, occipite spina erecta armato. *Linn. Syst. Nat. 11. 547. 24.* *Fn. 381.*

*Copris fusco niger*, capite clypeato angulato, pene curvato, elytris ferrugineo nebulosis, brevibus striatis.

*Geoff. Inf. 1. 89. 3.*

Scara-

*Scarabaeus ovinus* 3 s. capite operto. *Raj. Inf.*  
103. n. 2.

*Scarabaeus capite thoraceque atro opaco, elytris cinc-*  
*reis nigro nebulosis.* *Linn. Iter. Gosl.* 41.

*Roef. Inf.* 2. *Scarab.* 1. tab. A. fig. 4.

Habitat in Europae stercore.

Mas muticus, faemina a tergo cornuta.

105. *Sc. exscutellatus thorace inermi griseo nigro puncta-* *verticicornis.*  
to, capitis cornu erecto brevissimo.

Habitat in Anglia, *Mus. Dom. Tunstall.*

Statura et summa affinitas *S. nuchicornis*, at minor.

Capitis clypeus rotundatus aeneus cornu brevissimo  
recurvo. Thorax rotundatus inermis griseus pun-  
ctis duobus anticis et uno ad latera nigris. Elytra  
laevia grisea. Pedes pallidi.

106. *Sc. exscutellatus ater capitis tuberculo unico, ely-* *Sulcator.*  
tris striatis.

Habitat Cajennae. *D. Mallet.*

Statura exacte oblonga *S. Fosforis*, at paulo major.

Clypeus rotundatus in medio tuberculo unico sub-  
spinoso. Thorax gibbus, laevis ater puncto baseos  
impresso. Elytra atra, striata.

107. *Sc. exscutellatus ater, thorace inermi capite bitu-* *4 pustula-*  
berculato, elytris maculis duabus rubris. *tus.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. D. Banks.*

Statura omnino *S. Schreberi*, at duplo minor, ater,  
nitens. Clypeus rotundatus: basi tuberculis duobus  
approximatis et fere connexis. Thorax gibbus ro-  
tundatus ater, nitens, laevis. Elytra abdomine bre-  
viora, striata, atra: macula baseos apicisque rubra.  
Pedes nigri.

108. *Sc. exscutellatus niger thorace inermi crenato, cly-* *cristatus.*  
peo tuberculato quadridentato.

Habitat in Aegypto, *D. Forskahl.*

Statura *S. laticollis*, at paulo minor. Clypeus antice  
quadridentatus, et in medio tuberculo elevato fer-  
ruginoso. Thorax inermis rotundatus marginibus  
crenatis. Elytra laevia. Pedes ciliati.

109. *Sc.*

*Sacer.* 109. Sc. exscutellatus clypeo sexdentato, thorace inermi crenulato, tibiis posticis ciliatis, elytris laevibus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 545. 18. *M. L. V.* 13. *Amoen. acad.* 6. tab. 3. fig. 170.

*Scarabaeus laevis*, thorace inermi capite antice sex-dentato. *Osbeck. It.* 51.

*Scarabaeus pilularius niger*, clypeo antice ferrato, elytris nebulose maculatis submollibus planusculis. *Loefl. It.* 20.

Habitat in Europa australi.

\* \* \* \* \* *Exscutellati, mutici.*

*laticollis.* 110. Sc. exscutellatus muticus niger, clypeo sexdentato, elytris sulcatis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 549. 38.

*Copris niger*, capite clypeato, margine ferrato, thorace lato laevi, elytris striatis, *Geoff. Hist. Inf.* 1. 89. 2.

*Scarabaeus pillularius*. *Raj.* pag. 105. 4.

Habitat in China, Europa australi.

Nimis affinis videtur S. sacro.

*festivus.* 111. Sc. exscutellatus muticus thorace nigro maculato, elytris rubro aeneis, sterno porrecto. *Linn. Syst. Nat.* 11. 552. 52.

*Roef. Inf.* 11. *Scar.* 1. tab. B. fig. 8.

Habitat in America.

Color supra ruber nitidus capite thoracisque margine antico nigris.

*gibbosus.* 112. Sc. exscutellatus muticus clypeo quadridentato, elytris basi gibbere notatis.

Habitat in America.

*Paulo major* S. *stercorario obscure niger minime nitidus.*

*Capitis clypeus rotundatus apice quadridentatus palpis antennarumque clava ferruginea.* Thorax laevis, glaber, obscurus, antice excisus pro capite, lateribus angulatis, postice rotundatus absque scutello. Elytra abdomine breviora, laevia obscura, basi ad futuram gibbere elevata notata. Femora antica nigra, basi puncto ferruginaeo. Pedes postici sublongiores incurvi.

113. Sc. exscutellatus muticus clypeo quadridentato, cly- *novae Hol-*  
tris fulcatis. *landiae.*  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. D. Banks.*  
Magnitudo S. ovati totus ater. Thorax subpunctatus,  
elytra fulcata.
114. Sc. exscutellatus muticus clypeo bidendato, thorace *Koenigii.*  
scabro, elytris variolosis.  
Habitat Tranquebariae, *Koenig.*  
Statura S. Schaefferi totus niger. Clypeus scaber antice  
bidentatus. Thorax rotundatus scaber, postice fo-  
veola parva in medio excavatus. Elytra vario-  
lofa sive striata punctisque majoribus impressis va-  
gis excavata.
115. Sc. exscutellatus muticus nigro cupreus, clypeo *cupreus.*  
emarginato, thorace gibbo.  
Habitat in Africa. *D. Yeats.*  
Major S. laticolli totus niger colore cupreo tinctus,  
glaber, laevis. Clypeus rotundatus emarginatus.  
Thorax valde gibbus antice punctis duobus parvis  
impressus, postice rotundatus.
116. Sc. exscutellatus muticus niger opacus, clypeo emar- *flagella-*  
ginato, elytris scabris. *tus.*  
Habitat ad Cap. B. S.  
Statura et magnitudo S. Schaefferi. Capitis clypeus  
rotundatus antice late emarginatus. Thorax gib-  
bus, rotundatus, laevis. Elytra punctis elevatis  
majoribus in lineas digestis scabra. Pedes medio-  
cres mutici.
117. Sc. exscutellatus muticus thorace rotundato, clypeo *Schaefferi.*  
emarginato, elytris triangulis, femoribus posticis  
elongatis dentatis. *Linn. Syst. Nat. II. 550. 41.*  
Scarabaeus longipes, *Scopoli Ent. 84.*  
Copris niger pedibus longis, femorum posteriorum  
basi denticulata, elytris postice gibbis. *Geoff. Ins.*  
*I. 92. 9.*  
Habitat in Germaniae stercoribus.
118. Sc. exscutellatus muticus niger, opacus laevis, sub- *pilularius.*  
tus aeneus, thorace postice rotundato. *Linn. Syst.*  
*Nat. II. 550. 40. M. L. V. 19.*

Pilula-

*Pilularius*, *Plin. nat.* II. 34.

Habitat in Europa australi globulos e stercore con-  
ficiens volvens. Totus niger, elytra laevia.

*squalidus*. 119. Sc. exscutellatus muticus ater, clypeo emarginato,  
elytris striatis.

Habitat in stercore bovino Brasiliae. *Muf. Dom. Banks.*  
Magnitudo S. Schreberi. Caput et thorax atra, laevia,  
nitida, clypeo emarginato lobis rotundatis. Elytra  
obscuriora striata.

*Schreberi*. 120. Sc. exscutellatus muticus ater, glaber, elytris ma-  
culis duabus rubris. *Linn. Syst.* II. 551. 45.

*Copris niger nitidus*, thorace antice gibbo duplice  
elytro singulo macula duplice rubra. *Geoff. Inf.*  
I. 91. n. 7.

Habitat Halae Saxonum.

*pustula-* 121. Sc. exscutellatus muticus ater, elytrorum basi ma-  
cula rufa.

Habitat in nova Hollandia, *Muf. D. Banks.*

Statura exakte et nimia affinitas S. 4 pustulati, at paulo  
minor, caput muticum et macula unica ad basin  
elytrorum.

*triangu-* 122. Sc. exscutellatus muticus niger thoracis margine fe-  
morisque pallidis, clypeo emarginato.

*Scarabaeus triangularis*, *Drury. Inf.* I. tab. 36. fig. 7.

Habitat Surinami.

Statura omnino S. nuchicornis totus laevis.

*cinctus*. 123. Sc. exscutellatus muticus niger elytrorum margine  
pallido, clypeo emarginato.

Habitat in China, *D. Drury.* S. nuchicorni paullo  
longior. Thorax ater laevis, nitens. Elytra cre-  
nato striata nigra margine pallido, qui tamen color  
basin elytrorum haud attingit.

*ovatus*. 124. Sc. exscutellatus muticus niger, thorace rotundato  
subaeneo, elytris abbreviatis. *Linn. Syst. Nat.* II.  
551. 46.

Habitat in stercore bovino Halae, Angliae.

Statura omnino S. nuchicornis, at quadruplo minor.

3. TROX. *Palpi quatuor capitati.**Maxilla bifida.**Antennae lamellatae.*1. T. thorace elytrisque rugosis, thorace integerrimo. *sabulosus.*

*Scarabaeus sabulosus scutellatus muticus niger opacus tuberculis rugosis, antennis basi pilosis.* *Linn. Syst. Nat. II. 551. 48. Fn. Sv. 390.*

*Scarabaeus rugosus, Scop. Ent. Carn. 23.*

Habitat in collibus fabulosis Europae.

2. T. griseus thorace marginato margine postice dentato, *suberosus.*  
elytris striatis.

Habitat in Brasilia, *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, at major. Thorax carinatus marginatus postice dente unico armatus. Elytra minus rugosa, quam in praecedente.

3. T. nigricans, thorace postice utrinque emarginato, *spinicornis.*  
antennis spinosis.

Habitat - - - - *Mus. Dom. Tunstall.*

Statura T. fabulosi, at minor. Antennae lamellatae primo articulo spina valida fere longitudine stipitis armato. Clypeus rotundatus integer. Thorax scaber angulis posticis emarginatis. Elytra punctis elevatis vix striata. Pedes nigri.

4. MELOLONTHA. *Maxilla brevis cornea;**apice multidentata.**Antennae lamellatae.*1. M. testacea albo maculata, scutello macula duplii alba, antennis heptaphyllis. *Fullo.*

*Scarabaeus Fullo scutellatus muticus, antennis heptaphyllis, corpore nigro pilis albis, scutello macula duplii alba.* *Linn. Syst. Nat. II. 553. 57. Fn. Sv. 394. Scop. Ent. carn. 12.*

*Scarabaeus antennarum lamellis maximis corpore nigro, squamis albis varie maculato.* *Geoff. I. f. I. 69. 2.*

*Scarabaeus Fullo, Raj. Inf. 93. 9.*

Scara-

**Scarabaeus** albo maculatus Julii. *Frisch. Inf.* II. pag. 22.  
tab. I. fig. I.

**Scarabaeus** primae classis variegatus, *Roef. Inf.* 4. tab. 30.

*Ephem. Nat. Cur. Dec.* 2. *Ann.* 6. *Off.* 239.

*Aub. miscell.* tab. 16. fig. med.

Habitat in Europae sylvis, arenofis.

**vulgaris.** 2. M. testaceus thorace villoso, cauda inflexa, incisuris abdominis albis.

**Scarabaeus** Melolontha scutellatus muticus testaceus thorace villoso, cauda inflexa incisuris abdominis albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 554. 60. *Fn. Sv.* 392. *Geoff. Inf.* I. 70. *Scopol. carn.* 16.

**Scarabaeus** arboreus vulgaris major, *Raj. Inf.* 104. 1.

**Scarabaeus** maximus rufus uropygio deorsum inflexo, *Lift. Sc. Angl.* 379.

**Scarabaeus** major arboreus castaneus, *Petiv. Gaz.* pag. 29. tab. 19. fig. 2.

**Melolontha** vulgaris, *Roef. Inf.* II. **Scarab.** I. tab. I.

Larva grisea capite pedibusque testaceis devorat radices plantarum. **Scarabaeus** folia arborum, vesperi volitans tilia intacta.

Devoratur a vespertilione murino, autumnales morbos copiosior praenuntiat, oleum infusum cimicifugum reddit. *Scopoli.*

Variat thorace rufo et nigro, et utraque varietas alternat annuatim. *Roefel.*

**occidentalis.** 3. M. testacea thorace pubescente, elytris lineis quatuor niveis.

**Scarabaeus** occidentalis scutellatus muticus testaceus, thorace pubescente, elytris lineis quatuor niveis parallelis. *Linn. Syst. Nat.* II. 555. 62.

*Drury Inf.* 2. tab. 32. fig. 2.

Habitat in Hispania.

Simillima M. vulgari.

**fervida.** 4. M. glabra testacea, clypeo emarginato.

Habitat in America septentrionali.

Nimis affinis praecedenti, at minus villosa totaque testacea.

5. M. testacea, thorace villoso, elytris luteo-pallidis: *soltitialis*.  
lineis tribus pallidioribus.  
Scarabaeus solstitialis scutellatus muticus testaceus,  
thorace villoso, elytris luteo-pallidis: lineis tribus  
albis parallelis. *Linn. Syst. Nat.* II. 554. 61. *Geoff. Ins.*  
I. 74. 7. *Fn. Sv.* 393. *Scap. Car.* 3.  
Scarabaeus secundus arboreus. *Raj. Ins.* 105. 2.  
Scarabaeus alter ex flavo subcinereus. *Lst. Scar.* 301. 2.  
Scarabaeus lanuginosus arboreus. *Moffet. Ins.* pag.  
160. fig. 3.  
Scarabaeus pectinatus minor villosus. *Petiv. Gaz.*  
pag. 36. tab. 22. fig. 9.  
Scarabaeus Iunii f. solstitialis. *Frisch. Ins.* 9. pag. 30.  
tab. 15. fig. 3.  
Habitat in arboreis, praecedenti senior, ad solstici-  
tum aestivum frequentissima.
6. M. villosa testacea, abdome albicante. *ruficornis.*  
Habitat in Germania. *D. de Hattorf.*  
Statura omnino praecedentis, cuius forte varietas.  
Caput nigricans antennis rufis. Thorax et pectus  
villis densis albis tecta. Elytra testacea immaculata.  
Abdomen albidum, ano nigricante. Pedes nigri.
7. M. subtus lanata, capite thoraceque aureis, elytris *lanigera.*  
luteis.  
Scarabaeus lanigerus scutellatus muticus, subtus lana-  
tus, capite thoraceque auratis, elytris luteis. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 555. 65. *Mus. L. U.* 20.  
*Drury Ins.* I. tab. 34. fig. 6.  
Habitat in India.  
Statura M. punctatae. Clypeus truncatus, obtusus.  
Sternum antice acutum.
8. M. testacea elytris punctis tribus fuscis distantibus. *punctata.*  
Scarabaeus punctatus scutellatus muticus testaceus, ely-  
tris punctis tribus subfuscis obsoletis, distantibus.  
*Linn. Syst. Nat.* II. 557. 76. *Mus. L. V.* 23.  
*Gronov. Gazoph.* 438.  
*Drury Ins.* I. tab. 34. fig. 5.  
Habitat in America.  
Vngues arcuati acutissimi.

*glabrata.* 9. M. testacea nitida, sterno antice porrecto, obtuso.  
Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*

Statura omnino M. punctatae: supra glaberrima testacea,  
at viridi aeneo colore tincta, nitidissima. Clypeus  
late emarginatus. In capite et thorace maculae  
duae obscuriores. Scutellum triangulum. Subtus  
aenea, sterno antice porrecto obtuso, testaceo.

*viridis.* 10. M. glabra supra viridis, subtus aurea.  
Habitat in Cap. B. S. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo M. punctatae. Color supra viri-  
dis nitens immaculatus, subtus aureus, sternum  
haud porrectum.

*aenea.* 11. M. glabra aenea, abdominis lateribus albis, elytris  
acuminatis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. D. Banks.*

Statura et magnitudo praecedentis. Color supra ae-  
neus nitidus immaculatus, subtus magis coerulescens,  
pectoris abdominalisque marginibus piloso albis.  
Scutellum rotundatum. Elytra apice ad futuram  
acuminata. Sternum porrectum acutum. Femora  
linea punctorum impressorum.

*futuralis.* 12. M. viridis, elytrorum sutura flavescente.

Habitat in nova Zelandia, *Mus. Dom. Banks.*

Corpus statura et magnitudine M. punctatae. Caput  
viride, immaculatum, margine elevato. Thorax  
glaber viridis marginibus parum flavescentibus:  
postico obtuse angulato. Elytra glabra viridia, sub-  
striata sutura flavescente. Pectus et abdomen pilis  
albis tecta: sterno porrecto, acuto. Pedes virides,  
tarsis ferrugineis.

*bicolor.* 13. M. glabra supra viridis, subtus testacea, pedibus  
apice aureis.

Habitat ad Cap. B. S. *Mus. D. Banks.*

Statura praecedentis, at duplo minor: supra tota viri-  
dis, glabra, obscura, immaculata: subtus obscure  
testacea, aeneo colore tincta: Femora pallidiora.  
Tibiae et tarsi aurei.

14. M. glabra testacea, capite, thoracis elytrorumque *dorsalis.*  
dorso nigris.  
Habitat Tranquebariae. *Koenig.*  
Statura omnino M. solstitialis at glabra, et paulo minor.  
Caput atrum. Thorax itidem ater lateribus testaceis  
puncto atro. Elytra testacea linea lata dorsali atra.  
Pedes testacei tibiis posticis nigris.
15. M. glabra picea antennis pedibusque testaceis. *glacialis.*  
Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*  
Corpus magnitudine et statura M. dorsalis, piceum,  
obscurum, glabrum. Labium superius emarginatum.  
Maxilla tridentata. Pedes testacei, postici obscurores.
16. M. thorace nigro: margine pallido, elytris griseis  
nigro punctatis. *lurida.*  
Habitat ir - - - - - *Mus. Dom. Tunstall.*  
Statura praecedentium, at minor. Caput nigrum  
clypeo subintegro. Thorax niger margine laterali  
pallido. Elytra grisea macula oblonga ad marginem  
exteriorem baseos: punctis duobus ad suturam et  
unico versus apicem nigris. Pedes nigri.
17. M. glabra aenea elytris striatis; sutura lineisque *striata.*  
quatuor cupreis.  
Habitat in Terra del Fuego. *Mus. D. Banks.*  
Statura oblonga praecedentis, at minor. Caput et  
thorax aenea, glabra nitida. Scutellum obtusum  
aeneum. Elytra paulo obscuriora sulcis decem  
striata. Sutura lineaeque quatuor, quae postice  
per paria coëunt, cuprea. Corpus subtus, uti et  
pedes, atrum.
18. M. glabra testacea capite obscuriore, elytris striatis. *testacea.*  
Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*  
Statura omnino M. brunneae, at paullo major. Cor-  
pus totum testaceum, capite tamen magis nigricante,  
et punctum nigrum ad apices femorum. Labium  
emarginatum. Elytra striata.
19. M. glabra testacea, capite elytrorumque sutura nigris. *pallida.*  
Habitat in Cap. B. S. *Mus. Dom. Banks.*  
Major M. brunnea. Caput rotundatum nigrum, ore  
pallidiore. Thorax glaber laevis, testaceus. Elytra

substriata pallidiora sutura in primis ad scutellum nigra. Pedes pallidi apice nigri.

- brunnea.* 20. M. glabra testacea elytris striatis, thorace utrinque puncto notato.

*Scarabaeus brunneus* scutellatus muticus testaceus, elytris striatis, thorace utrinque puncto notato. *Linn. Syst. Nat.* 11. 556. 72.

*Scarabaeus fulvus* oculis nigris thorace glabro. *Geoff. Inf.* 1. 83. 22.

Habitat in Europae arboreis. Larvae devorant radices, declaratae folia.

- melanocephala.* 21. M. glabra rufescens, capite nigro, elytris pallidis. Habitat in Brasilia, *Mus. D. Banks.*

Statura et magnitudo M. brunneae. Clypeus rotundatus reflexus ater, orbita oculorum albida. Thorax rufescens, glaber, nitidus. Scutellum rufum. Elytra laevia pallida. Subtus uti et pedes rufescens.

- rufa.* 22. M. glabra rufescens elytris testaceis, clypeo quinquedentato.

Habitat ad Cap. B. S. *Mus. D. Banks.*

Statura et magnitudo omnino M. brunneae. Clypei margo reflexus dentibus quinque obtusissimis. Caput et thorax obscure rufescens. Elytra testacea laevia. Subtus pilis albidis hirta.

- festiva.* 23. M. supra glabra viridis thorace linea dorsali, elytris sutura nigris.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Minor M. brunnea. Caput viride nitens clypeo emarginato. Antennae ferrugineae clava nigra. Thorax viridis, glaber, nitens linea dorsali fusca. Elytra viridia nitida striis novem exarata, sutura longitudinali fusca. Corpus subtus testaceum albo pilosum. Sternum porrectum subcornutum.

- laetia.* 24. M. supra glabra aurea thoracis linea dorsali scutelloque sanguineis.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. D. Banks.*

Nimis praecedenti affinis, et forte ejus mera varietas: differt tamen colore aureo nitido, thoracis linea et scutello sanguineis elytrorumque sutura concolore.

25. M. nigro aenea elytris testaceis. *Frischii.*  
*Scarabaeus Iulii f. vitis. Frisch. Lsf. 4. p. 29. tab. 14.*  
*Habitat in vite, rosa Germaniae, Brasiliae. Dom. Banks.*  
*Simillima M. horticolae, at duplo major. Caput et thorax obscure aenea, glabra, nitida. Scutellum rotundatum aeneum. Elytra testacea futura virescente.*  
*Variat elytris thorace concoloribus.*
26. M. viridis, thoracis lateribus flavis. *Vitis.*  
*Habitat in Americae Europae vite. Mus. D. Hunter.*  
*Nimis praecedenti affinis. Corpus viride, thoracis lateribus flavis. Pedes nigri.*
27. M. testacea thorace maculis duabus nigris, pedibus rufis. *errans.*  
*Habitat - - - - - Mus. Dom. Tunstall.*  
*Statura sequentis. Caput testaceum, oculis nigris. Clypeus integer. Thorax rotundatus testaceus maculis duabus oblongis dorsalibus nigris. Elytra testacea, substriata. Pedes rufi.*
28. M. capite thoraceque coeruleo pilosis, elytris testaceis, pedibus nigris. *horticola.*  
*Scarabaeus horticola scutellatus muticus capite thoraceque coeruleo - subpilosus, elytris griseis, pedibus nigris. Linn. Syst. Nat. II. 554. 59. Fn. Sv. 391.*  
*Scarabaeus capite thoraceque coeruleo - pilosis, elytris rufis. Geoff. Inf. I. 75. 8.*  
*Scarabaeus ex nigro virescens, pennarum thecis rufis. Lister. Scar. 380. 3.*  
*Scarabaeus frisius. Linn. It. Scar. II. 321.*  
*Habitat in Europeae hortis, Pomoram devastat intacta pyro communi, Linn. Si mali sativi ac sylvestris folia depasci contingat, tunc chylus in intestinis contentus croceus ad picturam adhiberi potest. Lister.*
29. M. capite thoraceque coeruleo pilosis, elytris lividis, clypeo apice reflexo. *agricola.*  
*Scarabaeus agricola scutellatus muticus, thorace villoso, elytris lividis, limbo fasciaque nigris. Linn. Syst. Nat. II. 553. 58.*

*Scarabaeus cyathiger.* *Scopol. Ent. carn.* 6.

*Scarabaeus agricola.* *Post. Inf.* 21.

Habitat in spicis fecaliniis Germaniae.

Variat elytris nigro maculatis et immaculatis. Clypeus semper apice reflexus.

*uricola.* 30. M. atra sericea, elytris rufis margine nigro.

*Scarabaeus niger* elytris croceis, margine nigro. *Geoff.*  
*Hist. Inf.* 1. 80. 15.

Habitat in Anglia. *D. Lee.*

Statura M. horticolae. Clypeus rotundatus, integer.

Caput, thorax et abdomen atra, holosericea, immaculata. Elytra rufo testacea undique cincto margine nigro holosericeo.

Variat interdum elytris obscuris, margine tamen semper obscuriore.

*farinosa.* 31. M. supra coeruleo, subtus argenteo nitens, clypeo integro.

*Scarabaeus farinosus* scutellatus muticus niger polline virescente, elytris abbreviatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 555. 64. *Fn. Sv.* 299.

*Scarabaeus violaceus* et *squamulosus* squamis subtus argenteis. *Geoff. Inf.* 1. 79. 13.

*Scarabaeus coeruleus.* *Drury. Inf.* 2. tab. 32. fig. 4.

Habitat in Europa australi.

Statura et magnitudo omnino M. argenteae. Supra tota polline coeruleo nitidissimo adspersa. Thorax latior quam in reliquis, et elytra parum abbreviata. Subtus argenteo nitens colore viridi resplendente. Aqua calida imbuta color coeruleus in vivacissimum viridem transit.

*argentea.* 32. M. clypeo marginato niger subtus argenteo nitens, elytris testaceis,

*Scarabaeus argenteus.* *Scopol. n.* 9.

*Scarabaeus argenteus.* *Post. Inf.* 20.

Habitat in Angliae floribus frequens.

Descriptio *Scopoli* omnino convenit, at valde dubito, an haec sit species a *Linnaeo* pro *S. farinosa* descripta, quamvis idem synonymon *Scopoli* adfert, quam elytra nec nigra nec polline virescente adspersa. Pedes testacei posticis parum elongati.

elongatis. Elytra abdomine breviora postice gibba.  
Affinis M. horticolae, attamen distincta species.

33. M. corpore polline virescenti-argenteo, elytris pedibusque testaceis. *pulverulenta.*

Habitat Strasburgi.

Statura omnino M. argenteae, at duplo minor. Clypeus submarginatus. Thorax polline obscuriore adspersus. Elytra testacea abdomine breviora. Subtus nitida, viridi argentea, farinosa.

34. M. clypeo reflexo integro, corpore nigro glabro. *sylvicola.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. D. Banks.*

Statura M. ruricolae, at minor. Clypeus rotundatus margine reflexo integro. Caput et thorax glabra, nigra, immaculata. Antennae fuscae. Elytra abdomine breviora, laevia, nigra.

Variat interdum elytris fuscis.

35. M. flavesceps pedibus rufis, thorace subspinoso. *subspinosa.*

Habitat in Iamaica.

Statura et magnitudo omnino M. argenteae. Antennae rufae lamellis nigris. Corpus totum griseum, immaculatum. Thorax in medio exserit dentem brevissimum, obtusissimum. Pedes rufi plantis nigris.

36. M. atra tomento cinereo villosa. *mutabilis.*

Habitat Tranquebariae. *Koenig.* Minor reliquis, tota atra, at tomento cinereo subtilissimo tecta, quo cinereo colore certo situ resplendet.

37. M. obscure aenea, elytris tomento cinereo nitidulis. *versicolor.*

Habitat ad Sierra Leon Africæ. *Mus. Dom. Banks.*

Parva statura M. mutabilis. Caput aeneum clypei margine subreflexo. Thorax aeneus obscurus minime nitens. Scutellum breve, acutum. Elytra striata obscure aenea certo situ tomento cinereo resplendentia.

M. clypeo integro reflexo testacea glabra, capite atro. *monticola.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Minuta. Caput atrum, clypeo integro reflexo. Antennæ testaceæ. Corpus testaceum. Elytra abdomine multo breviora nitidula.

- humura-* 39. *M. atra* elytris basi punctoque medio pallidis.  
*lis.* Habitat in Europa. *Mus. Dom. Tunstall.*  
 Parva. Caput atrum, clypeo reflexo truncato integro.  
 Thorax ater immaculatus. Elytra substriata basi  
 pallida puncto nigro. Punctum parvum pallidum  
 in medio elytrorum. Pedes nigri.

- vittata.* 40. *M. cyanea* pilosa, elytris testaceis lineis tribus al-  
 bicantibus.

*Petr. Gazoph. tab. II. fig. 12.*

Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*

Statura M. horticolae, at magis oblonga et major.  
 Clypeus truncatus. Caput, thorax et scutellum  
 cyanea valde pilosa. Elytra abdomine paullo bre-  
 viora testacea, lineis tribus e villis albicantibus ex-  
 arata. Subtus hirta.

5. TRICHIUS. *Palpi* quatuor filiformes.  
*Maxilla* bifida.  
*Antennae* lamellatae.

- fasciatus.* 1. *T. niger* tomentoso - flavus elytris fasciis tribus nigris  
 abbreviatis.

*Scarabaeus fasciatus* scutellatus muticus niger tomen-  
 toso - flavus, elytris fasciis duabus luteis, coadunatis.  
*Linn. Syst. Nat. II. 556. 70. Fn. Sv. 395.*

*Scarabaeus niger* hirsuto - flavus, elytris luteis, fasciis  
 tribus nigris interruptis. *Geoff. Ins. I. 80. 16.*

*Drury. Ins. I. tab. 36. fig. 2.*

Delectatur floribus umbellatarum.

- indus.* 2. *T. thorace hirsuto*, elytris lividis fusco maculatis.  
*Linn. Syst. Nat. II. 556. 71. Mus. Reg. L. V. 27.*

Habitat in India.

Videtur hujus generis, quamvis Cetoniis valde affi-  
 nis sit.

- bibens.* 3. *T. capite thoraceque viridi aeneis pilosis*, elytris  
 testaceis viridi nitentibus.

Habitat in America. *Mus. Dom. Tunstall.*

Statura M. horticolae. Caput viridi-aeneum pilosum  
 clypeo emarginato. Thorax viridi aeneus nitens  
 pilosus.

pilosus. Elytra abbreviata testacea viridi colore nitida. Abdomen et pedes viridia pilosa.

4. T. thorace tomentoso rugis duabus longitudinalibus marginato, elytris abbreviatis. *hemipterus.*

*Scarabaeus hemipterus scutellatus*, muticus thorace tomentoso rugis duabus longitudinalibus marginato, elytris abbreviatis. *Linn. Syst. Nat. II. 555. 63.*

*Scarabaeus ater depresso et squamosus*, maculis albis variegatus, elytris abdomine brevioribus, foemina aculeo ani. *Geoff. Inf. I. 78. 12.*

Habitat in Europa.

Larvae ligno viciitant, declaratae floribus.

5. T. glaber cyaneus elytris lunulis duabus albis. *lunulatus.*

Habitat in Carolina. *Mus. Brit.*

Statura & magnitudo T. hemipteri. Capitis clypeus emarginatus. Corpus cyaneum maculis duabus lunatis albis ad marginem exteriorem elytrorum. Elytra abdomine multo breviora.

6. T. capite thoraceque aeneis villosis, elytris testaceis albo maculatis. *piger.*

Habitat in Marylandia. *Mus. Brit.*

Statura T. lunulati. Totus villosus. Clypeus emarginatus. Segmentum ultimum abdominis prominens, testaceum, macula utrinque oblonga, alba.

7. T. thorace nigro triangulo albo, elytris testaceis, puncto fusco. *Delta.*

*Scarabaeus Delta scutellatus*, muticus, flavus, thorace atro, triangulo flavo, elytris testaceo-flavis, nigro trimaculatis. *Ferster. Cent. I. 7. 7.*

*Scarabaeus Delta. Drury. Inf. 2. tab. 30. fig. 1. 2.*

Habitat in America.

Statura omnino T. pigri. Antennae ferrugineae, clava nigra. Caput porrectum atrum lineola transversa punctisque duobus verticis albis. Thorax holosericeus niger, margine omni trianguloque dorsali albis. Apex trianguli postica respicit. Scutellum nigrum punctis duobus albis.

Elytra laevissima abbreviata testacea, puncto medio fuso. Sutura fusca basi albicat. Abdomen ultimo segmento majori prominet niveum. Pedes testacei plantis nigris. Femora postica incurva crassiora.

### 6. CETONIA. *Maxilla* apice setosa.

*Labium* coriaceum emarginatum palpos tegens.

*Antennae* lamellatae.

*micans.* 1. *C. viridis nitens*, clypeo porrecto recurvo bifido, tibiis anticis ferratis.

*Scarabaeus micans*. *Drury. Inf. tab. 32. fig. 3.*

Habitat in Africa. *Dom. Drury.*

Statura omnino et magnitudo *C. chinensis*. Capitis clypeus viridis, carinatus spina parva utrinque inter oculos. Denticuli duo parvi elevati in medio, et duo alii ad apicem clypei. Carina excurrit in dentem elongatum fere longitudine capitis, compressum, recurvum, bifidum, laciinis divergentibus. Thorax laevis nitidus viridis, immaculatus. Scutellum triangulare acutum. Elytra abdome paullo breviora, acuminata nitentia. Sternum antice porrectum latum obtusum, linea longitudinali tenuissima ferruginea. Pedes antici elongati tibiis ferratis et tarsis sub unguibus fasciculo pilorum. Ultimum abdominis segmentum prominet puncto parvo utrinque impressio.

*chinensis.* 2. *C. aenea* clypeo emarginato subspinoso, thorace postice lobato, elytris acuminatis.

*Scarabaeus chinensis*. *Forster. Cent. Inf. 2. 2.*

Habitat in China. *D. Banks.*

Statura et magnitudo omnino *C. nigritae*. Clypeus cylindricus, late emarginatus, apicibus subspinosis. Thorax et elytra viridi aenea immaculata, laevia. Thorax postice productus, lobatus. Scutellum parvum, conicum. Elytra acuminata. Sternum prominens, obtusum. Subtus castanea parum nigro-maculata. Fulra postica nigra, puncto rubro. Tarsi omnes nigri.

3. C.

3. *C. glabra atra*, clypeo emarginato subspinoso, thorace *Nigrita*.  
postice lobato.

*Hermann. Mus.* pag. 17. n. 257.

*Pet. Caz.* tab. 28. fig. 3.

Habitat Ceylonae. *Mus. Brit.*

Statura omnino *C. nitidae*, at triplo major, tota atra,  
laevis, nitida. Clypeus quadratus late emarginatus,  
apicibus porrectis, acutis. Thorax laevis, glaber,  
ater, macula laterali brunnea, obsoleta. Scutellum  
parvum, depresso, acutum. Pedes picei.

4. *C. aurata*, segmento abdominalis primo lateribus unidentatis, elytris albo maculatis. *aurata*.

*Scarabaeus auratus* scutellatus, muticus, auratus, segmento abdominalis primo lateribus unidentatis, clypeo planiusculo. *Linn. Syst. Nat.* II. 557. 78. *Fn. Sv.* 400.  
*Scop. Ent. carn.* 17.

*Scarabaeus viridi aeneus*, thoracis parte prona antice prominentem. *Geoff. Ins.* I. 73.

*Scarabaeus arboreus viridis* f. *Scarabaeus auratus dictus*.  
*Fritsch. Ins.* 12. pag. 25. tab. 3. fig. 1.

*Scarabaeus major*, corpore breviore, alarum elytris et thoracis tegmine colore viridi splendentibus. *Raj. Ins.* 76. 7.

*Scarabaeus chlorochrysos*. *Worm. Mus.* pag. 342.

*Scarabaeus auratus*. *Roef. Ins.* II. *Scarab.* I. tab. 2.

Habitat in Europae lignis putrefactibus, formicarium acervis.

Larva quisquiliis, imago floribus delectatur.

Imago tacta per anum ejicit liquorem foetidissimum.

Variat magnitudine et colore, interdum totus ater.

5. *C. aurata*, abdomine postice albo punctato, elytris rugosis. *nobilis*.

*Scarabaeus nobilis* scutellatus, muticus, auratus, abdome postice albo punctato. *Linn. Syst. Nat.* II. 558. 81. *Fn. Sv.* 401.

*Scarabaeus viridis nitens*, thorace infra aequali non prominente. *Geoff. Ins.* I. 73. 6.

*Scarabaeus viridi aeneus*, thorace sulcato, elytris rugosis. *Vdm. Diff.* I.

Scara-

*Scarabaeus auratus secundus.* *Roeſ. Inf. II.* *Scarab.* I.  
tab. 3. fig. 1-5.

Habitat larva in ligno putrescente, imago in floribus  
praesertim umbellatis.

Larva grisea capite sanguineo, pedibus flavescenti-  
bus.

Variat colore, magnitudine.

*8 punctata* 6. *C. nigra*, thorace utrinque puncto baseos, elytrisque  
duobus flavis.

Habitat in Germania. *Dom. Schulz.*

Statura et magnitudo *C. nobilis*. Corpus atrum, puncto  
flavo utrinque ad basin thoracis. Puncta duo in  
elytris, interiore minutissimo. Punctum oblongum  
utrinque in ultimo abdominis segmento.

*nitida.* 7. *C. thorace postice lobato*, capite spina recumbente,  
sterno cornuto.

*Scarabaeus nitidus* scutellatus muticus, thorace postice  
lobato, capite spina recumbente, sterno porrecto.

*Linn. Syst. Nat. II. 552. 51. Mus. Lud. Vtr. 20.*

*Scarabaeus nitidus.* *Drury. Inf. I. tab. 33. fig. 5. 6.*

*Roeſ. II. Scar. I. tab. B. fig. 4.*

Habitat in Carolina.

*Chrysis.* 8. *C. scutello elytris dimidio breviore*, sterno porrecto,  
corpo viridi.

*Scarabaeus Chrysis* scutellatus muticus, sterno porrecto,  
scutello elytris dimidio breviore. *Linn. Syst. Nat. II.*  
*551. 49. Mus. Lud. Vtr. 21. Gronov. Zoophyl. 428.*  
*tab. 15. fig. 8.*

Habitat in America australi.

*Lanius.* 9. *C. exscutellata lucida nigro maculata*, sterno antice  
cornuto.

*Scarabaeus lanius* exscutellatus muticus ruber adspersus  
punctis nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 557. 77.*

*Drury. Inf. I. tab. 33. 8.*

*Scarabaeus rufus elytris nigro maculatis.* *Roeſ. Inf. II.*  
*Scarab. I. tab. B. fig. 3.*

*Scarabaeus e rubro cinereus minor*, maculis nigris nota-  
tus. *Sloane Jam. II. tab. 237. fig. 7. 8.*

Habitat in America.

Statura

Statura C. nitidae: tota livida nigro punctato maculataque.

*Roeselii* figura omnino convenit, at nostra minus rubra.

10. C. picea, abdominis segmentis margine albis, clypeo *tristis*. emarginato, sterno cornuto.

Habitat in America. *Mus. Dr. Hunter.*

Minor C. Lanio. Clypeus porrectus emarginatus.

Thorax niger immaculatus postice productus. Elytra picea linea una alterave elevata. Sternum breve cornutum. Abdomen piceum segmentorum marginibus albis, qui tamen color haud usque ad medium extenditur.

11. C. ferrugineo flavescentis, elytris virescentibus, sterno *smaragdula*.

Habitat in America. *Mus. Dom. Hunter.*

Statura C. chryseos. Caput et thorax obscure flavescentia. Thorax triangulus. Elytra virescentia. Corpus ferrugineo flavescentis, ab domine obscuriore. Tibiae posticae punctis impressis.

12. C. aeneo atra, thorace inaequali, scutello sulco longitudinali. *Eremita.*

*Scarabaeus Eremita* scutellatus muticus, aeneo ater, thorace inaequali, scutello sulco longitudinali. *Linn.*

*Syst. Nat.* II. 556. 74. *Scopoli Ent. carn.* 15.

*Scarabaeus magnus* piceus. *Roef. Inf.* II. *Scarab.* I. tab. 3. fig. 6.

Habitat in truncis putridis pyri, salicis. Statura C. nobilis, at triplo major. Recens odorem spargit corii russici.

13. C. thorace lineis quatuor albis, elytris viridibus, abdominis incisuris barbatis. *fascicularis.*

*Scarabaeus fascicularis* scutellatus, muticus, thorace lineolis quatuor albis, elytris viridibus, abdominis incisuris barbatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 557. 75. *Mus. Lud. Vlr.* 26.

*Scarabaeus fascicularis.* *Drury. Inf.* I. tab. 33. fig. 2.

Habitat in Africa.

Subtus tota luna heluola fasciculatim testa.

14. C.

*capensis.* 14. *C. hirta rufa, albo punctata.*

*Scarabaeus capensis* scutellatus muticus, rufus, hirtus, adspersus punctis albis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 556. 73.  
*Mus. Lud. Vlr.* 30.

*Scarabaeus capensis pilosus, vaginis rubris plurimis* punctulis albis adspersus. *Petiv. Gazoph.* tab. 8. fig. 6.

*Scarabaeus rufus albo punctatus.* *Roeſ. Inf.* 11. *Scarab.* 1.  
tab. B. fig. 6.

*Drury. Inf.* 1. tab. 33. fig. 3.

Habitat in Africa.

*margi- nata.* 15. *C. glabra atra, thoracis elytrorumque marginibus rufis.*

*Scarabaeus marginatus.* *Drury. Inf.* 2. tab. 32. fig. 1.

Habitat in Indiis. *Mus. Brit.* In Sierra Leon Africæ.  
*Mus. Dom. Banks.*

Statura C. nitidae. Clypeus emarginatus omnino inermis. Thorax niger, margine antico et laterali rufis. Elytra glabra, atra, margine laterali et postico late rufis.

*margi- nella.* 16. *C. viridis, thoracis elytrorumque margine ferrugineo.*

Habitat in Sierra Leon. *Mus. Dom. Turftall.*

Statura C. marginatae. Color supra obscure viridis, margine thoracis et elytrorum ferrugineo. Subtus viridis nitens, abdomine utrinque lineis duabus macularum albidarum. Sternum breve obtusissimum capitatum. Ultimum abdominis segmentum prominet maculis quatuor albidis.

*lineola.* 17. *C. nigra lineola flava à capite ad scutellum ducta.*

*Scarabaeus lineola.* *Linn. Syst. Nat.* 11. 552. 53.

*Scarabaeus parvus niger, lituris flavo brunneis.* *Roeſ. Inf.* 11. *Scarab.* 1. tab. B. fig. 7.

Habitat in America.

Variat elytris albo maculatis.

*fasciata:* 18. *C. nigra thoracis margine elytrisque testaceis; elytris futura fasciaque dentata nigris.*

Habitat Alexandriae. *D. Forſkäbl.*

*Corpus nigrum statura C. thoracicae. Thorax niger,* margine antico et laterali testaceis. Elytra testacea futura fasciaque postica dentata nigris.

19. *C. nigra*, thorace ferrugineo, elytris nigris subpurpureis  
purascientibus. *thoracica.*

Habitat Alexandriae. *D. Forskäbl.*

Major *C. auratae*, atra. Thorax ferrugineus, basi niger.

Elytra obscura purpureo colore imprimis ad margines tincta.

20. *C. testacea* thorace lineis punctisque duobus, elytris *olivacea*.  
maculis quatuor transversis nigris.

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Dom. Tunstall.*

Statura praecedentis. Caput nigrum immaculatum.

Thorax testaceus, lineis duabus latis dorsalibus et  
puncto utrinque parvo lateral i nigris. Scutellum  
testaceum margine nigro. Elytra obtusa testacea,  
maculis quatuor magnis transversalibus nigris, quae  
tamen marginem exteriorem haud attingunt. Subtus  
olivacea, abdominis segmentis apice nigris. Sternum  
breve obtusum.

21. *C. nigra*, thorace quinquelineato, elytris albo maculatis acuminatis. *picta.*

Habitat in Oriente. *Forskäbl.*

Statura et magnitudo *C. lineolae*. Caput nigrum, lineolis  
duabus maculaque utrinque oculari albis. Thorax  
niger lineis quinque albis. Scutellum triangulum  
nigrum linea alba, quae basin haud attingit.  
Elytra acuminata antice punctis albis substriata, pos-  
tice maculata. Ultimum abdominis segmentum  
prominens album linea nigra. Subtus alba linea  
media atra.

22. *C. nigra*, thoracis margine ferrugineo. *limbata.*

Habitat in Aegypto. *D. Forskäbl.*

Statura praecedentium obscure nigra haud nitida. Tho-  
rax margine antico et lateral i ferrugineis. Linea  
parva purpurascens in dorso elytrorum ad futuram.

23. *C. cyanea*, thoracis margine elytrisque testaceis. *splendida.*

Habitat in India.

Statura *C. Chryseos*. Corpus totum glabrum nitens.

Caput, thorax, scutellum et abdomen cyanea. Tho-  
racis margo et elytra testacea. Scutellum fere longi-  
tudine dimidii elytri.

*sprea.* 24. *C. cuprea nitida*, thorace scutello clytrisque viridi-bus.

Habitat - - - - Mus. Dom. Tunstall.

Magnitudo *C. auratae*. Caput cupreum clypeo truncato integro. Thorax viridis nitidus postice emarginatus. Scutellum triangulare. Elytra viridia, laevia immaculata. Subtus tota colore cupri fusi vivacissimi. Sternum breve obtusum.

*africana.* 25. *C. aenea nitens*, capitis spina incumbente: sterno porrecto.

*Scarabaeus africanus*. Drury. Ins. 2. tab. 30. fig. 4.

Habitat in Africa, Sierra Leon.

Statura *C. auratae*. Capitis clypeus apice reflexus, in medio spina parva incumbente armatus. Thorax aeneus, nitidus, laevissimus, immaculatus. Scutellum triangulare acutum. Elytra aenea nitida striato punctata apice obtusa. Sternum valde porrectum. Subtus concolor atomis minutissimis fuscis irrorata. Alae coerulescentes. Pedes aenei plantis nigris.

*futuralis.* 26. *C. thorace nigro margine rufo*, clytris aeneo nitidis futura nigra.

Habitat in Africa. Drury.

Statura et magnitudo *C. africanae*. Caput deest. Thorax elevatus laevis ater nitens margine obscure rufo, puncto parvo nigro. Scutellum triangulare nigrum. Elytra aenea laevissima sutura apice colloque baseos nigris. Sternum porrectum. Abdomen piceum. Pedes picei sive obscure ferruginei apicibus nigris.

*fulgida.* 27. *C. aenea nitidissima*, abdominis ultimo segmento prominente quadripunctato.

Habitat - - - - Mus. Dom. Banks.

Minor praecedenti. Capitis clypeus integer. Thorax aeneus parum ferrugineo mixtus, nitidissimus. Scutellum triangulare breve. Elytra viridia nitida ferrugineo mixta postice gibba. Sternum breve apice rotundatum. Abdomen aeneum utrinque lineis duabus macularum albidarum. Ultimum segmentum prominet punctis quatuor albis. Anus rufus. Pedes testacei geniculis nigris.

28. *C. atra nitida, clypeo truncato, reflexo, sterno obtuso.* *gagates.*

*Scarabaeus Gagates.* *Forster Cent. Inf. 6. 6.*

*Habitat ad Sierra Leon.* *Mus. Dom. Banks.*

*Statura praecedentis, tota atra glabra. Capitis clypeus truncatus, obtusus, reflexus. Thorax ater nitens, postice emarginatus. Scutellum triangulare, breve, acutum. Elytra obtusa nitida, postice gibba. Sternum obtusum.*

29. *C. atra, scutello elytris dimidio breviore, pedibus tringuiulatis, pollice fixo.* *tetrada.*

*Scarabaeus tetradactylus scutellatus, muticus, niger, pedibus triunguiulatis, pollice fixo.* *Linn. Mant. p. 530.*

*Scarabaeus tetradactylus.* *Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 7.*

*Scarabaeus major niger.* *Sloan. Jam. Tom. II. 237.*

*fig. 2.*

*Habitat in America.*

*Statura et magnitudo C. chryseos, at tota atra.*

30. *C. nigro aenea, elytris linceis duabus elevatis alboque maculatis.* *lurida.*

*Habitat in Brasilia.* *Mus. Dom. Banks.*

*Clypeus rotundatus, integer. Thorax niger aeneus, obscurus, vage punctatus, postice emarginatus. Scutellum triangulare acutum. Elytra obtusa, nigra, albo maculata. Lineae duae elevatae, postice coeuntes, apicem haud attingunt. Sternum breve obtusum.*

31. *C. aenea, opaca, elytris acuminatis albo maculatis.* *enrichal-*

*Habitat ad Suratte Indiae.* *Mus. Brit.*

*Similis C. philippensi, at duplo minor et minime nitens.*

*Clypeus subrotundus, integer. Thorax aeneus, im-  
maculatus. Elytra postice acuminata, obscure aenea,  
parum albo maculata.*

32. *C. aenea, nitida, thorace margine punctisque duobus albis, elytris maculatis acuminatis.* *Petiv. Gazoph. sis.*

*tab. 26. fig. 7.*

*Habitat in insulis Philippinis.* *Mus. Brit.*

*Statura C. auratae, at paullo major. Clypeus valde emar-  
ginatus. Thorax rotundatus, aeneus, nitens margine*

**D** *punctis-*

punctisque duobus dorsalibus albis. Elytra viridia, splendida, albo maculata, postice acuminata.

- fasciata.* 33. C. viridi fusca, obscura, thorace margine punctisque, elytris fascia media maculisque niveis, postice acuminatis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Caput fuscum, lineis duabus baseos albis. Clypeus emarginatus. Thorax obscure virescens, margine laterali punctisque utrinque duobus albis, posteriore majore. Scutellum triangulare, immaculatum. Elytra obscure virescentia, fascia in medio undata, quae tamen suturam haud attingit, maculisque plurimis albis. Sternum breve obtusum. Pedes fusi immaculati.

- acuminata.* 34. C. obscure aenea, pallido maculata, elytris acuminatis. Habitat ad Cap. B. S. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo C. hirtellae. Thorax rotundatus et elytra obscure aenea, pallido maculata. Elytra postice ad suturam excurrent in spinam compressam, acutissimam. Scutellum triangulare, immaculatum, Subtus aenea, lateribus albo maculatis.

- areata.* 35. C. nigra pubescens elytris disco rufo.

Habitat in Virginia. *Mus. Brit.*

Statura C. hirtellae; ideoque hic refero. Caput nobis deficit. Thorax niger pubescens. Elytra glabra, postice gibba, ad suturam linea unica elevata, nigra, disco ferrugineo. Abdomen nigrum.

- hirta.* 36. C. nigricans, hirta, elytris pallido maculatis, thorace carinato.

Scarabaeus hirtellus, scutellatus, muticus, hirtus, testaceo nigricans, elytris pallido maculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 556. 69.

Scarabaeus hirtus. *Scopoli Ent.* 8.

Scarabaeus hirtus. *Pod. Inf.* 21.

- β. Scarabaeus squalidus, scutellatus, muticus, niger, hirtus, thorace subcarinato. *Linn. Syst. Nat.* II. 556. 68. *Scop. Ent. carn.* 13.

Habitat in Europa australi. Vix specie differt β, quamvis elytra minus maculata.

37. *C. clypeo emarginato, nigra, albo maculata, abdomine subtus punctis quatuor albis.* *stictica.*

*Scarabaeus sticticus scutellatus, muticus, nigro glaber, punctis albis sparsis, abdomine subtus punctis quaternis albis.* *Linn. Syst. Nat. 11. 552. 54.*

*Scarabaeus nigro coerulescens, maculis albis sparsis, ordine macularum abdominalium longitudinali.* *Geff. Hist. Inf. 1. 79. 14.*

*Raj. Inf. 104. 8.*

Habitat in Galliae carduis.

38. *C. nigra, thorace rufo nigro maculato, elytris nigris, albo punctatis, dorso rufo.* *versicolor.*

Habitat in Aegypto. *Forskäbl.*

Statura et magnitudo *C. hirtellae.* Caput atrum. Thorax rufus, antice maculis duabus magnis nigris, lineolaque marginali cinerea. Margo tamen ipse parum elevatus, tenuissime niger. Scutellum triangulare nigrum, puncto apicis albo. Elytra nigra, punctis sparsis albis et disco macula magna oblonga ferruginea. Abdomen atrum, marginibus quoque albo maculatis.

Variat maculis atris thoracis albo pupillatis et coccis.

39. *C. testacea capite, thoracis lineis duabus, elytris sutura maculisque tribus nigris.* *Histrio.*

Habitat in Aegypto. *D. Forskäbl.*

Caput nigrum, immaculatum. Thorax testaceus, lineis duabus dorsalibus apice convergentibus nigris. Scutellum triangulare, testaceum. Elytra acuminata testacea, sutura et maculis tribus nigris posteriore transversa. Subtus picea, punctis plurimis albis.

40. *C. atra, thorace margine elytrisque maculis sparsis variegata.* *albis.*

Habitat Tranquebariae. *Koenig.*

Statura *C. sticticae.* Caput atrum, immaculatum. Thorax ater margine albo. Scutellum atrum puncto albo. Elytra obtusa, atra, maculis plurimis sparsis albis. Anus five ultimum abdominis segmentum prominet maculis duabus majoribus albis. Pedes nigri.

- Horten-*  
*tota.*
41. *C. atra glabra*, elytris postice punctis duobus albis.  
Habitat ad Cap. B. S. *Mus. Dom. Banks.*  
Statura reliquis longior et angustior. Caput atrum.  
Clypeo obtuso integro. Thorax ater, glaber, nitens,  
postice rotundatus. Elytra basi gibba vix striata, atra,  
apice pari punctorum alborum notata. Ultimum  
abdominis segmentum prominet macula utrinque ob-  
scure picea. Pedes atri. Sternum abbreviatum.

7. HISTER. *Maxilla unidentata.*

*Labium corneum*, cylindricum,  
integrum.

*Antennae clavatae.*

- major.* 1. *H. ater*, elytris substriatis, thoracis marginibus ciliatis.  
*Linn. Syst. Nat.* II. 566. 2.  
Habitat in Africa.  
Simillimus *H. unicolori*, at duplo major, et thorax pilis  
ferrugineis densis ciliatus.
- unicolor.* 2. *H. ater*, elytris oblique striatis. *Linn. Syst. Nat.* II.  
567. 2. *Scopoli Ent. carn.* 30. *Fn. Sv.* 440.  
Attelabus totus niger, elytris laevibus nonnihil stria-  
tis. *Geoff. Inf.* I. 94. tab. I. fig. 4.  
Scarabaeus antennis globulosis, media parte in annu-  
lum flexis, septimus. *Raj. Inf.* 91. 7. *Sulzer. Inf.*  
tab. 2. fig. 8. 9.  
Habitat in *Europae*, *Americae arena*, *stercore*.
- cyanus.* 3. *H. thorace aeneo*, elytris coerulecentibus.  
Habitat in *nova Hollandia*. *Dom. Banks.*  
Statura et magnitudo *H. unicoloris*. Caput obscurum.  
Thorax aeneus nitidus, laevis, margine obscuro  
subpunctato. Elytra coerulecentia, nitidissima, ab-  
breviata, basi oblique striata. Corpus coerulescens.  
Pedes nigri.
- brunneus.* 4. *H. ferrugineus*, elytris substriatis.  
Habitat in *Sveciae stercoribus*. *Mus. Dom. Banks.*  
Simillimus *H. unicolori*, at color totus brunneus.

5. *H. ater*, elytris laeuisimis. *Linn. Syst. Nat. I. 567. 4.* *pygmaeus.*  
*Fn. Sv. 441.*  
*Habitat in Europa boreali.*  
*Nimis affinis videtur *H. unicolor*.*
6. *H. ater*, elytris crenato striatis, striis interioribus abbreviatis. *abbreviat-*  
*tus.*  
*Habitat in America boreali. *D. Drury.**  
*Statura omnino *H. pygmaei*, ater, nitidus. Elytra*  
*striis quatuor crenatis, et inter has et suturam duo*  
*brevissimi apices.*
7. *H. ater*, elytris postice rubris. *Linn. Syst. Nat. I. 567. 5.* *2macula-*  
*Fn. Sv. 442.* *tus.*  
*Attelabus niger, elytro singulo, macula rubra. *Geoff. Inf. I. 95. 2.**  
*Hister simetarius. *Scop. Ent. 31.**  
*Coccinella, atra, glabra, elytris abdomine brevioribus,*  
*maculis duabus rubris. *Vdm. Diff. 80.**  
*Habitat in stercore bovino.*  
*An satis distinctus ab *unicolori*?*
8. *H. ater*, elytris bimaculatis. *Linn. Syst. Nat. II. 567. 6.* *4macula-*  
*Fn. Sv. 443.* *tus.*  
*Scarabaeus ovatus niger, glaber, maculis duabus rubris*  
*in singulo elytro. *Gud. satag. 76.**  
*Habitat in Europa boreali.*  
*Saepius maculae cohaerent in unicam lunatam. Affi-*  
*nis valde *H. bimaculato*.*
9. *H. aeneus*, elytris basi striatis apice punctatis. *aeneus.*  
*Attelabus nigro cupreus, capite nonnihil pominulo.*  
*Geoff. Hist. des Inf. I. 95. 3.*  
*Habitat in Anglia. *Mus. D. A. Monsson.**  
*Statura et magnitudo *H. pygmaei*. Corpus totum*  
*aeneum, splendens. Thorax glaber. Elytra ab-*  
*domine multo breviora basi, striis quatuor arcuatis*  
*impressa, quae vix medium clytorum attingunt,*  
*apice vase punctata.*
10. *H. ater*, nitens, elytris piecis, apice obscuris. *detritus.*  
*Habitat in nova Hollandia. *Dom. Banks.**  
*Magnitudo praecedentis, totus ater, nitens, elytra basi*  
*subpieca nitida, striis quatuor obliquis, lateralibus*  
*minoribus, apice obscura, punctata, et quasi detrita.*

8. APATE. *Palpi filiformes aequales.*  
*Maxilla unidentata.*  
*Labium membranaceum truncatum.*  
*Antennae perfoliatae.*

*muricatus.* 1. A. elytris reticulatis, postice retusis dentatis, thorace muricato gibbo.

*Dermestes muricatus niger*, elytris postice retusis, dentatis, thorace muricato. *Linn. Syst. Nat. II. 562. 6.*  
 Habitat in Africæ lignis.

Descriptio *Linnæi* omnino quadrat, at D. Lardario fere quadruplo major, et elytra profunde reticulata.

*Monachus.* 2. A. elytris obtusis, retusis, thorace gibbo truncato.

Habitat in America. *Dom. Drury.*

Summa aſſinitas A. muricati, et forte ejus varietas.

Caput atrum, fronte pilis densis elongatis rufis tectum. Thorax globosus, ater, antice ad latera denticulis brevibus, elevatis, numerosis truncatus. Elytra nigra, punctata, lineisque elevatis tribus laevibus, postice obtusa integra. Abdomen piceum.

*Jesuita.* 3. A. elytris integris variolosis, thorace antice truncato.

Habitat in nova Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*

Statura omnino praecedentium. Antennae perfoliatae, nigrae, apice ferrugineae. Thorax rotundatus, ater, antice dentibus plurimis elevatis acutis muricatus. Elytra punctis latioribus striata, basi puncto gibbo, apice vix retusa, integra. Pedes nigri.

*Minutus.* 4. A. niger, elytris integris piceis, thorace antice scabro.

Habitat in nova Zelandia. *Muf. Dom. Banks.*

Statura exæte praecedentium, at decuplo minor. Antennae flavescentes, perfoliatae. Thorax rotundatus, gibbus antice niger, punctis elevatis scaber. Elytra integerrima, laevia, et pedes testacei.

9. DERMESTES. *Palpi inaequales filiformes.*  
*Maxilla bifida.*  
*Labium corneum, obtusum, integrum.*  
*Antennae clava perfoliata.*

1. *D. niger*, elytris antice cinereis. *Linn. Syst. Nat. II. lardarius.*  
*561. I. Geoff. Inf. I. 101. 5. Fn. Sv. 408.*  
*Scarabaeus antennis clavatis clavis in annulos divisis*  
*quartus. Raj. Inf. 107. 1.*  
*Scarabaeus lardi parvus fascia transversali clytrorum*  
*nigro-fuscorum albida. Frisch. Inf. 5. 25. tab. 9.*  
*Habitat larva ovata cinerea glabra in animalibus*  
*asservatis lardo, carnibus, repositoriis culinariis*  
*et musacis infesta.*  
*Scybala inter vorandum ex ano protrudit, concate-*  
*nata pendula. Olea et pinguedines expedit alii*  
*lethales. Varietatem misit *D. de Hattorf*, elytris*  
*antice ferrugineis: an distincta species?*
2. *D. niger*, elytris antice testaceis, abdome albo. *carni-*  
*Habitat in nova Hollandia et Zelandia. Mus. Dom. Banks.* *rusr.*  
*Statura et magnitudo *D. Lardariae*. Antennae fuscae*  
*clava ferruginea. Caput et thorax nigra lateribus*  
*griseo villosis. Elytra nigra, antice testacea. Ab-*  
*domen subtus album. Pedes nigri.*
3. *D. niger*, ore ferrugineo. *cadaveri-*  
*Habitat in insula St. Helena. Mus. D. Banks.* *nus.*  
*Statura et summa affinitas praecedentis. Antennae*  
*fuscae clava ferruginea. Os ferrugineum. Elytra*  
*tota nigra. Abdomen subtus cinerascens.*
4. *D. niger*, elytris puncto albo. *Pellio.*  
*Dermestes Pellio niger coleoptris punctis albis binis,*  
*Linn. Syst. Nat. II. 562. 4. Fn. Sv. 411. Geoff. Inf.*  
*100. 4. Scop. Inf. carniol. 37.*  
*Scarabaeus parvus corpore brevi fusco, elytris puncto*  
*albo notatis, Raj. Inf. 85. 35.*  
*Scarabaeus lardi larva brunnea, cauda setosa longiori,*  
*Frisch. Inf. 5. 22. tab. 8.*

Habitat in pellitiis, lardo. Elytra colore variant,  
mox obscuriora, mox dilucidiora.

Larva oblonga, pilosa, cauda setosa.

*undatus.* 5. D. oblongus, niger, elytris fascia alba linearis duplicit.  
*Linn. Syst. Nat.* II. 562. 3. *Fn. Sv.* 410.

Habitat in Europae putridis, suffocatis.

Statura D. pellionis, at loco puncti elytrorum fasciae  
duae undulatae.

*20 gutta-* 6. D. oblongus, ater, punctis viginti albis.  
*tus.* Habitat Halae Saxonum. *D. Schaller.*

Statura omnino et magnitudo D. undati. Corpus  
atrum, glabrum. Punctum e pilis albis utrinque  
ad basin thoracis, et novem in singulo elytro. Ab-  
domen nigrum certo situ albicans.

*murinus.* 7. D. oblongus, tomentosus, nigro alboque nebulosus,  
abdomine niveo.

*Dermestes murinus tomentosus*, oblongus, fusco cine-  
reoque nebulosus, scutello luteo. *Linn. Syst. Nat.*  
II. 563. 18. *Fn. Sv.* 426. *Geoff. Inf.* I. 102.

*Scarabaeus erucae*, nigrae, glabrae pinguedinis. *Frijch.*  
*Inf.* 4. pag. 34. tab. 18.

Habitat in Europa, victitans cadaveribus.  
Larva oblonga brunnea, ore atro.

*stellatus.* 8. D. oblongus, tomentosus, fusco cinereoque nebulosus,  
abdomine fusco.

*Dermestes flavescens*, pilosus, oculis nigris. *Geoff. Inf.*  
I. 100. 8.

Habitat in Angliae cadaveribus.

Statura et magnitudo omnino D. murini, cuius forte  
varietas. Differt tamen colore minus nigro et albo,  
et abdomine omnino fusco.

*navalis.* 9. D. elongatus, ferrugineo fuscus, oculis atris.

Habitat in nova Zelandia. *Mys. Dom. Banks.*

Statura D. murini, at quadruplo minore, totus ferrugi-  
neo fuscus, elytris parum dilutioribus. Antennae  
perfoliatae.

10. D. nigro coeruleo-sens, thorace villoso. *Linn. Syst. violaceus.*  
*Nat. II. 567. 12. Fn. Sv. 422.*  
*Dermestes violaceus, thorace elytrisque villoso. Scop.*  
*Entom. carniol. 57.*  
*Clerus nigro coeruleus. Geoff. Inf. I. 30.*  
*Scarabaeus antennis clavatis. 12. Raj. Inf. 100.*  
*Habitat in cadaveribus frequens.*
11. D. violaceus, thorace elytrorumque basi rufis. *ruficollis.*  
*Habitat in India orientali. Mus. Dom. Banks.*  
*Statura et magnitudo D. violacei. Caput nigrum, an-*  
*tennis perfoliatis. Thorax glaber, laevis, rufus,*  
*immaculatus. Elytra subpubescentia punctis minu-*  
*tissimis striata, cyanea, basi rufa. Pectus rufum.*  
*Abdomen violaceum, basi rufum.*
12. D. oblongus testaceus, oculis nigris. *Linn. Syst. Nat. fumatus.*  
*II. 564. 22. Fn. Sv. 432. Geoff. Inf. I. 104. 12.*  
*Dermestes rosae. Scopoh Ent. 39.*  
*Habitat in Europae floribus.*  
*Magnitudo et statura D. undati.*
13. D. oblongus, villosus, griseus, capite punctis duo-  
 bus fuscis. *tomentosus.*  
*Habitat in Anglia.*  
*Statura omnino D. fumati, cuius forte varietas, totus*  
*supra villis cinereis tectus. Puncta duo fusca, ele-*  
*vata in fronte. Pedes dilutiores.*
14. D. oblongus, ferrugineus, oculis rufis. *Linn. Syst. panicenus.*  
*Nat. II. 564. Fn. Sv. 431.*  
*Scarabaeus parvus, luteus panis. Frisch. Inf. 2. 36. tab. 8.*  
*Habitat in pane diutius asservato.*  
*Larva ovata, alba, nitida.*
15. D. oblongus, testaceus, oculis abdominalisque basi nigris. *testaceus.*  
*Habitat in Belgio.*  
*Statura D. panicei, at triplo minor, totus laevis, glaber,*  
*testaceus, solis oculis et abdominalis basi subtus fuscis.*
16. D. griseus, thorace elytrisque scabris. *scaber.*  
*Habitat in nova Zelandia. Mus. Dom. Banks.*  
*Pervus, totus griseus punctis elevatis, scaber. Tho-*  
*rax marginatus, margine crenulato. Antennae*  
*perfoliatae.*

*chinensis.* 17. D. oblongus, ferrugineus, elytris striatis.

Habitat in seminibus e China acceptis.

Minor D. fumato, totus ferrugineus, glaber, elytris punctato, striatis.

*scanicus.* 18. D. ater, thorace puncto que elytrorum testaceis.

Dermestes scanicus fuscus, thorace testaceo. *Linn. Syst. Nat.* 11. 564. 26. *Fn. Sv.* 437.

Habitat in Svecia.

Statura D. panicei, at minor. Caput cum antennis perfoliatis testaceum, oculisque nigris. Thorax testaceus. Elytra glabra, atra, nitida, puncto baseos testaceo. Abdomen nigrum. Pedes testacei.

*feneſtralis.* 19. D. castaneus, capite nigricante, thorace fusco. *Linn.*

*Syst. Nat.* 11. 563. 15. *Fn. Sv.* 423.

Habitat in Europa boreali.

Magnitudo vix pediculi.

## 10. MELYRIS. *Palpi filiformes.*

*Maxilla unidentata, acuta.*

*Labium clavatum emarginatum.*

*Antennae totae perfoliatae.*

*viridis.* 1. M. viridis, elytris lineis elevatis tribus.

Habitat ad Cap. B. S.

Caput sub thorace inflexum, uti in dermestide, viride, antennis perfoliatis nigris. Thorax submarginatus, margine reflexo, dorso canaliculato. Scutellum parvum rotundatum. Elytra viridia, nitida, scabra, lineisque elevatis tribus.

II. BOSTRICHVS. *Maxilla cornea.*

*Labium cylindricum integrum, apice palpigerum.*

*Antennae clava solida.*

1. B. niger, clytris abdomineque rubris, thorace emarginato retuso. *Capucinus.*

Bostrichus. *Geoff. Inf.* I. 302. 1.

Dermestes capucinus, niger, clytris abdomineque rubris, thorace emarginato retuso. *Linn. Syst. Nat.* II. 562. 5. *Fn. Sv.* 416.

Habitat in Europae truncis emortuis.

2. B. testaceus, pilosus, clytris striatis retusis praemorso-dentatis. *typographus.*

Dermestes typographus testaceus, pilosus, clytris striatis retusis praemorso-dentatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 562. 7. *Fn. Sv.* 418.

Scarabaeus antennis clavatis. *Raj. Inf.* 100. 10.

Habitat intra cortices truncorum labyrinthos pulvere repletos formans.

Variat colore testaceo et fusco.

3. B. ater clytris praemorso-dentatis rufis. *enlongatus.*

Dermestes calcographus ater, clytris praemorso dentatis, rufis: lateribus basique nigricantibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 562. 8. *Fn. Sv.* 417.

Habitat intra arborum cortices.

Triplo minor B. typographo.

4. B. glaber, clytris truncatis integris, abdomine retuso. *Scolytus.*

Scolytus. *Geoff. Inf.* I. 310. 1. tab. 5. fig. 5. mal.

Destruit ulmos Angliae. *Dom. Lee.*

Statura B. typographi, totus glaber. Antennae clava solida. Caput et thorax atra, laevissima, nitida, longitudine elytrorum. Elytra striata, picea, apice truncata integra, abdomine paulo longiora; abdomen nigrum valde retusum.

5. B.

*piniperda.* 5. B. niger, subvillosum, elytris piceis integris, plantis rufis.  
*Dermestes piniperda niger*, subvillosum, elytris piceis integris, plantis rufis. *Linn. Syst. Nat.* 563. II. *Fn. Sv.* 421.

Habitat in ramulis inferioribus Pini, quos perforat, exsiccatur, destruit. *Linn.*  
 Statura fere curculionis.

*varius.* 6. B. subvillosum, corpore nigro cinereoque vario.  
 Habitat Hafniae.

Statura praecedentis, at paulo minor et corpus variegatum.

**12. BYRRHVS.** *Palpi aequales, subclavati.*  
*Maxilla bifida.*  
*Labium bifidum.*  
*Antennae moniliformes extrorsum crassiores.*

*pilula.* 1. B. fuscus, elytris striis atris interruptis. *Linn. Syst. Nat.* II. 568. 4.

*Dermestes tomentosus*, ovatus, fusco nebulosus. *Linn. Fn. Sv.* 427.

Habitat in Europae fabulosis.

*varius.* 2. B. niger, thorace aeneo, elytris fuscis, striis tribus abbreviatis viridibus nigro maculatis.

Habitat in Anglia: captus prope Henly, die 28. Iun. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et summa affinitas B. pillulae. Corpus subtus nigrum. Caput aeneum, antennis extrorsum crassioribus nigris. Thorax ovatus obscure aeneus, immaculatus. Elytra fusca, striis tribus nitentibus, dorsalibus viridibus fusco maculatis, quae tamen apicem glytrorum non attingunt. Pedes nigri tibiis compressis.

*aeneus.* 3. B. totus aeneus.

Habitat Upsaliae.

Simillimus B. pilulae, at triplo minor, supra totus aeneus, subtus marinus.

13. ANTHRENVS. *Palpi inaequales, filiformes.**Maxilla membranacea, linearis, bifida.**Labium corneum, integrum.**Antennae clava solida.*

1. A. niger, elytris fascia alba, apice ferrugineis: litura alba. *Pimpinellae.*

*Anthrenus squamosus niger, fascia punctisque coleoptorum albis, suturis fuscis. Geoff. Inf. I. 114. 1.*  
Habitat in pimpinellae floribus Galliae.

*Thorax niger, albo ferrugineoque maculatus.*

2. A. niger, elytris albo maculatis, sutura sanguinea. *Scrophulariae.*

*Byrrhus Scrophulariae niger, elytris albo maculatis, sutura sanguinea. Linn. Syst. Nat. II. 568. 1.*

*Scarabaeus parvus corpore subrotundo, collo oblongo, alarum elytris nigris, binis punctis albicantibus notatis. Raj. Inf. 85. 37.*

*Dermestes tomentosus maculatus, sutura elytrorum rubra. Linn. Fn. Sv. 429.*

Habitat in Scrophulariis Europae.

3. A. nebulosus, elytris subnebulosis. *Musaeorum.*

*Byrrhus Musaeorum nebulosus, elytris subnebulosis, punto albo. Linn. Syst. Nat. II. 568. 2.*

*Dermestes tomentosus maculatus, elytris punto albo. Linn. Fn. Sv. 430.*

Habitat in musaeis, animalia asservata destruens.

*Simillimus praecedenti, at minor absque sutura sanguinea.*

4. A. niger, elytris fasciis tribus undatis albis. *Verbasci.*

*Anthrenus squamosus niger, elytris fuscis, fascia triplici undulata alba. Geoff. Inf. I. 115. 2.*

*Byrrhus Verbasci fuscus, elytris fasciis tribus undulatis pallidis. Linn. Syst. Nat. II. 568. 3.*

Habitat in Verbaico Galliae.

Affinis B. scrophulariae, at minor.

14. ANOBIVM. *Palpi clavati.**Maxilla obtuse dentata.**Labium integrum.**Antennae filiformes.**pertinax.* 1. *A. fuscum, immaculatum.**Ptinus pertinax, fuscus, unicolor. Linn. Syst. Nat. II,*  
*565. 2.**Byrrhus totus nigro fuscus. Geoff. Inf. I. 112. 4.**Dermestes pertinax. Linn. Fn. Sv. 414.**Destruit e ligno confecta, devoratur a Clero formicario. Captum se contrahit immobile.**molle.* 2. *A. testaceum, oculis nigris.**Ptinus mollis testaceus, oculis fuscis. Linn. Syst. Nat.*  
*II. 565. 3.**Byrrhus fulvus, obscurus, oculis nigris. Geoff. Inf.*  
*I. 112. 2.**Dermestes mollis. Linn. Fn. Sv. 415.**Habitat in Europae quisquiliis.**Affinis praecedenti, attamen distincta species.**frumentarium.* 3. *A. testaceum, thorace ciliato, dorso plano carinato.*  
*Habitat in pane diutius asservato: captum in nave pro-**pe Brasiliam, Mus. Dom. Banks.**Statura A. mollis, totum testaceum. Antennae por-*  
*rectae, fuscae, filiformes. Thorax magis obscurus,*  
*spinis minutissimis ciliatus, dorsoque piano carina-*  
*to. Elytra testacea striata.**nigrum.* 4. *A. pilosum, nigrum, elytris molliusculis.**Dermestes niger oblongus, pilosus, niger, elytris mol-*  
*liusculis. Linn. Syst. Nat. II. 564. 28. Fn. Sv. 459.**Cantharis pilosa. Scopoli Ent. 131.**Habitat in floribus Europae.**Hujus generis videtur.**lineatum.* 5. *A. pilosum, nigrum, elytris lineis sesquitertiis rufis.**Habitat in Brasilia. Mus. Dom. Banks.**Statura exacte praecedentis. Capit et thorax pilosa,*  
*nigra, aeneo paucō mixta. Antennae nigrae, filiformes.*  
*Elytra molliuscula, nigra margine exteriori,*  
*linea*

linea basi flexuosa ad suturam, quae apicem haud attingit, et lineola in disco abbreviata rufis. Pedes nigri.

6. A. subvillosum, cyaneum, antennis nigris. *cyaneum.*  
Habitat in Europa australiore.  
Statura et magnitudo omnino A. nigri.

15. PTINVS. *Palpi filiformes.*

*Maxilla bifida.*

*Labium bifidum.*

*Antennae filiformes.*

1. P. griseus, elytris postice cinereis. *Gigas.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Gigas in hoc genere. Antennae filiformes, corpore longiores, apice nigrae, articulo ultimo acuto. Caput magnum, griseum. Thorax rotundatus, griseus, lineis quatuor obsoletis fuscis, puncto albo. Elytra grisea, punctis aliquot oblongis, apiceque cinereis, abdomen et pedes cinerei.

An proprii generis?

2. P. testaceus thorace quadridentato, elytris fasciis duabus albis. *Linn. Syst. Nat. II. 566. 5.* *Fur.*

Bruchus testaceus elytrorum fascia duplii albida.

*Geoff. Ins. I. 164. 4. tab. 2. fig. 6.*

Buprestes Fur. *Scopoli. Ent. 210.*

Cerambyx Fur. *Linn. Fn. Sv. 651.*

Habitat in musacis, pessimus, destruens herbaria, infesta, ayes, vix pellendus.

3. P. fuscus, thorace subcarinato, coleoptris, macula alba *imperialis.* aquilam expansam referente. *Linn. Syst. Nat. II. 565. 4.*

Habitat in Europae borealis arboribus.

4. P. thorace bidentato, testaceus, immaculatus. *Latro.*  
Habitat Strasburgi. *Dom. Prof. Hermanni.*

Statura et magnitudo omnino P. furis, cuius forte varietas. Antennae filiformes longitudine corporis.

Thorax

Thorax angustus, rotundatus dentibus duobus dorsibus, acutis. Elytra punctato-striata testacea, inimaculata.

**16. BRVCHVS.** *Palpi aequales filiformes. Maxilla membranacea, bifida.*

*Labium acuminatum.*  
*Antennae filiformes.*

**spinosus.** 1. *B. antennis filiformibus, thorace elytrisque spinosis.*  
Habitat in Iamaica. *D. Drury.*

Statura omnino hujus generis, at reliquis major. Maxillae porrectae. Antennae filiformes longitudo dimidii corporis. Thorax rotundatus, antice angustatus, griseus, spinis tribus dorsalibus elevatis acutis. Elytra longitudine fere abdominalis, grisea, spinis sparsis erectis brevibus. Corpus et pedes grisei.

**Pist.** 2. *B. elytris nigris albo maculatis, podice albo, punctis binis nigris.* *Linn Syst. Nat. II. 604. 1. M. L. VI. 35.*  
*Mylabris fusca, cinereo-nebulosa abdominalis apice, cruce alba.* *Geoff. Inf. I. 267. 1.*  
*Curculio Pisorum.* *Amoenit. acad. 3. 347.*  
*Bruchus Americae septentrionalis.* *Kalm. It. 294.*  
*Laria Salicis.* *Scopol. Ent. Carniol. 6.*  
Habitat in America septentrionali, Europa australi victitans pisus. Devoratur a Gracula Quiscula. Caput et antennae nigrae. Femora subdentata.

**scabrosus.** 3. *B. niger, elytris rufis elevato striatis, punctis nigris sparsis.*

Habitat in Anglia. *Mus. Brit.*

Statura B. seminarii, at paulo major. Antennae nigrae extrorsum subcassiores. Caput et thorax nigra. Elytra rufa striis elevatis scabris, punctisque aliquot nigris holosericeis sparsis.

**Cacas.** 4. *B. corpore fusco, griseo, maculato.*

Habitat in Theobromae seminibus. Corpus statura B. pisorum, at paulo minor.

5. B. clytris griseis nigro maculatis, pedibus rufis, scutello albo. *Linn. Syst. Nat.* II. 605. 2. *Theobromae.*  
Habitat in Theobromae seminibus. Elytra punctis striata. Thorax sublineatus.
6. B. elytris nigris, atomis albis, femoribus posticis unidentatis. *Bruchus granarius.*  
*Bruchus granarius* elytris nigris; atomis albis, pedibus anticis rufis: posticis dentatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 605. 5.  
*Curculio atomarius.* *Fn. Sv.* 628.  
Habitat in seminibus plantarum.  
Antennae basi testaceae. Thorax sutura alba. Elytra striata abdome breviora. Tibiae anticae testaceae.
7. B. ater, immaculatus, femoribus muticis. *Cisti.*  
Habitat in floribus Cisti Helianthemi. *Mus. D. Banks.*  
Statura praecedentium, at duplo minor.
8. B. ater, antennarum basi pedibusque anticis testaceis, femoribus muticis. *seminarius.*  
*Bruchus seminarius* ater, antennarum basi pedibusque anticis testaceis. *Linn. Syst.* II. 605. 6.  
*Mylabris nigra*, abdome albo sericeo. *Geoff. Inf.* I. 268. 3.  
Habitat in floribus: captus d. 28. Jun. prope Henly Anglorum.  
De synomino *Linnaei* dubito; quum pedes omnes et antennae totae nigrae. Statura B. granarii, at pauculo minor. Caput prominens, antennis quasi pedunculatis crassis, ferratis. Thorax antice attenuatus. Elytra striata abdome breviora. Pedes inermes.
9. B. elytris punctatis, testaceis, nigro maculatis, podice griseo punctis binis nigris. *maculatus.*  
Habitat in America. *D. v. Robr.*  
Statura et magnitudo B. seminarii. Antennae ferratae, testaceae. Thorax testaceus, obscure fusco-maculatus. Elytra punctis striata, testacea, maculis tribus magnis fuscis.
10. B. antennis pectinatis corpore longioribus, corpore serraticornis, griseo, fusco, maculato. *Forskähl.*

Major pectinicorni. Antennae longitudine corporis,  
valde ferratae. Thorax tomento cinereo tectus,  
postice trilobus. Elytra abdomine breviora, cinerea,  
sulcata, abdomen et pedes cinerea.

- pectinicornis.* II. B. antennis pectinatis, corpore ferrugineo longioribus,  
Bruchus pectinicornis antennis pectinatis corpore lon-  
gioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 605. 7.  
Habitat in Chinae seminibus.  
Simillimus B. ferraticornis, at totus ferrugineus.

17. ELOPHORVS. *Maxilla* cornea, apice  
membranacea.

*Labium* corneum, qua-  
dratum.

*Antennae* clava solida.

- aquaticus.* I. E. fuscus, thorace rugoso elytrisque fusco aeneis.  
*Silpha aquatica* cinerea, clytris substriatis, thorace emar-  
ginato, longitudinaliter rugoso, virescente. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 575. 25.

*Dermestes viridi aeneus*, thorace fasciis quatuor eleva-  
tis, elytris punctato striatis. *Geoff. Inf.* I. 105. 15.  
Habitat frequens in aquis stagnantibus.

- minutus.* 2. E. fuscus, thorace rugoso, aeneo, elytris pallidis.  
Habitat in Angliae aquis stagnantibus. Forte E.  
aquatici varietas triplo minor. Statura et color  
exacte idem, exceptis solis elytris pallidis.

18. SPHAERIDIVM. *Palpi* quatuor filiformes.

*Labium* quadratum, emar-  
ginatum.

*Antennae* perfoliatae.

- scarabaeoides.* I. S. ovatum, atrum, elytris maculis duabus ferrugineis.  
*Dermestes Scarabaeoides* ovatus, ater, glaber, elytris  
maculis duabus obsolete ferrugineis. *Linn. Syst.*  
*Nat.* II. 563. 17. *Fn. Sv.* 428. *Scop. Ent. carn.* 36.  
Der-

I. ELEVTERATA. Sphaeridium. 67

*Dermestes niger*, coleoptris, punctis rubris quaternis, elytris laevibus, subrotundis. *Geoff. Inf.* l. 106. 17.

*Scarabaeus ovatus*, niger, glaber, maculis duabus rubris in singulo elytro. *Gud. Satag.* 76.

Habitat in Europae locis suffocatis.

2. *S. ferrugineum*, elytris atris.

Habitat in insula St. Helena. *Mus. Dom. Banks.*

*Dytiscoides.*

Statura et magnitudo *S. scarabaeoidis*, totum glabrum, nitidum. Antennae rufae, perfoliatae. Caput, thorax, pectus, abdomen rufa, elytra atra, glabra.

3. *S. laeve*, atrum, elytris crenato - striatis, pedibus pallidis. *atomarium.*

*Silpha atomaria*, nigra, subovata, elytris immarginatis, pedibus pallidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 574. 35.

*Dermestes niger* subrotundus, elytris striatis. *Geoff. Inf.* l. 107. 19.

Habitat in stercore Angliae. *D. Banks.*

Statura *S. melanocephali*, at paulo majus, atrum, nitens, immaculatum. Thorax glaberrimus. Elytra crenato striata. Pedes pallidi.

4. *S. atrum* glabrum, elytris griseis: macula communis baseos nigra. *melanocephalum.*

*Dermestes melanocephalus* niger ovatus, glaber, elytris griseis. *Linn. Syst. Nat.* II. 563. 16. *Fn. Sv.* 425.

Habitat in stercore Angliae.

Corpus atrum, laeve, nitidum. Elytra testacea, macula magna triangulari nigra ad basin. Pedes atri.

5. *S. atrum*, elytris apice rufis

*haemor.*

*Anthribus niger* ovatus, elytris apice punctis duobus rubris. *Geoff. Inf.* l. 308. 5. *rboidale.*

Habitat in stercore bovino Angliae. *Dom. Banks.*

Statura omnino *S. atomarii*, at paulo minus. Elytra vix striata, abdomine paulo longiora, apice rufa.

6. *S. atrum*, nitidum, thoracis margine elytrorumque macula sanguineis. *4 pustulatum.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium. Antennae porrectae, perfoliatae, nigrae. Palpi filiformes. Thorax ater, nitidus

dus, margine rufo. Elytra truncata, atra, nitida, macula magna rufa versus basin, abdomen acutissimum. Pedes nigri.

*finetari-* 7. S. atrum immaculatum, elytris laevissimis.  
um. Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium, totum atrum, immaculatum.

*minutum.* 8. S. atrum, elytris striatis, pedibus concoloribus.

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus minutum, totum atrum immarginatum, elytra postice pallidiora.

*pulicari-* 9. S. nigrum, oblongum, elytris abbreviatis, abdomine acuto.  
um.

Silpha pulicaria nigra, oblonga, elytris abbreviatis, abdome acuto. *Linn. Syst. Nat. II. 574. 33.*

Anthribus niger, elytris abdomine brevioribus. *Geoff. Inf. 308. 4.*

Scarabaeus antennis clavatis, clavis in annulos divisit.  
*Raj. Inf. 108. 29.*

Habitat in Europae floribus cursitans.

Hujus generis videtur: antennae vix clavatae, attamen tres ultimi articuli prominent.

## 19. TRITOMA. *Palpi anteriores securiformes.*

*Labium emarginatum.*

*Antennae perfoliatae.*

*2 pustula-* 1. T. atra, elytris macula laterali coccinea.  
ta. Tritoma. *Geoff. Inf. I.*

Habitat in Agaricis arboreis Angliae, capta d. 17.  
April. ad Hamstead.

Corpus magnitudine coccinellae, totum atrum, glabrum, nitidum. Thorax postice acuminatus. Elytra striata, basi laterali macula magna coccinea, in qua punctum parvum fuscum. Pedes nigri, plantis pallidis.

2. T.

2. *T. nigra*, thoracis lateribus abdomineque rufis. *collaris.*  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
 Statura praecedentis, at antennae filiformes, ideoque de genere haereo: forte potius anthrenus. Caput et thorax nigra, thoracis lateribus rufis. Elytra nigra fasciis duabus undatis, obsoletis, cinereis, abdomen rufum.
3. *T. oblonga*, nigra, elytris punctis duobus ferrugineis. *4 pustulata.*  
*Silpha 4. pustulata, oblonga, nigra, elytris punctis duobus ferrugineis. Linn. Syst. Nat. II. 570. 5. Fn. Sv. 446.*  
*Dermestes niger coleoptris, punctis rubris quaternis, elytris striatis, oblongus. Geoff. Ins. I. 106.*  
*Scarabaeus parvus luteo maculatus; erucae lanigerae. Frisch. Ins. 9. 36. tab. 19.*  
 Habitat in Europae ligno humido. De synonymo  
*Geoff. dubito, nam elytra in nostra laevissima.*  
 Larva oblonga, hirsuta, grisea.
4. *T. oblonga*, nigra, thorace rugoso, elytris striatis: *maculis duabus rubris. crenata.*  
 Habitat in Suecia.  
 Statura omnino *T. quadripustulatae*, at quadruplo minor. Thorax longitudinaliter rugosus, obscure niger. Elytra striis crenatis nigra, basi apiceque macula magna ferruginea.
5. *T. oblonga*, glabra, atra, fronte, pedibus, maculisque duabus elytrorum ferrugineis. *rufifrons.*  
 Habitat in Anglia. *Dom. Banks.*  
 Statura omnino praecedentium, et magnitudo *T. crenatae*. Antennae nigrae, clava ferruginea. Caput nigrum fronte ferrugineo. Thorax glaber, ater, laevis, nitidus, immaculatus. Elytra laevia, nitida, punctis duobus ferrugineis, altero ad basin, altero ad apicem.

20. HISPA. *Palpi aequales, medio crassiores, fusiformes.*  
*Maxilla bifida.*  
*Labium corneum, integrum.*  
*Antennae cylindricae.*

*mylacina.* 1. *H. antennis pectinatis, elytris testaceis albo punctatis.*  
*Habitat in nova Hollandia. Mus. Dom. Banks.*

Gigas in hoc genere. Caput nigrum, antennis approximatis pectinatis, radiis compressis, elongatis maximis. Maxillae porrectae, corneae, acutae, dentatae. Palpi aequales articulo ultimo obtuso. Thorax cinereus. Elytra testacea, punctis plurimis albis sparsis. Abdomen subtus cinereum, utrinque lineis duabus punctorum nigrorum. Pedes cinerascentes.

*flabellicornis.* 2. *H. antennis pectinatis, elytris laevibus.*  
*Habitat in Anglia. D. Lee.*

Corpus totum cylindricum, atrum. Caput globosum, antennis uno latere valde pectinatis. Thorax cylindricus, basi utrinque terminatus, dente valido acuto. Elytra seabra vix distincte striata.

*pectinicornis.* 3. *H. antennis pectinatis, fuscis, pedibus luteis.*  
*nis.* Ptinus pectinicornis fuscus, antennis luteis pectinatis.  
*Linn. Syst. Nat. II. 565. 1.*  
*Dermestes pectinicornis. Fn. Sv. 412.*  
*Ptilinus atro fuscus, thorace convexo, pedibus anten-*  
*nisque pallidis. Genff. Inf. I. 65. 2.*  
*Habitat in Europae quisquiliis.*

*hirta.* 4. *H. antennis ferratis, atra, hirta.*  
*Dermestes hirtus, ater hirtus. Linn. Syst. Nat. II. 563. 14.*  
*Habitat in tritico Europae australioris. D. Dana.*  
*Certe huius est generis. Animalculum totum atrum,*  
*pilis erectis, hirtum. Antennae valde ferratae.*

*coerulea.* 5. *H. antennis subserratis, coerulea, hirta.*  
*Habitat in Germania. D. de Hattorf.*  
*Statura et summa affinitas praecedentis, at corpus to-*  
*tum coeruleum, nitidum, pilis erectis fuscis hirtum.*  
*6. H.*

# I. ELEVTERATA. Nicrophorus. 71

6. *H. inermis, nigra, antennis pilosis, elytris striatis.* *mutica.*  
*Hispa mutica inermis, antennis pilosis. Linn. Syst.*  
*Nat. II. 604. 4.*
- Dermestes clavicornis, niger, antennis clavatis pilosis.*  
*Linn. Fn. Sv. 413.*  
*Habitat in Europae quisquiliis, muscis.*
7. *H. thorace elytrisque spinosis, corpore atro.* *atra.*  
*Hispa atra corpore toto atro. Linn. Syst. Nat. 603.*  
*Crioceris tota atra, spinis horrida. Geoff. Inf. I. 243. 7.*  
*Habitat in Europa australi ad radices graminum.*  
*Antennae fusiformes prominent.*
8. *H. corpore testaceo, antennis aculeisque nigris.* *Linn. testacea.*  
*Syst. Nat. II. 603. 2.*  
*Habitat in Africa.*  
*Thorax spinis lateralibus, elytra aculeis sparsis omnibus nigris.*
9. *H. nigra, thorace elytrorumque basi rufis, elytris ferratis.* *sanguinicollis.*  
*Hispa sanguinicollis inermis, atra, thorace sanguineo.*  
*Linn. Mantis. 530.*  
*Habitat in America. D. v. Rohr.*  
*Caput nigrum, antennis fusiformibus. Thorax glaber, rotundatus, laete rufus. Elytra margine inprinis apice ferrata, striis tribus elevatis, spatio interiecto punctato; nigra, basi rufa.*
21. NICROPHORVS. *Labium cordatum, emarginatum, crenatum.*  
*Antennae perfoliatae.*

1. *N. ater, clypeo obrotundo, inaequali.* *germanicus.*  
*Silpha germanica oblonga, atra, clypeo obrotundo inaequali marginato, elytris obtusissimis, margine laterali ferrugineo. Linn. Syst. Nat. II. 569. 1.*
- Dermestes thorace marginato, elytris abscisis, totus niger. Geoff. Inf. I. 99. 2.*
- Scarabaeus antennis clavatis, clavis in annulos divisus, primus. Raj. Inf. 107. 1.*
- Scarabaeus majusculus ex toto niger. Lst. Loqu. 381.*

Habitat in Germania, vietitans cadaveribus.

Apex antennarum ferrugineus. Variat interdum puncto uno alterove elytrorum ferrugineo.

- vulgaris.* 2. N. ater, elytris fascia dupli ferruginea.  
 Silpha Vespillo oblonga, atra, clypeo orbiculato inaequali, elytris fascia dupli ferruginea. *Linn. Syst. Nat. 11. 569. 2. Fn. Sv. 444.*  
 Dermestes thorace marginato, elytris abscissis nigris, fasciis duabus transversis undulatis luteis. *Geoff. Inf. 1. 98. 1. tab. 1. fig. 6.*  
 Scarabaeus foetidus primus. *Raj. Inf. 106.*  
 Cantharis tertius. *Mouffet. Inf. 149. fig. 1.*  
 Scarabaeus majusculus, niger, duabus luteis fasciis undulatis transversim ductis supra alarum thecas. *Lift. loqu. 381. 2.*  
 Scarabaeus Moschi odore. *Frisch. 12. 28. tab. 3. fig. 2.*  
 Vespillo. *Roef. Inf. 4. tab. 1. fig. 1. 2.*  
 Habitat in Europae, Americae cadaveribus, quae sepelit.  
 Moschum spirat, ocyssime volitat elytris erectis approximatis. Acaris infestatur.  
 Varietates vidi plures, et Americanos et Europaeos, at nullo modo distingui merentur.

22. SILPHA. *Maxilla unidentata.*  
*Labium dilatum, bifidum.*  
*Antennae perfoliatae.*

- surina-  
menis.* 1. S. atra, elytris: fascia postica flava, femoribus posticis dentatis.  
 Habitat in America meridionali. *Muf. Dr. Hunter.*  
 Summa affinitas S. littoralis, at elytra postice fascia ferruginea.
- littoralis.* 2. S. atra, elytris laevibus; lineis elevatis tribus, thorace orbiculato nitido. *Linn. Syst. Nat. 11. 570. 11. Fn. Sv. 450.*  
 Peltis nigra, elytris lineis tribus elevatis, prima et secunda gibbositate connexis, thorace laevi. *Geoff. Inf. 1. 126. 3.*

- Scarabaeus campestris.* *Frisch. Inf.* 6. 12. tab. 5.  
*Silpha littoralis.* *Scop. Ent. Carn.* 55.  
 Habitat in Europae cadaveribus.  
 Larva ovata, fusca, voracissima.
3. *S. nigra elytris: fasciis duabus ferrugineis, thorace antice bidentato.* *Linn. Syst. Nat.* 11. 570. *Mus. Lud. Vlr.* 38.  
 Habitat in India.
4. *S. depressa nigra, thorace flavo: centro nigro.* *ameri-  
cana.*  
*Silpha Americana ovata, fusca, clypeo flavo; centro  
nigro intra annulum fulvum.* *Linn. Syst. Nat.* 11.  
 570. 7.  
*Blatta americana.* *Catesby Car.* 3. tab. 10. fig. 5.  
 Habitat in America.  
 Statura fere S. thoracicae, at paulo major & magis de-  
 pressa. Thorax postice rotundatus, flavescens, ma-  
 cula magna in medio nigra. Elytra postice sub-  
 marginata, rugosa, immaculata.
5. *S. oblonga rufa, antennis elytris pectoreque nigris.* *russica.*  
*Linn. Syst. Nat.* 11. 570. 10. *Fn. Sv.* 449.  
*Dermestes elytris nigris, capite, clypeo et abdомine,  
rubro.* *Vdm. Diff.* 7.  
 Habitat in Europa boreali.
6. *S. nigra, elytris linea elevata unica, thorace testaceo.* *thoracica.*  
*Linn. Syst. Nat.* 11. 571. 13. *Fn. Sv.* 452. *Strom. Act.*  
*Nidr.* 3. tab. 6. fig. 1.  
*Peltis nigra, lineis tribus elevatis acutis, thorace testa-  
ceo.* *Geoff. Inf.* 1. 121. 6.  
*Scarabaeus primo similis, parum canaliculatus, scapulis  
croceis.* *Raj. Inf.* 90. 10.  
*Cassida nigra, clypeo latissimo pallide rufo, macula lata  
nigra nitida.* *Gudd. Satag.* 25.  
*Silpha thoracica.* *Scop. carn.* 54.  
 Habitat in Europa.
7. *S. gibba nigra, elytris rugosis lineis elevatis tribus, laevicollis.*  
 thorace laevi emarginato.  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magna, tota gibba nigra. Capitis clypeus subtruncatus. Thorax valde marginatus, niger, laevis, antice late emarginatus. Elytra rugosa, lineis elevatis tribus, et inter has lineas aliaetres minus elevatae.

*rugosa.* 8. S. nigricans, elytris rugosis: lineis elevatis tribus, thorace rugoso postice sinuato. *Linn. Syst. Nat.* II. 571. 16. *Fn. Sv.* 455. *Scop. carn.* 53.

Peltis nigra, elytris lineis tribus elevatis acutis, spatio interiecto veluti complicato, thorace scabro. *Geoff. Inf.* I. 120. 4.

Scarabaeus inter cadavera frequens. *Raj. Inf.* 90. 9.

Habitat frequentissime in Europa.

Cadavera, pisces, carnes, consumens. Capta humorem foetidissimum evomit.

*atrata.* 9. S. atra, elytris punctatis: lineis elevatis tribus laevis, thorace integro. *Linn. Syst. Nat.* II. 571. 12. *Scop. carn.* 56.

Peltis nigra, elytris lineis tribus elevatis, spatio interiecto punctato, thorace laevi. *Geoff. Inf.* I. 118. 1.

Habitat in Europae agris et viis frequens.

*laevigata.* 10. S. atra, elytris laevibus subpunctatis.

Peltis nigra tota, elytris laevibus, punctis minimis excavatis. *Geoff. Inf.* I. 122. 8.

Habitat in sylvis Europae.

Nimis affinis S. atratae, a qua tamen differt elytris laevibus nec striis tribus elevatis.

*obscura.* 11. S. nigra, elytris punctatis: lineis elevatis tribus, thorace antice truncato. *Linn. Syst. Nat.* II. 572. 18. *Fn. Sv.* 457. *Scop. carn.* 57.

Cassida ovata, nigra, lineis tribus elevatis: media longissima. *Vdm. Diff.* 8.

Habitat in Europa boreali.

*opaca.* 12. S. fusca, elytris concoloribus lineis elevatis subternis, thorace antice truncato. *Linn. Syst. Nat.* II. 571. 15. *Fn. Sv.* 454.

Habitat in Europa.

S. atratae paulo minor.}

13. S. thorace emarginato rugosissimo, elytris lineis elevatis tribus apice sinuatis. *sinuata.*

Peltis nigra, elytris lineis tribus elevatis, spatio interjecto minutissime punctato, thorace scabro. *Geoff.*  
*Inf. I. 119. 2.*

Habitat in Anglia. Cap. Bon. Spec. *Dom. Banks.*

Statura omnino S. opacae, cuius forte varietas.

Thorax antice emarginatus, fuscus, argenteo colore splendens, punctis nigris elevatis, scaber. Elytra nigra apice sinu rotundo excavata:

14. S. nigra, elytris pallidis, puncto baseos medioque quadrinigro, thorace emarginato. *Linn. Syst. Nat. II. punctata.*  
571. 14.

Peltis nigra, thorace elytrisque testaceis, thoracis macula coleoptrorumque punctis quinque nigris. *Geoff.*  
*Inf. I. 122. 7.*

Silpha quadripunctata nigra, elytris ex albidis, maculis quatuor nigris. *Schreb. Inf. 2. fig. 5.*

Habitat frequens in quercu Angliae.

15. S. testacea, antennis apice nigris.

*Paede-*  
*montana.*

Peltis tota testacea. *Geoff. Inf. I. 123. 9.*

Habitat Paedemontiae. *Dr. Allioni.*

Statura et magnitudo S. atratae. Corpus totum obscure testaceum, elytris tamen paulo pallidioribus. Elytra laevissima, punctata: lineis tribus elevatis obsoletis. Ultimi tres articuli antennarum nigri.

16. S. ferruginea, elytris lineis elevatissimis, thorace emarginato, capite latiore. *Linn. Syst. Nat. II. 572. 19.* *ferrugi-*  
*nea.*  
*Scop. Ent. carn. 60.*

Scarabaeus minor e rufo sordide nigricans, elytris striatis. *Raj. Inf. 84. 33.*

Habitat in Europa.

17. S. nigra, elytris striis punctatis: lineis elevatis senis, thorace emarginato. *Linn. Syst. Nat. II. 572. 22. Fn.*  
*Sv. 460.* *oblonga.*

Habitat in Europa.

**23. OPATRVM.** *Palpi anteriores clavati, clava oblique truncata: posteriores filiformes. Labium subemarginatum. Antennae moniliformes, extrorsum crassiores.*

*sabulosum.* 1. *O. fuscum, elytris lineis elevatis tribus dentatis, thorace emarginato.*

*Silpha fabulosa fusca, elytris lineis elevatis tribus utrinque dentatis, thorace subemarginato. Linn. Syst. Nat. II. 572. 17. Fn. Sv. 456.*

*Tenebrio atra, elytris striis quinque utrinque dentatis. Geoff. Inf. I. 350. 7.*

*Dermestes niger, inter elytrorum lineas quatuor elevatis scrobiculis exaratus. Vddm. Diff. 5.*

*Habitat in Europae, Americae borealis fabulosis.*

*gibbum.* 2. *O. nigrum, elytris lineis elevatis plurimis obsoletis. Habitat in Sveciae collibus arenosis.*

*Magnitudo omnino praecedentis, at magis oblongum et postice magis gibbum. Elytra obsoleta, lineis elevatis striata.*

*arenari-* 3. *O. griseum, elytris striatis.*

*Habitat in Cap. bon. Spei. Mus. Dom. Banks.*

*Statura et magnitudo omnino O. fabulosi: obscure cinereum. Palpi anteriores clava oblique truncata. Antennae moniliformes, extrorsum crassiores. Capitis clypeus emarginatus. Thorax laevis. Elytra striata. Pedes nigri.*

*orientale.* 4. *O. cinereum, thorace elytrisque rugosis, tibiis anticis dilatatis triangularibus.*

*Habitat in Oriente. Forskahl.*

*Simillimum S. gibbae. Caput ruga transversali elevata clypeoque fisso. Thorax scaber, rugosus, inaequalis. Elytra scabra striisque longitudinalibus rugosa. Pedes cinerei.*

5. O.

5. O. cinereum, thorace rugoso, elytris lineis elevatis qua- *minutum.*  
tuor laevis.

Habitat in Svecia.

Praecedentibus quadruplo minus, totum cinereum ob-  
scurem. Elytra laevia lineis elevatis quatuor.

24. NITIDVLA. *Palpi filiformes.*

*Maxilla cylindrica, mem-  
branacea.*

*Labium cylindricum, inte-  
grum.*

*Antennae clava solida.*

1. N. ovata, nigra, elytris puncto rubro.

Sylpha 2 pustulata oblonga, nigra, elytris singulis  
puncto unico rubro. *Linn. Syst. Nat.* II. 570. 4.  
*Fn. Sv.* 445.

*Dermestes niger coleoptris, punctis rubris binis. Geoff.*

*Ins* I. 100. 3.

Habitat in Europae cadaveribus.

2. N. testacea, subtomentosa, thorace emarginato, oculis *aestiva.*  
nigris.

Silpha aestiva, testacea, subtomentosa. Thorace emar-  
ginato, oculis nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 574. 32.  
*Fn. Sv.* 465.

Habitat in Europae floribus.

3. N. ovata, thorace marginato, ferruginea, capite fusco. *ferrugi-  
nea.*  
*Dermestes ferrugineus, oblongus, ferrugineus, semi-*  
*cylindricus, elytris abbreviatis. Linn. Syst. Nat.* II.  
564. n. 21? *Fn. Sv.* 433?

Habitat in Angliae lycoperdis: capt. d. 9. Jul.

Magnitudo et statura N. aestivae. Caput fuscum, imma-  
culatum, fronte impressa. Thorax marginatus, fer-  
ruginous, antice emarginatus. Elytra obsolete pun-  
ctato-striata, ferruginea, postice obscuriora. Ab-  
domen in quibusdam acutum prominet. Subtus niger,  
pedibus ferrugineis.

4. N.

*Colon.* 4. N. nigra, elytris ferrugineo variis, thorace emarginato.

Silpha Colon nigra, elytris ferrugineo variis, thorace emarginato; tergo dupli puncto impresso. *Linn. Syst. Nat.* II. 573. 27. *Fn. Sv.* 462.

Habitat in Europa.

Duplicem vidi varietatem vix nisi magnitudine differentem.

*discoidea.* 5. N. thorace marginato, nigra, elytrorum disco ferrugineo.

Habitat in Anglia. *Dom. Banks.*

Statura et magnitudo N. bipustulatae. Caput atrum. Thorax inaequalis, marginatus margine obscure ferrugineo. Scutellum nigrum. Elytra nigra macula magna, orbiculata, communi, ferruginea. Pedes nigri.

*pedicula-* 6. N. nigra, elytris laevibus, thorace marginato.

*ria.* Silpha pedicularia nigra, elytris laevibus, thorace marginato. *Linn. Syst. Nat.* II. 574. 34. *Fn. Sv.* 466.

Habitat in Europae hortis.

*aenea.* 7. N. thorace marginato viridi, aenea, antennis pedibusque nigris.

Habitat in Anglia. *Dom. Banks.*

Statura N. bipustulatae, at duplo minor. Corpus totum viride-aeneum, laeve, glabrum.

*rufipes.* 8. N. nigra, nitida, pedibus pallidis.

Silpha rufipes nigra, laevis, thorace subemarginato, pedibus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 573. 24.

Habitat in Anglia.

Statura N. aeneae, at paulo longior. Totum corpus nigrum violaceo nitens, glabrum. Pedes pallidi, geniculis nigris.

25. COCCINELLA. *Palpi anteriores securiformes, posteriores filiformes.*

*Labium cylindricum.*  
*Antennae clava solida:*

1. C. coleoptris rubris: margine nigro, thorace utrinque puncto marginali albo. *Coccinella marginata* *margi-*  
*nata.*  
Coccinella marginata coleoptris flavis immaculatis, margine nigro, thoracis margine punctis duobus albis.  
*Linn. Syst. Nat. II. 579. 1.*  
Habitat in Brasilia.
2. C. coleoptris rubris immaculatis, thorace capiteque nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 579. 2. Am. Acad. 6.* *surina-*  
*mensis.*  
393. 12.  
Habitat in America meridionali.  
Corpus magnitudine C. 7 punctatae.
3. C. coleoptris sanguineis immaculatis, thorace maculis *sanguinea.*  
nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 579. 3. Amoen. Acad. 6.*  
393. 4.  
Habitat in America meridionali.  
Parva, subtus atra.
4. C. coleoptris rubris: puncto nullo. *Linn. Syst. Nat. II.* *impun-*  
*ctata.*  
579. 4.  
Habitat in Sveciae hortis.  
Magnitudo C. bipunctatae.
5. C. elytris rubris: lineola baseos apicisque nigra. *lineola.*  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
Parva. Caput albidum. Thorax albidus punctis quatuor nigris. Elytra rubra lineolis duabus, altera ad basin, altera versus apicem nigris. Subtus nigra, tibiis albis.
6. C. coleoptris rubris: punctis nigris duobus. *Linn. Syst. 2 punctata.*  
*Nat. II. 580. 7. Geoff. Ins. I. 320.*  
Scarabaeus alter niger, exiguis, pennarum crustis miniatulis, in quibus duae tantum maculae nigrae. *List.*  
*Scar. Angl. 383. 8.*  
*Scara-*

*Scarabaeus hemisphaericus minor*, elytris e flavo rubentibus, singulis maculis seu punctis nigris media parte notatis. *Raj. Inf.* 86. 2.

*Coccinella anglica bimaculata* seu minor rubra. *Petiv. Gazoph.* 34. tab. 21. fig. 4.

*Coccinella secundae magnitudinis*, punctis coleoptorum duobus. *Frisch. Inf.* 9. 33. tab. 16. fig. 4.  
Habitat in hortis frequens.

*bierogly-phica.* 7. *C. coleoptris luteis*: maculis duabus nigris longitudinalibus sinuatis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 580. 14. *Fn. Sv.* 476.  
Habitat in Europa.

Parva est. Caput nigrum flavo maculatum. Thorax flavus, punctis quatuor baseos et uno utrinque laterali nigris. Elytra flava lineis duabus longitudinalibus nigris, exteriore sinuata, interiore interrupta, vel potius punctis quatuor constante. Corpus atrum.

*inaequalis.* 8. *C. elytris flavis*; punctis anticis tribus, futura fascia que apicis nigris.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Corpus nigrum. Caput flavum. Thorax ater, antice flavus. Elytra flava futura antice maculis tribus et postice fascia magna inaequali nigris.

*trifasciata.* 9. *C. coleoptris rubris*: fasciis nigris tribus, *Linn. Syst. Nat.* 11. 580. 13. *Fn. Sv.* 475.

Habitat in Europae hortis.

Affinis *C. conglomeratae*.

*4 punctata.* 10. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris quatuor. *Linn. Syst. Nat.* 11. 580. 9.

Habitat in Europa media.

Thorax flatus, punctis 4 nigris.

*5 punctata.* 11. *C. coleoptris sanguineis*: punctis nigris quinque. *Linn. Syst. Nat.* 4. 580. 4. *Fn. Sv.* 474. *Geoff. Inf.* 1. 320.

Habitat in Europae arboribus.

*glacialis.* 12. *C. coleoptris rubris*: punctis sex nigris, intermediis majoribus sinuatis.

Habitat in America boreali, *D. Drury.*

Statura C. 13 punctatae. Caput atrum, macula frontalē alba. Thorax ater, nitidus, margine lineolisque duabus obliquis albis. Elytra rufa, punctis tribus nigris, quorum baseos parvum, intermedium majus sinuatum, apicis orbiculatum. Differt manifeste a C. sex-punctata *Linnaei*.

13. C. coleoptris rubris: punctis nigris septem. *Linn. Syst. Nat.* II. 581. 15. *Fn. Sv.* 477. *Geoff. Ins.* I. 321. tab. 6. 7 punctata. fig. 1.

*Scarabaeus alter niger. List. Scar. Engl.* 382. 7.

*Coccinella anglica vulgatissima, rubra, septem nigris maculis punctata. Petiv. Gazoph.* tab. 21. fig. 3.

*Scarabaeus subrotundus s. hemisphaericus rubens, major vulgatissimus. Raj. Ins.* 86. 1.

*Coccinella major. Frisch.* 4. tab. 1. fig. 4.

*Roef. Ins.* 2. *Scar.* 3. p. 7. tab. 2.

Habitat in Europae plantis frequentissima.

14. C. coleoptris rubris: punctis nigris octo.

Habitat in Germania. *D. de Hattorf.*

Magnitudo C. 2 punctatae. Caput albicans, punctis duobus nigris in fronte. Thorax albicans, punctis quinque nigris ad basin, et unico utrinque ad marginem. Elytra rubra, punctis quatuor nigris, quorum unicum ad basin et tria in medio.

15. C. coleoptris rubris: punctis novem nigris, postice communi, thorace bipunctato. 9 punctata.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Corpus rufum. Thorax ruber, nitidus, punctis duobus dorsalibus nigris. Elytra punctis quatuor. I. 2. 1. et postico communi.

16. C. coleoptris rubris: punctis nigris novem. *Linn. Syst. Nat.* II. 581. 16. *Fn. Sv.* 478. 10 punctata.

*Coccinella coleoptris rubris, punctis novem nigris, thorace nigro, lateribus albis. Geoff. Ins.* I. 322. 4.

*Coccinella nigra elytris rubris, punctis novem nigris.*

*Vddm. Diff.* 14.

Habitat in Europa.

- 10 pun-  
Etata.* 17. *C. coleoptris fulvis: punctis nigris decem, thorace quadrimaculato.* *Linn. Syst. Nat. II. 581. 17. Fn. Sv. 479. Scopul. carn. 237.*  
Habitat in Europa.
- dilatata.* 18. *C. subrotunda, coleoptris marginatis fulvis: punctis nigris decem, thorace bipunctato.*  
Habitat in America. *Mus. Brit.*  
*Magna, fulva. Thorax antice valde emarginatus, mar-*  
*gine punctisque duobus dorsalibus nigris. Elytro-*  
*rum margo dilatatus, niger.*
- 11 pun-  
Etata.* 19. *C. coleoptris rubris: punctis nigris undecim.* *Linn.*  
*Syst. Nat. II. 581. Fn. Sv. 480.*  
*Coccinella coleoptris rubris: punctis undecim nigris,*  
*thorace rubro, immaculato.* *Geoff. Ins. I. 325. 9.*  
*Strom. Aet. Nidr. 3. tab. 6. fig. 2.*  
Habitat in Europa boreali.
- 12 pun-  
Etata.* 20. *C. coleoptris flavis: punctis nigris duodecim: ex-*  
*timis linearibus repandis.* *Linn. Syst. Nat. II. 581. 19.*  
Habitat in Europae hortis.  
*Thorax flavus, punctis maculisque duabus nigris.*
- chrysome-  
lina.* 21. *C. coleoptris rufis: punctis duodecim nigris, thorace*  
*immaculato.*  
Habitat in insula St. Helena. *Mus. Dom. Banks.*  
Major. Caput et thorax rubra, immaculata, margine  
paulo pallidiora. Elytra rufa, punctis sex nigris  
per paria distributis. Pedes flavescentes.
- borealis.* 22. *C. coleoptris flavis, punctis nigris duodecim, duobus*  
*communibus, ultimis orbiculatis.*  
Habitat in America boreali. *D. Drury.*  
Statura C. ocellatae. Caput flavum. Thorax flava,  
punctis tribus nigris, intermedio majori. Elytra  
flava, punctis septem, at duobus ad suturam dimi-  
diatis nigris, ultimo orbiculato majori 3. 3. 1. Sub-  
tus flava, pectore nigro.
- cassidea.* 23. *C. oblonga rubra: coleoptris punctis duodecim, tho-*  
*race quatuor nigris.*  
Habitat in Marylandia. *Mus. Brit.*

Thorax

- Thorax ruber, punctis quatuor nigris, antice emarginatus, margine incrassato, postice tridentatus. *13 punctata.*
24. C. rotunda, coleoptris flavis: punctis nigris tredecim. *13 maculata.*  
Habitat in Svecia.  
Distincta sane a *13 punctata*, tota fere orbiculata.  
Thorax albus, maculis quatuor nigris. Coleoptra flava, punctis nigris *13* nempe, 1, 3, 2, et communi.
25. C. oblonga, coleoptris luteis: punctis nigris tredecim. *13 punctata.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 582. 20. Geoff. Inf. I. 323.*  
Coccinella *13 punctata*. *Scopol. carn. 238.*  
*Reaum. Inf. 3. tab. 31. fig. 79.*  
Habitat in Europa.  
Puncta elytrorum 1. 2. 2. 1. et communi ad basin.
26. C. coleoptris flavis: punctis nigris quatuordecim: quibusdam contiguis. *Linn. Syst. Nat. 3. 582. 21.* *Fn. Sv. 482.*  
*Coccinella tessulata. Scop. carn. 243.*  
*Coccinella luteo nigroque variegata. Frisch. Inf. 9.*  
tab. 17. fig. 4. 5.  
Habitat in Europa.
27. C. coleoptris luteis, punctis nigris quindecim. *Linn. ocellata.*  
*Syst. Nat. II. 582. 23. Fn. Sv. 484.*  
Coccinella elytris flavo-luteis, punctis *15* nigris, ocello flavo cinctis. *Gad. Sat. 16.*  
Coccinella. *Sultz. Inf. tab. I. fig. 14.*  
*Schaeff. Icon. tab. I. fig. 2.*  
- elem. tab. 47. fig. I.  
*Menar. Inf. Eur. 48. fig. 5.*  
Habitat in Europae hortis.  
Major reliquis.
28. C. coleoptris flavis: punctis nigris octodecim, ultimo arcuato. *Linn. Syst. Nat. II. 582. 24.* *18 punctata.*  
Habitat in Europa boreali.  
Media, thorax lateribus flavis.
29. C. coleoptris flavis, punctis nigris novendecim. *Linn.*  
*Syst. Nat. II. 582. 25. Fn. Sv. 485.* *19 punctata.*  
Coccinella coleoptris rubris: punctis novendecim.  
*Geoff. Inf. I. 325. 10.*

Habitat in Europae plantis, hortis.

Thorax punctis 6. Elytris punctis 9. et unico communi.

- 20 punctata.* 30. *C. coleoptris flavis:* punctis nigris viginti. Coccinella coleoptris flavis, punctis viginti nigris. *Geoff. Inf.* I. 329. 17. Habitat in Anglia. *D. Eaton.* Parva. Statura hieroglyphicae. Caput nigrum. Thorax flavus, punctis quinque baseos nigris. Elytra flava, punctis tribus nigris, dein 3. ultimis quatuor in figura quadrata dispositis. Subtus nigra.
- 22 punctata.* 31. *C. coleoptris flavis:* punctis nigris viginti duobus. *Linn. Syst. Nat.* II. 582. 26. *Fn. Sv.* 486. Habitat in Europa. Parva est.
- 25 punctata.* 32. *C. coleoptris rubris:* punctis rubris viginti quinque distinctis. *Linn. Syst. Nat.* II. 582. 27. Habitat in Germaniae hortis. Thorax ruber, punctis tribus nigris.
- 24 punctata.* 33. *C. coleoptris rubris:* punctis nigris viginti quatuor. *Linn. Syst. Nat.* II. 583. 28. *Fn. Sv.* 487. *Geoff. Inf.* I. 326. 11. Habitat in Europa.
- 28 punctata.* 34. *C. coleoptris rubris:* punctis nigris viginti octo. Habitat Tranquebariae. *Koenig.* Corpus medium rufum. Thorax rufus, punctis nigris septem, duobus in medio fere coalitis. Elytra subvillosa, punctis nigris 14.
- conglomerata.* 35. *C. coleoptris flavescensibus:* punctis nigris plurimis contiguis. *Linn. Syst. Nat.* II. 583. 31. *Fn. Sv.* 490. Coccinella coleoptris rubris, punctis plurimis nigris, quibusdam connexis, futura longitudinali nigra. *Geoff. Inf.* I. 316. 12. Scarabaeus hemisphaericus flavidus, maculis nigris variae figurae depictus. *Raj. Inf.* 87. 5. Scarabaeus luteus, nigris maculis distinctus. *Lifl. Loqu.* 383. 9. *Frisch. Inf.* 9. p. 34. tab. 17. fig. 6. Habitat in Europa. Nimis affinis *C. 14 punctatae.*

36. C. flava, coleoptris immaculatis, thorace albo maculato. *detrita.*  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
 Statura et magnitudo C. 14 punctatae. Corpus totum  
 flavescens. Caput punctis duobus orbitaque ocu-  
 lorum albis. Thorax utrinque margine puncto,  
 lineis duabus flexuosis, lineaque dorsali albis. Ely-  
 tra immaculata.
37. C. coleoptris luteis: punctis albis decem. *Linn. Syst. 10guttata.*  
*Nat. II. 583. 33.*  
 Habitat in Svecia.  
 Puncta elytrorum 2. 2. 1.
38. C. coleoptris rufis: punctis albis quatuordecim. *14guttata.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 583. 34. Fn. Sv. 492. Geoff. Ins. I.*  
*327. 13.*  
 Scarabaeus subrufus. *Lift. Scar. Angl. 383. X.*  
 Habitat in Europae salicibus.
39. C. coleoptris luteis: punctis albis sedecim. *Linn. Syst. 16guttata.*  
*Nat. II. 584. 35. Fn. Sv. 493.*  
 Coccinella 16 guttata. *Scop. carn. 249.*  
 Habitat in Europa.
40. C. coleoptris rubris: punctis albis octodecim. *18guttata.*  
 Habitat in Europa.  
 Parva, punctis novem in singulo elytro.
41. C. coleoptris rubris: punctis albis viginti. *Linn. Syst. 20guttata.*  
*Nat. II. 584. 37. Fn. Sv. 495.*  
 Habitat in Europa.
42. C. coleoptris rubris: lineis punctisque albis. *Linn. oblongo-*  
*Syst. Nat. II. 584. 38. Fn. Sv. 496. guttata.*  
 Habitat in hortis rarius.
43. C. coleoptris nigris; puncto nullo. *Linn. Syst. Nat. II. impunsta-*  
*584. 40.*  
 Habitat in Germaniae nemoribus.  
 Thoracis latera flava puncto nigro.
44. C. coleoptris atris: maculis duabus rubris. *Linn. Syst. Cacti.*  
*Nat. II. 584. 41.*  
 Coccinella coleoptris marginatis, nitidis, atris, macula  
 solitaria subrotunda utrinque. *Gronov. Zooph. 609.*

*Scarabaeus hemisphaericus cochinelifer.* *Petiv. Gazoph.*  
tab. 1. fig. 5.

*Sloan. Fam.* 2. tab. 237. fig. 31-33. et tab. 9. fig. 13.  
Habitat in Americae caētis, saepius inter coccus caēti  
leēta.

Affinis C. 2 pustulatae, a qua tamen differt macula  
majori simplicissima.

*2 pustulata* 45. *C. coleoptris nigris:* punctis rubris duobus compositis, abdomine sanguineo. *Linn. Syst. Nat.* 11. 585. 42. *Fn. Sv.* 498.

*Coccinella rotunda nigra, coleoptrorum margine re-*  
*fexo, fascia transversa rubra.* *Geoff. Inf.* 1. 334. 26.

*Coccinella media nigra, punctis duobus rubris dorsali-*  
*bus.* *Frisch. Inf.* 9. p. 34. tab. 16. fig. 6.

*Roef. Inf. Scarab.* 3. p. 10. tab. 3.

Habitat in Europa.

Singulum punctum e tribus componitur.

*4 pustu-*  
*lata* 46. *C. coleoptris nigris:* punctis rubris quatuor: interi-  
oribus longioribus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 585. 43. *Fn.*  
*Sv.* 499.

*Coccinella rotunda nigra, coleoptrorum magine reflexo,*  
*punctis quatuor rubris.* *Geoff. Inf.* 1. 333. 25.  
Habitat in Europae urticis.

*6 pustu-*  
*lata.* 47. *C. coleoptris nigris:* punctis rubris sex. *Linn. Syst.*  
*Nat.* 11. 585. 44. *Fn. Sv.* 500.

*Coccinella ovata, coleoptris nigris:* punctis rubris sex.  
*Geoff. Inf.* 1. 331. 10.

*Scarabaeus hemisphaericus minor, elytris nigris, ru-*  
*bris maculis pictis.* *Raj. Inf.* 87. 4.  
Habitat in Europa.

*lunata.* 48. *C. coleoptris nigris,* maculis decem rubris, sex  
lunatis.

Habitat in insula St. Helena. *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Caput album. Thorax niger margine antico,  
in primis ad latera albo. Elytra atra macula magna  
lunata, baseos punctis duobus rotundatis, in medio  
et postice maculis duabus magnis lunatis, altera ad  
marginem interiorem, altera ad exteriorem. Corpus  
subtus nigrum.

49. *C. coleoptris nigris*: punctis fulvis rotundatis decem. *Linn. Syst. Nat.* II. 585. 35. *Fn. Sv.* 501. *10 pustulata.*
- Coccinella coleoptris nigris*, punctis decem flavescens-tibus aut rubris. *Geoff. Inf.* I. 330. 19.  
Habitat in Europa.  
Variat maculis flavis et rubris.
50. *C. coleoptris nigris*: punctis albis quatuordecim. *Linn. Syst. Nat.* II. 585. 46. *Fn. Sv.* 502. *Geoff. Inf.* I. 530. 18. *14 pustulata.*
- Coccinella 14 maculata.* *Pod. Inf.* 26.  
Habitat in Europae floribus.  
Maculae interdum flavae, interdum rubrae.
51. *C. coleoptris nigris*; punctis duobus flavis, quatuor rufis. *Guttata-pustulata.*  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
Magna. Caput flavescentia. Thorax niger, lateribus late albis. Elytra nigra, puncto flavescente ad marginem exteriorem baseos; puncto majore rufo ad marginem interiorem, et denique postice macula magna vel posticis fascia sinuata rufa, quae tamen suturam haud attingit. Corpus nigrum.
52. *C. globosa*, *coleoptris atris*: punctis sex albis. *felina.*  
Habitat in America boreali. *D. Drury.*  
Parva, tota globosa. Caput album, immaculatum. Thorax albus macula baseos nigra. Elytra atra punctis tribus lineolaque parva baseos albis.
53. *C. coleoptris nigris*, punctis flavis octo. *Linn. Syst. Nat.* II. 585. 48. *Fn. Sv.* 504. *pantherina.*  
Habitat in Europa.
54. *C. coleoptris atris*: punctis albis sedecim. *leonina.*  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
Parva. Caput atrum punctis duobus albis in fronte. Thorax ater utrinque macula magna marginali alba. Elytra atra nitida punctis octo albis 2. 3. 2. 1. Corpus atrum.

*tigrina.* 55. C. coleoptris nigris: punctis albidis viginti. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 586. 49. *Fn. Sv.* 505.

*Coccinella coleoptris nigris, punctis viginti albis.* *Vddm.*  
*Diff.* II.

Habitat in Europa boreali.

26. CASSIDA. *Palpi anteriores clavati:*  
*posteriores filiformes.*  
*Labium elongatum integrum.*  
*Antennae moniliformes.*

*viridis.* 1. C. viridis corpore nigro. *Geoff. Inf.* I. 313. 1. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 574. 1. *Fn. Sv.* 467. *Scop. Ent. carn.* 117.  
*Scarabaeus antennis clavatis, clavis in annulos divisus.*  
*Raj. Inf.* 107. 5.

*Testudo viridis.* *Goidait belg.* Vol. I. 94. tab. 43.  
*Roef. Inf.* 2. *Scarab.* 3. tab. 6.

*Reaum. Inf.* Vol. 3. tab. 18.

*Merian. Eur.* tab. 115.

Habitat in plantis variis Europae.

Larva depressa, hexapoda, spinis lateralibus acutis,  
cauda bifeta. Proprio stercore obtecta, obambulat.

*maculata.* 2. C. viridis, elytris variis, sutura dorsali confertius nigro  
maculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 575. 6.

*Cassida viridis maculis nigris variegata.* *Geoff. Inf.* I.  
314. 5. tab. 5. fig. 6.

Habitat in Germaniae plantis.

Affinis C. viridi.

*affinis.* 3. C. elytris griseis nigro punctatis, thorace flavescente,  
immaculato.

Habitat in Germania. *D. de Hattorff.*

Nimis praecedenti affinis. Corpus atrum. Thoracis  
clypeus omnino flavesiens, immaculatus. Elytra grisea  
punctis numerosis nigris. Margo flavesiens, ante  
tice immaculatus, postice punctis quatuor nigris.

4. C. virens, sutura dorsali sanguinolenta. *Linn. Syst.* *Vibex.*  
*Nat.* II. 575. 5.  
 Habitat in Germania.  
 Niunis affinis praecedentibus.
5. C. pallido nebulosa fusco punctata. *Linn. Syst. Nat.* II. *nebulosa.*  
 575. 3. *Fn. Sv.* 468.  
*Cassida nebulosa*, pallida, corpore nigro. *Geoff. Inf.* I.  
 313. 2.  
 Scarabaeus minor fordide fulvus, punctis et maculis  
 aliquot nigris temere sparsis notatus. *Raj. Inf.* 88. 13.  
*Cassida viridis*. *Frisch. Inf.* 4. p. 30. tab. 15.  
 Habitat in carduis.
6. C. viridis, thoracis elytrorumque marginibus flavis. *margi-*  
*Habitat in Brasilia. Mus. Dom. Banks.* *nella.*  
 Statura omnino C. nebulosae. Clypeus rotundatus,  
 integer, viridis, margine flavo. Elytra punctata, viri-  
 dia, margine flavo. Aliam vidimus simillimam, totam  
 pallescentem, vix distinctam.
7. C. flavescens, thorace immaculato, clytris ante mar-  
 ginem punctisque nigris. *interru-*  
*Habitat in nova Hollandia. Mus. Dom. Banks.* *pta.*  
 Statura omnino praecedentis. Antennae flavae, apice  
 nigrae. Thoracis clypeus rotundatus, flavus, integer.  
 Elytra flavescens, linea lata atra in medio inter-  
 rupta, quae ante marginem a basi ad angulum ani  
 excurrit. Margo ipse late flavescens fasciis duabus  
 atris, altera ad basin, altera versus apicem. In disco  
 obscuriore puncta aliquot nigra sparsa. Corpus  
 subtus flavescens.
8. C. rufescens, thorace punctis duobus, elytris nume-  
 rosis cyaneo nigris, clypeo integro. *deusta.*  
 Habitat in nova Hollandia. *Dom. Banks.*  
 Statura nostratum. Antennae apice nigrae. Clypeus  
 rotundatus, integer, rufus, punctis duobus nigris  
 in medio, elytra rufa, punctis circiter novem latera-  
 libus majoribus nigro cyaneis. Margo subtus fasciis  
 tribus. Corpus flavescens.

- cribraria.* 9. *C. rufescens*, thorace punctis quatuor, elytris numerosis, nigris, clypeo emarginato.  
*Habitat in America. Mus. Dom. Banks.*  
*Statura nostratum, at paulo major. Antennae apice nigrae. Clypeus emarginatus, rufescens, punctis quatuor dorsalibus nigris. Elytra laevia, gibba, rufescens, punctis numerosis sparsis. Corpus nigrum.*
- murraca.* 10. *C. nigra*, clypeo rubro, elytris sanguineis: punctis nigris sparsis. *Linn. Syst. Nat. II. 575. 2.*  
*Cassida rubra maculis nigris variegata. Geoff. Inf. I. 314. 5. B.*  
*Habitat in plantis Europae.*  
*Varietatem C. maculatae dicit Geoff. An rite?*
- nobilis.* 11. *C. grisea*, elytris linea coerulea nitidissima. *Linn. Syst. Nat. II. 575. 4.*  
*Cassida pallida, linea dupli longitudinali viridi deaurata. Geoff. Inf. I. 313. 3.*  
*Scarabaeus antennis clavatis, clavis in annulos divisus. Raj. Inf. 107. 7.*  
*Habitat in stellatis, carduis Europae.*
- cruciata.* 12. *C. flavescens*, coleoptris disco nigro: maculis quatuor flavescentibus.  
*Cassida cruciata pallida, elytris disco fusco cruciato. Linn. Syst. Nat. II. 576. 9.*  
*Habitat in Europa.*  
*Corpus magnitudine C. nebulosae, pallide flavescens. Thoracis clypeus rotundatus, integer, lineolis tribus dimidiatis nigris; intermedia breviore, obsoletiore. Elytra punctata, vix marginata, pallida, disco nigro, maculis duabus magnis flavescentibus dorsalibus.*
- suberculata.* 13. *C. testacea*, margine thoracis elytrorumque flavis, coleoptris basi trituberculatis.  
*Cassida marginata, testacea, margine thoracis elytrorumque flavo. Linn. Syst. Nat. II. 576. 14.*  
*Habitat in Sierra Leon Africæ.*  
*Parva; statura C. cruciatae. Testa testacea, margine omni flavo: excepto elytrorum basi testaceo. Coleoptra basi tuberculis tribus elevatis, lateralibus minoribus. Corpus subtus pallidum.*

14. *C. thorace flavo, elytris rufescentibus, maculis duabus lateralibus flavis.* *biguttata.*  
*Habitat Cajennae. D. Manduit.*  
*Statura et magnitudo C. cruciatae. Clypeus rotundatus, integer, flavus, immaculatus. Elytra obscure rufescentia, maculis duabus oblongis flavis, posteriore minori.*
15. *C. flava, thorace immaculato, elytris nigro punctatis: margine bifasciato.* *miliaris.*  
*Habitat in insula St. Helena. Mus. Dom. Banks.*  
*Statura C. marginatae. Antennae flavae, apice nigrae. Thoracis clypeus rotundatus, integer, immaculatus. Elytra laevia, flava, punctis circiter decem nigris sparsis. Margo uti in reliquis dilatatus fasciis duabus, altera ad basin, altera versus apicem nigris. Sutura apice nigra. Subtus nigra, margine flavescente. Pedes flavi.*
16. *C. cyaneo-nigra, elytris testaceis, margine nigro.* *Linn.* *margi-*  
*Syst. Nat. II. 578. 23.* *nata.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Magnitudo C. jamaicensis. Clypeus cyaneus, medio gibbus. Elytra testacea, margine omni cyaneo. Corpus nigrum.*
17. *C. luteo-aenea, elytris innaculatis excavato punctatis.* *Linn. Syst. Nat. II. 577. 21.* *jamaicensis.*  
*Sloan. Fam. 2. p. 208. Tab. 233. fig. 27. 28.*  
*Habitat in America.*  
*Thorax elytrorumque margo testaceus. E spiritu vini extracta colorem aeneum in triste testaceum mutat, naturalem vero recuperat, aqua calida immissa.*
18. *C. cyanea, elytris angulo antico spina truncata.* *Linn.* *bicornis.*  
*Syst. Nat. II. 576. 8. Amoenit. acad. 6. p. 393. 9.*  
*Habitat in Indiis.*
19. *C. cyaneo aenea, elytris innaculatis excavato punctatis.* *Linn. Syst. Nat. II. 577. 39. Mus. Lud. Vlr. 39.* *cyanea.*  
*Petiv. Gazoph. tab. 57. fig. 6.*  
*Habitat in America. Mus. Brit.*

- spinifex.* 20. *C. ferruginea*, elytris angulo antico spina porrecta, thorace utrinque spina transversa. *Linn. Syst. Nat.* II. 576. 7. *Amoen. Acad.* 6. 392. 7.  
Habitat in India.  
Linea nigra ad basin elytrorum.
- flava.* 21. *C. flava immaculata*, corpore testaceo, puncto scutellari nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 576. 11.  
Habitat in America australi.
- leucophaea.* 22. *C. testacea*, margine punctisque flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 576. 13. *Amoen. acad.* 6. 392. 8.  
Habitat in America.  
Reliquis minor. Margo thoracis et elytrorum flavus, et praeterea puncta elevata flava in disco.
- reticulata.* 23. *C. flava*, elytris coeruleo variegatis: lateribus unifasciatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 576. 15.  
Habitat in America.  
Thorax emarginatus, testaceus, linea dorsali crassa nigra.
- variegata.* 24. *C. rufa*, elytris coeruleo variegatis: lateribus bifasciatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 576. 16.  
Habitat in America.  
Thorax fuscus. Margo extimus elytrorum tenuissime cyaneus.
- grossa.* 25. *C. sanguinea*, elytris disco punctis nigris sparsis, margine lineis ramosis nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 577. 17.  
Habitat in America meridionali.  
Gigas in hoc genere. Thorax sanguineus, immaculatus.
- 7guttata.* 26. *C. nigra*, coleoptris, maculis septem albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 577. 19.  
Habitat in India orientali.
- exclamationis.* 27. *C. elytris lineis ternis nigris*. Inter media signum! referente. *Linn. Syst. Nat.* II. 577. 20.  
Habitat in America.  
Corpus medium pallide flavescens. Lineae laterales obsoletiores.

28. C. ferrugineo aenea, elytris macula flava subovata *inaequalis*.  
*disci. Linn. Syst. Nat. II. 578. 24.*  
*Mus. petropol. 650. n. 130.*  
 Habitat in America.  
 Elytra inaequalia.
29. C. fusco aenea, elytris macula flava laterali. *Linn. lateralis.*  
*Syst. Nat. II. 578. 26.*  
 Habitat in America.  
 Tota cyaneo aenea, elytris macula magna flava.
30. C. viridi aenea, elytris macula didyma flava disci. *discooides.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 578. 27.*  
 Habitat in America. *Mus. Hunteri.*  
 Corpus subtus nigrum.
31. C. elytris viridi aeneis: maculis duabus sanguineis. *bipustulata.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 578. 30. Amoen. acad. 6. 392. 8. ta.*  
 Habitat Cayennae.  
 Statura et magnitudo C. lateralis. Clypeus rotundatus, emarginatus, obscure aeneus, innaculatus. Elytra gibba, viridi-aenea, maculis duabus sanguineis approximatis, interiori lunata, exteriori minori suborbiculata. Antennae nigrae.
32. C. nigro coerulescens, elytris flavo maculatis: maculis *decussata.*  
 dorsalibus reticulatis, lateralibus distinctis.  
 Habitat in Jamaica. *Mus. Brit.*  
 Magna. Thoracis clypeus emarginatus, coerulescens, macula utrinque magna flava. Elytra dorso reticulata, margine maculis sex vel septem distinctis flavis.
33. C. flavescens, elytris punctis duobus nigris. *Linn. 2 punctata.*  
*Syst. Nat. II. 578.*  
 Habitat in India orientali.  
 Variat elytrorum punctis duobus et tribus.

27. ALVRNVS. *Palpi* sex, acuti, brevissimi:  
*Maxilla* cornea, fornicata.  
*Antennae* filiformes.

*Grossus.* 1. ALVRNVS.

Habitat in Indiis.

Statura Chrysomelae, oblongae, at maxima. Corpus atrum. Antennae filiformes, nigrae, corpore dimidio breviores. Thorax depresso, subrugosus, basi utrinque acuminatus, coccineus, margine postico nigro. Scutellum rotundatum, nigrum. Elytra corpore majora longioraque basi, gibbosa, subpunctata, flava. Pedes nigri, tarsis subtus valde spongiosis.

28. CHRYSOMELA. *Palpi* sex extrorsum  
 crassiores.

*Labium* corneum, integrum.  
*Antennae* moniliformes.

*tenebri-* 1. C. ovata, aptera, atra, antennis pedibusque violaceis.  
*cosa.* Chrysomela atropurpurea elytris coadunatis, alis nullis. *Geoff. Inf.* 1. 295. 19.

Tenebrio laevigatus apterus, niger, laevis, elytris laevibus, thorace lunato, subtus coeruleus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 678. 29.

Habitat in Europa australiori.

Statura et summa affinitas C. Goettingensis, at triplo major.

Larva gibba, violacea, ano rufo, in plantis herbaceis polyphaga.

*Goettin-* 2. C. ovata, atra, pedibus violaceis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 586. 4. *Fn. Sv.* 506.

*Roes. Inf.* 2. Scarab. 3. tab. 5.

Habitat in Germania.

Plantae rufae.

3. C.

3. C. ovata, viridi aenea, subtus violacea. *bicolor.*  
 Habitat in Oriente. *D. Forskäbl.*
- C. Statura Ch. populi. Tota subtus violacea, supra obscure aenea. Elytra punctata, striata, striis per paria approximatis.
4. C. ovata, supra aenea, subtus testacea. *Bankii.*  
 Habitat in Lusitania. *Mus. D. Banks.*  
 Statura C. bicoloris. Caput aeneum, ore testaceo, antennisque fuscis. Elytra aenea, punctata. Subtus tota cum pedibus et elytrorum margine inferiori testacea.
5. C. ovata, nigra, elytris flavis: fasciis duabus punctisque baseos nigris. *gibbosa.*  
 Chrysomela gibbosa, ovata, nigra, elytris testaceis, nigro punctatis: fascia media posticaque nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 586. 2. Am. acad. 6. 393. 13.*  
 Coccinella. *Gron. Zooph. 606. tab. 14. fig. 5.*  
 Habitat in America meridionali.  
 Magnitudo C. graminis. Elytra flavescentia, basi punctis quatuor nigris, quorum posterius transversum commune. Fasciae dentatae.
6. C. cyanea, coleoptris flavis: fascia maculisque duabus nigris. *trimaculata.*  
 Chrysomela trimaculata ovata, nigra, elytris flavis: maculis tribus oblongis, nigris, intermedia futurae communi. *Linn. Syst. Nat. II. 592. 45.*  
 Habitat in America.  
 Magna. Caput et thorax cyanea, nitida, immaculata. Scutellum cyaneum. Elytra subpunctata, flava, fascia ad basin communi, quae marginem extiorem haud attingit. Macula magna triangularis nigra versus apicem. Pedes cyanei, plantis rufis.
7. C. aenea, elytris flavis: sutura vitta aeneis. *futuralis.*  
 Habitat in America septentrionali. *Mus. D. Banks.*  
 Media, tota aenea. Elytra flava, sutura lata aenea, quae, tamen basin elytrorum haud attingit. Vitta lata aenea in medio, quae nec basin, nec apicem attingit.

- surino-* 8. *C. cyanea*, glaberrima, antennis plantisque fuscis.  
*mensis.* Habitat Surinami. *Mus. Dom. Banks.*  
 Major Ch. graminis, tota cyanea, glabra, nitida. Os, antennae et plantae fuscae, femora subdentata.
- Graminis.* 9. *C. ovata* viridi coerulea, nitida, antennis pedibusque concoloribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 587. 7.  
*Fn. Sv.* 509.  
*Chrysomela viridi coerulea.* *Geoff. Inf.* I. 260. 10.  
*Coccinella graminis.* *Scop. carn.* 220.  
 Habitat in Europae plantis.
- cuprea.* 10. *C. ovata*, capite thoraceque aeneis elytris cupreis, corpore atro.  
 Habitat in Germania. *D. de Hattorf.*  
 Statura et magnitudo omnino *C. graminis*; Corpus, antennae et pedes nigra. Caput aeneum, oculis fuscis. Thorax aeneus, margine incrassato, punctato. Elytra omnino cuprea, nitida, basi gibba. Abdominis margo sanguineus.
- haemoptera.* 11. *C. ovata*, violacea, plantis alisque rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 587. 11. *Fn. Sv.* 572.  
*Chrysomela tota violacea.* *Geoff. Inf.* I. 258. 5.  
*Chrysomela graminis.* *Pod. Inf.* 26.  
 Habitat in pratis Europae.  
 Primus antennarum articulus rufus.
- Semistria-* 12. *C. ovata* nigra, elytris flavis: fascia media nigra; ta. antice posticeque nigro striatis.  
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*  
 Statura *C. trimaculatae*. Caput atrum, antennis moniliformibus, rufis. Thorax ater, margine antico lateribusque flavis. Elytra laevia, flava, basi striis decem abbreviatis nigris, quae nec basin, nec fasciam attingunt. In medio fascia lata atra, et postice iterum striae octo abbreviatae, secunda tertiaque brevissimis. Subtus atra, plantis ferrugineis.
- Populi.* 13. *C. ovata*, thorace coerulecente, elytris rubris, apice nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 590. 30. *Fn. Sv.* 523.  
*Chrysomela nigro-coerulea*, elytris rubris, apice nigris. *Geoff. Inf.* I. 256. 1.

*Scarabaeus viridis*, alarum thecis miniatis. *Lifler. Scarab. Angl.* 381. 6.

*Coccinella populi*. *Scopoli Ent.* 228.

*Merian. Inf.* 14. tab. 27.

*Albin. Inf.* 63. fig. 6.

Habitat in populo tremula folia saepius devastans.  
Larvae hexapodae, albo nigroque variae, duplice  
serie tuberculorum, e quibus humoris lactei gut-  
tulas fundunt. Odorem spargunt gravem et in-  
gratum. *Lifler.*

14. *C. ovata* obscure testacea tota. *Linn. Syst. Nat.* II. 590. 26. *Fn. Sv.* 518. *staphy- laea.*

Habitat in Europae pratis.

Corpus *C. polita* majus.

15. *C. ovata*, testacea, elytris aeneis: margine testaceo. *fervida.*

Habitat in insula Java. *D. Mauduit.*

Magna. Statura *C. staphylaea*. Caput testaceum, oculis  
albis. Thorax rotundatus, nitidus, testaceus, pun-  
ctis quatuor dorsalibus nigris. Elytra viridia, ni-  
tida, margine testaceo.

16. *C. ovata*, thorace aurato, elytris testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 590. 27. *Fn. Sv.* 522. *polita.*

Chrysomela viridi aenea, elytris rubicundis punctis  
sparsis. *Geoff. Inf.* I. 257. 2.

*Coccinella polita*. *Scopoli Ent. Carn.* 229.

Habitat in salice, populo.

17. *C. ovata*, nigra, elytris castaneis. *Linn. Syst. Nat.* II. 590. 28. *lurida.*

Chrysomela nigra, elytris rubris striatis, striis pun-  
ctatis. *Geoff. Inf.* I. 258. 3.

Habitat in vite. *D. Mallet.*

Statura politae, at minor.

18. *C. ovata*, nigra, elytris fasciis tribus flavis repandis. *Boleti.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 591. 36. *Fn. Sv.* 527.

Diaperis. *Geoff. Inf.* I. 337. tab. 6. fig. 3. fig. mala.

*Coccinella falcata*. *Scopoli Ent.* 247.

*Dermestes ater*, nitens, elytris nigris, fasciis duabus  
flavis undulatis. *Vddm. Diff.* 4. f. 3.

Habitat in boletis arborum.

*fotlida.* 19. C. ovata, ferruginea, capite thoraceque flavis, elytris variegatis.

Habitat in America.

Statura C. boleti. Caput et thorax flava, immaculata, oculis antennisque nigris. Elytra flavo ferrugineo-que varia, margine tamen semper flavo. Subtus abdomen et pedes ferruginea.

*nigricornis.* 20. C. ovata, nigro-aenea, capite, thoracis lateribus elytrorumque macula dupli, baseos ferrugineis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, at longior. Caput ferrugineum puncto frontali antennisque nigris. Thorax aeneus, lateribus pectoreque rufis. Elytra aenea, subtilissime punctata, basi ad marginem exteriorem macula dupli fulva. Abdomen nigrum, basi apiceque ferrugineum. Pedes nigri.

Varietatem vidimus macula ferruginea in apice elytrorum et adhuc aliam punctis duobus in medio, et majori, ad apicem elytrorum ferrugineis.

*collaris.* 21. C. ovata, violacea, thoracis marginibus albis: puncto nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 591. 37. *Fn. Sv.* 528.

Habitat in Europae, Americae salicibus.

*viminalis.* 22. C. ovata, nigra, thorace rufo bimaculato, elytris rufis. Chrysomela viminalis ovata, nigra, thorace bimaculato, elytris testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 590. 31. *Fn. Sv.* 524.

Chrysomela rubra, thorace punctis duobus nigris, coleoptrorum sutura nigra. *Geoff. Ins.* I. 265. 18.

Coccinella signata. *Scopoli Entom.* 233.

Habitat in salicibus Europae.

Affinis C. 10 punctatae.

*cyanipes.* 23. C. ovata, rufa, elytris punctis posticeque cyaneis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis paulo major. Caput rufum macula baseos antennisque moniliformibus cyaneis. Thorax rufus, nitidus, glaber. Scutellum cyaneum. Elytra glabra, basi ferruginea, punctis duobus aut tribus apiceque cyaneis, qui color ad futuram paulo altius aseendit, postice ad marginem crassiorem inter-

interdum puncto parvo ferrugineo. Abdomen nigrum, ano rufo. Pedes cyanei.

24. C. ovata, rufa, thorace macula dorsali punctisque cyanicordibus, coleoptris maculis octo cyaneis. *nis.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et summa affinitas praecedentis. Caput rufum, macula baseos antennisque cyaneis. Thorax rufus, macula magna dorsali punctaque utrinque porro cyaneis. Scutellum cyaneum. Coleoptra glabra, nitida, rufa, maculis octo cyaneis 2. 3. media communi 3. media apicis communi. Abdomen cyaneum, basi apiceque ferrugineis. Pedes cyanei.

25. C. ovata, thorace rubro postice nigro, elytris rufis, 10 punctis subquinis nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 590. 32. ta.*

*Fn. Sv. 525.*

Chrysomela rubra, elytro singulo maculis quinque nigris. *Geoff. Ins. I. 258. 4.*

Habitat in Europae populo.

Variat clytrorum punctis.

26. C. ovata, flavescens, oculis nigris. *Linn. Syst. Nat. II. pallida.*  
589. 25. *Fn. Sv. 521.*

Crioceris pallida, oculis nigris. *Geoff. Ins. I. 243.*

Habitat in falice.

27. C. ovata, flavescens, elytris maculis duabus nigris. *crassicornis.*  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura C. pallidae. Caput flavescens, oculis nigris. Antennae moniliformes, extrorsum crassiores nigrae, basi pallidae. Thorax flavescens, immaculatus. Elytra flavescens, maculis duabus nigris, posteriore majori oblonga. Pedes nigri, basi flavescentes.

28. C. ovata, nigra, elytris rubris: punctis sparsis, impressis, coeruleis. *Linn. Syst. Nat. II. 591. 33. variolosa.*

Habitat in Africa.

Statura C. 10 punctatae.

29. C. ovata, thorace viridi, elytris rubris: fascia inter punctum maculamque lunatam coerulea. *Linn. Syst. Nat. II. 591. 34. Fn. Sv. 526. lapponica.*

Habitat in Europa boreali.

Sutura elytrorum coerulea.

- undulata*. 30. C. ovata, rufa, elytris fasciis tribus atro-coeruleis, undulatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 591. 35. *Annoen. acad.* 6. 393. 14.  
 Habitat in India.  
 Fasciae elytrorum undulatae, in primis secunda. Antennae, pedes et basis abdominis atro-coeruleae.
- 18 gutta-ta*. 31. C. ovata, elytris fusca: punctis octo pallidis, quibusdam connexis.  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
 Caput pallidum macula baseos, antennisque nigris.  
 Thorax glaber, pallidus, maculis tribus dorsalibus fusca. Elytra fusca, subtilissime punctato-striata, punctis octo pallidis, quibusdam ad basin connexis. Abdomen nigrum, margine pallido.
- Polygoni*. 32. C. ovata, coerulea, thorace femoribus anoque rufis. *Linn. Syst. Nat.* II. 589. 24. *Fn. Sv.* 520.  
 Chrysomela nigra, elytris coeruleo viridibus, thorace pedibus antennarumque basi rufis. *Geff. Ins.* I. 283. 4.  
 Habitat in Polygono, gravida ultra coleoptera ventricosa evadit.
- cerealis*. 33. C. ovata, aurata, thorace lineis tribus coleoptrisque quinque coeruleis. *Linn. Syst. Nat.* II. 588. 17.  
 Chrysomela aurea, fasciis coeruleis, cupreisque alternis, punctis inordinatis. *Geff. Ins.* I. 262. 14.  
*Schaeff. Icones* I. tab. 3.  
 Habitat in Europae australioris segete.
- america*-na. 34. C. ovata, viridi aenea, elytris striis quinque sanguineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 592. 46.  
 Chrysomela americana. *Sulz. Ins.* tab. 3. fig. 16.  
 Habitat in America.  
 Caput aeneum, macula verticis coccinea. Affinis Ch. cereali.
- festiva*. 35. C. nigro aenea, elytris lineis tribus suturaque antica flavis.  
 Habitat in America. *Mus. Brit.*  
 Statura C. fastuosa, at duplo minor. Caput et thorax obscure aenea. Elytra punctato striata, obscure aenea, margine antico lineisque tribus longitudinalibus

I. ELEVTERATA. Chrysomela. 101

libus flavis. Lineae duae exteriore apice coeunt,  
intermedia vero apicem haud attingit.

36. C. ovata, aurea, coleoptris lineis tribus coeruleis. *fastuosa.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 588. 18.*

Coccinella fastuosa. *Scopoli carn. 232.*  
Habitat in lamio albo Germaniae.

37. C. ovata, viridi sericea, elytris lineis duabus aureis. *speciosa.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 588. 19.*

Coccinella speciosissima. *Scopol. Ent. carn. 231.*  
Habitat in Germaniae sylvis.  
Lineae elytrorum antice posticeque coeunt.

38. C. ovata, thorace rotundato cyaneo, elytris aureis: *aurata.*  
margin'e cyaneo.

Habitat in Pensylvania. *Muf. Brit.*  
Affinis C. fastuosae, at longior. Caput et thorax cya-  
nea, nitida, antennis nigris. Elytra aurea, nitida,  
margin'e exteriori cyaneo, basi gibba. Abdomen  
cyaneum.

39. C. ovata, atra: coleoptrorum limbo sanguineo. *limbata.*

Chrysomela nigro coerulea, elytris luridis, punctatis,  
margin'e exteriori et anterieri rubris. *Geoff. Inf.*  
I. 260. 9.

Habitat in Anglia. *Dom. Lee:*

Statura et summa affinitas C. sanguinolentae, a qua  
tamen manifeste differt elytris multo laeviori-  
bus, et margin'e anteriori sanguineo; color omnis  
niger, parum aeneo tinctus.

40. C. ovata, atra, elytris margin'e exteriori sanguineis. *sanguino-*  
*lenta.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 591. 38. Fn. Sv. 529.*

Chrysomela nigro coerulea, elytris atris punctatis,  
margin'e exteriori rubro. *Geoff. Inf. I. 259. 8.*  
tab. 4. fig. 8.

Buprestis sanguinolenta. *Scop. carn. 203.*  
Habitat in Europa.

41. C. ovata, nigro aenea, elytris margin'e luteis. *Linn. margina-*  
*ta.*  
*Syst. Nat. II. 591. 39. Fn. Sv. 529.*

Habitat in Europae pratis apricis.  
Elytra striato-punctata.

- marginella.* 42. *C. ovata*, nigro coerulea, thorace elytrisque margine luteis. *Linn. Syst. Nat.* II. 591. 40. *Fn. Sv.* 331.  
Habitat in Europae ranunculis.
- hannoveriana.* 43. *C. ovata*, cyanea, thorace margine, elytris margine vittaque ferrugineis.  
Habitat in Germania. *D. de Hattorf.*  
Parva. *Statura C. marginatae*, cyaneo nitida, glabra. Antennae moniliformes nigrae. Thorax margine late ferrugineo. Elytra punctato striata, margine vittaque media ferrugineis, quae postice cum margine coit.
- litura.* 44. *C. ovata*, rufescens, elytris sutura lineaque longitudinali nigris.  
Habitat in Anglia, capta in fabuletis Richmondensibus, die VI. Maj.  
*Statura Ch. pallidae*, at duplo minor. Caput rufum, margine postico nigro. Thorax rotundatus, nitidus, immaculatus. Elytra striato punctata, sutura lineaque media nigris. Subtus nigra, pedibus pallidis. Mas pallidus, ubi foemina rufescens, interdum linea nigra clytrorum deest.
- lineola.* 45. *C. ovata*, flava, coleoptris punctis undecim lineisque duabus nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 593. 47.  
Habitat in America.  
Puncta 3 ad basin, lineola abbreviata in medio; puncta 2 ad apicem, et unicum commune.
- sacra.* 46. *C. ovata*, supra rufa, thoracis linea punctis duobus, elytrorumque sutura nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 593. 49. *Mus. Lud. Vlr.* 40.  
Habitat in Palaestina.  
Alae sanguineae.
- haemorrhoidalalis.* 47. *C. ovata*, nigra, nitida, antennis basi flavescentibus, ano supra rubro. *Linn. Syst. Nat.* II. 587. 6. *Fn. Sv.* 508.  
Coccionella haemorrhoidalis. *Scop. Ent. carn.* 225.  
Habitat in betula, alno.  
Elytra striato punctata.

48. *C. ovata*, nigra, thorace rotundato angustiori, pedibus posticis elongatis. *obscura.*  
*Chrysomela obscura* subcylindrica, thorace pedibusque nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 599. 96.  
 Habitat in Europa.  
 Thorax valde gibbus, elytris angustior.
49. *C. ovata*, viridis, elytris flavis, viridi maculatis, antennis pedibusque ferrugineis. *philadelphica.*  
*Chrysomela philadelphica* ovata, viridis, elytris flavis: punctis virescentibus, oblongiusculis, antennis pedibusque ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 592. 44.  
*Petiv. Gazoph. tab. 26. fig. 11.*  
 Habitat in Pennsylvania.  
 Variat futura viridi et flava.
50. *C. ovata*, coerulescens, nitida, subtus nigra. *Linn. Armora-*  
*Syst. Nat.* II. 588. 16. *Fn. Sv.* 515. *ciae.*  
 Habitat in cochlearia armoracia, Ranunculo aquatili et R. flammula.
51. *C. oblonga*, nigra, punctata, elytris coriaceis. *Tanaceti.*  
*Chrysomela Tanaceti* ovata, atra, punctata, antennis pedibusque nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 587. 5.  
*Fn. Sv.* 507.  
 Galleruca atro fusca, elytris lineis tribus elevatis, punctis numerosis. *Geoff. Ins.* I. 252. I. tab. 4. fig. 6.  
 Habitat in Tanaceto Europae.  
 Variat colore toto obscure griseo.
52. *C. oblonga*, thorace flavescente, elytris viridibus: punctis sex nigris. *12 punctata.*  
 Habitat - - -  
 Statura et magnitudo *C. alni*. Caput nigrum. Antennae nigræ, articulo secundo et tertio virescentibus. Thorax flavescens puncto utrinque impresso. Elytra viridia, punctis sex nigris distinctis per paria dispositis. Pectus nigrum, abdomen et pedes flavescentes.
53. *C. oblonga*, violacea, elytris vase punctatis, pedibus antennisque nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 587. 9. *Ahi.*  
*Fn. Sv.* 511.

*Cryptocephalus violaceus*, punctis inordinatis. *Geoff.*  
*Ins. 1. 332. 1.*

*Scarabaeus Alni coeruleus*, *Frisch. Ins. 7. p. 13. tab. 8.*  
 Habitat in betula, alno,

- Betulae.* 54. *C. oblonga*, violacea, elytris punctato-striatis. *Linn.*  
*Syst. Nat. 11. 587. 10. Fn. Sv. 514.*  
*Chrysomela nigro-purpurea*, punctis excavatis striata. *Geoff. Ins. 1. 264. 17.*  
*Coccinella Betulae*. *Scop. Ent. carn. 221.*  
~~: Roef. Ins. 2. Scarab. 3. tab. 1.~~  
 Habitat in betulae albae folijs paginam inferiorem  
 exedens,

- Vitelli-nae.* 55. *C. oblonga*, viridi aenea.  
*Chrysomela Vitellinae ovata*, viridi coerulea. *Linn.*  
*Syst. Nat. 11. 589. 23. Fn. Sv. 519.*  
*Coccinella vitellinae*. *Scop. carn. 224.*  
~~: Roef. Ins. 2. Scarab. 3. p. 5. tab. 1.~~  
 Habitat in salice,  
*Parva*, tota aenea, elytris striato-punctatis. *Larvae*  
 foetentes, flavae, nigro punctatae, capite cauda-  
 que nigris, in turmis parallelis foliorum pul-  
 pam exedunt,

- vulgatissima.* 56. *C. oblonga*, coerulea, antennis basi ferrugineis. *Linn.*  
~~ma.~~ *Syst. Nat. 11. 589. 22. Fn. Sv. 517.*  
*Coccinella vulgatissima*. *Scopol. carn. 222.*  
 Habitat in Europae salicibus,  
 Affinis praecedenti, at paulo major.

- aenea.* 57. *C. oblonga*, viridis, nitida, elytris aeneis.  
*Chrysomela aenea ovata*, viridis, nitida, abdomine  
 postice ferrugineo. *Linn. Syst. Nat. 11. 587. 8.*  
~~Fn. Sv. 510.~~  
*Chrysomela viridis*, nitida, thorace antice excavato,  
 fasciis elytrorum longitudinalibus coeruleis. *Geoff.*  
*Ins. 1. 261. 12.*  
 Habitat in betula, alno,

- analis.* 58. *C. oblonga*, atra, elytris fuscis, margine exteriori  
 testaceo. *Linn. Syst. Nat. 11. 582. 42.*  
 Habitat ad praedium Illi. Archiatri Linné. *Hammarby.*  
 Thorax ater, nitens. Antennae basi pallescentes.

# I. ELEVTERATA. *Cryptocephalus.* 105

59. *C. oblonga*, thorace marginato, sanguineo: macula nigra, elytris sanguineis: maculis duabus nigris.  
*Linn. Syst. Nat.* II. 592. 43. *Fn. Sv.* 532.

*Coccinella coleoptris rubris*, maculis 4. nigris. *Uddm.*  
*Diss.* 13.

Habitat in *Europae borealis corylo.*

60. *C. oblonga*, nigra, coleoptris rubris, punctis decem nigris, duobus communibus. *10 maculata.*

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

*Statura C. coccinea.* Corpus nigrum. Thorax submarginatus, rufus, maculis duabus magnis dorsalibus nigris. Coleoptera coccinea punctis nigris decem.  
3. 2. 3. 2.

65. *C. oblonga*, viridi aenea, thoracis marginibus albis, *20 punctata.*  
elytris albis: maculis decem aeneis. *1a.*

*Petiv. Gazoph.* tab. 29, fig. 5.

Habitat in Anglia. *Mus. Brit.*

*Statura C. analis.* Thorax aeneus, marginibus incrassatis albis. Elytra alba, sutura maculisque decem oblongis aeneis. Pedes aenei, geniculis albis.

## 29. CRYPTOCEPHALVS.

*Palpi* filiformes.

*Maxilla* unidentata.

*Labium* corneum, integrum.

*Antennae* filiformes.

1. *C. niger*, obscurus, elytris pallidis: maculis tribus nigris, pedibus anticis elongatis. *longipes.*

Habitat Dresdae.

*Statura C. tridentati*, at major, *Antennae breves*, serratae. Thorax niger, subpubescens. Elytra pallida, punctis tribus nigris, uno ad basin et pari in medio. Pedes nigri, antici in omnibus, quos vidi, elongati.

- 4 punctata.* 2. *C. niger*, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis brevibus serratis.  
*Chrysomela* 4. *punctata cylindrica*, thorace nigro, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis brevibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 596. 76. *Fn. Sv.* 432.  
*Melolontha coleoptris rubris*, maculis quatuor nigris, thorace nigro. *Genff. Inf.* I. 195. tab. 3. fig. 4.  
*Buprestis quadripunctata*. *Scopoli Ent.* 206.  
*Habitat in corylo frequens.*
- 10 maculatus.* 3. *C. niger*, thorace elytrisque rubris: punctis quatuor nigris.  
*Habitat in Capite bonae spei*. *Mus. Dom. Banks.*  
*Statura et magnitudo omnino C. 4. punctati*. Caput atrum, antennis brevibus serratis, basi rufescentibus. Thorax rotundatus, laevis, nitidus rufus, punctis quatuor nigris; mediis duabus majoribus. Elytra glabra, rufa, pari punctorum ad basin, in medio macula magna vel potius fascia, margines haud attingens, atra, et punctum parvum ad apicem. Subtus totus ater.
- obfusus.* 4. *C. testaceus*, antennis elytrorumque margine nigris.  
*Habitat in America*. *Dom. Drury.*  
*Caput et thorax rufescentia*, glabra, nitida, antennis ferratis nigris. Elytra testacea, margine omni nigro inprimis futura. Abdomen cinereo fuscum. Statura C. tridentati.
- tridentatus.* 5. *C. coeruleus*, elytris testaceis.  
*Chrysomela tridentata cylindrica*, thorace coeruleo, elytris testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 596. 73. *Fn. Sv.* 546.  
*Habitat in Lonicera Xylosteo.*  
*Punctum parvum cyaneum ad basin elytrorum*.  
*Pedes antici in altero sexu elongati*.
- lineatus.* 6. *C. rufescens*, thorace maculis, elytris lineis duabus nigris.  
*Habitat in Brasilia*. *Mus. Dom. Banks.*  
*Magnitudo praecedentis*. Caput nigrum fronte rufescente. Antennae thorace longiores, filiformes, nigrae, basi rufescentes. Thorax glaber, rufescens, maculis duabus magnis dorsalibus nigris. *Scutellum*

# I. ELEVTERATA. *Cryptocephalus.* 107

Ium nigrum. Elytra rufescentia, vittis duabus longitudinalibus nigris, altera ad marginem, altera ad futuram. Subtus rufescens. Pedes nigri, femoribus basi rufis.

7. C. ater, glaber, thorace elytrisque punctis quatuor *Gorteriae.* flavescentibus.

*Chrysomela Gorteriae.* Linn. Syst. Nat. II. 596. 74.  
Amoen. acad. 6. 394. 16.

Habitat in *Gorteria* C. B. S.

Puncta quatuor elytrorum per paria remota. Duo ad basin, duo ad apicem.

8. C. ater, thorace utrinque macula lutea, tibiis flavis. *auritus.*

*Chrysomela aurita* subcylindrica, nigra, thorace utrinque macula lutea, tibiis flavis. Linn. Syst. Nat. II. 596. 75.

Habitat in *corylo Saxoniae.*

9. C. rufus, elytris maculis tribus nigris: anteriore *didymus.* postice didyma.

Habitat in *nova Hollandia.* Mus. Dom. Banks.

Statura praecedentis. Antennae thorace longiores, filiformes, nigrae, basi rufescentes. Caput et thorax obscure rufa, immaculata. Elytra punctato striata, glabra, rufa, futura dimidiaque parte postica marginis exterioris, maculisque tribus disci nigris. Macula anterior oblonga, postice didyma, media subrotunda, tertia versus apicem linearis. Subtus rufus, pectore pedumque geniculis nigris.

10. C. thorace tibiisque luteis, elytris luteis: maculis duabus coerulescenti nigris. *4 maculatus.*

*Chrysomela 4. maculata.* Linn. Syst. Nat. II. 596. 77.

Habitat in *Saxonie.*

Puncta elytrorum remota, alterum ad basin, alterum ad apicem.

11. C. obscure aeneus, elytris testaceis.

*Chrysomela longimana*, subcylindrica obscuro-aenea, elytris livido-flavis, pedibus anticis longissimis. Linn. Syst. Nat. II. 599. 95.

Habitat in *trifolio montano Sueciae.*

*longimus.*

Pun-

*Punctum parvum, aeneum ad basin elytrorum, et pedes in altero sexu elongati.* Videtur varietas minor *C. tridentati*.

- bipunctatus.* 12. *C. niger, nitidus, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis longitudine corporis.*

*Chrysomela bipunctata cylindrica, thorace nigro, nitido, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis longis.* *Linn. Syst. Nat. II. 597. 78. Fn. Sv. 548.*

*Cryptocephalus niger, elytris rubris, striatis, maculis quatuor limboque nigris.* *Geoff. Inf. I. 234. Petiv. Gazoph. tab. 31. fig. 4.*

*Chrysomela atra, elytris rubris, punctis quatuor nigris.* *Uddm. Diff. 21 & 22.*

Habitat in Europae corylo.

Varietas linea longitudinali, loco punctorum.

- cordiger.* 13. *C. thorace variegato, elytris rubris: punctis duobus nigris.*

*Cryptocephalus niger, thoracis lineis flavis, elytris rubris punctatis, maculis quatuor limboque nigris.* *Geoff. Inf. I. 235. 7.*

*Chrysomela cordigera cylindrica, thorace variegato, elytris rubris: punctis duobus nigris.* *Linn. Syst. Nat. II. 598. 91. Fn. Sv. 558.*

*Chrysomela nigra, elytris subflavis, punctis quatuor nigris.* *Uddm. Diff. 23.*

Habitat in Europae corylo, salice. Macula intermedia thoracis interdum cordata.

- bothnicus.* 14. *C. ater, thorace linea longitudinali rubra.*

*Chrysomela bothnica.* *Linn. Syst. Nat. II. 598. 90. Fn. Sv. 557.*

Habitat in Suecia.

Frons macula quadrata rufa. Pedes flavescentes.

- vitis.* 15. *C. niger, glaber, elytris rufis.* *Geoff. Inf. I. 233. 2.*

Habitat in vite vinifera Europae australis, quam misere saepius depascit.

An satis distinctus a *C. coryli*?

I. ELEVTERATA. *Cryptocephalus*. 109

16. *C. niger*, thorace elytrisque testaceis, immaculatis. *Coryli.*  
*Chrysomela Coryli cylindrica*, thorace elytrisque testaceis, pedibus nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 598. 88.*  
*Fn. Sv. 555.*  
 Habitat in Europae corylo.
17. *C. niger*, thorace rufo, elytris testaceis. *ruficollis.*  
 Habitat in insula St. Helena. *Mus. Dom. Banks.*  
*Caput nigrum, antennis filiformibus, longitudine corporis. Thorax glaber, rufus, immaculatus. Elytra laevia, testacea. Abdomen nigrum, segmentorum marginibus rufis. Pedes atri.*  
*Variat, margine thoracis pallido femoribusque basi rufis.*
18. *C. niger*, thorace variegato, elytris rubris: maculis tribus nigris. *6 punctatus.*  
*Chrysomela 6 punctata cylindrica*, thorace variegato, elytris rubris: maculis tribus nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 599. 92. Fn. Sv. 559.*  
*Euprestis 6 punctata. Scopoli Entom. 208. Sultz. Ins. tab. 3. fig. 18.*  
 Habitat in Europa.  
*Genicula tibiarum puncto albo notata.*
19. *C. violaceus*, capite thorace femoribusque dentatis rufis. *calcaratus.*  
 Habitat ad Sierra Leon Africæ. *Mus. Dom. Banks.*  
*Corpus medium C. longimani. Caput rufum, antennis oreque nigris. Thorax valde globosus, glaber, rufus. Elytra striata, violacea. Abdomen nigro violaceum. Pedes violacei, femoribus dente acuto notatis, rufis basi apiceque nigris.*
20. *C. cyaneus*, thorace pedibusque rufis. *cyaneus.*  
*Melolontha coerulea, thorace pedibusque ferrugineis.*  
*Geoff. Ins. I. 197. 4.*  
 Habitat in Gallia. *D. Mallet.*  
*Statura C. cordigeri. Caput et elytra cyanea, nitida. Thorax glaber, rufus.*
21. *C. viridi coeruleus*, antennis nigris. *sericeus.*  
*Cryptocephalus viridi auratus, sericeus. Geoff. Ins. I. 233.*  
*Chryso-*

110 I. ELEVTERATA. *Cryptocephalus.*

*Chrysomela sericea cylindrica*, thorace coeruleo, elytris pedibusque coeruleis. *Linn. Syst. Nat.* II. 598. 86. *Fn. Sv.* 554.  
Habitat in salicibus.

*nitens.* 22. *C. viridis*, nitens, ore pedibusque testaceis.

*Chrysomela nitens cylindrica*, thorace coeruleo, nitido, elytris coeruleis, pedibus testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 598. 84. *Fn. Sv.* 551.  
Habitat in Europa.

*glabratus.* 23. *C. violaceus*, thorace elytrisque viridi aeneis, anten-  
nis fuscis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Caput aeneum fronte canaliculato. Antennae fuscae,  
basi ferrugineae. Thorax glaber, laevis, nitens,  
aeneus. Elytra laevissima, nitida, aenea. Subtus  
totus violaceus.

*vittatus.* 24. *C. niger*, elytris margine striaque abbreviata flavis.

*Cryptocephalus niger*, elytro singulo duplice, linea  
longitudinali flava. *Geoff. Inf.* I. 233. 4.

Habitat in graminosis Europae australis.

Magnitudo et statuta *C. Moraei*; Corpus nigrum,  
nitidum. Elytrorum margo exterior flavidus, et  
in medio stria abbreviata flava.

*Moraei.* 25. *C. ater*, elytris maculis duabus flavis marginalibus.

*Cryptocephalus niger*, capite thoraceque antice luteis,  
elytro singulo externe macula duplice flava. *Geoff.*  
*Inf.* I. 234. 5.

*Chrysomela Moraei cylindrica*, thorace nigro, elytris  
nigris; maculis duabus rubris marginalibus. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 597. 82. *Fn. Sv.* 550.

Buprestis Moraei. *Scopoli Ent.* 202.

Castilla nigra, nitida, clypeo caput fere integrum te-  
gente, macula ad apicem et basin elytrorum lutea.  
*Gudd. Diff.* 28.

Var. Caput et thorax interdum albo maculata.

*15 gutta-  
tus.* 26. *C. rufus*, thorace maculis tribus, elytris sex flavis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Antennae nigrae, basi flavescentes. Caput rufum,  
fronte flavo. Thorax glaber, nitens, rufus, ma-  
culis

I. ELEVTERATA. *Cryptocephalus.* III

culis tribus flavis, lateralibus majoribus sublunatis.  
 Elytra glabra, rufa, maculis sex per paria dispositis  
 flavis. Pedes rufi, femoribus anticis puncto flavo.

27. C. capite thoraceque variegatis coleoptris flavis, 10 punctis  
 punctis 10. nigris.

*Chrysomela* 10 punctata cylindrica, thorace variegato,  
 elytris flavis: punctis quinque nigris. *Linn. Syst.*  
*Nat.* 2. 597. *Fn. Sv.* 560.

Habitat in Italia. *D. Albini.*

Parva. Statura C. pini. Caput flavum, punctis tribus  
 parvis nigris. Thorax rotundatus, flavus, punctis  
 quinque difformibus connatis nigris. Elytra lae-  
 via, flava, punctis quinque nigris. Tria horum  
 ad futuram exteriorem subrotunda, duo majora  
 oblonga in medio. Corpus nigrum, pedes flavi.

28. C. niger, elytris rufo bimaculatis.

*Chrysomela* 4 pustulata. *Linn. Syst. Nat.* II. 597. 80. 4 pustula-  
*Fn. Sv.* 549.

Habitat in Suecia.

Maculae elytrorum rufae, remotae, altera major ad  
 basin, altera minor ad apicem.

29. C. rufus, elytris punctis duobus coerulescentibus. *Koenigii.*

Habitat Tranquebariae. *Koenig.*

Statura et magnitudo omnino C. Scopolini. Caput  
 et thorax obscure rufa. Elytra paulo pallidiora  
 punctis duobus coeruleis, quae margines haud  
 attingunt.

30. C. niger, thorace rufo, elytris rufis: fasciis duabus *scopolinus.*  
 cyanis.

*Chrysomela scopolina* cylindrica, thorace rufo, elytris  
 rufis: fasciis duabus nigris. *Linn. Syst. Nat.* II.  
 597. 81.

Habitat in America, Europa australi.

Fasciae elytrorum nec futuram nec marginem  
 attingunt.

31. C. elytris flavis, lineola punctisque tribus nigris. *paracen-*

*Chrysomela paracentesis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 1066. I. *tesis.*

Habitat in Europa australi.

Supra flavus, thorace nigro variegato.

*Pini.* 32. *C. testaceus*, elytris pallidis, antennis fuscis.  
*Chrysomela Pini cylindrica*, testacea, elytris pallidioribus, pedibus concoloribus, antennis fuscis. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 598. 89. *Fn. Sv.* 556.

Habitat in pino Sueciae.

*labiatus.* 33. *C. ater*, nitidus, ore pedibus basique antennarum lutescentibus.  
*Chrysomela labiata subcylindrica*, atra, thorace nitido, ore pedibus anticus basique antennarum lutescentibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 598. 87. *Fn. Sv.* 553.

Habitat in Europae rosis. Minutus.

30. ALTICA. *Palpi* quatuor filiformes.  
*Maxilla* cylindrica, bifida:  
laciniis linearibus.  
*Antennae* moniliformes.

*bicolor.* 1. *A. rufa*, elytris femoribusque posticis coeruleis.  
*Chrysomela bicolor saltatoria*, ovata, rufa, elytris femoribusque posticis coeruleis. *Linn. Syst. Nat.* II. 593. 52.  
Habitat in America.  
Gigas in hoc genere.

*aequinoctialis.* 2. *A. thorace rubro*, elytris violaceis, maculis quatuor albis alternis.  
*Chrysomela aequinoctialis*. *Linn. Syst. Nat.* II. 596. 71.  
Habitat in America meridionali.

*oleracea.* 3. *A. viridi coerulea*. *Geoff. Inf.* I. 245.  
*Chrysomela oleracea saltatoria*, virescenti coerulea.  
*Linn. Syst. Nat.* II. 593. 51. *Fn. Sv.* 534.  
*Scopoli Ent. carn.* 212.  
Habitat in Cotyledonibus plantarum, in primis Tradynamistarum, quas misere destruit.  
Pellitur cineribus vegetabilium, in primis Tabaci.

*albicollis.* 4. *A. thorace pallido*, elytris aeneis: maculis duabus fasciaque aureis.  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statu-

Statura et magnitudo A. oleraceae. Caput nigrum, antennis filiformibus, basi pallidis. Thorax rotundatus, totus pallidus. Elytra glabra, nitida, aenea, punctis duobus baseos fasciaque media aureis. Abdomen nigrum. Pedes pallidi, femoribus posticis crassioribus nigris.

5. A. viridis, nitida, pedibus testaceis: femoribus posticis violaceis. *Hyoscyami.*  
*Altica coerulea elytris striatis, tibiis ferrugineis.*  
*Geoff. Inf. 1. 248. 11.*  
*Chrysomela Hyoscyami saltatoria, virescenti-coerulea, pedibus testaceis, femoribus posticis violaceis. Linn.*  
*Syst. Nat. 11. 594. 54. Fn. Sv. 536.*  
*Capricornus exiguus, saltatorius. Raj. Inf. 98. 9.*  
*Habitat in hyoscyamo, brasfica.*
6. A. viridi-aenea, pedibus nigris. *nigripes.*  
*Habitat in Anglia. Mus. D. Hunter.*  
*Affinis A. Hyoscyami, at pedes omnes nigri.*
7. A. viridis, nitens, capite thoraceque aureis, pedibus ferrugineis. *nitidula.*  
*Altica nigra, aurata, thorace aureo, femoribus ferrugineis. Geoff. Inf. 1. 249. 13.*  
*Chrysomela nitidula, saltatoria, elytris coeruleis, capite thoraceque aureo, pedibus ferrugineis. Linn.*  
*Syst. Nat. 11. 594. 60. Fn. Sv. 542.*  
*Habitat in Europae salice.*
8. A. viridi aenea, antennis fuscis, pedibus testaceis. *Helxinis.*  
*Altica aurea, pedibus flavis. Geoff. Inf. 1. 249. 14.*  
*Chrysomela Helxinis saltatoria, viridi aenea, antennis pedibusque omnibus testaceis. Linn. Syst. Nat. 11. 594. 58.*  
*Chrysomela Helxinis. Sultz. Inf. tab. 3. fig. 12.*  
*Habitat in polygono fagopyro.*
9. A. supra albida: fasciis tribus fuscis. *trifasciata.*  
*Chrysomela trifasciata saltatoria, supra albida: fasciis tribus fuscis. Linn. Syst. Nat. 11. 594. 61.*  
*Habitat in Europa.*  
*Fascia unica capitis, duae elytrorum. Femora rufa.*

- erythrocephala.* 10. A. atro coerulea, capite geniculisque pedum rufis.  
*Altica nigro-aenea*, elytris striatis, pedibus ferrugineis. *Geoff. Inf.* 1. 246. 4.  
*Chrysomela saltatoria erythrocephala*. *Linn. Syst. Nat.* 11. 594. 56. *Fn. Sv.* 558.  
*Habitat in Europa.*
- atricilla.* 11. A. nigra, thorace elytrisque cinereis.  
*Altica elytris pallido flavis*, capite nigro. *Geoff. Inf.* 1. 251. 19.  
*Chrysomela atricilla saltatoria*, nigra, thorace elytris tibiisque testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 594. 55. *Fn. Sv.* 537.  
*Habitat in Europa.*
- anglica.* 12. A. atra, elytris tibiisque pallidis.  
*Habitat in Anglia*. *Mus. D. Hunter.*  
*Statura et affinitas summa A. atricillae*, at thorax etiam ater. *Tibiae pallidae.*
- 4 pustulata.* 13. A. nigra, coleoptris punctis quatuor rufis. *Geoff. Inf.* 2. 250. 15.  
*Habitat in hortis Angliae, Galliae.*  
*Magnitudo A. rufipedis*, punctum alterum elytrorum ad basin, alterum versus apicem.
- rufipes.* 14. A. coerulea, capite thorace pedibus antennarumque basi rufis.  
*Altica nigra*, elytris coeruleis, thorace pedibusque rufis. *Geoff. Inf.* 1. 245. 2.  
*Chrysomela rufipes*, saltatoria, coerulea, obovata, capite thorace pedibus antennisque rufis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 595. 65. *Fn. Sv.* 545.  
*Habitat in Europa.*
- fusipes.* 15. A. violacea, capite thoraceque rufis, pedibus nigris.  
*Habitat in Anglia.*  
*Forte varietas A. rufipedis*, a qua solis pedibus nigris differt.
- testacea.* 16. A. testacea, gibba, elytris laevissimis.  
*Altica ovata*, ferruginea, elytris punctis sparsis. *Geoff. Inf.* 1. 250. 17.  
*Habitat in Anglia*. *Dom. Banks.*

Differt

Difserit sene ab A. exoleta. Major est, magis gibba,  
thorace elytrisque laevissimis, nitidis.

17. A. ferruginea, elytris striatis. *Geoff. Inf.* I. 250. 4. *exoleta.*  
Chrysomela exoleta, saltatoria, livida, pedibus testaceis, capite abdomineque fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 594. 59. *Fn. Sv.* 541?  
Altica oblonga ferruginea, elytris striatis. *Geoff. Inf.* I. 250. 16.  
Habitat in Echii floribus.
18. A. nigra, nitida, elytris apice puncto rubro. *holistica.*  
Chrysomela holistica. *Linn. Syst. Nat.* II. 595. 67. *Fn. Sv.* 544.  
Habitat apud nos frequens, olera depascens.
19. A. pallida, oculis nigris. *tabida.*  
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*  
Statura omnino A. exoletae, at paulo minor, tota pallida, immaculata, oculis solis nigris, prominulis.  
Elytra laevia.
20. A. atra, elytris flavis: margine omni nigro. *nemorum.*  
Altica atra, elytris longitudinali in medio flavescen-tibus. *Geoff. Inf.* I. 247. 9.  
Chrysomela nemorum saltatoria; elytris linea flava, pedibus pallidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 595. 62. *Fn. Sv.* 543.  
Habitat in Pulmonaria, Dentaria, Cardamine polyphega.  
Duae sunt varietates, vix nisi magnitudine differentes.
21. A. atra, nitida, antennarum basi plantisque piceis. *atra.*  
Altica nigra, subrotunda, tibiis ferrugineis. *Geoff. Inf.* I. 247. 8.  
Habitat Hafniae.  
Parva, tota atra, solis plantis pedum et basi anten-narum subrufescensibus.
22. A. suborbiculata, depressa, nigra.  
Chrysomela hemisphaerica, saltatoria, nigra, hemi-sphaerica, tibiis piceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 595. 68. *hemisphae-rica.*  
Habitat in corylo Saxoniae.

*surina-mensis.* 23. A. flavescens, elytris margine fasciaque sanguineis.  
*Chrysomela surinamensis.* Linn. Syst. Nat. II. 595. 69.  
 Habitat Surinami.  
 Antennae et pedes pallidi.

*S. littera.* 24. A. pallida, elytris nigris, linea longitudinali flexuosa alba.  
*Chrysomela S. littera, saltatoria, pallida:* linea longitudinali flexuosa alba. Linn. Syst. Nat. II. 595. 70.  
 Habitat Surinami.

31. CISTELA. *Palpi filiformes*  
*Maxilla unidentata.*  
*Labium membranaceum,*  
*bifidum.*  
*Antennae filiformes.*

*cervina.* 1. C. livida, pedibus fuscis.  
*Cistela subvillosa, viridescentis, fasciis longitudinalibus fuscis interruptis.* Geoff. Inf. I. 116?  
*Chrysomela cervina oblonga, livida, thorace postice transverso.* Linn. Syst. Nat. II. 602. 115. Fn. Sv. 575.  
 Habitat in Europa.

*livida.* 2. C. livida, antennis fuscis.  
 Habitat in terra del Fuego. Mus. Dom. Banks.  
 Statura praecedentis, at duplo minor. Antennae fuscae articulis superne lividis. Thorax et elytra glabra, nitida, livida. Abdomen et pedes lividi, at paulo obscuriores.

*Ceramboi-des.* 3. C. atra, elytris striatis, testaceis.  
*Chrysomela Ceramboides oblonga, nigra, elytris testaceis, antennis ferratis.* Linn. Syst. Nat. II. 602. 117.  
 Fn. Sv. 576.

*Mordella nigra elytris fulvis striatis.* Geoff. Inf. I. 354. 3.

*testacea.* 4. C. nigra, thorace elytris abdomineque testaceis.  
 Habitat in Europa australi. Forstkahl.  
 Statura C. ceramboidis. Antennae nigrae, articulis conicis. Thorax punctis duobus dorsalibus impressis.

5. *C. flava*, elytris sulphureis. *sulphurea.*  
*Chrysomela sulphurea oblonga*, *flava tota*. *Linn. Syst.*  
*Nat. II. 602. 114.*
- Tenebrio lutea*. *Geoff. Ins. I. 351. II.*  
*Habitat in floribus umbellatarum.*  
*Antennae fuscae.*
6. *C. rufescens*, antennis, macula elytrorum, anoque *analis.*  
*nigris.*  
*Habitat Tranquebariae*. *Koenig.*  
*Statura et magnitudo C. sulphureae.*  
*Antennae fere longitudine corporis, nigrae. Caput et thorax in primis subtus flavescens. Elytra rufa, macula magna baseos nigra. Abdomen rufum, anno nigro.*  
*Variat elytris maculis duabus nigris, altera baseos, altera versus apicem.*
7. *C. nigra*, elytris pedibusque testaceis. *murina.*  
*Chrysomela murina oblonga*, *nigra*, *elytris pedibusque testaceis*. *Linn. Syst. Nat. II. 602. 118. Fn. Sv. 577.*  
*Mordella nigra*, *elytris fulvis, laevibus*. *Geoff. Ins. I. 355 - 4.*  
*Habitat in Europa.*
8. *C. pallida*, capite elytrorumque apicibus fusca. *pallida.*  
*Habitat in Anglia*. *Mus. Dom. Hunter.*  
*Statura omnino C. murinae, at caput et elytrorum apices fusca. Antennae fuscae, pedes pallidi.*
9. *C. flava*, capite pectoreque nigris, elytris viridibus. *aeruginea*  
*Habitat in Africa.*  
*Statura C. sulphureae. Antennae filiformes, basi virescentes, medio nigrae, apice flavae, ultimo articulo tamen nigro. Thorax et abdomen flava. Elytra et pedes viridia, glabra, nitida.*
10. *C. nigra*, thorace rufo, elytris nigris: margine vittaque luteis. *innuba.*  
*Habitat in America*. *D. Drury.*  
*Statura et magnitudo C. murinae. Antennae filiformes, rufescentes. Caput atrum, nitens. Thorax rotundatus, laevis, flavus. Elytra fusca, punctata, margine exteriori vittaque longitudinali versus futuram flavis. Pedes lutei.*

- melanoce-* 11. *C. thorace flavo*, elytris pallidis, vitta media nigra.  
*phala.* Habitat in America septentrionali. *Muj. Dom. Banks.*  
 Statura praecedentis; caput nigrum. Pedes pallidi,  
 plantis nigris.
- quinque-* 12. *C. testacea*, clytrorum marginibus vittaque media  
*vittata.* nigris.  
 Habitat in Carolina. *Dom. Monson.*  
 Corpus testaceum, antennis nigris, ferratis. Elytra  
 rufescens, margine omni vittaque in medio unius-  
 cuiusque elytri nigris. Femora postica valde in-  
 crassata, intus canaliculata.
- minuta.* 13. *C. nigra*, elytris pedibusque griseis.  
 Chrysomela minuta ovata, nigra, elytris pedibus thora-  
 cisque lateribus griseis. *Linn. Syst. Nat.* II. 593. 50.  
*Fn. Sv.* 533.  
 Habitat in Europae aquosis,  
 Facies Dytisci.

32. CRIOCERIS. *Palpi filiformes.**Maxilla bifida.**Labium corneum inte-  
grum.**Antennae filiformes.*

- nymphaea.* 1. *C. fusca*, elytris margine prominulo flavescente.  
 Chrysomela nymphaea oblonga, fusca, elytris margine  
 prominulo flavescentibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 600. 99.  
*Fn. Sv.* 565.  
*Galeruca pallida*, thorace nigro variegato, elytris uni-  
 coloribus pallidis. *Geoff. Ins.* I. 254. 4.  
 Habitat in Nymphaeis Europae tarda.

- capreae.* 2. *C. thorace nigro maculato*, elytrisque griseis, antennis  
 nigris.  
 Chrysomela capreae oblonga, thorace nigro punctato,  
 elytrisque griseis, antennis nigris longis. *Linn. Syst.*  
*Nat.* II. 600. 100. *Fn. Sv.* 516.

- Galleruca nigra*, thorace elytrisque luteolividis. *Geoff.*  
*Ins.* I. 254. 5.

Habitat

Habitat in falcibus.

Abdomen nigrum.

3. C. pallida, elytrorum margine omni atro. *cineta.*  
 Habitat Tranquebariae. *Koenig.*  
 Statura et magnitudo C. Capreae. Corpus totum pallidum, flavescens, oculis nigris. Elytra adhuc pallidiora, futura omni lineaque marginali postice interrupta atris. Margo ipse tenuissime pallidus.
4. C. ovata cinerea, elytris vitta lineolaque baseos nigris. *Calmariensis.*  
 Chrysomela Calmariensis oblongiuscula, ferruginea, elytris macula longitudinali nigricante. *Linn. Syst. Nat. II. 600. 101.*  
 Galeruca pallida, thorace nigro variegato, elytris fasciis duabus longitudinalibus nigris. *Geoff. Ins. I. 253. 3.*  
 Habitat in Europa.  
 Affinis C. Capreae. Thorax nigro variegatus.
5. C. ovata, rufa, antennis oculisque nigris. *sanguinea.*  
 Habitat Halae Saxonum. *Dom. Schaller.*  
 Statura omnino C. Capreae, at rubra, antennis oculisque nigris. Abdomen nigrum, pedes cinerei.
6. C. ferruginea, elytris margine thoraceque flavis. *tenella.*  
 Chrysomela tenella oblongiuscula, ferruginea, elytris margine thoraceque flavis. *Linn. Syst. Nat. II. 600. 102. Fn. Sv. 564.*  
 Habitat in Europa.  
 Affinis C. Capreae, at minor.
7. C. ferruginea, elytris violaceis, antennis nigris. *nigricornis.*  
 Habitat in Germania. *D. de Hattorff.*  
 Statura omnino praecedentium. Caput ferrugineum, basi parum violaceum, antennisque nigris. Thorax ferrugineus, puncto utrinque impresso. Elytra viridi violacea, glabra, nitida, subtus tota ferruginea, pectore puncto utrinque nigro.
8. C. rufa, capite nigro, elytris violaceis. *melanocephala.*  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
 Magnitudo praecedentis. Caput et antennae nigra; thorax glaber, laevis, nitidus, rufus, punctis duobus dorsalibus impressis. Elytra laevia, cyanea. Scutellum rufum. Pedes nigri, femoribus rufis.

- cantba-* 9. *C. violacea*, capite thorace pedibusque rufis.  
*roidis.* Habitat in Anglia. *Mus. Brit.*  
 Statura C. nymphae. Antennae filiformes, basi rufescentes. Caput et thorax exacte nymphae, rufa, immaculata. Elytra et abdomen cyanea, nitida.
- merdi-* 10. *C. rubra*, thorace cylindrico utrinque impresso.  
*gera.* Chrysomela merdigera oblonga, rubra, thorace cylindrico utrinque impresso. *Linn. Syst. Nat.* II. 599. 97. *Fn. Sv.* 563.  
*Crioceris rubra.* *Geoff. Ins.* I. 239. I.  
*Attelabus Lilii.* *Scopoli Ent.* 112.  
*Schaeff. Elm.* tab. 32.  
*Reunin. Ins.* 3. tab. 17, fig. 12.  
*Merian. Europ.* 3. tab. 21.  
 Habitat in liliis conuallariis. Differt habitu ab hoc genere, attamen vix distinctum genus.
- 12 puncta-* 11. *C. thorace cylindrico*, rubra, elytris punctis sex nigris.  
*ta.* Chrysomela 12 punctata oblonga, rufa, elytris punctis sex, pectore pedumque geniculis nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 601. 110. *Fn. Sv.* 568.  
*Crioceris rubra*, punctis tredecim nigris. *Geoff. Ins.* I. 241. 2. tab, 4. fig. 5.  
*Attelabus 12 punctatus.* *Scopoli Ent.* 114.  
*Frisch. Germ.* 13. tab. 28.  
 Habitat in Asparago.  
 Statura C. merdigerae.
- bifascia-* 12. *C. thorace cylindrico*, rufa, elytris fasciis duabus atris.  
*ta.* Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
 Statura praecedentis. Antennae nigrae, basi rufae; Caput et thorax glabra, nitida, rufa, immaculata. Elytra nitida, rufa, fasciis duabus atris, altera baseos, altera versus apicem. Pedes rufi, plantis fuscis.
- unifascia-* 13. *C. thorace cylindrico*, rufa, elytris fascia atra,  
*ta.* Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
 Statura et nimia affinitas praecedentis, cuius forte varietas. Differt solummodo basi elytrorum, haud atra, sed rufa.
- nigripes,* 14. *C. thorace cylindrico*, flava, antennis pectore pedibusque nigris.  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura

Statura et magnitudo C. merdigerae. Caput flavum, antennis filiformibus nigris. Thorax cylindricus, utrinque impressus, flavus. Elytra laevia, flava. Subtus flava, pectore pedibusque nigris.

15. C. thorace cylindrico, flava, elytris basi nigris, puncto oculata. flavo.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Caput et thorax flavescens, immaculata. Antennae filiformes, flavae longitudine corporis. Elytra vix striata, flava, basi nigra, puncto magno flavo. Pectus nigrum. Abdomen flavidus. Pedes flavi, femoribus nigris.

16. C. coerulea, thorace cylindrico: lateribus gibbis. cyanella.

Chrysomela cyanella oblonga, coerulea, thorace cylindrico: lateribus gibbis. *Linn. Syst. Nat. II. 600. 104. Fn. Sv. 572.*

Crioceris tota coeruleo viridis. *Geoff. Ins. I. 243. 5.*

Habitat in Europa.

Statura C. merdigerae.

17. C. oblonga coerulea, thorace pedibusque rufis. melanopa.

Chrysomela melanopa oblonga, coerulea, thorace pedibusque rufis. *Linn. Syst. Nat. II. 601. 105. Fn. Sv. 573. Sultz. Ins. 3. tab. 3. fig. 19.*

Habitat in Europa.

18. C. cyanea, thorace rufo, antennis pedibusque fuscis. cyanocephala.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo C. melanopae. Caput cyaneum, nitidum, antennis filiformibus fuscis. Thorax planus, glaber, rufus, Elytra laevia, cyanea. Pedes omnes fuscii.

19. C. oblonga, thorace rubro: punctis duobus nigris, Asparagi.

coleoptris flavis: cruce punctisque quatuor nigris.

*Linn. Syst. Nat. II. 601. 112. Fn. Sv. 567. sub Chrysomela.*

Crioceris thorace rubro, punctis duobus nigris, coleoptris flavis, cruce nigro. *Geoff. Ins. I. 241. 3.*

Attelabus Asparagi. *Scop. Ent. carn. 113.*

*Roef. Ins. 2. Scar. 3. p. 11. tab. 4.*

*Frisch. Germ. I. pag. 27. tab. 6.*

Habitat in Europa asparagos devastans.

*Phellan-* 20. *C. oblonga*, nigra, thorace elytrisque lineis duabus flavis.

*Chrysomela Phellandrii oblonga*, nigra, thorace elytrisque lineis duabus luteis. *Linn. Syst. Nat.* II. 601. III. *Fn. Sv.* 569.

*Chrysomela oblonga*, nigra, elytrorum lineis duabus longitudinalibus luteis. *Geoff. Inf.* I. 266. 20.  
Habitat ad Phellandrii aquatici radices.

*carolinia-* 21. *C. oblonga*, flava, thorace punctis duobus, coleoptrisque vittis quinque nigris.

Habitat in Carolina. *D. Drury.*

Statura C. Asparagi. Caput flavum, antennis oculisque nigris; thorax vix marginatus, flavus, punctis nigris. Elytra flava vitta nigra ad marginem exteriorem, altera in medio elytri, et tertia communis per suturam; Femora postica incrassata, ferruginea.

*tomentosa*. 22. *C. oblonga*, thorace pallido punctis tribus nigris, elytris nigris vittis duabus albis.

*Chrysomela tomentosa oblonga*, elytris subtomentosis nigris: linea longitudinali margineque pallidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 601. 107.

Habitat in America.

Affinis *C. caroliniana*. Caput nigrum fronte alba. Thorax pallidus, punctis tribus dorsalibus nigris. Elytra in rostro glabra, nitida, vittis duabus albis, quae apice coemunt. Margo elytrorum omnis niger. Abdomen fuscescens, lateribus albis. Femora postica incrassata, fusca, margine interiori pallido.

*vittata*. 23. *C. oblonga*, thorace rufo, elytris flavis: vitta nigra. Habitat in Carolina. *Mys. Dom. Monson.*

Statura et magnitudo *C. Phellandrii*. Caput nigrum, antennis basi pallidis. Thorax rotundatus, glaber, rufescens. Elytra glabra, flava, vitta longitudinali nigra. Abdomen nigrum. Pedes flavescentes, geniculis nigris.

33. EROTYLVIS. *Palpi inaequales, anteriores securiformes, posteriores clavati.*

*Labium corneum, apice dilatatum, emarginatum.*

*Antennae filiformes.*

1. E. ovatus, niger, coleoptris punctis fulvis numerofissimis. *Linn. Syst. Nat. II. 586. 1.* sub Chrysomela. *Coccinella gigantea. Sultz. Inf. tab. 3. fig. 15.* *Habitat in India.* *Dorsum gibbum, elevatum.* *Giganteus.*
2. E. ovatus, elytris nigris: punctis quinque rubris. *Linn. Syst. Nat. II. 586. 3.* *Coccinella coleoptris nigris punctato impressis; maculis decem rubris. Gronov. Gazoph. 613. tab. 16. fig. 7.* *Habitat in America.* *spunctatus.*
3. E. niger, elytris flavis, punctis numerofissimis nigris. *Habitat in America. Mus. D. Hunter.* *Statura E. 5 punctati. Antennae filiformes. Caput et thorax nigra, immaculata. Elytra gibba, punctis numerosis sparsis nigris. Corpus subtus piceum.* *punctatis-*  
*simus.*
4. E. oblongus, ater, immaculatus. *Morio.* *Habitat in nova Hollandia. Mus. Dom. Banks.* *Antennae filiformes, atrae. Thorax nitidus, ater, laevis. Elytra atra, punctato striata.*
5. E. oblongus, ater, thorace elytrisque cupreis. *cupreus.* *Habitat in nova Hollandia. Mus. Dom. Banks.* *Magnus ovatus. Corpus atrum, immaculatum. Antennae filiformes, nigrae. Thorax laevis, cupreus, obscure nitidus. Elytra punctato striata, cuprea, nitida.*
6. E. oblongus, ater, elytris viridibus, striatis. *smaragdulus.* *Habitat in nova Hollandia. Mus. Dom. Banks.* *Statura omnino E. cuprei. Antennae filiformes, nigrae. Corpus obscurum, atrum. Thorax laevis, niger. Elytra viridia, punctato striata.*

*amethystina.* 7. C. oblongus, ater, thorace elytrisque cyaneis.  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

E. smaragdulo nimis affinis. Antennae filiformes, nigrae,  
frons retusa. Thorax elytris angustior, laevis,  
glaber, coerulescens. Elytra striata, punctata. Cor-  
pus atrum, femoribus interdum rufis.

*bicolor.* 8. E. oblongus, ater, supra aeneus.  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium. Caput aeneum, antennis fili-  
formibus palpisque securiformibus nigris. Thorax  
rotundatus, laevis, nitidus, aeneus. Elytra obscure  
aenea, punctato striata. Subtus totus ater.

### 34. LAGRIA. *Palpi* quatuor anteriores se- curiformes, posteriores extrorsum crassiores.

*Labium membranaceum in-*  
*tegrum.*

*Antennae filiformes.*

*aenea.* 1. L. obscure aenea, immaculata.

Habitat in insulis Americae. *Mus. Dom. Banks.*

Animalculum magnum, oblongum. Antennae filifor-  
mes, nigrae, articulis obconicis. Thorax et elytra  
obscure aenea, minime nitida.

*livida.* 2. L. livida, oculis nigris.

Habitat in Otaheiti maris australis. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo L. aeneae. Palpi anteriores lon-  
gissimi, securiformes, postici breviores, subfiliformes.  
Antennae filiformes, lucidae, longitudine corporis.  
Thorax et elytra laevia, glabra, livida, immaculata.  
Pedes lividi.

*lineata.* 3. L. livida, thorace lineis, elytris vitta fuscis.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae filifor-  
mes, lividae. Caput lividum, fronte macula fusca.  
Thorax subcylindricus, lineis tribus fuscis. Elytra  
laevia, glabra, livida, vitta lata fusca, quae tamen  
apicem elytri haud attingit. Subtus livida.

4. *L. coerulea*, antennis fuscis. *cyanea.*  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
 Statura omnino *L. lividae*, at duplo minor. Antennae longae, filiformes, fuscae. Corpus glabrum, obscure cyaneum. Anus stylis duobus validis, acutis. Femora postica crassiora, incurva.
5. *L. rufa*, elytris vitta, abdominisque apice fuscis. *vittata.*  
 Habitat in America. *D. v. Robr.*  
*Paulo major L. elongatae.* Caput cum antennis rufum, oculis nigris. Thorax rotundatus, rufus, immaculatus. Elytra rufescens, vitta lata fusca, vel potius fusca margine omni rufescens. Abdomen rufum, apice fuscum. Pedes rufi.
6. *L. atra*, thorace rufo, villoso. *elongata.*  
*Chrysomela elongata*, atra, thorace rubro, subvilloso. *Linn. Syst. Nat. II. 603. 122.*  
 Habitat in Anglia.
7. *L. nigra*, thorace marginato villoso, elytris glabris, *pubescens.*  
*testaceis.*  
*Chrysomela pubescens elongata*, nigra, thorace nigro, villoso, elytris plantisque testaceis. *Linn. Syst. Nat. II. 603. 120.*  
 Habitat in Germania.  
*Nimis affinis videtur L. hirtae*, at paulo major.
8. *L. villosa*, nigra, thorace tereti elytris testaceis. *hirta.*  
*Chrysomela hirta oblonga*, villosa, nigra, thorace teretiusculo, elytris testaceis. *Linn. Syst. Nat. II. 602. 119.*  
*Fn. Sv. 578.*  
 Habitat in Europa.
9. *L. villosa*, cyanea, abdomine femoribusque rufis. *tomentosa.*  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
*Statura praecedentis.* Antennae rufescentes, apice fuscae. Caput et thorax villosa, obscure cyanea. Elytra hirta, paulo dilutiiora. Abdomen rufum. Pedes nigri, femoribus rufis.  
*Variat elytris fuscis.*
10. *L. glabra*, thorace rufescente, elytris flavis. *glabrata.*  
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*  
*Statura et magnitudo omnino L. hirtae*, at tota glabra.

*antherina.* II. L. nigra, elytris fasciis duabus ferrugineis.

Meloe antherinus, alatus, niger, elytris fasciis duabus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 681. 16. *Fn. Sv.* 829. Habitat frequens in floribus, agilis, cursitans, vix pediculo major.

*floralis.* 12. L. nigra, thorace ferrugineo.

Meloe floralis, alatus, niger, elytris maculis duabus pallidis obsoletis. *Linn. Syst. Nat.* II. 681. 15. *Fn. Sv.* 829. Habitat in Europae plantis.

Statura omnino praecedentis.

### 35. ZYGIA. *Palpi* inaequales, filiformes.

*Maxilla* unidentata.

*Labium* elongatum, membranaceum.

*Antennae* moniliformes.

*oblonga.* I. ZYGIA.

Habitat in Oriente. *Forskäbl.*

Media, oblonga, rufa, capite elytrisque obscure cyanis. Thorax rotundatus, immarginatus, punctatus, carinatus. Scutellum rotundatum. Elytra rugosa, obtusa, lineis elevatis tribus laevibus. Pedes rufi, inermes.

### 36. ZONITIS. *Palpi* filiformes.

*Maxilla* palpis longior, integra.

*Labium* emarginatum.

*Antennae* setaceae.

*chrysome-* 1. Z. flava, elytris puncto medio apiceque nigris.  
*lina.* Habitat in Oriente. Prof. *Forskäbl.*

Statura cistelae et magnitudo sulphureae. Caput flavum ore, antennis oculisque nigris. Thorax glaber, nitens, flavus, puncto medio nigro. Elytra laevia, flava, puncto et apice nigris. Subtus atra.

2. Z. rufescens, elytris flavis, apice nigro. flava.

Habitat in Oriente. Prof. Forskäbl.

Statura et affinitas praecedentis, at minor. Antennae, excepto ultimo articulo, nigrae. Caput et thorax rufescentia, immaculata. Elytra laevia, flava, apice fusca. Abdomen basi nigricans. Pedes flavi.

37. APALVS. *Palpi aequales, filiformes.*

*Maxilla cornea, unidentata.*

*Labium membranaceum,  
truncatum, integrum.*

*Antennae filiformes.*

I. APALVS.

Meloe bimaculatus alatus, niger, elytris luteis, macula nigra postica. Linn. Syst. Nat. II, 680. 9. Fn. Sv. 828. Vddm. Diff. 82.

Habitat primo vere in Europae arenosis.

*2 macula-  
tus.*

38. CVRCVLIO. *Palpi quatuor filiformes.*

*Maxilla cylindrica, uni-  
dentata.*

*Labium integrum.*

*Antennae insedentes rostro  
corneo.*

\* *Longirostres femoribus simplicibus.*

1. C. longirostris, thorace elytrisque scabris, antennis apice albis.

Habitat in Japonia. Mus. Brit.

Magnitudo fere C. palmarum. Rostrum elongatum, cylindricum, arcuatum, antice fuscum, postice cinereum. Thorax rotundatus, in primis lateribus punctis elevatis acutis, scaber, fuscus, dorso cinerascente. Elytra connata, scabra, obscure grisea, punctis fuscis, albisque vagis. Femora scabra, inermia. Antennae clavatae, apice albae,

*Gigas.*

*2. C.*

- Palma-  
rum.* 2. *C. longirostris*, ater, thorace supra plano, elytris abbreviatis striatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 506. *Mus. Lud. Vlr.* 42.  
*Cossius saguarius.* *Rumph. amb.* I. p. 79. tab. 17. fig. 9.  
*Petiv. Gazoph.* tab. 35. fig. 5.  
*Gronov. Zooph.* 578. tab. 16. fig. 4.  
*Merian. Sur.* tab. 48. fig. 3.  
*Sultz. Inf.* tab. 3. fig. 20.  
Habitat in Indiae palmis.
- cruenta-  
tus.* 3. *C. longirostris*, ater, thorace lineis, elytrisque punctis duobus sanguineis.  
Habitat in Carolina. *Mus. Dom. Banks.*  
*Statura S. palmarum*, at minor. Rostrum elongatum, compressiusculum, arcuatum, atrum. Antennae clava ferruginea, truncatae. Thorax planus, ater, lineis duabus dorsalibus subflexuosis sanguineis. Elytra abbreviata striata, holosericea, atra, punctis duobus disci sanguineis. Pedes atri, femoribus simplicibus. Tibiae apice spina valida, acuta, arcuata.
- indus.* 4. *C. longirostris*, ater, thorace subovato, excavato, punctato, elytris rugoso sulcatis, tibiis spinosis. *Linn. Syst. Nat.* II. 506. 2. *Mus. Lud. Vlr.* 43.  
Habitat in India.  
Magnitudo C. palmarum.
- hemipte-  
rus.* 5. *C. longirostris*, obscure purpurascens, elytris abbreviatis, maculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 506. 3. *Mus. Lud. Vlr.* 44.  
Habitat in India.  
Elytra abdomine paulo breviora, nigro maculata. Thorax nigro-lineatus.
- paganus.* 6. *C. longirostris*, griseus, thoracis dorso fusco : arcubus cinereis, rostro bisulcato.  
Habitat in Indiis. *D. Torstenson.*  
*Statura C. Pini*, at duplo major. Rostrum crassum, capite duplo longius, fuscum, fulcis duobus exaratum. Antennae griseae, basi nigrae. Thorax lateribus griseis, dorso fusco, arcubus quatuor lineolaque media cinereis. Elytra obtusa, immaculata. Femora inutica.

7. *C. longirostris, cinereus, coleoptris macula communis cordata fusca.* *melano-*  
*cardius.*
- Curculio melanocardius longirostris, cinereus, coleoptris fascia cordata fusca. *Linn. Syst. Nat.* 11. 608. 18.  
*Mus. Lud. Vlr.* 45.  
 Habitat in India.  
 Antennae nigrae.
8. *C. longirostris, subspinosus, niger, thorace lineis, elytris postice cruce albis.* *cruciatus.*
- Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- Caput nigrum fascia baseos cinerea. Rostrum thorace longius, cylindricum, inflexum, antennis clavatis nigris. Thorax ovatus, punctis elevatis acutis, subspinosus, niger, linea laterali albida. Elytra itidem punctis elevatis, acutis, numerosissimis subspinosa, nigra, lineola baseos, cruceque postica albis. Pedes mutici, nigri: femorum apice tibiarumque basi puncto albo.
9. *C. longirostris, niger, elytris holofericeo striatis.* *striatulus.*
- Habitat in insula Terre neuve Americae. *Mus. D. Banks.*
- Magnitudo C. Abietis. Rostrum longum, ferrugineum, apice nigrum. Thorax rotundatus, niger, scaber. Elytra nigra, striis elevatis holofericeis e punctis albis nigrisque alternis. Pedes ferruginei, femoribus simplicibus.
10. *C. longirostris, elytris rufescensibus, fasciis nebulosis.* *Pini.*  
*Linn. Syst. Nat.* 11. 608. 19. *Fn. Sv.* 589.  
 Habitat in Pini sylvestris cortice.  
 Affinis C. Abietis, at femora simplicia.
11. *C. longirostris, niger, cinereo irroratus, elytris puncto baseos distincto.* *Jaceae.*
- Habitat in Centaurea Jacea. Prof. *Hermann.*
- Statura C. Pini, antennae fractae, nigrae. Rostrum crassiusculum, cylindricum, nigrum. Thorax ovatus, niger, cinereo irroratus. Elytra nigra, atomis cinereis villosis adspersa et puncto distincto baseos versus scutellum.
- Obs. Junior semper atomis plurimi e villo cinereo conflatis adspersus, aetate vero semper magis glaber et niger evadit.

- Colon.** 12. *C. longirostris*, griseus, elytris puncto albo.  
*Curculio oblongus*, fuscus, thoracis lateribus albidis,  
 elytris striatis puncto albo. *Geoff. Inf.* 1. 280. 6.  
*Curculio palustris*. *Scop. Ent.* 104.  
*Curculio Colon longirostris*, canescens, femoribus anti-  
 cis subdentatis, thorace utrinque linea elytrisque  
 puncto albo. *Linn. Mant.* 531.  
 Habitat in Germania.  
*Medius*, totus cinereus, utrinque linea thoracis albi-  
 cante et puncto elytrorum albo.
- biguttatus.** 13. *C. longirostris*, niger, elytris puncto elevato, abdo-  
 mine pedibusque posticis flavis.  
 Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*  
 • *Parvus*. Caput nigrum. Antennae clavatae. Thorax  
 cylindricus, niger, immaculatus. Elytra laevia,  
 nigra, puncto magno elevato globose flavescente ad  
 basin. Abdomen flavum, Pedes antici elongati,  
 nigri, reliqui flavi.
- Equiseti.** 14. *C. longirostris*, thorace laevi, elytris muricatis nigris,  
 punctis duobus apiceque albis.  
 Habitat in Equiseto arvensi Angliae.  
 Nimis affinis videtur *C. Lapathi*. Rostrum atrum,  
 thorax niger, vix tuberculatus, lateribus albis.  
 Elytra muricata, lateribus apiceque albis, in parte ante-  
 riori nigra puncta duo parva alba. Femora sim-  
 plicia.
- Bacchus.** 15. *C. longirostris*, aureus, rostro plantisque nigris. *Linn.*  
*Syst. Nat.* 11. 611. 38.  
*Rhinomacer niger*, elytris rubris, capite thoraceque  
 aureis, proboscide longitudine corporis. *Geoff. Inf.*  
 1. 270. 4.  
 Habitat in vite.
- Betulae.** 16. *C. longirostris*, corpore viridi aurato, subtus con-  
 colore. *Linn. Syst. Nat.* 11. 611. 39. *Fu. Sv.* 605.  
*Rhinomacer totus viridi coeruleus*. *Geoff. Inf.* 1. 270. 2.  
*Schaeff. Icon.* tab. 6. fig. 4.  
 Habitat in betula alba, in vite, folia contorquens.  
 Alter sexus thoracem antrorsum spinosum gerit.  
 Color saepe coeruleus.

17. *C. longirostris*, corpore viridi ignito: subtus atro coerulecente. *Linn. Syst. Nat.* II. 511. 40. *Fn. Sv.* 606.  
*Rhinomacer viridi auratus*, subtus nigro violaceus.  
*Geoff. Inf.* I. 270. 3.  
 Habitat in betula, populo.  
 Thorax in altero sexu antrorsum spinosus.
18. *C. longirostris*, niger, thorace elytrisque rufis. *bicolor.*  
 Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*  
 Statura C. bacchi. Caput rufum rostro atro. Thorax et elytra rufa immaculata. Femora mutica.
19. *C. longirostris*, violaceus, hirtus, rostro atro. *pubescens.*  
 Habitat in Germania. *v. Hattorf.*  
 Magnitudo et statura praecedentium. Rostrum longitudine thoracis, fulcis duobus exaratum, atrum. Oculi flavescentes. Thorax cylindricus, lateribus gibbis, uti in *C. betulae*, et elytra violacea, pilis plurimis erectis, fuscis hirta.
20. *C. longirostris*, obscure aeneus, subtus obscurior. *cupreus.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 608. 21. *Fn. Sv.* 593.  
 Habitat in Europae hortis.
21. *C. longirostris*, aeneus, rostro pedibusque nigris. *Tragiae.*  
 Habitat in Tragiae volubilis semenibus Brasiliae.  
*Mus. Dom. Banks.*  
 Parvus: triplo minor *C. cupreo*. Caput nigricans, rostro longo cylindrico. Thorax aeneus, obscurus, immaculatus. Elytra acnea. Pedes nigri, femoribus muticis.
22. *C. longirostris*, niger, elytris aeneis. *aeneus.*  
 Habitat in Anglia. *Mus. D. Hunter.*  
 Parvus: corpus nigrum, clytris solis aeneis, femora mutica.
23. *C. longirostris* griseus, pedibus rufis, rostro femoribusque basi nigris. *fuscirostris.*  
 Habitat in Germania. *v. Hattorf.*  
 Parvus: statura sequentis. Rostrum elongatum, cylindricum, nigrum. Thorax et elytra striata grisea, lineis duabus aut tribus albis ad futuram. Pedes rufi, femoribus basi nigris.

- nigrirostris.* 24. *C. longirostris, viridis, rostro atro.*  
*Habitat in Anglia. D. Banks.*  
*Caput fuscum, rostro cylindrico, atro, nitido. Thorax gibbus, rotundatus, viridis, lineis duabus dorsalisibus fuscis. Elytra tomentosa, viridia, immaculata. Pedes fuscii, femoribus simplicibus.*
- rufirostris.* 25. *C. longirostris, niger, rostro dimidiato pedibusque rufis.*  
*Habitat in Anglia. D. Banks.*  
*Statura et magnitudo C. aterrimi. Caput nigrum, anterior dimidia rostri pars rufa, apice tamen puncto parvo nigro. Thorax niger. Elytra striata immaculata. Pedes rufi, femoribus simplicibus.*
- pericarpinus.* 26. *C. longirostris, subglobosus, nebulosus, clytrorum futura basi alba.*  
*Curculio pericarpius longirostris, subglobosus, coleoptris macula cordata alba. Linn. Syst. Nat. II. 609. 31. Fn. Sv. 602.*  
*Habitat in Scrophulariis.*  
*Statura C. campanulae. Parvus, totus supra obscure fuscus, futurae basi lineola parva alba, subtus cinereus. Femora clavata, inermia. Pedes picei.*
- Alliariae.* 27. *C. longirostris, violaceus totus. Linn. Syst. Nat. II. 506. 4. Fn. Sv. 580.*  
*Habitat in erysimo alliaria.*
- cyanus.* 28. *C. longirostris, ater, elytris violaceis. Linn. Syst. Nat. II. 506. 5. Fn. Sv. 581.*  
*Habitat in salicibus.*
- globosus.* 29. *C. longirostris, gibbus, supra ater, subtus cinereus.*  
*Curculio Craccae longirostris, niger, ovatus, rostro subulato, abdomine pallido. Linn. Syst. Nat. II. 506. 6?*  
*Habitat in Germania.*  
*Parvus, fere globosus, supra glaber, ater, subtus subvillosus, pallidus.*
- Malvae.* 30. *C. longirostris, griseus, elytris pedibusque testaceis.*  
*Habitat in Angliae malvis. Mus. Dom. Banks.*  
*Parvus. Rostrum nigricans. Thorax et abdomen pilis cinereis grisea. Elytra testacea. Pedes testacei, femoribus inermibus.*

31. *C. longirostris*, nigricans, coleoptris maculis quatuor albidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 609. 29. *Fn. Sv.* 600. *4 maculatus.*  
*Curculio cinereus* elytrorum puncto quadruplici albo, proboscide thorace longiori. *Geoff. Ins.* I. 287. 22.  
Habitat in Europa.
32. *C. longirostris*, piceus, abdomine ovato. *Linn. Syst. acridulus*  
*Nat.* II. 507. 13. *Fn. Sv.* 584.  
*Curculio pyriformis*, nigro coerulescens, abdomine ovato. *Geoff. Ins.* I. 291.  
Frequens in floribus tetrady namis. Elytra striata.
33. *C. longirostris*, ater, femoribus luteis. *Rhinomacer subglobosus*, niger striatus, femoribus rufis. *Geoff. Ins.* I. 272. 8.  
Habitat frequens primo vere locis apicis calidioribus.  
Parvus. Statura C. Alliariae, at totus ater, pedibus solis flavis. Elytra striata.
34. *C. longirostris*, sanguineus. *Linn. Syst. Nat.* II. 608. *frumentarius.*  
*Aet. Holm.* 1750. p. 186. I.  
*Leuwenh. arc.* 168. *aug.* 6. p. 83. fig. 3.  
Habitat in frumento diutius asservato. Elytra striata.
35. *C. longirostris*, elytris rubris, futura nigra. *Linn. dorsalis.*  
*Syst. Nat.* II. 608. 17. *Fn. Sv.* 588.  
Habitat in ranunculo ficaria.  
Parvus. Tibiis flavis.
36. *C. longirostris*, ovatus, fuscus, linea longitudinali alba. *futuralis.*  
Habitat in salice Germaniae.  
Corpus parvum. Statura C. violacei. Rostrum longum, arcuatum, nigrum. Thorax fuscus, linea dorsali alba. Elytra striata, gibba, futura alba, subtus cinereus.
37. *C. longirostris*, ater, elytris puncto lineolaque apicis albis. *exclamationis.*  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
Parvus, totus ater, nitens, puncto in medio et lineola ad apicem elytrorum albis.

*Rumicis.* 38. *C. longirostris*, griseus, nigro nebulosus, antennis fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 614. 60. *Fn. Sv.* 590.

Habitat in Rumice.

Convenit Linnaeana descriptio, at femora mutica.

*granarius.* 39. *C. longirostris*, piceus, thorace punctato longitudine elytrorum. *Linn. Syst. Nat.* II. 608. 16. *Fn. Sv.* 587.

*Curculio rufo-testaceus*, oblongus, thorace elytrorum fere longitudine. *Geoff. Inf.* I. 285. 18.

*Scarabaeus parvus* fordide fulvus, proboscide longa deorsum arcuata. *Raj. Inf.* 88.

Devastat granaria, pellitur Isatide, Hyoscyamo, Thlaspide.

*Oryzae.* 40. *C. longirostris*, piceus, thorace punctato longitudine elytrorum, elytris punctis duobus rufis.

*Curculio Oryzae longirostris*, oblongus, niger, elytris maculis quatuor ferrugineis, femoribus muticis. *Linn. Amoen. acad.* 6. 395. 19.

Habitat in Oryza.

Statura et summa affinitas *C. granarii*, at puncta duo rufa in elytris.

*barbicornis.* 41. *C. longirostris*, cylindricus, rostro longissimo: subtus barbato, elytris elongato clavatis.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Singularis structurae insectum. *C. anchorago triplo major.* Rostrum corpore longius, cylindricum, apice parum incrassatum, fuscum, subtus pilis densis barbatum. Antennae rostro breviores, filiformes, hirtae, articulis undecim cylindricis versus apicem rostri insertae. Oculi globosi, atri, Thorax cylindricus, canaliculatus, niger, pilis griseis. Elytra ab domine longiora, ante apicem compressa, ideoque clavata, fornicata, punctato striata, nigra, maculis quatuor rufis obsoletis, Pedes nigri, pilis griseis, femoribus simplicibus.

*assimilis.* 42. *C. longirostris*, cylindricus, rostro apice glabro, atro, elytris ferrugineo subfasciatis.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

videtur mas praecedentis duplo minor. Rostrum cylindricum, corpore brevius, ad medium pilis griseis hirtum, apice glabrum, atrum, nitidum, subtus laeve.

Anten-

Antennae filiformes, piceae, apice fuscae, articulis undecim pilosis. Thorax cylindricus, canaliculatus, ater, pilis griseis adspersis. Elytra vix abdomine longiora, acuta, punctato striata, nigra, maculis quatuor rufis. Pedes fuscui simplices.

43. *C. longirostris*, cylindricus, thorace lineis, clytris *semipunctatus*.  
punctis albis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo *C. paraplectici*. Caput nigrum, palpebris albis. Antennae submoniliformes, extorsum crassiores, fuscae. Thorax ater, canaliculatus, lineis quinque albis. Elytra punctata, substriata, abdomine longiora, acutiuscula, nigra, punctis numerosissimis albis sparsis. Subtus albicans punctis aliquot albis. Pedes fuscui, femoribus muticis.

44. *C. longirostris*, cylindricus, subcinereus, elytris *paraplecticus*.  
mucronatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 610. 34. *Fn. Sv.* 604.  
*Il. Scar.* 184.

*Curculio oblongus*, elytris villoso cinereis, sutura nigra. *Geoff. Ins.* I. 279.

*Schreber. Sammlung.* Tom. XI. 336. tab. 4.

Habitat larva intra caulem umbellatarum aquatistarum. Paraplegiam equorum causare fertur.

45. *C. longirostris*, niger, rostro barbato, tibiis anticis *barbirostris*.  
tridentatis. *Scb. Mus.* IV. tab. 95. fig. 5.

Habitat in Indiis. *Mus. Kramer.*

Statura elongata *C. paraplectici*, at paulo major. Rostrum tenue, barba laterali densa ferruginea. Thorax scaber. Elytra profunde sulcata sulcis scabris. Femora mutica, at tibiae anticae tridentatae.

46. *C. longirostris*, cylindricus, ater, elytris obtusis *angustatus*.  
punctatis.

Habitat in Anglia.

Statura *C. paraplectici*, at paulo major. Thorax scaber. Elytra striato punctata.

47. *C. longirostris*, cylindricus, ater, lateribus subcoerulecentibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 610. 36. *Aescanii.*

Habitat in Europa australi.

Statura omnino *C. paraplectici*, at paulo minor.

*lineola.* 48. *C. longirostris, cylindricus, niger, elytris vitta testacea.*  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

*Parvus, cylindricus, niger. Antennae clavatae, fuscae,*  
*thoracis dorsum planum. Elytra striata vitta lata*  
*testacea. Femora simplicia. Variat interdum elytris,*  
*loco guttae solo puncto baseos apiceque testaceo.*

*linearis.* 49. *C. longirostris, elongatus, niger, antennis pedibus-*  
*que piceis, rostro basi attenuato.*

Habitat Strasburgi. *D. Prof. Hermann.*

Statura valde oblonga et tenuis. Minor *C. Ascanio.*  
Rostrum mediocre, basi valde attenuatum, apice multo  
crassiore. Antennae ferrugineae. Thorax ob-  
longus, niger, punctatus. Elytra striata. Pedes picei.  
Varietas tota ferruginea invenitur.

*crassipes.* 50. *C. longirostris, femoribus anticis subclavatis, cor-*  
*pore atro.*

Habitat Strasburgi. *D. Prof. Hermann.*

Statura oblongiuscula *C. Ascanii.* Antennae fractae,  
nigrae, apice fuscae. Thorax elongatus, planus,  
crassitie fere elytrorum, postice rotundatus. Elytra  
abdomine breviora, laevia, atra.

\* \* *Longirostres femoribus dentatis.*

*bidens.* 51. *C. longirostris, femoribus posticis dentatis niger,*  
*elytris unispinosis.*

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnitudine *C. viridis.* Rostrum cylindricum,  
atrum, nitidum. Antennae extrorsum crassiores,  
fuscae. Thorax cylindricus, laevis, subrugosus. Ely-  
tra striata crenatis in medio spina erecta val-  
lida, acuta, armata. Pedes nigri, femoribus posti-  
cis dente valido compresso.

*mucoreus.* 52. *C. longirostris, femoribus quatuor anticis dentatis,*  
*elytris polline flavescentibus, supra apicem gibbosis.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 612. 49. Mus. L. Utr. 53.*

Habitat in India.

*pustulatus.* 53. *C. longirostris, femoribus quatuor posterioribus den-*  
*tatis, elytris nigris, striatis, linea repanda grisea.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 612. 50. Mus. L. U. 46.*

Habitat in Indiis.

54. C. longirostris, femoribus dentatis, elytris sulcatis tuberculato spinosis. *scaber.*

Habitat Cayennae. *D. Mallet.*

Magnitudo fere C. palmarum. Rostrum mediocre, crassum, nigrum. Thorax carinatus, niger. Elytra sulcata striis elevatis tuberculisque subspinosis, scabra. Pedes atri, femoribus acute dentatis.

An Curculio vaginalis *Linn.*? at elytra postice haud mucronata.

55. C. longirostris, femoribus dentatis, thorace scabro, elytris postice bituberculatis. *cylindro-rostris.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

*Magnus.* Caput nigrum, rostro thorace longiore cylindrico. Antennae clavatae. Thorax fuscus, punctis elevatis numerosissimis scaber. Elytra fusco griseoque varia, lineis elevatis quatuor subferratis, interstitiis punctato striatis. Tubercula duo paria, erecta ad apicem elytri. Pedes variegati, antici elongati, femoribus omnibus acute dentatis.

56. C. longirostris, femoribus dentatis, clytris macula magna ferruginea. *Linn. Syst. Nat. II. 612. 52.* *stigma.*

*Mus. L. U. 48.*

Habitat in Indiis.

Macula magna ferruginea in medio clytrorum.

57. C. longirostris, pallidus, femoribus dentatis, thorace annulatus. elytrisque strigis nigris.

Curculio annulatus longirostris, femoribus dentatis, thorace elytrisque fasciis linearibus nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 613. 54.* *Mus. Lud. Ulv. 51.*

Habitat in Indiis.

Striga unica in thorace et duae in elytris.

58. C. longirostris, femoribus dentatis, oblongus, elytrorum striis punctatis approximatis. *caliginosus.*

Habitat in Anglia. *Mus. Brit.*

Statura oblonga C. paraplectici, at paulo minor, totus ater, obscurus, minime nitens. Thorax rotundatus, punctatus, carinatus. Elytra striato punctata, striis per paria approximatis profundis. Femora acute dentata.

*Abietis.* 59. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris fusco-fasciis duabus linearibus interruptis albidis. *Linn.* *Syst. Nat.* 11. 613. 57. *Fn. Sv.* 615.

*Curculio subfuscus.* *Linn. It. Oel.* 26.

*Curculio norvegicus.* *Petiv. Gazoph.* 14. tab. 8. fig. 9.  
Habitat in Pini sylvestris cortice et resina.

*reticulatus.* 60. *C. longirostris*, femoribus dentatis, oblongus, piceus, elytris reticulatis, fasciis obliquis pallidis, tibiis antice spinosis.

Habitat Tranquebariae. *Koenig.*

Statura C. Abietis, at magis oblongus. Rostrum atrum. Elytra subtilissime reticulata, fasciis aliquot obliquis pallidis. Femora omnia dentata. Tibiae anticae apice spina valida incurva armatae.

*Lapathi.* 61. *C. longirostris*, femoribus bidentatis, albo nigroque varius, thorace elytrisque muricatis.

*Curculio longirostris* albido nigroque varius, muricatus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 608. 20. *Fn. Sv.* 591.

Habitat in salice.

Videtur curculio Lapathi *Linn.*, quamvis femora omnia bidentata. Affinis *C. equiseti* eiusdemque staturalae. Caput albo nigroque varium, rostro incurvo nigro. Thorax supra fuscus, tuberculis quinque elevatis muricatus, lateribusque albis. Elytra fusco alboque variegata, muricata, apice alba. Abdomen nigrum. Femora omnia bidentata, alba.

*6 gutta-* 62. *C. longirostris*, femoribus dentatis, niger, elytris maculis tribus albis.

Habitat in America. *Muf. D. Hunter.*

Medius. Antennae clavatae, nigrae. Rostrum thorace longius, nigrum, linea longitudinali alba. Thorax niger, lateribus albis. Elytra laevia nigra, maculis tribus magnis albis. Pedes nigri, femoribus dentatis.

*luridus.* 63. *C. longirostris*, femoribus dentatis, ovatus, obscure niger, elytris punctato striatis.

Habitat in nova Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo *C. Lapathi*. Totus obscure niger, minimè nitens. Antennae clavatae, apice fuscae.

fuscae. Rostrum cylindricum, thorace longius, sub pectore inflexum. Thorax scaber, linea dorsali elevata, glabra. Elytra punctis majoribus striata, quae striae per paria postice coeunt. Pedes dente brevissimo.

64. C. longirostris, femoribus dentatis, elytris striatis, postice acuminatis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis. Totus obscure niger, minime nitens. Antennae clavatae. Rostrum cylindricum, thorace longius, atrum, nitidum. Thorax sublaevis, obscurus. Elytra obscura, striata, striis postice per paria coeuntibus. Apex elytrorum acuminatus. Femora omnia acute dentata.

65. C. longirostris, femoribus dentatis, niger, thoracis lateribus rotundatis, clytris subspinosis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium: totus obscure niger, opacus. Rostrum thorace longius, incurvum. Thorax latior, quam in reliquis, lateribus rotundatis, scaber, obscurus. Elytra connata, punctis elevatis acutis subspinosa. Femora scabra, dentata.

66. C. longirostris, femoribus dentatis, griseus, thorace linea, punctisque duobus dorsalibus albis.

*Mangiferae.*

Habitat in nucleis mangiferae. *Koenig.*

Magnitudo et statura C. Lapathi. Rostrum valde inflexum, fuscum. Caput nigricans. Thorax griseus, linea dorsali et juxta lineam punctum utrinque album. Scutellum album. Elytra striata, grisea, punctis nigris sparsis. Pedes grisei.

67. C. longirostris, femoribus dentatis, ater, thorace germanus. utrinque punctis duobus testaccis.

Curculio germanus longirostris, femoribus subdentalis, corpore ovato, nigro, punctis testaceis adperso. *Linn. Syst. Nat. II. 613. 58.*

Habitat in Germania.

68. C.

- Scrophulariae.* 68. *C. longirostris*, femoribus dentatis, coleoptris maculis duabus dorsalibus atris.  
*Curculio Scrophulariae longirostris*, subglobosus, coleoptris maculis duabus dorsalibus atris. *Linn. Syst. Nat.* 11. 614. 61. *Fn. Sv.* 603.
- Curculio subglobosus niger*, punctis duobus atris, suturae longitudinalis coleoptrorum, thorace exalbido. *Geoff. Hist. des Inf.* 1. 296. 44.
- Scarabaeus exiguis cinereus*, duabus maculis nigris in alarum thecis insignitus. *List. Scarab. Angl.* 395. 35.  
*Reaum. Inf.* 3. tab. 2. fig. 12.  
*Habitat in scrophularia, verbascō.*  
*Rostrum inflexum, nigrum, antennis piceis. Elytra cinerea, lineis elevatis quatuor holosericeis, albo nigroque variis. Puncta duo atra communia, anterius orbiculatum, posticum oblongum.*
- gravis.* 69. *C. longirostris*, femoribus dentatis, niger, elytris ferrugineo variegatis, femoribus canaliculatis.  
*Habitat in Cap. B. S. Mus. Dom. Banks.*  
*Statura C. verbasci. Rostrum atrum, incurvum, thorace longius. Antennae piceae, clavatae. Thorax cylindricus, punctis elevatis scabris. Elytra striata, scabra, ferrugineo varia. Pedes nigri, postice ferruginei. Femora subtus late canaliculata, dente valido.*
- s punctata* 70. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris sutura punctisque duobus albis.  
*Curculio s. punctatus longirostris*, femoribus dentatis, elytris sutura alba maculisque duabus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 614. 64. *Fn. Sv.* 618.  
*Habitat in Europa.*  
*Corpus supra purpureum, subtus cinereum. Thorax linea dorsali alba et elytris sutura punctisque duobus albis.*
- haemorrhoidalis.* 71. *C. longirostris*, femoribus dentatis, thorace fusco: lateribus cinerascentibus, elytrorum sutura apice ferruginea.  
*Habitat in nova Hollandia. Mus. Dom. Banks.*

**Parvus:** statura C. cuprei. Caput fuscum, rostro cylindrico, thorace longiore antennisque clavatis. Thorax ovatus, fuscus, lateribus in parte cinereis, in femina ferrugineis, punctis aliquot fuscis. Elytra striata obscura, futura apice ferruginea. Pedes fuscis, femoribus dentatis.

72. C. longirostris, femoribus dentatis, coleoptris nigris, trimaculatus. *Prof. Hermann.*

Habitat in Alfatia. *Prof. Hermann.*

Caput nigrum, immaculatum. Thorax supra fuscus, antice macula utrinque marginali cinerea, lineaque dorsali brunnea. Elytra fuscata, futura baseos brunnea, puncto parvo albo, macula magna alba in medio marginis exterioris, et altera lunata ad apicem.

Pectus et abdomen cinerea. Femora fuscata annulo cinereo.

73. C. longirostris, femoribus dentatis, albo nigroque varius, rostro atro. *litura.*

Habitat in Europa.

Statura praecedentis. Thorax linea dorsali nigra, antice lineola, postice puncto albis.

74. C. longirostris, femoribus dentatis, ater, elytris nitidis. *Linn. Syst. Nat. II. 607. 10. Fn. Sv. 582.* *aterrimus.*

Curculio niger thorace utrinque dentato. *Geoff. Ins.*

I. 299. 48.

Habitat in Europa.

Affinis C. Alliariae, at color aliis.

75. C. longirostris, femoribus dentatis, ater, elytris opacis oblongis. *Linn. Syst. Nat. II. 607. 11. Fn. Sv. 583.* *Cerasi.*

Curculio Cerasi. *Scop. carn. 84.*

Habitat in foliis Cerasi.

Nimis affinis videtur C. aterrimo.

76. C. longirostris, femoribus dentatis, violaceus, totus. *violaceus.* *Linn. Syst. Nat. II. 614. 63. Fn. Sv. 579.*

Rhinomacer subvillosum, coeruleus. *Geoff. Ins. I. 271. 5.* *Habitat in pinis.*

77. C. longirostris, femoribus dentatis, corpore griseo, Nucum. longitudine rostri. *Linn. Syst. Nat. II. 673. 59.* *Fn. Sv. 616.*

Curcu-

*Curculio rufo-marmoratus*, scutello cordato albo, proboscide subulata longissima. *Geoff. Inf.* 1. 295. 42.

*Curculio ovatus*, griseus, rostro filiformi, longitudine corporis. *Uddm. Diff.* 24.

~~—~~ *Inf.* 3. tab. 67. fig. 5. 6.

*Sultz. Inf.* tab. 3. fig. 22.

Habitat in nucibus coryli avellanae.

*probosci-* 78. *C. longirostris*, femoribus dentatis, griseus, rostro corpore duplo longiore.

Habitat in America boreali. *Dom. Banks.*

Nimis affinis videtur *C. nucum*, at magis oblongus.

Rostrum cylindricum, ferrugineum, nitens, corpore fere duplo longiore. Corpus oblongum, griseum, strigis oblongis obscurioribus.

*varius.* 79. *C. longirostris*, femoribus omnibus dentatis, griseo nigroque varius, rostro pedibusque rufis.

Habitat Cayennae *D. Mallet.*

Statura *C. nucum*, at magis oblongus. Rostrum longum, cylindricum, rufum, antennis tenuissimis. Thorax elytraque cinereo fuscoque variegata. Pedes omnes rufi, femoribus acute dentatis, cinguloque nigro.

*Ceraso-* 80. *C. longirostris*, femoribus dentatis, fuscus, scutello clytrorumque fasciis obsoletis cinereis.

Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*

Statura *C. nucum*, at triplo minor. Rostrum cylindricum, glabrum, atrium. Thorax fuscus, linea dorsali obsoleta cinerea. Scutellum cinereum. Elytra striata fasciis duabus repandis cinereis fere obsoletis.

*assimilis.* 81. *C. longirostris*, femoribus dentatis, ater, thorace punctis duobus, coleoptris quinque niveis.

Habitat in nova Hollandia. *Mys. Dom. Banks.*

Statura *C. nucum*, at triplo minor. Caput atrum, rostro cylindrico, longitudine corporis. Antennae clavatae, fuscæ. Thorax ater, glaber, utrinque puncto baseos niveo. Elytra striata, nigra, in medio lineola suturali et postice punctis duobus niveis. Pedes atri, femoribus omnibus dentatis.

82. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris testaceis obsolete fasciatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 614. 62. *Drupa-rum.*  
*Fn. Sv.* 617.  
*Curculio flavescens*, elytris luteo et rufo tessellatis.  
*Geoff. Ins.* I. 296. 43.  
*Schaeff. Icon. tab.* I. fig. II.  
*Sultz. Ins.* tab. 3. fig. 21.  
*Habitat in cerasi padi nucleis.*
83. *C. longirostris*, femoribus dentatis, thorace depresso: *depressus.*  
 lateribus obtuse angulatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 612. 53.  
*Mus. Lud.* V. 49.  
*Scb. Mus.* IV. tab. 95. fig. 4.  
*Habitat in America.*
84. *C. longirostris*, femoribus anticis dentatis, corpore *Pomorum.*  
 griseo, nebuloso. *Linn. Syst. Nat.* II. 612. 46.  
*Fn. Sv.* 612.  
*Curculio in floribus arborum.* *Frisch. Ins.* I. p. 32. tab. 8.  
*Habitat in Pomonae floribus.*
85. *C. longirostris*, femoribus dentatis, corpore testaceo, *Tortrix.*  
 pectore fusco. *Linn. Syst. Nat.* II. 615. 67. *Fn. Sv.* 622.  
*Curculio ferrugineus*, elytris striatis, oculis nigris.  
*Geoff. Ins.* I. 300. 51.  
*Habitat in populo tremula, folia contorquens.*
86. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris flavo *Anchora-*  
 striatis, thorace elongato. *Linn. Syst. Nat.* II. 613. 56. *go.*  
*Mus. Lud. Ulr.* 52.  
*Gronov. Zooph.* 583. tab. 15. fig. 4.  
*Habitat in Indiis.*  
*Statura et antennae proprium genus indicant.*
87. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elongatus, niger, *dispar.*  
 elytris maculis quatuor rufescentibus.  
*Curculio dispar longirostris*, femoribus dentatis, elytris emarginatis; rubro striatis. *Linn. Syst. Nat.* II.  
 613. 55. *Mus. Lud. Ulr.* 50.  
*Curculio minutus.* *Drury. Ins.* I. tab. 42. fig. 3. 7?  
*Habitat in America. D. Drury.*  
*Statura exacte C. anchoraginis et ejusdem certe ge-*  
*neris. Caput obscure rufum, nitidum, rostro*  
*elongato cylindrico. Antennae moniliformes,*  
*rufescen-*

rufescentes, rostro duplo longiores. Thorax ovatus, ater, nitidus, macula utrinque obscure rufa obsoleta. Elytra valde striata, nigra, maculis quatuor rufescensibus obsoletis longitudinaliter dispositis. Pedes rufescentes, femoribus valde dentatis.

**Varietas.** Aliud vidimus insectum, huic simillimum, at loco rostri adsunt maxillae duae prominentes unidentatae. An variat sexus?

Genus proprium constituere videntur species 86 et 87 distinctissimum, figura, antennis totis moniliformibus, at partes oris mihi haud rite notae. Ad Attelabos refert *Geoffroy*, at vix jure.

- 4 pustula-** 88. *C. longirostris*, femoribus dentatis, niger, elytris maculis duabus ferrugineis.

Habitat in Cap. B. S. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis *C. dispari*, at antennae haud moniliformes, sed clavatae, nigrae, clava apice albida. Rostrum longum, cylindricum, atrum. Thorax ater, macula utrinque marginali albida. Elytra striata, truncata, nigra, maculis duabus ferrugineis, anteriori majore. Femora dente obsoleto.

- elongatus.** 89. *C. longirostris*, femoribus dentatis, thorace elongato, tibiis anticis bidentatis.

Habitat in Jamaica. *Drury.*

Statura *C. anchoraginis*, at duplo minor, niger. Elytra punctato striata, nigra, fasciis duabus ferrugineis.

\* \* \* *Longirostris, femoribus posticis saltatoriis.*

- Alni.** 90. *C. pedibus saltatoriis*, niger, coleoptris testaceis, maculis duabus obscuris.

Habitat in Anglia.

Parvus, niger. Thorax testaceus, fascia abbreviata nigra. Elytra testacea, inacula baseos oblonga, et postice majore transversali communi obscuriore.

- Salicis.** 91. *C. longirostris*, pedibus saltatoriis, elytris atris, fasciis duabis albis. *Linn. Syst. Nat. II. 611. 43.*  
*Fu. Sv. 610.*

Habitat in salicis floribus.

92. C. longirostris, pedibus saltatoriis, corpore testaceo. *viminalis.*  
Habitat in salice Germaniae.

Corpus magnitudine C. salicis. Elytra striata. Femora  
postica crassissima, unidentata.

93. C. longirostris, pedibus saltatoriis, corpore atro, *Fagi.*  
femoribus pallidis. *Linn. Syst. Nat. II. 611. 44.*  
*Fn. Sv. 609. 21. Scar. III. Scop. Ent. carn. 73.*

Habitat in foliis fagi sylvatici.

Affinis C. flavipedis, at saliens.

\* \* \* \* brevirostres femoribus muticis.

94. C. brevirostris, femoribus submuticis, corpore toto *argyreus.* ?  
viridi, argenteo aureoque maculato. *Linn. Syst.*  
*Nat. II. 615. 74. Mus. Lud. Ulr. 54.*

Habitat in Indiis.

95. C. brevirostris, femoribus muticis, corpore viridi *regalis.* ?  
sericeo, fasciis aureis repandis. *Linn. Syst. Nat. II.*  
*616. 75.*

Habitat in America meridionali.

Femora fusca, annulo aureo.

96. C. brevirostris, fuscus, elytrorum futura abdominis- *margina-*  
que marginibus aureis. *tus.*

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Magnus. Antennae extrorsum crassiores. Caput nigrum, immaculatum, rostro plano. Thorax rotundatus, fuscus, pectore lineis duabus aureis. Elytra nigra, punctata, futura basi aurea. Abdomen subtus nigrum, lateribus aureis. Pedes nigri, femoribus muticis.

97. C. brevirostris, canescens, thorace punctis nigris 19 *puncta-*  
quatuor, coleoptris novendecim. *tus.*

Habitat in Cayenna. *D. Mauduit.*

Statura C. regalis. Caput coerulescens, oculis attenuisque clavatis, nigris. Thorax cinerascens, punctis quatuor nigris, lateralibus minoribus. Elytra cinerea, punctis novem et uno communi, 1, 2, 2, 2, 2, tertio pari majori. Punctum commune puncto minutissimo cinereo notatum. Pedes coerulescentes.

*16 punctata-* 98. *C. brevirostris*, coerulescens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris duodecim. *Linn. Syst. Nat. II.* 618. 92. *Mus. Lud. Ulr. 58.*

Habitat in Indiis.

Caput fulcatum.

*decorus.* 99. *C. brevirostris*, supra fuscus, thorace coleoptrisque vittis duabus viridi-aureis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura C. regalis, at minor. Rostrum breve, crassum, fuscum, apice canaliculatum. Antennae longae, fuscae, primo articulo longissimo. Thorax rotundatus, fuscus, lineis duabus viridi aureis nitidis. Elytra striata, punctata, fusca, vitta in medio viridi aurea. Corpus subtus aureum, abdominis medio fuscum. Pedes fuscui, femoribus clavatis, muticis.

*nitidulus.* 100. *C. brevirostris*, femoribus muticis, viridi-tomentosus, elytris punctatis.

Habitat in Cajenna.

Affinis *C. argentato*, pulcherrimus. Rostrum sulcatum, cinereum. Thorax et elytra punctata, holosericea, viridi nitentia.

*candidus.* 101. *C. brevirostris*, femoribus muticis, elytris spinosis albis, macula laterali fusca.

Habitat in Cajenna. *D. Mallet.*

Statura C. albini. Caput aureo nitens. Thorax dorso fuscum, lateribus albis. Elytra spinis paucis sparsis elevatis, alba, postice macula magna laterali fusca. Pedes fuscui, tibiis rufis.

*viridis.* 102. *C. brevirostris*, femoribus muticis, virescens, thoracis elytrorumque lateribus flavis.

*Curculio viridis brevirostris*, femoribus muticis, corpore viridi, supra obscuro, subtus flavidiore. *Linn. Syst. Nat. II.* 616. 76.

*Sultz. Ins. tab. 3. fig. 24.*

Habitat in Europa.

Statura C. pyri. Subtus flavescens, uti et margo latus elytrorum.

103. C.

103. *C. brevirostris*, corpore ferrugineo, aureo maculato. *aurifer.*

*Curculio aurifer.* *Drury. Ins. I.* tab. 32. fig. 1.

Habitat in America.

Magnitudo et statura *C. nebulosi*. Rostrum planum, ferrugineum. Thorax laevis, ferrugineus, punctis duobus apicis aureis. Elytra striato-punctata, postice acuminata, ferruginea, punctis lineolisque plurimis vagis, aureis.

104. *C. brevirostris*, canus, elytris fasciis obliquis nigris. *nebulosus.*

*Linn. Syst. Nat. II.* 617. 84. *Fn. Sv.* 635.

*Curculio albo nigroque varius*, proboscide planiuscula, carinata, thoracis longitudine. *Geoff. Ins. I.* 278. 1. tab. 4. fig. 8.

*Curculio brevirostris.* *Frisch. Germ. II.* 32. tab. 23. fig. 5.

Habitat in Europae campis.

Rostrum valde carinatum.

105. *C. brevirostris*, cinereus, clytris lineis tribus elevatis, crenulatis, atris. *crenulatus.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

*Medius.* Antennae griseae, articulo ultimo crassiore fusco. Caput cinereum, dorso fusco. Thorax cylindricus, cinereus, dorso fusco. Elytra cinerea, lineis tribus elevatis, glabris, atris, utrinque punctis impressis, crenulatis. Pedes fusci, femoribus muticis.

106. *C. brevirostris*, fuscus, oblongus, thoracis dorso *incanus.* plano.

*Curculio incanus brevirostris*, cinereus, oblongus, elytris obtusiusculis. *Linn. Syst. Nat. II.* 616. 81. *Fn. Sv.* 631.

*Curculio cinereus*, squamosus, alis carens, elytris striatis. *Geoff. Ins. I.* 282. 10.

*Scarabaeus fuscus lanagine incanus.* *Lister. Scarab. Angl.* 394. 30.

Habitat in Europae pinetis.

107. *C. brevirostris*, fuscus, thorace margine punctisque duobus ferrugineis, pedibus anticis elongatis. *longimanus.*

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura *C. incani*. Rostrum breve, crassum, fuscum, dorso plato. Thorax globosus, lateribus marginato-

K 2 que

que antico ferrugineis. Dorsum fuscum, punctis duobus ferrugineis. Elytra striata, fusca, viridi tintata. Abdomen subtus virescens. Pedes antici nigri, longiores femoribus incrassatis, muticis, tibiae serratae; quatuor postici ferruginei, tibiis fuscis, femora mutica.

Variat thorace elytrisque ferrugineis linea nigra. In thorace linea nigra dorsalis, in elytris ad marginem crassiorem. Pedes nigri.

*griseus.* 108. C. brevirostris, supra griseo fuscus, subtus cinereus, rostro canaliculato.

Habitat in Anglia. *D. Lee.*

Statura C. lineati, at paulo longior. Rostrum cylindricum, sulco longitudinali profundiore exaratum. Supra totus obscure griseus, subtus cinereus, immaculatus. Femora simplicia.

*3 guttatus.* 109. C. brevirostris, nigricans, elytris griseis: maculis duabus albis; posteriori majori communii.

Habitat in Anglia: captus VI. Maj. in fabuletis Richmondensibus.

Statura et magnitudo C. tristis. Rostrum breve, canaliculatum, et thorax fuscus immaculatus. Elytra substriata, grisea, puncto parvo albo in medio et macula majori communii versus apicem.

*Coryli.* 110. C. brevirostris, cinereo-fuscoque varius, elytrorum sutura dimidiata, atra.

Habitat in corylo Angliae: capt. d. XX. Maj.

Affinis C. cervino. Rostrum brevissimum, apice atrum. Thorax elytraque glabra, cinereo fuscoque varia; dimidia suturae pars basi proxima atra, glabra.

*lineatus.* 111. C. brevirostris, fuscus, thorace striis tribus pallidioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 616. 80. *Fn. Sv.* 630.

Curculio rostro thoracis longitudine, thorace striis tribus pallidioribus. *Geoff. Ins.* I. 283.

Habitat in Europa.

*lunatus.* 112. C. brevirostris, coleoptris elevato striatis: fascia semicirculari maculaque postica albis; lunula nigra.

Habitat in Anglia: captus die VI. Maj. in arenosis Richmondensibus.

Parvus

**Parvus.** Statura C. lineati. Rostrum breve, crassum, cinereum, puncto frontis impresso. Elytra lineis tribus v. quatuor elevatis, acutis, quae tamen apicem elytri haud attingunt, cinerea, fascia alba ab angulo humerali ad medium suturae ducta, quae in coleoptris semilunarem constituit. Postice macula magna communis alba, in cuius medio lunula communis nigra. Pedes cinerei, fusco fasciati.

113. C. brevirostris, corpore cinereo hispido. *scabriculus*.  
Curculio scabriculus brevirostris, femoribus muticis, *hus*.  
cinereus, elytris hispidis. *Linn. Mantif. 531.*  
Habitat in Suecia arenosis.  
Magnitudo C. cervini: totus cinereus. Caput et  
rostrum canaliculatum. Thorax punctis elevatis,  
scaber. Elytra striata, hispida.
114. C. brevirostris, griseis antennis basi rufescens. *cervinus*.  
*Linn. Syst. Nat. II. 615. 70. Fn. Sv. 627.*  
Habitat in Europa.  
In rostris femora inermia.
115. C. brevirostris, ater, antennis rubris, thorace utrinque bituberculato. *ruficornis*.  
*Linn. Syst. Nat. II. 616. 78. Fn. Sv. 636.*  
Habitat in Europa.  
Thoracis tubercula utrinque duo. Elytra striata.
116. C. brevirostris, niger, antennis pedibusque rufis. *cloropus*.  
*Linn. Syst. Nat. II. 617. 82. Fn. Sv. 635.*  
Habitat in Europa.  
Parvus et valde oblongus.
117. C. brevirostris, niger, elytris striatis cinereis. *tristis*.  
Habitat in Suecia, Anglia.  
Medius. Caput, thorax, abdomen et pedes obscure nigra. Elytra profunde striata, cinerea.
118. C. brevirostris, ater, elytris postice albo maculatis. *adspersus*.  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
Duplo minor C. tristi: ovatus. Antennae longitudine fere corporis, articulo ultimo crassiore. Rostrum breve, obtusum. Thorax subglobosus, ater, macula

cula utrinque obsoleta alba ad basin. Elytra cre-nato striata, atra, postice inprimis albo maculata. Pedes elongati.

*punctatus.* 119. C. brevirostris, fuscus, elytris punctis holosericeis elevatis: margineque flavo.

Habitat in Suecia.

Major, ovatus. Rostrum brevissimum. Thorax gib-bus, glaber. Elytra striato punctata, et praeterea punctis elevatis, holosericeis, atris adspersa.

*obscurus.* 120. C. brevirostris, ovatus, ferrugineo fuscus.

Habitat in Suecia.

Totus obscure ferrugineus. Elytra lineis obsoletis elevatis.

*niger.* 121. C. brevirostris, ovatus, niger, scaber, pedibus rufis.

Habitat in Germania. v. *Hattorf.*

Corpus magnitudine et statura C. tristis, totum ob-scure nigrum, punctis parvis elevatis, seabrum. Antennae nigrae. Pedes rufi, genubus plantis-que nigris.

*variolosus.* 122. C. brevirostris, niger, thorace carinato varioloso, elytris striatis.

Habitat in Saxonia.

Statura C. punctati: totus niger. Thorax punctis majo-ribus passim confluentibus excavatus. Elytra con-nata, postice acuminata.

*valgus.* 123. C. brevirostris, ater, nitens, elytris punctato stria-tis, femoribus annulo cinereo.

Habitat in America. *Mus. Tottianum.*

Medius. Statura C. pyri: totus ater, nitens. Femora mutica, apice annulo obsolete cinereo.

*vittatus.* 124. C. brevirostris, ater, elytris striis albis rubrisque abbreviatis.

Curculio vittatus longirostris, elytris lineis albis lu-teisque. *Linn. Syst. Nat. II. 610. 33.*

Scarabaeus Curculio proboscide longa, dorsum arcua-tum, elytris fasciis albis et luteis variegatis. *Sloan. Jam. 2. pag. 210.*

Habitat in America.

Rostrum

Rostrum crassum, supra planum, atrum: ideoque ad brevirostres numerandus. Thorax supra planus, laevis. Elytra striata, punctata, atra, stria alba ad futuram et rufa latiori impressa fere in medio, quae ambae abbreviatae a basi ultra medium haud extenduntur. Stria multo brevior, rubra, nigro subpunctata ad marginem exteriorem. Apex elytrorum parum cinerascit. Subtus ater, pectore albo maculato.

125. C. brevirostris, elytris flavis, lineis atris, glaberri- *Spengleri*, mis, abbreviatis.

*Curculio Spengleri longirostris*, fuscus, elytris flavis, lineis atris, glaberriinis, abbreviatis, inaequalibus, pedibus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 609. 32.

Habitat in America.

Rostrum crassum, thorace brevius, ideoque brevi- rostris.

126. C. brevirostris, elytris acuminatis griseis: margine *Robris*: baseos flavescente.

Habitat in America. *D. v. Rohr.*

Magnitudo et statura omnino C. Spengleri. Rostrum nigrum, bisulcatum. Thorax fuscus, atomis albis, in margineque flavescente. Elytra apice acuminata, grisea. Pedes nigri.

127. C. brevirostris, niger, fronte anoque albis, tho- *albinus*. race tuberculato. *Linn. Syst. Nat.* II. 616. 79.  
*Fn. Sv.* 632.

*Curculio niger*, aculeis thoracis tribus, elytrorum sex. *Uddm. Diff.* 27.

*Curculio albinus*. *Scop. Ent. carn.* 66.  
Habitat in Europa.

128. C. brevirostris, rostro latissimo, explanato, elytris *latirostris*. apice albis, punctis duobus nigris.

Habitat Halae Saxonum. *Dom. Schaller.*

Statura C. albini, at major. Corpus nigrum. Rostrum latissimum, planum, album, apice nigrum. Thorax niger, canaliculatus. Elytra nigra, striis inter- ruptis glaucis, apice alba, punctis duobus nigris. Pedes nigri, albo annulati. Abdomen subtus album, lateribus nigris.

An varietas major C. albini?

*verruco-* 129. *C. brevirostris, aeneo-niger, elevato punctatus, elytris postice verrucosis.* Linn. *Syst. Nat.* II. 618. 90. *Mus. Lud. Ulv.* 60.

*Curculio verrucosus. Drury. Ins. I. tab. 32. fig. 5.*  
Habitat in Aethiopia.

*Totus aeneus, minime splendens. Elytra striis tribus elevatis, punctis elevationibus adpersis. Inter singulas striae elevatas striae duae punctorum impressorum. Postice in singulo elytro verruca elevata, obtusa.*

*capensis.* 130. *C. brevirostris, ater, thorace elevato - punctato, elytris striis crenatis.* Linn. *Syst. Nat.* II. 618. 82. *Mus. Lud. Ulv.* 59.

Habitat ad Cap. B. S.

*Vitulus.* 131. *C. brevirostris, niger, fronte bidentato, elytris unispinosis.*

Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*

Statuta C. verrucosi. Caput nigrum, rostro brevissimo, crassissimo, dorso canaliculato. Inter oculos dentes duo elevati, acuti. Thorax cylindricus, ater, rugosus, antice punctis duobus subelevatis. Elytra atra, carinata, rugosa, postice spina elevata, acuta. Pedes nigri, femoribus simplicibus.

*acuminata.* 132. *C. brevirostris, cylindricus, fuscus, elytris apice acuminatis.*

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statuta longa et angusta. Antennae clavatae, fuscae. Caput et thorax elytris angustiora, longiora, cylindrica, glabra, fusca. Elytra striata, fusca, terminantur postice in spinam porrectam, acutam. Pedes ferruginei, femoribus muticis.

*emeritus.* 133. *C. brevirostris, niger, thorace elytrisque spinosis, fronte excavata.* Linn. *Syst. Nat.* II. 617. 87. *Mus. Lud. Ulv.* 35.

Habitat in Indiis.

Magnitudo C. barbari.

*barbarus.* 134. *C. brevirostris, thorace subspinoso, elytris angulis duplice crispa.* Linn. *Syst. Nat.* II. 617. 88.

Habitat in Africa, in Gallia; duplo minor.

135. *C. brevirostris*, thorace spinoso, quinque sulcato, *globoſus*.  
elytris laevibus.

*Curculio globosus*. *Drury. Inf. I. tab. 32. fig. 4.*

Habitat in Indiis. *D. Drury.*

Statura C. barbari, at triplo minor: totus ater.  
Rostrum breve, crassum, bisulcatum. Thorax  
utrinque spinosus, sulcisque quinque exaratus,  
quorum laterales in ipsa spinarum basi reliquis  
breviores. Elytra connata, glabra, atra. Pedes  
nigri, tibiis femoribusque apice annulo pallido.

136. *C. brevirostris*, thorace tuberculis duobus com- *cultratus*.  
pressis, elytris tuberculatis, postice cinereis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Medius. Caput cinereum; rostro brevi crassiori atro,  
Antennae clavatae, fuscae. Thorax scaber, niger,  
margin'e antico cinerascente. Antice tubercula duo  
approximata, elevata, compressa. Elytra crenato-  
striata, tuberculis sex v. septem elevatis, sparsis,  
nigra, postice cinerea, tuberculo nigro. Pedes gri-  
sei, simplices.

137. *C. brevirostris*, cinereus, thorace elytrisque subspi- *cornutus.*  
nosis, capite cornuto. *Linn. Syst. Nat. II. 618. 91.*  
*Mus. Lud. Vlr. 57.*

Habitat in Indiis.

Magnitudo praecedentis. Thorax spinosus. Elytra  
punctis elevatis striata, adjecto fasciculo pilorum.

138. *C. brevirostris*, cinereus, thorace scabro, antice im- *Tribulus.*  
presso, elytris spinosis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Medius. Caput fuso cinereum. Rostrum longitudi-  
ne fere thoracis, apice incrassatum. Antennae arti-  
culo primo longissimo, reliquis brevibus pilosis, ul-  
timo clavato. Thorax obscure cinereus, scaber,  
antice puncto majusculo impresso. Elytra connata,  
spinis plurimis erectis, acutis, posticis duabus ad su-  
turam majoribus. Femora simplicia.

139. *C. brevirostris*, cinereus, thorace scabro, elytris *4 dens.*  
spinosis: spinis quatuor posticis longioribus.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo C. Tribuli. Antennae cinereae, articulo ultimo crassiori, fusco. Rostrum breve, crassum, cinereum, dorso canaliculato. Thorax punctis elevatis obtusissimis, scaber. Elytra spinosa, spinis quatuor posticis longioribus. Pedes cinerei, femoribus simplicibus.

*Clavus.* 140. C. brevirostris, albicans, thorace canaliculato, coleoptris spinosis, lineolis tribus baseos rubris.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura C. Tribuli. Caput cinereum, rostro brevi, crasso, dorso leviter carinato. Thorax cylindricus, scaber, dorso canaliculato rufescente. Elytra albida, spinis plurimis nigris, duabus lateralibus baseos, et duabus dorsalibus apicis longioribus. Lineola brevis lateralis rubra, et adhuc minor communis in futura. Pedes albi, femoribus simplicibus.

*nodulosus.* 141. C. brevirostris, thorace lineis sex nodulosis, elytris spinosis.

Habitat in Capite Bon. Spei. *Mus. Dom. Banks.*

Statura C. Tribuli. Rostrum thorace vix brevius, crassum, dorso canaliculato, canali apice dilatato. Thorax griseus, lineis sex e nodulis elevatis, atris, nitidis consistentibus. Elytra grisea, spinis plurimis atris. Pedes cinerei, femoribus inermibus.

*apterus.* 142. C. brevirostris, thorace spinoso, cruce impresso, elytris ferrugineo punctatis.

Curculio apterus brevirostris, pedibus muticis, corpore atro, thorace spinoso, elytris coadunatis, abdome punctato. *Linn. Syst. Nat. 11. 6:9. 95.*

Habitat in India.

Rostrum crassissimum, planum, marginibus elevatis.

Elytra nigra, lineis duabus punctorum ferrugineorum.

*acellatus.* 143. C. brevirostris, thorace spinoso, antice excavato, elytris cinereis, punctis atris subspinosis.

Habitat in Madagascar. *Mus. Brit.*

Corpus magnum C. Barbari. Rostrum breve, crassum, obtusum, unifurcatum. Thorax utrinque acute spinosus, antice fouea lata excavatus, scaber, fuscus, lineis tribus longitudinalibus griseis. Elytra conata

nata, grisea, punctis elevatis, glabris, nitidis striata.  
Puncta vero duarum striarum reliquis elevationioria,  
subspinosa. Femora fusca, annulo albo cincta.

\* \* \* \* \* *Brevirostres femoribus dentatis.*

144. C. brevirostris, femoribus dentatis, corpore viridi *specabilis.*  
nigroque variegato.

Habitat in noya Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnus. Rostrum breve, obtusum, nigro viridi-  
que varium. Antennae clavatae, clava ferruginea.  
Thorax elytraque reticulata, nigro viridique varia.  
Femora dentata.

145. C. brevirostris, femoribus dentatis, corpore obscuro. *Liguistic.*

Curculio brevirostris, femoribus subdentatis, abdo-  
mene subovato, murino. *Linn. Syst. Nat. II. 615. 68.*  
*Fn. Sv. 621.*

Habitat in Ligustico leuisticico.

Major. Thorax cinereus, scaber.

146. C. brevirostris, femoribus dentatis, ater, clytris *sulcatus.*  
striatis, ferrugineo-maculatis.

Habitat in Saxonia.

Major. Totus ater. Elytra testaceo-maculata, cre-  
nato-striata.

147. C. brevirostris, femoribus dentatis, aeneo fuscus. *Pyri.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 615. 72. Fn. Sv. 623.*

Curculio squamoso-viridis, rostro thorace breviore,  
pedibus rufis. *Geoff. Inf. I. 282.*

Curculio viridis, opacus, pedibus antennisque magis  
fuscis. *Linn. It. Scan. 355.*

Habitat in pyri foliis, in corollis declaratus.

148. C. brevirostris, femoribus dentatis, corpore viridi-  
argenteo. *Linn. Syst. Nat. II. 615. 73.*

Curculio squamosus, viridi auraatus. *Geoff. Inf. I. 293. 38.*  
Habitat in Europae urtica, betula.

149. C. brevirostris, femoribus dentatis, viridis, ore  
antennisque nigris, oculis atris. *virida-*

Habitat Tranquebariae. *Koenig.* *rins.*

Statura

Statura et summa affinitas C. argentati. Corpus totum in junioribus laete viride, in adultioribus magis obscurum. Os s. apex rostri et antennae nigra. Oculi magni, atri.

- oblongus.* 150. C. brevirostris, femoribus dentatis, antennis elytris pedibusque ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 615. 21. *Fn. Sv.* 625.

Curculio oblongus niger, elytris pedibusque testaceis. *Geoff. Inf.* I. 294. 39.  
Habitat in Europa.

- ovatus.* 151. C. brevirostris, femoribus dentatis, corpore nigro, pedibus antennisque rufis. *Linn. Syst. Nat.* II. 615. 69. *Fn. Sv.* 626.

Habitat in Europa.

- attelaboides.* 152. C. brevirostris, femoribus dentatis, rostro elytrisque unituberculatis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino Attelabi. Antennae clavatae, articulo primo longissimo ferrugineo. Rostrum breve, griseum, tuberculo magno elevato carinato. Frons canaliculatus, spina brevissima utrinque armatus. Thorax scaber, griseo fuscoque varius, antice attenuatus. Elytra scabra, fusco griseoque variegata, in medio ad suturam tuberculo magno elevato, carinato. Pedes variegati, femoribus clavatis, dentatis.

### 39. ATT'ELABVS. *Palpi* filiformes.

*Maxilla* bifida.

*Labium* corneum, palpos tegens.

*Antennae* moniliformes, insidentes rostro.

- Coryli.* 1. A. niger, elytris rufis, reticulatis.

Attelabus Coryli niger, elytris rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 619. I. *Fn. Sv.* 638.

Curculio niger, elytris rubris, capite postice elongato. *Linn. It. oel.* 153.

*Sultz. Inf.* tab. 4. fig. I.

- 6 Attelabus avellanae niger, elytris thorace pedibusque rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 619. 2.
- Rhinomacer thorace elytrisque rubris, capite parce elongato. *Geoff. Inf.* I. 273. II.
- Curculio collaris. *Scopoli carn.* 71.  
Habitat in coryli foliis, quae in cylindrum convolvit, et utrinque claudit.
2. A. niger, elytris striatis thoraceque rubris. *curculio-*  
Attelabus curculionoides niger, thorace elytrisque rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 619. 3.
- Rhinomacer niger, thorace elytrisque rubris, proboscide longitudine capitis. *Geoff. Inf.* I. 273. 10.
- Curculio nitens. *Scopoli Ent.* 72.  
Habitat in Europae corylo, salice.
3. A. ater, pedibus saltatoriis. *Betulae.*  
Attelabus Betulae pedibus saltatoriis, corpore toto atro. *Linn. Syst. Nat.* II. 620. 7. *Fn. Sv.* 640.  
Habitat in betulae foliis, quae rodendo pulcre crispa reddit. *Linné.*
40. CLERVS. *Palpi* quatuor,  
Anteriores filiformes,  
Posteriores longiores, securiformes.  
*Antennae* moniliformes.
1. C. niger, elytris fascia triplici alba. *mutilla-*  
Habitat Halae Saxonum. *Dom. Schaller.* *rius.*  
Statura et summa affinitas C. formicarii, at paulo maior. Corpus nigrum, fronte hirsutie densa alba tecta. Thorax niger, vix pubescens. Elytra nigra, basi parum rufescentia, fasciisque tribus albis, quarum prima interrupta, tertia in ipso apice elytrorum. Subtus niger, abdomine rufo.
2. C. elytris fascia dupli alba basique rubris. *formica-*  
Attelabus formicarius niger, elytris fascia dupli alba, basique rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 620. 8. *rius.*  
*Fn. Sv.* 641.

Cantha-

*Cantharis* XXIX. *Raj. Inf.* 103. 29.

*Sultz. Inf.* tab. 4. fig. 8.

Habitat in Europa, America boreali.

*sipylus.* 3. *C. viridis*, elytris fascia duplice flava interrupta, thorace hirsuto. *Linn. Syst. Nat.* 11. 620. 9. *Mus. Lud. Ulr.* 63.

Habitat in Africa.

Magnitudo et statura praecedentis.

*apiarius.* 4. *C. elytris rubris*: fasciis tribus coerulecentibus.

*Clerus nigro violaceus*, hirsutus, elytris fascia triplici coccinea. *Geoff. Inf.* 1. 304. 1; tab. 5. fig. 4.

*Attelabus apiarius* coerulescens, elytris rubris, fasciis tribus nigris. *Linn. Syst. Nat.* 11. 620. 10.

*Sultz. Inf.* tab. 4. fig. 6.

*Schaeff. elem.* tab. 46.

Habitat frequens in Europae, Americae floribus.

#### 41. NOTOXVS. *Palpi* quatuor securiformes. *Maxilla* unidentata. *Antennae* moniliformes.

*mollis.* 1. *N. pubescens*, elytris nigris: fasciis tribus pallidis.

*Attelabus mollis* griseus, pubescens, elytris fasciis tribus pallidis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 621. 11. *Fn. Sv.* 642.

*Clerus fuscus*, villosus, elytris flavis, cruce fusca. *Geoff. Inf.* 1. 305. 3.

*Curculio oblongus* ruber, elytris nigris, fascia triplici albicante. *Uddm. Diff.* 28. tab. 1. fig. 9.

Habitat in Europa.

*monoceros.* 2. *N. thorace in cornu supra caput protenso.*

*Meloe monoceros*, alatus, thorace in cornu supra caput protenso. *Linn. Syst. Nat.* 11. 681. 14.

*Attelabus monoceros.* *Linn. Fn. Sv.* 638.

*Notoxus.* *Geoff. Inf.* 1. 356. tab. 6. fig. 8.

Habitat in Europa.

- 42. SPONDYLIS.** *Palpi* subfiliformes.  
*Maxilla* conica, crassa,  
 integra.  
*Labium* corneum, bifidum.  
*Antennae* moniliformes.

1. *S. atra*, thorace subgloboso. *buprestoides.*  
*Attelabus buprestoides* ater, elytris nervosis, thorace subgloboso. *Linn. Syst. Nat. II. 621. 3.*  
*Scarabaeus arboreus*, collo crasso. *Frisch. Inf. 13.*  
 p. 23. tab. 19.  
 Habitat in Europae sylvis.
2. *S. atra*, elytris rugosis, thorace latioribus. *ceramboides.*  
*Attelabus ceramboides* ater, elytris rugosis. *Linn. des.*  
*Syst. Nat. II. 621. 12. Fn. Sv. 643.*  
*Curculio maximus*, ater, oblongus, elytris irregulariter reticulatis. *Uddm. Diff. 26. tab. I. fig. I.*  
 Habitat in boleto fomentario.

- 43. PRIONVS.** *Palpi* quatuor filiformes.  
*Maxilla* cylindrica, integra.  
*Labium* brevissimum, membranaceum.  
*Antennae* setacae.

1. *P. thorace spinis mobilibus*, elytris basi unidentatis, apiceque bidentatis, antennis longis. *longimanus.*  
*Cerambyx longimanus.* *Linn. Syst. Nat. II. 621. 1.*  
*Mus. Lud. Ulr. 64.*  
*Merian. sur. tab. 28.*  
*Scarabaeus capricornus maximus*, nigricans, fasciis elytrorum coccineis et flavis. *Sloan. Iam. 2. p. 209.*  
*Noeoonaca.* *Grew. Mus. 161. tab. 13.*  
*Roef. Inf. 2. Scarab. 2. p. 11. tab. I. fig. a.*  
*Aub. miscell. tab. 64. fig. I.*  
 Habitat in America.

In altero sexu tibiae anticae longissimae. Corpus supra rubro nigroque variegatum.

*fuligino-* 2. P. thorace marginato, crenato, unidentato, ater, elytris apice crenato dentatis.

Habitat in America. *Mus. Brit.*

Statura et summa affinitas P. lineati, uti suadent antennae, pedes et gibber sterni. Differt tamen dente thoracino magis versus posteriora inserto, et corpore atro immaculato.

*lineatus.* 3. P. thorace marginato, crenato, unidentato, niger, albivittatus, elytris apice crenato-dentatis.

Cerambyx lineatus, thorace marginato, serrato, dentato, elytris nigris, linea alba, antennis compressis brevioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 624. 14.

*Sloan. Iam.* 2. p. 209. tab. 237. fig. 34.

*Brown. Iam.* 430. tab. 43. fig. 7.

Habitat in America. *Mus. Brit.*

Antennae breves, compressae, ferrugineae. Caput nigrum, canaliculatum, canali villo albo replete. Maxillae breves, inermes. Thorax niger, lineis tribus villosis, albis. Elytra nigra, vitta media lata et parva marginali albis. Sternum antice gibbere elevato, obtuso, postice bifidum. Pedes ferruginei.

*mucronata-* 4. P. thorace marginato, bidentato, elytris rufis, mucronatis.

Habitat in America. *Drury.*

Corpus P. cervicorni paulo minus. Frons retusa, antennis brevibus, compressis. Thorax dorso bituberculato. Elytra rufescens, holosericea, acuminata.

*luzonum.* 5. P. thorace marginato, multispinoso, maxillis porrectis, unidentatis, apice bifidis, pedibus anticis elongatis.

*Petiv. Gazoph.* tab. 47. fig. 1.

Habitat in insulis Luzonum. *Mus. Brit.*

Magnitudo P. cervicornis. Antennae nigrae, longitudo corporis, articulo 2. 3. 4. 5. subtus aculeatis. Maxillae prominentes, basi unidentatae, apiceque bifidae. Thorax niger, glaber, margine spinis duodecim ciliato. Elytra mucronata, pallide ferruginea,

ginea, basi subpunctata nervoque uno, altero ave  
elevato. Pedes antici reliquis longiores, scabri,  
subtus aculeati. Reliqui subtus aculeati, supra  
glabri, nitidi.

6. P. thorace marginato, utrinque tridentato, maxillis *cervicornis*,  
porrectis, extus unispinosis, antennis brevibus.

*Cerambyx cervicornis*, thorace marginato, dentato,  
maxillis porrectis, corniformibus, utrinque spinosis,  
antennis brevibus. *Linn. Syst. Nat. II. 622. 3. Mus.*  
*Lud. Utr. 65.*

*Sloan. Iam. 2. tab. 237. fig. 6.*

*Merian. Sur. tab. 48.*

*Roef. Inf. 2. Scar. 2. p. 12. tab. 1. fig. 8.*

*Brown. Iam. 249. tab. 44. fig. 8.*

*Aubent. miscell. tab. 90. fig. 3.*

Habitat in Americae ligno bombacis. Larva exempta  
edulis in delicis.

Maxillae magnae, interne dentatae, externe versus  
apicem spina unica, valida, acuta, armatae.

7. P. thorace marginato, tridentato, corpore piceo, *coriarius*.  
elytris mucronatis, antennis brevibus.

*Prionus. Geoff. Inf. I. 198. tab. 3. fig. 9.*

*Cerambyx coriarius. Linn. Syst. Nat. II. 622. 7. Fn.*  
*Sv. 647.*

*Cerambyx maxima cornubus magnis articulatis. Raj.*  
*Inf. 95. I.*

*Cerambyx cinereo nigricans, antennis et pedibus rufis.*  
*Gad. Sat. 79.*

*Cerambyx niger antennis serratis. Frisch. Inf. 13. tab. 9.*

*Schultz. inf. tab. 4. fig. 26.*

*Roef. Inf. 2. Scar. 2. tab. 1. fig. 12.*

*Schaeff. Elem. tab. 103.*

Habitat in Europae betulis putridis.

8. P. thorace utrinque tridentato, corpore nigro, elytris *giganteus*,  
ferrugineis, antennis brevibus.

*Cerambyx giganteus. Linn. Mant. I. 531.*

*Aub. Miscell. I. tab. 64. fig. 2.*

Habitat in Cajenna.

Maxillae bidentatae.

- armilla-sus.* 9. P. thorace marginato, utrinque quadridentato, elytris ferrugineis, nigro marginatis.  
*Cerambyx armillatus*, thorace marginato, utrinque quadridentato, elytris ferrugineis, nigro marginatis, femoribus posticis unidentatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 622. 4.  
*Gronov. Zooph.* 525. tab. 15. fig. 6.  
 Habitat in India.  
 Maximus, frons retusa. Maxillae emarginatae. Thorax lateribus rufescens. Elytra apice acuminata.
- damicornis.* 10. P. thorace marginato, denticulato, maxillis porrectis, bidentatis, antennis brevibus.  
*Cerambyx damicornis*, thorace marginato, crenulato, angulato, maxillis porrectis, corniformibus, introrsum bidentatis, antennis mediocribus. *Linn. Mant.* 532.  
*Drury. Ins.* I. tab. 37. fig. 1.  
 Habitat in America.  
 Duplo minor *P. cervicorni*. Maxillae porrectae, longitudine capitis, arcuatae, acutae, intus dentibus duobus validis armatae. Caput canaliculatum, punctatum, nigrum. Thorax planus, denticulis posticis paulo majoribus. Elytra mucronata.
- bifascia-tus.* 11. P. thorace marginato, denticulato, corpore nigro, elytris rubris, fasciis duabus atris, antennis brevibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 624. 16.  
*Gronov. Zooph.* 532. tab. 14. fig. 4.  
 Habitat in America.  
 Fascia elytrorum altera in medio, altera postica terminalis.
- Thomae.* 12. P. thorace marginato, crenulato, corpore nigro, elytris glabris, ferrugineis: margine luteo.  
*Cerambyx Thomae* thorace marginato, denticulato, corpore nigro, elytris ferrugineis, margine luteo. *Linn. Syst. Nat.* II. 623. 9.  
 Habitat in insula St. Thomas Americae.  
 Elytra apice rotundata.

13. P. thorace marginato, crenato, albo, bilineato, elytris *bilineatus*.  
ferrugineis, atomis albis, margineque luteo.

Habitat in America. *D. v. Rohr.*

Nimis affinis *P. Thomae*, a quo tamen differt thoracis dorso lineis duabus albis, elytris atomis albis irroratis, apice subspinosis.

14. P. thorace marginato, crenato, capite sub maxillis spinoso, scabro, maxillis tridentatis. *spinibarbis.*

*Cerambyx spinibarbis* thorace marginato, subcrenulato, capite sub maxillis spinoso, scabro, antennis brevibus. *Linn. Syst. Nat. II. 624. 4. Mus. Lud. Ulr. 67.*

*Merian. Surinam. 24. tab. 24.*

Habitat in America.

Maxillae magnae, crassae, intus tridentatae, apiceque emarginatae.

15. P. thorace marginato, crenato, maxillis porrectis: *maxillo-*  
intus hirsutis, quadridentatis. *fus.*

*Cerambyx maxillosus. Drury. Ins. I. tab. 38. fig. 3.*

Habitat in America. *Mus. Brit.*

Minor *P. melanopo*, totus ater, nitens. Maxillae porrectae, acutae, intus hirsutae, apice tridentatae, basique unidentatae. Elytra apice mucronata.

Affinis videtur *P. spinibarbi*.

16. P. thorace marginato, denticulato, maxillis porrectis, *cinnamo-*  
tridentatis. *meus.*

*Cerambyx cinnamomeus*, thorace marginato, denticulato, corpore ferrugineo, elytris mucronatis. *Linn. Syst. Nat. II. 623. 10. Mus. Lud. Ulr. 66.*

*Merian. Surinam. tab. 24.*

*Drury. Ins. I. tab. 40. fig. 2.*

Statura *P. cervicornis*: at duplo minor.

44. CERAMBYX. *Palpi filiformes.**Maxilla obtusa*, unidentata.*Labium bifidum.**Antennae setaceae.*

*aedilis.* 1. *C. thorace spinoso*, punctis quatuor luteis, elytris obtusis, nebulosis, antennis longissimis. *Linn. Syst. Nat.* II. 628. 37. *Fn. Sv.* 653.

*Cerambyx nebulosus* antennis corpore longioribus, thoracis punctis quatuor luteis. *Linn. It. ocl.* 8.

*Capricornus rusticus.* *Petiv. Gazoph.* tab. 8. fig. 8.

*Mouf. Inf.* 151. fig. 2.

*Frisch. Inf.* 13. tab. 12.

*Sultz. Inf.* tab. 4. fig. 27.

Habitat in truncis arborum Europae borealis.

Variat elytris punctato striatis nebulosis, et elytris glabris cinereis vix punctatis, umbra postica obsolete fusca. Vix tamen specie differt.

*araneifor-* 2. *C. thorace spinoso tuberculatoque*, elytris porosis, mis. antennis longis, articulo quinto unidentato. *Linn. Syst. Nat.* II. 625. 22.

*Sloan. Iam.* II. tab. 237. fig. 24.

*Drury. Inf.* tab. 35. fig. 4.

Habitat in America.

Corpus statura C. *aedilis*. Caput inter antennas carinatum, basi circulo nigro cinctum. Antennae corpore longiores, articulo quinto denticulo parvo intus armato, cinereae in rostro, absque pilis. Thorax lateribus spinosis dorso tuberculatus, cinereus, parce nigro-punctatus. Elytra in primis basi porosa, cinerea, macula magna laterali fusca et apicibus obsolete fuscescens. Pedes apice pilosi.

*nodosus.* 3. *C. thorace spinoso*, elytris cinereis, nigro maculatis, antennis longissimis, articulo tertio apice nodoso.

Habitat in Marylandia. *Muf. Brit.*

Statura et summa affinitas C. *araneiformis*. Antennae corpore quadruplo longiores, articulo tertio gibbere rotun-

rotundato, obtuso, prominente. Elytra plana, rotundata, cinerea, maculis aliquot oblongis nigris basi punctata.

4. C. thorace multidentato, dorso plano, clytris tibiis que anticis unidentatis. *canceriformis.*

*Cerambyx pustulatus. Drury. Ins. 2. tab. 35. fig. 1.*  
Habitat in Jamaica.

Statura et magnitudo omnino C. araneiformis. Antennae longiores, articulo primo apice unidentato. Thorax cinereus, dorso valde explanato, marginē dentibus quinque vel sex minoribus, in duabus seriebus collocatis, armato. Elytra cinerea, punctis elevatis fuscis irrorata, apice unidentata. Femora clavata, tibiis anticis unidentatis.

5. C. thorace quinquespinoso, glaucus, clytris muricatis, latere fasciaque nigris, antennis longis. *Linn. glaucus.*  
*Syst. Nat. 11. 626. 28.*

Habitat in America.  
Elytra apice unidentata.

6. C. thorace subspinoso, clytris bidentatis, scabris, cinereo fuscis. *bidentatus.*

Habitat in America. *D. v. Rohr.*

Statura C. araneiformis, at triplo minor. Antennae corpore longiores, griseae, articulorum apicibus fuscis. Thorax inaequalis, utrinque unispinosus spina obtusa. Elytra bidentata, punctis elevatis acutis, scabra. Femora clavata. Color cinereo fusco-que nebulosus.

7. C. thorace spinoso, viridis, nitens, antennis cyaneis, mediocribus. *moschatus.*

*Cerambyx moschatus thorace spinoso, clytris obtusis, viridibus, nitentibus, femoribus muticis, antennis mediocribus. Linn. Syst. Nat. 11. 627. 34. Fn. Sv. 652.*

*Cerambyx viridi coerulescens. Geoff. Ins. 1. 203. 5.*

*Scarabaeus major viridis, odoratus. Raj. Ins. 81. 17.*

*Scarabaeus suaviter olens. Lister. Scar. Angl. 324. 11.*

*Scarabaeus arboreus coeruleo viridis. Frisch. Ins. 13. tab. 11.*

*Cerambyx tertius. Monff. Ins. 149. fig. ult.*

Habitat in salice Europae.

Odorem spargit gratum et soporiferum, quem cum vita amittit. Ova candida, sapida. *Lister.*  
Variat antennis pedibusque cyaneis et fuscis.

*virens.* 8. C. thorace rotundato, spinoso, corpore viridi, femoribus rufis.

Cerambyx virens, thorace spinoso, elytris obtusis, corpore viridi, antennis longioribus, femoribus unidentatis. *Linn. Syst. Nat. 11. 627. 33.*

*Drury. Inf. 1. tab. 40. fig. 1.*

Habitat in America.

Corpus magnum, viride, femoribus solis rufis. Antennae nigrae.

Variat antennis corpore longioribus et brevioribus, femoribus dentatis et muticis.

*ater.* 9. C. thorace rotundato, spinoso, corpore viridi, antennis pedibusque rufis.

Cerambyx ater. *Linn. Mant. 532.*

*Drury. Inf. 1. tab. 39. fig. 4.*

Habitat in Africa. *D. Solander.*

Statura C. virentis, at duplo minor. Caput viride, fronte subretusa, oculis nigris, antennisque corpore sublongioribus, rufis. Thorax rotundatus, spinosus, transverse striatus, viridis, nitens, immaculatus. Elytra subattenuata, viridia, sutura nitidiore. Pedes omnes rufi, femoribus quatuor anticis clavatis.

*festivus.* 10. C. thorace spinoso, viridi, elytris violaceis, basi viridibus, femoribus ferrugineis, unidentatis.

Habitat ad fluvium Gaboon Africæ. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Antennæ mediocres, nigrae, primo articulo rufo. Caput viride, nitens, labio superiore subferrugineo. Thorax viridis, nitens, utrinque spinis duabus obtusis, posteriore majori. Elytra cyanea, nitida, basi viridia. Femora ferruginea, unidentata. Tibiae fuscescentes.

*vittatus.* 11. C. thorace spinoto, viridis, nitens, thorace elytrisque nigro lineatis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura

Statura omnino praecedentis. Antennae nigrae, corpore sublongiores. Caput viride, nitens. Thorax inaequalis, spinosus, viridis, lineis duabus dorsalibus atris. Elytra obtusa, viridia, lineis longitudinalibus duabus atris. Femora rubra, inernia. Tibiae nigrae.

12. C. thorace spinoso, niger, vitta atra. *velutinus.*

Habitat in America. *D. Schultze.*

Nimis affinis C. virenti. Antennae corpore paulo longiores. Corpus nigrum. Thorax rotundatus, spina valida, acuta. Elytra obtusa, nigra, vitta dorsali velutina atra s. obscuriore. Femora quatuor antica clavata, postica elongata. Tibiae posticae compressae, apice spinosae.

13. C. thorace subspinoso, niger, elytris viridibus, apice spinosis. *spinicornis.*

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium. Antennae nigrae, longiores articulo tertio, quarto, quinto et sexto, apice spinosis. Thorax niger, tuberculis utrinque tribus lateralibus obtusis. Elytra viridia, nitida, apice spina acuta armata. Corpus nigrum. Pedes nigri, femoribus clavatis, subferrugineis.

14. C. thorace spinoso, rugoso, niger, antennis longis.

Cerambyx Credo thorace spinoso, rugoso, nudo, corpore nigro, antennis longis, articulis quatuor primis clavatis. *Linn. Syl. Nat. II. 629. 39.*

Cerambyx ater, elytris rugosis integris, antennis corpore longioribus. *Geoff. Inf. I. 201. 2.*

Cerambyx Credo. *Scopoli Ent. 162.*

*Frisch. Inf. 13. tab. 8.*

*Mouff. Inf. 149. fig. 2.*

*Drury. Inf. I. tab. 39. fig. 1.*

*Credo.*

- β. Cerambyx Heros. *Scopoli Ent. 163. Var. maj.*

Cerambyx fuscō niger, elytris rugosis, apice interiori spinosis, antennis corpore longioribus. *Geoff. Inf. I. 200.*

Habitat in Europa.

Vix specie differunt α et β.

- alpinus.* 15. *C. thorace spinoso*, coleoptris fascia maculisque quatuor atris, antennis longis. *Linn. Syst. Nat.* II. 628.  
 35. *Fn. Sv.* 654. *Iter. Scov.* 260.  
*Cerambyx cinereo coerulescens*, elytrorum maculis sex fuscis. *Geoff. Inf.* I. 202. 4.  
*Capricornis primus Moneti* coloris fere cinerei, cuius venter crura et cornua coerulea, articulis nigris interstanta, scapulae, cauda et elytra nigris quibusdam maculis variegata. *Scheuchz. Itin.* I. tab. I. fig. 5.  
*Inst. Inf.* tab. 15. fig. 3.  
*Saltz. Inf.* tab. 4. fig. d.  
*Dury. Inf.* 2. tab. 31. fig. 5.  
 Habitat in Europae montosis.
- succinctus.* 16. *C. thorace bispinoso*, rugoso, elytris fascia flava, antennis longioribus, compressis. *Linn. Syst. Nat.* II. 627. 32. *Mus. Lud. Ulr.* 72.  
 Quici. *Marg. Bras.* 254.  
*Dury. Inf.* I. tab. 39. fig. 2.  
 Habitat in America, Brasilia.
- fasciatus.* 17. *C. thorace spinoso*, cyaneus, elytris fascia flava, antennis mediocribus ante apicem flavis.  
 Habitat Tranquebariae. *Koenig.*  
 Antennae compressae, cyaneae, articulis quatuor penultimis flavis, ultimo cyaneo. Thorax cyaneus, acute spinosus. Elytra cyanea, fascia lata flava. Pedes cyanei, postici compressi.
- barbicornis.* 18. *C. thorace spinoso*, antennarum quatuor primis articulis nigro-barbatis, corpore testaceo, nigro-variegato. *Linn. Syst. Nat.* II. 625. 18. *Mus. Lud. Ulr.* 68.  
 Habitat in Asia.
- farinosus.* 19. *C. thorace spinoso*, elytris punctis sparsis farinosis, antennis longis. *Linn. Syst. Nat.* II. 626. 24.  
*Merian. Surinam.* tab. 24.  
 Habitat in radice Argemonae mexicanae.  
 Larva albicans, capite caudaque nigris.
- nebulosus.* 20. *C. thorace spinoso*, elytris punctis fasciisque nigris, antennis longioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 627. 29.  
*Fn. Sv.* 650.

*Cerambyx nebulosus.* Scop. carn. 173.

Sultz. Inf. tab. 4. fig. c.

Habitat in abietum truncis.

21. C. thorace spinoso, elytris apice bidentatis, antennis hispidus.  
mediocribus hirtis.

*Cerambyx hispidus thorace spinoso,* elytris subpraemorsis, punctisque tribus hispidis, antennis hirtis longioribus. Linn. Syst. Nat. II. 627. 30. Fn. Sv. 651.

*Cerambyx ovatus,* fuscus, elytris antice cinereis, apice bidentatis. Geoff. Inf. I. 206. 9.

*Scarabaeus antennis articulatis longis.* Raj. Inf. 97. 4.

Frisch. Inf. 13. p. 22. tab. 16.

Habitat in Europa.

22. C. thorace inermi, elytris subtestaceis: margine marginalis.  
omni nigro.

Habitat in Cap. B. S. Mus. Dom. Banks.

Magnitudo C. Alpini. Antennae piceae, corpore vix longiores. Caput fuscum, palpis filiformibus, articulo ultimo obtuso. Thorax ovatus, inermis, fuscus, margine antico et postico nigris. Elytra subtestacea, laevia, sutura marginibusque tenuissime nigris. Pedes nigrantes.

23. C. thorace inermi, viridi, elytris obscuris, antennis brevicornis.  
brevibus nigris.

Habitat in Sierra Leon Africæ. Mus. Dom. Banks.

Statura C. afri, at duplo minor. Caput viride, nitens, antennis brevibus compressis, nigris. Thorax rotundatus, viridis, nitens, punctatus, inermis. Elytra glabra, laevia, viridia, obscura. Pedes nigri, femoribus clavatis, anticis quatuor rufis, posticis viridibus.

24. C. thorace inermi, rugoso, elytris acuminatis, nigris, Iuvencus.  
lanuginoso - canescensibus, antennis longissimis.

Linn. Syst. Nat. II. 631. 53.

Habitat in America.

Statura omnino C. Cerdonis, at thorax haud spinosus.  
Antennæ corpore sesquiloniores. Thorax valde rugosus.

45. LAMIA. *Palpi quatuor filiformes.*  
*Maxilla cornea, bifida.*  
*Labium corneum, bifidum.*  
*Antennae fetaceae.*

*Tribulus.* 1. L. thorace quadrispinoso, scutello elytrisque spinosis, antennis longioribus.

Habitat ad fluvium Gaboon Africae. *D. Solander.*  
*e Mus. Dom. Banks.*

Statura L. futoris, at paulo major. Antennae corpore longiores, fuscae, articulorum basi cinerea. Caput fusco cinereoque variegatum, ore prominulo. Thorax rotundatus, spinis quatuor erectis lateralibus acuminatis, acutioribus. Puncta duo cinerea ad basin spinarum intermedianarum. Elytra fusco cinereoque variegata, basi versus marginem exteriorem gibbere bispinoso armata, versus futuram spinae duae validae, erectae, acutae. In medio elytri spina sensim elevata, valida, recumbens, acuta. Apex elytrorum acuminatus denticulo brevi acuto. Scutellum parvum, rotundatum, denticulis duobus brevibus, erectis. Pedes fusco nigroque variegati. Tibiae intermediae apice parvo notantur tuberculo.

*pedicornis.* 2. L. thorace elytrisque spinosis, femoribus anticis cornutis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Caput griseum, antennis mediocribus villosis. Thorax rotundatus, griseus, spinis sex brevibus erectis dorsalibus. Scutellum inerme. Elytra grisea, macula marginali lunata fasciaque media cinerea, spinae plurimae baseos breves, erectae, atrae. Pedes grisei, femoribus anticis cornu elongato, arcuato, acuto.

*erista.* 3. L. thorace acute spinoso, grisea, elytris basi tuberculo compresso tridentato.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Minor. Antennae corpore paulo longiores, cinereae, articulorum apicibus nigris. Thorax rotundatus, utrinque spina acuta armatus, et sub spina punctum fulvum.

fulvum. Elytra antice grisea, tuberculo magno compresso tridentato, postice pallida, striga parva, obliqua nigra. Femora clavata, nigra, clava grisea. Tibiae griseae, apice nigrae.

4. L. thorace antice utrinque bispinoso, corpore nebuloso. *ambulator.*

*Petiv. Gazoph. tab. 37. fig. 6.*

Habitat in insulis Luzonum. *Mus. Brit.*

Statura L. textoris. Antennae, teste *Petiverio*, longitudine corporis, mihi haud visae. Thorax rotundatus, castaneo cinereoque nebulosus, antice spinis duabus brevibus, una supra alteram armatus. Elytra cinereo castaneoque nebulosa.

5. L. thorace spinoso, elytris convexis, atris, antennis mediocribus. *textor.*

*Cerambyx textor* thorace spinoso, elytris obtusis, convexis, atris, punctatis, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat. II. 629. 41. Fn. Sv. 656.*

*Cerambyx ater*, elytris punctis elevatis, antennis corpore brevioribus. *Geoff. Inf. I. 201. 3.*

*Cerambyx sordide niger*, punctis elevatis, sparsis, antennis crassis, corporis longitudinem subaequantibus. *Uddm. Diff. 29.*

*Cerambyx textor.* *Scop. carn. 164.*

*Schaeffer. Icon. tab. 10. fig. 1.*

Habitat in truncis arborum Europae.

6. L. thorace spinoso, nigra, antice fasciis, postice punctis viridibus, elytris basi mucronatis. *pulchra.*

*Cerambyx pulcher.* *Drury. Inf. I. tab. 32. fig. 6.*

Habitat in Africa. *Dom. Drury.*

Statura L. sutoris: pulcherrima, nitida. Antennae nigrae, corpore paulo longiores. Caput nigrum, striis tribus viridibus, quarum laterales oculos ambient. Thorax rotundatus, obtuse spinosus, ater, striis tribus viridibus, quarum intermedia curvata et in curvatura striga parva abbreviata ejusdem coloris. Elytra punctata, basi denticulis duobus elevatis, truncatis, mucronata, antice fasciis duabus, postice punctis numerosis sparsis viridi nitentibus. Subtus nigro viridiisque variegata.

7. L.

- Aermita-* 7. L. thorace spinoso, elytris basi porosis, antennis mediocribus.  
*tor.* Habitat in insula Barbados. *D. Drury.*  
 Statura L. textoris, at paulo major. Antennae nigricantes, articulo ultimo acuto. Thorax valde spinosus, supra inaequalis. Elytra obtusa, nigra, basi punctis majoribus, inaequalibus, impressa. Subtus tomento flavo tecta.
- guttura-* 8. L. thorace spinoso, elytris testaceis, albo irroratis: basi punctis elevatis, glabris.  
*ter.* Habitat in Africa. *Mus. Brit.*  
 L. sutori paulo major. Caput testaceum, linea longitudinali, glabra, nigra. Thorax rotundatus, spinosus, testaceus ruga media, transversali, elevata. Elytra obtusa, testacea, atomis flavicantibus irrorata; basi punctis aliquot elevatis, glabris, rubris. Antennae desunt.
- ariolator.* 9. L. thorace spinoso, lineato, elytris fuscis: linea semicirculari, alba.  
 Habitat in India.  
 Statura L. sutoris, at paulo angustior. Antennae corpore longiores. Thorax rotundatus, spinosus, fuscus, linea dorsali lateralibusque albis. Elytra obtusa, fusca, linea alba, quae ab angulo humerali incipit, in medio cum sutura coit et versus apicem ad marginem exteriorem excurrit.
- Sutor.* 10. L. thorace spinoso, elytris atris, ferrugineo maculatis, scutello luteo, antennis longissimis.  
 Cerambyx sutor thorace spinoso, elytris obtusis, atris, subnebulosis, scutello luteo, antennis longissimis. *Linn. Syst. Nat. II. 628. 38. Fn. Sv. 655. Scopoli carn. 162.*  
 Cerambyx nigro nebulosus, scutello pallido, elytris fusco aeneis. *Gadd. Diff. 27.*  
 Habitat in Europae sylvis.
- titillator.* 11. L. thorace spinoso, elytris cinereo fusco glaucoque nebulosis, antennis longissimis, rufis.  
 Habitat in Carolina. *Mus. Brit.*  
 Statura et magnitudo L. sutoris. Antennae corpore triplo longiores, excepto primo articulo fuso, rubrae.

rubrae. Thorax utrinque spinosus, antice tuberculis duobus minutissimis. Elytra punctata, cinerea, maculis fuscis glaucisque inordinatis sparsis. Tibiae rufescentes, secundi paris gibbere parvo superue notatae.

12. L. thorace spinoso, elytris cinereo pulverulentis; *vittator.*  
vittis duabus flavis, nigro marginatis.

*Petiv. Gazoph.* tab. 24. fig. 6.

Habitat ad littora sinus Campechani. *Mus. Brit.*

Statura et magnitudo L. sutoris. Antennae mediocres cinereo fuscoque variegatae. Caput cinereo pulverulentum, lineis duabus glabris, atris. Thorax spinosus, cinereus, lineis tribus longitudinalibus, glabris, atris. Elytra cinerea vittis duabus flavis, quarum margines elevati, glabri, atri. Maculae aliquot sparsae, atrae, ad basin elytrorum.

13. L. thorace spinoso, nigra, elytris sanguineis.

*Kaehleri.*

*Cerambyx Kaehleri* thorace spinoso, niger, thorace elytrisque sanguineis: macula magna nigra. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 631. 50.

*Cerambyx niger*, elytris thoracisque lateribus rufis.

*Genff. Hist. des Inf.* I. 204. 6.

*Schaeff. Inf.* tab. I. fig. 1.

Habitat in Europa australi.

Thorax variat immaculatus, et macula lateralii rufa.

Elytra apice emarginata.

14. L. thorace bispinoso, nigra, elytris fasciis quatuor *capensis.*  
rufis, antennis mediocribus.

*Cerambyx Capensis* thorace spinoso, niger, elytris fasciis quatuor rufis, antennis mediocribus. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 628. 36.

*Drury. Inf.* I. tab. 39. fig. 3.

Habitat ad Cap. b. spei.

Statura et magnitudo L. textoris. Thorax scaber,  
mucronibus utrinque duobus armatus.

15. L. thorace spinoso, rufo; elytris nigris, fascia maculique duabus marginalibus sanguineis. *bottent.*  
*totta.*

Habitat ad Cap. B. S. *D. Yeats.*

*Statura*

**Satura omnino** L. capensis, at duplo major. Caput nigrum, antennis longitudine corporis. Thorax spinosus, scaber, obscure rufus. Elytra nigra, aeneo cineta, fascia media maculisque duabus marginalibus sanguineis. Pedes nigri.

**bumeralis.** 16. L. thorace spinoso, elytris flavis, nigro-fasciatis, antice mucronatis.

Habitat in - - - - D. Drury.

**Satura et magnitudo** L. capensis. Antennae nigrae, corpore paulo longiores. Caput flavum, lineis quatuor nigris. Thorax rotundatus, spinosus, flavus, fasciis tribus nigris basi utrinque emarginatus. Elytra flava, fasciis variis passim confluentibus, nigris, basi mucronata. Sternum parum porrectum, apice bidentatum.

**trifascia-** 17. L. thorace subspinoso, atra, elytris fasciis tribus flavis, antennis mediocribus.

Habitat ad Sierra Leon Africæ. D. Solander ex Mus. Dom. Banks.

**Satura** L. capensis, at duplo major. Thorax rotundatus, ater, tuberculo tantum obsoleto lateralí notatus. Elytra abdomine subbreviora, atra, fasciis tribus latis flavis. Pedes atri, tibiis intermediis apice tuberculatis.

**bifasciata.** 18. L. thorace spinoso, postice sinuato, elytris flavis, fasciis duabus maculaque rhombea cyaneis.

Habitat in Jamaica, Mus. Brit.

**Satura et magnitudo** L. capensis. Antennae corpore paulo longiores, atrae. Caput flavum, orbita oculorum cyanea. Thorax unispinosus, flavus, postice fascia cyanea sinibusque duobus erosus. Scutellum basi apiceque cyaneum. Pedes lutei, femoribus coeruleis.

**aerbiops.** 19. L. thorace spinoso, atra, elytris fasciis duabus punctoque apicis luteis, antennis mediocribus.

Habitat ad Cap. Bon. Sp. Mus. Brit.

**Satura** L. capensis. Antennae nigrae, corpore sublongiores. Caput canaliculatum. Thorax obtuse spinosus, subrugosus. Elytra holofericea, atra, fasciis duabus

duabus flavis, quae tamen suturam dorsalem haud attingunt, puncto que parvo apicis luteis. Pedes compressi, atri.

- - Punctum apicis fulvum interdum, at raro, deest.

20. L. fusca, thorace coleoptrisque ocellis quatuor atris. *curculionoides.*  
*Leptura nigro-cinerea*, thorace elytrisque maculis oculiferis, atris, circulo cinereo, thorace subcylindrico. *Geoff. Inf. I. 210. 5.*

*Cerambyx curculionoides* thorace mutico, ocellis quatuor nigris, elytris ocello sesquialtero: antennis longis. *Linn. Syst. Nat. II. 634. 84.*

*Schaeffer. Icon. tab. 39. fig. 1.*

Habitat in Europa australiori.

L. Fuliginatori paulo major.

21. L. thorace spinoso, fusca, elytris maculis duabus *trifinis.*  
 atris, antennis mediocribus.

*Cerambyx trifinis* thorace spinoso, niger, elytris fuscis, maculis duabus atris, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat. II. 629. 42.*

Habitat in ligno cupressi Galliae australioris.

Statura L. fuliginatoris, at paulo major. Antennae vix longitudine corporis.

22. L. thorace spinoso, cinerea, elytris subfasciatis, antennis mediocribus. *rotator.*

Habitat in India. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Antennae longitudine corporis, articulis cineris, apice fuscis. Caput sulcatum, cinereum, palpis nigris. Thorax rotundatus, spina utrinque armatus. Elytra cinerea, fusca, subfasciata.

23. L. thorace subspinoso, nigra, elytris cinerascentibus, *fuliginator.*  
 antennis brevibus.

*Cerambyx fuliginator.* *Linn. Syst. Nat. II. 639. 43.*

*Cerambyx ater*, ovatus, antennis corpore dimidio brevioribus, elytris vellere cinereo albidis. *Geoff. Inf. I. 205. 8.*

*Frisch. Inf. 13. tab. 19.*

Habitat in Europa australiori.

*coquus.* 24. L. thorace subspinoso, hirsuto, elytris obtusis, sulcatis, atris, antice ferrugineis, antennis mediocribus.  
*Linn. Syst. Nat. II. 630. 44.*

Habitat in America boreali.  
 Spinae thoracis minutissimae.

*tornator.* 25. L. thorace spinoso, quadripunctato, elytris rufis, maculis quatuor nigris, antennis brevibus.

Habitat in America.

Minor L. fuliginatori. Antennae nigrae, corpore breviores. Caput rufum, puncto elevato, nigro, ad basin antennarum. Thorax utrinque obtuse dentatus, rufus, punctis quatuor dorsalibus nigris. Elytra obtusa, punctata, rufa, maculis quatuor nigris, quarum prima ad marginem exteriorem baseos, duae approximatae in medio, quarta versus apicem. Subtus nigra, cinereo nitens.

*Bankii.* 26. L. thorace subbispinoso, grisea, elytris ferrugineo irroratis, fasciisque duabus cinereis.

Habitat ad Cap. B. S. *Mus. Dom. Banks.*

Parva. Caput cinereum, antennis mediocribus fusco cinereoque variis. Thorax rotundatus, antice utrinque spinis duabus, anteriore brevissima armatus, griseus, ferrugineo irroratus. Scutellum nigrum. Elytra obtusa, punctata, grisea, atomis ferrugineis numerosis irrorata, fasciisque duabus cinereis, altera ad basin fere obsoleta, altera in medio obliqua suturam haud attingens. Pedes grisei.

*pedestris.* 27. L. thorace spinoso, atra, vitta integra alba, antennis mediocribus.

*Cerambyx pedestris*, thorace spinoso, apterus, niger, elytris tomentosis, atris: futura alba, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat. II. 631. 51.*

*Cerambyx arenarius.* *Scop. carn. 168.*

*Cerambyx pedestris.* *Pod. Inf. 34. 9.*

Habitat in Europa australiori.

*molitor.* 28. L. thorace subspinoso, fusca: vittis tribus integris albis, antennis mediocribus.

Habitat in India. *Mus. Brit.*

Valde

Valde affinis L. pedestri, cuius forte varietas. Corpus supra fuscum, vittis tribus albis, a capite ad apicem elytrorum ductis, intermedia in thorace subdídyma per futuram elytrorum excurrit. Lineola parva inter vietas ad basim elytrorum. Thorax tuberculo laterali notatus.

29. L. thorace spinoso, bimaculato, elytris bidentatis: *Rubus.*  
basi scabris mucronatis.

*Cerambyx rubus* thorace spinoso, antennis subtus hispidis, longis, elytris bidentatis basique mueronatis, albo bimaculatis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 625. 21.

Habitat in India.

Puncta elytrorum valde variant.

30. L. thorace acute spinoso, grisea, elytris apice bidentatis. *bidens.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

L. Rubo triplo minor. Antennae corpore longiores, fuscae. Caput griseum. Thorax rotundatus, griseus, utrinque acute spinosus. Elytra apice bidentata. Pedes inerines.

31. L. thorace subspinoso, nigro, elytris bidentatis, fuscis, *Solandri.*  
cinereo irroratis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo L. bidentis. Antennae mediocres nigrae.  
Thorax cylindricus, subrugosus, niger, antice utrinque spinula brevissima, acuta. Scutellum nigrum. Elytra punctata, nigra, cinereo irrorata, basi punctata, humeri gibbo apice bidentata. Pedes nigri, planitis fuscis.

32. L. thorace obtuse spinoso, maxillis basi cornutis, *cornutor.*  
antennis longissimis.

Habitat in America. *Mus. Brit.*

Statura L. Rubi. Antennae nigrae, corpore longiores.  
Caput canaliculatum, nigrum, maxillis porrectis,  
acutis, basi tuberculo elevato, valido, corniformi.  
Thorax rotundatus, utrinque obtuse spinosus, niger,  
immaculatus. Elytra punctata, nigra, flavo maculata,  
basi mucrone parvo inflexo armata, apice rotunda,  
inermia.

- leprosa.* 33. L. thorace spinoso, elytris basi variolosis, cinereis, macula laterali nigra, antennis longis.

Habitat in America. *Dom. Drury.*

Statura L. rubi, at duplo minor. Antennae obscure rufae, corpore longiores. Thorax rotundatus, unispinosus, dorsoque inaequali. Elytra basi punctis majoribus concatenatis impressa, postice laevia cinerea, puncto parvo in medio, macula magna laterali, et puncto parvo apicis, nigris. Macula nivea utrinque sub basi abdominis. Pedes cinerei.

46. STENOCORVS. *Palpi* quatuor anteriores filiformes, posteriores clavati.

*Antennae* setaceae.

- meridiana.* 1. S. thorace subspinoso, elytris fastigiatis, pectore nitente.

Cerambyx meridiana thorace subspinoso, elytris subfastigiatis, fuscis, antice testaceis, pectore nitente.

*Linn. Syst. Nat.* II. 630. 47. *Fn. Sv.* 648.

Cerambyx elytris spadiceis, ventre argenteo. *Raj. Inf.* 96. 1.

*Schaeffer. Icon.* tab. 3. fig. 13. et tab. 79. fig. 7.

Habitat in Europa.

Foemina nigricans, mas testaceus. Larva sub terra, pedibus longissimis. *Raj.*

- lamed.* 2. S. thorace spinoso, pubescente, elytris fastigiatis, lividis: taenia obscura, longitudinali, sinuata.

Cerambyx lamed. *Linn. Syst. Nat.* II. 630. 46. *Fn. Sv.* 649.

Stenocorus niger, elytris rubescensibus, apice suturaeque medietate nigris. *Geoff. Inf.* I. 226. 6.

Habitat in Europa.

- garganicus.* 3. S. thorace spinoso, elytris bidentatis, testaceis: macula pallida, antennis longis.

Habitat in Marylandia. *Mus. Brit.*

Magni-

- Magnitudo media. Antennae fuscae, corpore longiores.  
 Thorax subvillosum, spinosum, castaneus. Elytra  
 bidentata, testacea, lunula in medio alba.
4. S. thorace utrinque bidentato, elytris bidentatis, viri-  
 dibus, linea laterali lutea. *festivus.*  
*Cerambyx festivus. Linn. Syst. Nat. II. 623. II.*  
*Gronov. Zooph. 541. tab. 16. fig. 5.*  
*Drury. Ins. I. tab. 37. fig. 5.*  
 Habitat in America.
5. S. thorace depresso, tuberculato, mutico, elytris biden-  
 tatis, fusco cinereoque nebulosis, antennis ine-  
 diocribus. *marylan-  
 dicus.*  
 Habitat in Marylandia. *Mus. Brit.*  
 Statura oblonga S. gorganici. Antennae mediocres,  
 subaculeatae. Totum corpus cinereo fuscoque  
 variegatum.
6. S. thorace mutico, elytris apice unidentatis, margine  
 omni albo. *trilinea-  
 tus.*  
*Cerambyx trilineatus, thorace cylindrico, corpore  
 ferrugineo, elytris mucronatis, marginibus dentato  
 albis, antennis longissimis. Linn. Mant. 532.*  
*Drury Ins. I. tab. 41. fig. 1.*  
 Habitat in America. *Drury.*  
 Statura omnino S. irrorati, at paulo major. An-  
 tennae longiores, articulo primo secundoque  
 subtus subtilissime barbatis. Caput nigrum, linea  
 laterali alba, dorsalique duplicata, flava. Thorax  
 inermis, niger, flavo irroratus, lineis tribus albis.  
 Elytra apice unidentata, nigra, flavo irrorata,  
 margine exteriori futuraque albis.
7. S. thorace inermi, tuberculato, elytris bidentatis, an-  
 tennarum articulis bispinosis. *spinicor-  
 nis.*  
 Habitat in America. *D. Drury.*  
 Statura exakte S. trilineati. Antennae articulis (ex-  
 cepto primo) apice utrinque spina valida armatis.  
 Corpus cinerascens, punctis elevatis fuscis. Elytra  
 apice bidentata, testacea, cinereo irrorata.

*semipunctatus.* 8. S. thorace spinoso, inaequali, elytris bidentatis, basi punctatis, apice glabris.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium. Caput atrum, palpis posticis clavatis, ferrugineis. Antennae corpore paulo longiores, fuscae, articulis intermediis apice spinosis. Thorax tomentosus, ater, tuberculatus, utrinque unispinosus. Elytra basi nigro flavoque variegata, punctata: altera dimidia pars atra, glabra, nitida, macula apicis flava. Elytra terminantur dentibus duobus, interiore minore. Pedes fuscii.

*irroratus.* 9. S. thorace mutico, inaequali, elytris apice bidentatis, albo irroratis, antennis longioribus, aculeatis.

*Cerambyx irroratus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 633. 62.

Habitat in America.

*glabratus.* 10. S. thorace mutico, cinereo, linea glabra, fusca, elytris bidentatis.

Habitat in insula St. Croix. *Dom. v. Rohr.*

Corpus cylindricum. Statura S. irrorati. Antennae mediocres fuscae, articulis tribus spinosis. Thorax cylindricus, griseus, linea dorsali glabra, fusca. Elytra bidentata, griseo fuscoque varia.

*4 maculatus.* 11. S. thorace scabro, spinoso, elytris bidentatis, maculis duorum parium glabris.

*Cerambyx 4. maculatus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 27.

*Sloan. Iam.* 2. tab. 237. fig. 21.

*Drury. Ins.* 1. tab. 37. fig. 3.

Habitat in America.

Femora quatuor postica, apice spinosa.

*annulatus.* 12. S. thorace lineato, elytris unidentatis, antennis longioribus: annulis tribus albis.

Habitat - - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis: Antennae corpore longiores, ferrugineae, fascia alba in articulo tertio, quinto et penultimo. Caput fulcum, lineis duabus albis. Thorax rotundatus, griseus, lineis quatuor albis. Elytra grisea, apice fusca, margine albo, truncata, unidentata. Pedes fuscii, cinereo annulati.

13. *S. thorace subspinoso, quadrimaculato, elytris bidentatis, ferrugineis, flavo cinereoque maculatis.* *10 maculatus.*

Habitat in America. *Dom. Banks.*

Statura *S. quadrimaculati*, at paulo major. Antennae corpore longiores, ferrugineae. Thorax tuberculis utrinque duobus lateralibus, ferrugineus, maculis quatuor cinereis. Elytra apice obsolete bidentata, ferruginea, macula glabra, solitaria, flava ad basin, dein macula orbiculata, cinerea; in medio maculae duas approximatae, glabrae, flavae, et tandem linea cinerea, apice bifida, ab apice elytri fere ad medium ducta.

14. *S. thorace subspinoso, elytris truncatis, bidentatis, ferrugineis, cinereo fasciatis, antennis brevibus.* *Drurii.*

Habitat in America. *Dom. Drury.*

Statura et magnitudo *S. quadrimaculati*. Antennae piceae, corpore breviores. Thorax rotundatus, utrinque spina parva armatus, et dorso lineis quibusdam transversis elevatis. Elytra apice truncata, bidentata, spina exteriori majori ferruginea, fasciis tribus cinereis, ad futuram connatis. Pectus ferrugineum, maculis utrinque duabus majoribus albis. Abdomen utrinque punctis tribus albis.

15. *S. thorace spinoso, cinereus, elytris bidentatis, fasciis undatus.* *duabus undatis, nigris.*

Habitat in America. *Drury.*

Statura et magnitudo *S. gorganici*. Caput cinereum, oculis nigris. Antennae corpore parum longiores, villosae, nigrae, articulorum apicibus cinereis. Thorax utrinque spinosus, cinereus, maculis aliquot dorsalibus glabris, nigris. Elytra punctata, apice bidentata, cinerea, fasciis duabus valde undatis, nigris, quarum posterior crassior.

47. CALOPVS. *Palpi* quatuor,  
anteriores clavati,  
posteriores filiformes.  
*Maxilla* bifida.  
*Labium* membranaceum,  
bifidum.  
*Antennae* filiformes.

- ferraticor-* 1. *C. fuscus*, *antennis compressis.*  
*nis.* *Cerambyx ferraticornis*, thorace mutico, subovali, cor-  
pore lurido, fusco, *antennis compressis*, antice  
ferratis, mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 634. 65.  
*Fn. Sv.* 665.  
Habitat in Europa boreali.  
*Animalculum elongatum*, cylindricum, statura fere  
Cleri.
- blandus.* 2. *C. violaceus*, *elytris antice luteis*, *antennis brevibus.*  
Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*  
Hujus generis videtur, *C. ferraticorni* paulo major,  
totus cyaneus, *elytris antice luteis*, punctis duobus  
fuscis impressis. *Scutellum cyaneum.*

48. RHAGIVM. *Palpi* quatuor capitati.  
*Maxilla* unidentata.  
*Labium* membranaceum,  
bifidum.  
*Antennae* setaceae.

- inquisitor.* 1. *R. thorace spinoso*, *elytris nebulosis*, *fusco sub-  
fasciatis.*  
*Cerambyx inquisitor.* *Linn. Syst. Nat.* II. 630. 49.  
*Fn. Sv.* 659.  
*Stenocorus niger*, *vellere flavo variegatus*, *elytris lineis  
duabus elevatis*, *thorace spinoso.* *Geoff. Inf.* I. 223. 2.  
*Frisch. Inf.* 13. tab. 14.  
*Schaeff. Icon.* tab. 2. fig. 10.

B. Steno-

3. *Stenocorus glaber*, e fusco niger, elytro singulo lineis tribus elevatis, maculis duabus luteis, thorace spinoso. *Geoff. Ins.* 1. 222. 1.

*Schaeff. Elem.* tab. 118. fig. 1.

*Schaeff. Icon.* tab. 8. fig. 2. 3.

Habitat in Europae truncis arborum.

2. R. thorace spinoso, elytris rufis, sutura lineaque cursor. nigris.

*Cerambyx cursor* thorace spinoso, elytris obtusis, rufis, margine lineaque nigris, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 630. 45. *Fn. Sv.* 658.

*Cerambyx cursor.* *Scopoli carn.* 167.

Habitat in Europa.

Margo exterior rufus.

3. R. thorace spinoso, elytris fuscis: fasciis duabus obliquis, flavis. bifasciatum.

*Stenocorus glaber*, e fusco niger, elytro singulo lineis tribus elevatis, maculis duabus luteis, thorace spinoso. *Geoff. Ins.* 1. 222. 1.

Habitat in Anglia, Gallia.

Statura R. inquisitoris. Antennae ferrugineae, primo articulo nigrae, corpore breviores. Caput atrum, canaliculatum, postice gibbum. Thorax rotundatus, niger, subcanaliculatus, spina valida utrinque armatus. Elytra fasciis duabus obliquis flavis, quae tamen margines haud attingunt. Pedes nigri, femoribus basi tibiisque rufis.

4. R. thorace spinoso, nigrum, elytris fascia lata flava. ornatum.

Habitat in Pensylvania. *Muf. Dom. Banks.*

Minor R. inquisitori. Antennae breves, subferrugineae. Caput nigrum, oculis testaceis. Thorax rotundatus, niger, utrinque spina acuta, recurva. Elytra nigra, in medio fascia lata flava. Margo exterior et apex subferruginea. Pedes ferruginei, femoribus basi nigris.

**49. SAPERDA.** *Palpi filiformes.*  
*Maxilla membranacea,*  
*bifida.*  
*Labium cordatum, trun-*  
*catum.*  
*Antennae setaceae.*

- carcharias.* 1. *S. corpore griseo, nigro, punctato, antennis mediocribus.*  
*Cerambyx carcharias thorace mutico, cylindrico, cor-*  
*pore griseo, nigro, punctato, antennis mediocribus.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 631. 52. Fn. Sv. 660.*  
*Leptura cinerea, nigro punctata, thorace cylindraceo.*  
*Geoff. Inf. I. 208. I.*  
*Capricornus norvegicus nigrescens, vaginis punctatis,*  
*maculisque pallidis adspersis. Petiv. Gazoph. 5. tab.*  
*2. fig. I.*  
*Gaed. Inf. 2. tab. 51.*  
*Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 4.*  
*Habitat in Europae sylvis.*
- scalaris.* 2. *S. coleoptris, linea suturali dentata, punctisque flavis,*  
*antennis mediocribus.*  
*Cerambyx scalaris. Linn. Syst. Nat. II. 632. 55. Fn. Sv.*  
*697. Scopoli carn. 175.*  
*Cerambyx elytris nigris, albo variegatis. Frisch. Inf.*  
*12. p. 29. tab. 3. fig. 3.*  
*Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 5.*  
*Habitat in Europae populo.*
- oculata.* 3. *S. thorace luteo, punctis duobus atris, elytris nigris.*  
*Cerambyx oculatus, thorace mutico, cylindrico, luteo,*  
*punctis duobus nigris, elytris fastigiatis, linearibus,*  
*nigris. Linn. Syst. Nat. II. 633. 60. Fn. Sv. 664.*  
*Cerambyx ferrugineo rufus, elytris nigro cinereis,*  
*punctis excavatis, nigris. Uddm. Diff. 31.*  
*Habitat in Europae sylvis.*
- birta.* 4. *S. grisea, villosa, scutello flavo.*  
*Habitat in nova Zelandia. Mus. Dom. Banks.*  
*Magnitudo S. oculatae. Antennae setaceae, fuscae,*  
*longitudine corporis. Caput griseum, maculis qua-*  
*tuor*

tuor baseos flavescentibus. Thorax cylindricus, griseus, villosus, immaculatus. Scutellum parvum, flavum. Elytra pilis griseis hirta, immaculata, apice obtusa. Pedes grisei.

Palporum articulus exterior oblique subtruncatus.

5. *S. cylindrica*, nigra, pedibus luteis, antennis mediocribus. *linearis.*

*Cerambyx linearis*, thorace mutico, cylindrico, niger, pedibus omnibus totis luteis, antennis mediocribus.

*Linn. Syst. Nat. II. 632. 58. Fn. Sv. 663.*

Leptura parallela. *Scop. carn. 153.*

Habitat in Europae sylvis.

6. *S. cylindrica nigra*, thorace linea albida, pedibus anticis luteis. *cylindrica.*

*Cerambyx cylindricus*, thorace mutico, cylindrico, linea albida, elytris fastigiatis, nigris, pedibus anticis pallidis. *Linn. Syst. Nat. II. 633. 59. Fn. Sv. 662.*

Leptura cylindrica. *Scopoli carn. 157.*

*Roef. Inf. 2. scar. 2. tab. 3.*

Habitat in pyri, pruni ramis.

7. *S. nigra*, thoracis lateribus, elytrorumque vitta lateraliter ali ferrugineis. *lateralis.*

Habitat in - - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnitudine fere *S. linearis*, nigrum. Antennae defunt. Thorax rotundatus, lateribus ferrugineis, qui color in vertice capitis coit. Elytra nigra, vitta laterali ferruginea. Margo tamen ipse niger. Pedes nigri.

8. *S. thorace atro*, puncto utrinque ferrugineo, elytris griseis, acuminatis. *lyncea.*

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo *S. cylindrica*. Palpi filiformes, aequales. Caput nigrum, antennis setaceis, fuscis, longitudine corporis. Thorax cylindricus, laevis, ater, nitens, puncto utrinque ferrugineo. Scutellum parvum, ferrugineum. Elytra grisea, basi punctato striata, apice acuminata, divergentia. Corpus atrum, abdomine utrinque punctis quatuor ferrugineis. Pedes fuscii, femoribus clavatis.

*grisea.* 9. *S.* *grisea*, scutello margine, elytris lineolis flave-scentibus.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino praecedentis. Antennae fuscae, cor-pore paulo longiores. Caput fuscum, palpis filiformibus, fuscis. Thorax cylindricus, griseus. Scutel-lum margine flavo. Elytra subvillosa grisea, lineolis aliquot brevissimis, flavis, basi punctis impressis, apice vix acuminatis. Pedes fusti, femoribus clavatis.

*cardui.* 10. *S. fusca*, thorace lineato, scutello flavo, anten-nis longis.

*Cerambyx cardui* thorace mutico, cylindrico, cor-pore fuscum, linea longitudinali flavicante, antennis longioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 632. 56.

Habitat in Europae australioris carduis.

Corpus fuscum, flavo irroratum, lineae tres flavae in thorace. Scutellum flavum.

*tristis.* 11. *S. thorace quadrispinoso*, corpore fuscum.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura *S. cylindrica*. Palpi quatuor filiformes, articulo ultimo globoso. Antennae breves, fuscae. Thorax rotundatus, niger, spinis quatuor mediis obtusis, lateralibus majoribus acutis. Elytra lae-via, fusca.

*populnea.* 12. *S. thorace flavo*, lineato, elytris punctis quatuor fla-vis, antennis mediocribus.

*Cerambyx populneus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 632. 57.  
*Fn. Sv. 661.*

Leptura nigra, thorace lineis tribus, elytrorumque maculis villoso-flavis, thorace cylindraceo, anten-nis corpori aequantibus. *Geoff. Inf.* I. 208. 3.

*Cerambyx fuscocinereus*, antennis nigro alboque va-riegatis, elytrorum punctis octo luteis. *Gadd. Sat.* 79.

Habitat in Europae, Americae populetis.

*tremula.* 13. *S. viridis*, thorace punctis duobus, elytris qua-tuor nigris.

Habitat Halae. *D. Schreber.*

Statura *S. populneae*, cui valde affinis. Antennae mediocres, longitudine corporis.

14. S. thorace mutico, totus viridis, punctis nigris numerosis, antennis mediocribus. *punctata.*

*Cerambyx punctatus* thorace mutico, subcylindrico, totus viridis, punctis nigris, antennis mediocribus.

*Linn. Syst. Nat. II. 1067. 7.*

Habitat in Europa australiori.

Affinis *S. tremulæ*, at major. Antennæ et pedes nigri.

15. S. thorace cylindrico, inermi, corpore violaceo. *violacea.*

Habitat in regione Pedemontana. *D. Allioni.*

Statura et magnitudo *S. cylindricæ*. Antennæ nigrae, corpore vix longiores. Thorax rotundatus, subpubescens. Elytra laevissima, rugosa. Pedes nigri.

16. S. nigra, elytris flavis, apice nigris. *praeusta.*

*Leptura praeusta*, thorace subgloboso, fusco, elytris flavis, apice nigris, pedibus quatuor pallidis. *Linn. Syst. Nat. II. 641. 24.*

*Leptura nigra*, elytris flavis, apice nigris. *Geoff. Ins. I. 209. 4.*

Habitat in Europa.

50. CALLIDIVM. *Palpi* quatuor clavati.

*Maxilla* membranacea,  
bifida.

*Labium* bifidum, laciniis  
tenuissimis, acutis.

*Antennæ* setaceæ.

1. C. thorace villoso, tuberculis duobus, corpore fusco. *Bajulus.*

*Cerambyx Bajulus*, thorace mutico, subrotundo, villoso, tuberculis duobus, antennis brevibus. *Linn. Syst. Nat. II. 636. 76. Fn. Sv. 672.*

*Leptura Bajula.* *Scopoli carn. 156.*

*Frisch. Ins. 13. tab. 10.*

*Schueff. elem. tab. 76. fig. 4.*

Habitat in Europa.

Elytra in altero sexu pallida.

*fennicum.* 2. C. thorace tuberculato, rufo, elytris violaceis, antennis mediocribus.

Cerambyx fennicus thorace mutico, subrotundo, tuberculis subferrugineo-obsoletis, elytris violaceis, antennis longiusculis. *Linn. Syst. Nat.* II. 636. 77.  
*Fn. Sv.* 674.

Leptura atra, thorace testaceo, femoribus crassis.  
*Geoff. Inf.* I. 219. 19.

Cerambyx elytris nigro-coeruleis, apice abdominis ferrugineo. *Uddm. Diff.* 33.

Habitat in Europa.

*clavipes.* 3. C. nigrum, opacum, femoribus omnibus clavatis, antennis longioribus.

Habitat in Germania. *D. v. Hattorf.*

Magnitudo C. Bajuli, totum nigrum, opacum. Antennae corpore longiores, femora omnia valde clavata.

*violaceum.* 4. C. thorace subpubescente, corpore violaceo, antennis brevibus.

Cerambyx violaceus thorace mutico, subrotundo, pubescente, corpore violaceo, antennis mediocribus.

*Linn. Syst. Nat.* II. 635. 70. *Fn. Sv.* 667.

Cantharis nigra, thorace rotundato, elytris coerulecentibus. *Gadd. Diff.* 28.

*Frisch. Inf.* 12. tab. 3.

Habitat in Europa.

*variabile.* 5. C. thorace glabro, corpore fusco-aeneo, antennis pedibusque fuscis.

Cerambyx variabilis, thorace mutico, subrotundo, inaequali, glabro, pectore anoque ferrugineo, antennis ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 635. 74. *Fn. Sv.* 669.

*Frisch. Inf.* 12. 345. tab. 6. fig. 3. 4.

Habitat in Europa.

*ruflicum.* 6. C. thorace nudo, corpore lurido, antennis brevibus.

Cerambyx rusticus. *Linn. Syst. Nat.* II. 634. 67.  
*Fn. Sv.* 666.

*Sulz. Inf.* tab. 4. fig. 9.

*Schaeff. elem.* tab. 76. fig. 1.

Habitat in Europae sylvis.

Majus reliquis.

7. C. thorace punctato, corpore atro, elytris laevibus, *stigma.*  
stigmate albo.  
*Cerambyx stigma.* *Linn. Syst. Nat.* II. 635. 72.  
Habitat in America.
8. C. thorace rotundato, subtus utrinque macula tomentosa, ferruginea, antennis longioribus, barbatis.  
Habitat Tranquebariae. *D. Koenig.*  
Statura C. pagani, at paulo minus. Antennae corpore longiores, nigrae, tomento ferrugineo barbatae.  
Ad latera pectoris utrinque macula ocellari, tomento ferrugineo. Corpus nigrum.
9. C. thoracis dorso glabro, atro, lineis quatuor albis, *variegatum.*  
elytris flavo irroratis.  
Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*  
Magnitudo C. Bajuli. Antennae longitudine corporis interdum longiores, nigrae, articulis ultimis duobus ferrugineis. Caput nigrum, lineis duabus strigaque transversali albidis. Thorax lateribus flavo irroratis, dorso glabro, atro, nitido, lineis quatuor albidis. Elytra lineolis tribus subelevatis atra, atomis flavescientibus numerosissimis irrorata. Abdomen atrum, utrinque punctis flavis. Pedes nigricantes, femoribus elongatis, posticis annulo albo.
10. C. thorace lineis duabus, elytris quatuor albis, *lineatum.*  
me-diis coeuntibus, abbreviatis.  
Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*  
Statura C. variegati, at triplo minus. Antennae breves, fuscae, articulo primo clavato, ferrugineo. Palpi omnes clavati. Caput nigrum, lineis duabus albis, labium albicans, lineis tribus nigris. Oculi sinu albidente impressi. Thorax ater, nitidus, lineis duabus albis. Scutellum albidum. Elytra obtusa, ferruginea, linea impressa villoso-alba ad marginem exteriorem, duabus in medio ante apicem coeuntibus, et quarta futurali. Abdomen albidum, medio nigrum. Pedes ferruginei, geniculis nigris.
11. C. thorace tomentoso, cinereo, elytris albo nigro-*fulcatum.*  
que striatis.  
Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura

Statura et summa affinitas C. lineati, at paulo minus.  
 Antennae breves, fuscae. Caput cinereum, linea frontis elevata, glabra, atra. Thorax villis cinereis testus. Elytra sulcata lineis elevatis, glabris, atris, sulcis quatuor villosis, albis. Pedes grisei,

- sanguineum.* 12. C. thorace subtuberculato elytrisque sanguineis, antennis mediocribus.

*Cerambyx sanguineus*, thorace mutico, subrotundo, elytrisque sanguineis, corpore nigro, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 636. 80.

*Leptura nigra*, thorace coleoptrisque sericeo-rubris. *Geoff. Ins.* I. 220. 21.

*Cerambyx minor*. *Raj. Ins.* 97. 3.

Habitat in Europa.

- testaceum.* 13. C. thorace subtuberculato, corpore testaceo, antennis mediocribus, fuscis.

*Cerambyx testaceus*, thorace subrotundo, mutico, glabro, corpore testaceo, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 635. 75. *Fn. Sv.* 670.

*Leptura testacea*, thorace glabro. *Geoff. Ins.* I. 218. 18.

Habitat in Europa.

Elytra pallidiora.

- luridum.* 14. C. thorace subtuberculato, nudo, nigrum, elytris testaceis.

*Cerambyx luridus* thorace mutico, subrotundo, corpore nigro, elytris luridis. *Linn. Syst. Nat.* II. 634. 68.

Habitat in Europa.

Simile C. Bajulo, at triplo minus.

- hafniense.* 15. C. thorace subvilloso, nigro, lineis quatuor albis, intermediis abbreviatis, antennis brevibus.

Habitat Hafniae.

Statura C. striati. Elytra nigra, albedine irrorata.

- aulicum.* 16. C. thorace laevi, nitido, corpore nigro, opaco, elytris laevis, antennis brevibus.

Habitat Hafniae.

Valde affine C. striati, at thorax nitidus et elytra haud striata.

17. C. thorace glabro, corpore nigro, elytris striatis, *striatum*.  
antennis brevibus.

*Cerambyx striatus*. *Linn. Syst. Nat. II. 635. 73. Fn.*  
*Sv. 668.*

Habitat in Europa sylvis.

18. C. thorace rotundato, subspinoso, villoso, nigrum, *lynceum*.  
elytris macula subdidyma, fulva.

Habitat ad Cap. B. S. *D. Yeats.*

Statura C. Ejuli. Corpus totum nigrum. Thorax  
villosum, rotundatus, spina parva utrinque armatus.  
Elytra versus basin macula magna interne didy-  
ma, fulva.

19. C. thorace subrotundo, mutico, corpore flavo, fe- *flavum*.  
moribus clavatis, antennis mediocribus.

Habitat in America. *Mus. Tottianum.*

- Statura C. striati. Palpi quatuor clavati. Antennae  
longitudine corporis, flavae, oculis solis nigris. Fe-  
mora omnia valde clavata.

20. C. thorace tuberculato, elytris nigris: fasciis duabus *undatum*.  
undatis albis, antennis brevibus.

*Cerambyx undatus*, thorace mutico, subrotundo, tuber-  
culato, elytris fasciis duabus undulatis, antennis  
submediocribus. *Linn. Syst. Nat. II. 6. 36. 79.*  
*Fn. Sv. 675.*

*Schaeff. Icon. tab. 68. fig. I.*

Habitat in Europa.

21. C. thorace rotundato, elytris lividis, fasciis tribus *colonum*.  
fuscis, antennis brevibus.

Habitat in Carolina.

- Statura C. undati. Thorax ferrugineo-fuscus. Elytra  
truncata, livida, fasciis tribus fuscis, quarum ultima  
vix futuram attingit.

22. C. thorace rotundato, flavo-fasciato, elytris fasciis *flexuosum*.  
septem flavis, anticis antrorsum, posticis retror-  
sum arcuatis.

*Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 3?*

Habitat in America. *Dom. Drury.*

Statura

Statura et magnitudo C. arcuati. Antennae et pedes ferrugineae. Caput nigrum, fasciis tribus flavis. Thorax niger, etiam fasciis tribus semicircularibus, flavis.

- minutum.* 23. C. testaceum, elytris fascia abbreviata, alba.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Parvum. Antennae mediocres, primo articulo crassiori testaceo, reliquis basi albis, apice nigris. Caput testaceum, oculis fuscis. Thorax rotundatus, testaceus. Elytra testacea ante medium, fascia alba, quae suturum haud attingit. Pedes testacei, femoribus valde clavatis, basi albis.

- angulum.* 24. C. thorace globoso, nigro, flavo, fasciato, elytris nigris: fasciis sex flavis, secunda tertiaque angulatis.

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Majus C. arcuato. Antennae longitudine corporis, fuscae. Thorax globosus, niger, strigis quatuor flavis. Scutellum flavum. Elytra obtusa, nigra, fasciis sex flavis, prima recta, secunda et tertia angulata, reliquis interruptis. Abdomen atrum, fasciis flavis. Pedes ferruginei.

- fulminans.* 25. C. thorace globoso, maculato, elytris nigris, fasciis undato angulatis, albis.

Habitat - - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Majus C. arcuato. Antennae breves, cinereae. Caput griseum. Thorax globosus, cinereus, maculis tribus atris, intermedia majori. Scutellum nigrum, margine cinereo. Elytra nigra, fasciis sex valde undatis, albis. Corpus fascum.

- arcuatum.* 26. C. thorace rotundato, elytris fasciis quatuor flavis, prima interrupta, reliquis retrorsum arcuatis.

Leptura arcuata, thorace globoso, nigra, elytris fasciis linearibus flavis, tribus retrorsum arcuatis, pedibus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat. II. 640. 21. Fn. Sv. 696.*

Leptura nigra, elytrorum lineis quatuor arcuatis, punctisque flavis, pedibus testaceis. *Geoff. Ins. I. 212. 10.*

Cerambyx niger elytris, fasciis quatuor flavis, arcuatis. *Uddm. Diff. 30.*

*Scarabaeus arboreus*: luteo pictus. *Frisch. Inf.* 12. fig. 3.  
*Cerambyx niger*, elytris fasciis quatuor flavis, arcuatibus. *Lechenon. sp.* 30.

*Scarabaeus major* corpore longo, angusto, nigro, cum tribus in utraque ala lineis transversis, lutescentibus. *Raj. Inf.* 83. 23.

Habitat in Europae hortis.

27. *C. thorace rotundato*, nigro, elytris nigris, fasciis flavis, secunda antrorsum arcuata, pedibus ferrugineis. *arietis.*

*Leptura arietis*. *Linn. Syst. Nat.* II. 640. 23. *Fn. Sv.* 695.

*Leptura nigra*, elytrorum lineis tribus transversis, punctisque flavis, pedibus testaceis. *Geoff. Inf.* I. 214. II.

*Scarabaeus medius niger*, lineolis et maculis luteis, pulchre variegatis. *Raj. Inf.* 82. 22.

*Scarabaeus niger*, lineolis quibusdam luteis distinctis.

*List. Scarab. Angl.* 385. 14.

*Petr. Gazoph. tab.* 63. fig. 6.

*Frisch. Inf.* 12. 32. tab. 3. fig. 5.

Habitat in Europa.

28. *C. thorace globoso*, immaculato, elytris nigris: *rufisticum*. fasciis linearibus albis.

*Leptura rustica* thorace globoso, tomentoso, elytris cinereis, fasciis linearibus, albidis, undatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 639. 17. *Fn. Sv.* 692.

*Leptura nigra*, elytrorum lineis transversis, punctisque albis. *Geoff. Inf.* I. 215. 12.

*Scarabaeus niger*, elytris lineis duabus albis. *Raj. Inf.*

83. 25.

*Petr. Gazoph. tab.* 63. fig. 5.

Habitat in Europa.

29. *C. thorace rotundato*, maculato, elytris mucronatis, nigris, strigis tribus arcuatis, flavis, basi ferrugineis. *mucronatum.*

Habitat in America. *Dom. D. Solander.*

Statura omnino *C. arcuati*. Caput fuscum, lineis duabus flavis. Antennae breves, ferrugineae, apice fuscescentes. Thorax globosus, niger, striga antica flava et macula utrinque ferruginea. Scutellum fuscum, margine flavo. Elytra nigra, basi ferruginea,

ginea, dein fasciae tres flavae, quarum anterior antrorsum, posteriores retrorsum arcuatae. Apex elytrorum rotundatus, mucronatus.

- acuminatum.* 30. C. thorace rotundato, subspinoso, elytris bidentatis, fuscis: strigis quatuor flavis, femoribus clavatis, compressis.

Habitat in America. *D. Solander.*

Statura omnino C. mucronati, at duplo minor. Caput, thorax, antennae, obscure ferruginea, immaculata. Thorax rotundatus, tuberculis aliquot dorsalibus elevatis, acutis, subspinosis. Elytra nigra, strigis quatuor rectis, flavis, apice bidentata. Pedes ferruginei, femoribus clavatis, compressis.

- detritum.* 31. C. thorace rotundato, flavo, fasciato, elytris nigris, fasciis quinque flavis, pedibus ferrugineis.

Leptura detrita thorace globoso, nigricante, elytris fuscis, fasciis quatuor transversis flavis, pedibus rufis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 640. 20. *Fn. Sv.* 694.

Leptura nigra, elytris pallido fuscis, signaturis flavis. *Geoff. Inf.* 1. 216.

*Schaeff. elem. tab.* 76. fig. 2.

Habitat in Europa.

- Verbasci.* 32. C. thorace rotundato, nigro, maculato, elytris subvirescentibus, fasciis tribus nigris, prima lunari.

Leptura Verbasci thorace subovato, nigro, elytris fasciis tribus nigris, prima semiannullata. *Linn. Syst. Nat.* 11. 640. 22.

Habitat in verbasco Europae australioris.

- aegyptiacum.* 33. C. thorace rotundato, ferrugineo, elytris cinerascentibus, fasciis tribus fuscis, prima annulari.

Habitat in Oriente. *D. Prof. Forskahl.*

Statura et affinitas C. Verbasci, at duplo minor, et thorax ferrugineus, immaculatus.

- mysticum.* 34. C. thorace rotundato, elytris fuscis, fasciis apiceque cinereis, basi rufis.

Leptura mystica thorace globoso, tomentoso, elytris fusco cinereis, antice rufis: fasciis linearibus, arcuatis, lateque canis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 639. 18. *Fn. Sv.* 693.

Leptu-

*Leptura nigra*, elytris maculis testaceis, nigris, albidis,  
lineisque nigris et albicantibus variegatis. *Geoff. Inf.*  
1. 217. 15.

*Scarabaeus parvus*, elytris triplici colore, rufo, albo,  
nigro. *Raj. Inf.* 83. 26.

*Cerambyx quadricolor*. *Scop. Ent. carn.* 177.

*Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 9.*

Habitat in Europae hortis.

35. C. thorace rotundato, nigrum, elytris fasciis duabus *Alni*.  
albis, elytrorum basi antennis tibiisque ferrugineis.

*Leptura Alni*. *Linn. Syst. Nat.* II. 639. 19.

Habitat in Europa, Anglia.

Affinis C. mystico, at quadruplo minus.

## 51. DONACIA. *Palpi filiformes.*

*Maxilla unidentata.*

*Labium membranaceum,*  
*integrum.*

*Antennae setaceae.*

### 1. D. femoribus posticis clavatis, dentatis.

*crassipes.*

*Leptura aquatica deaurata*, antennis nigris, femori-  
bus posticis dentatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 637. I.  
*Fn. Sv.* 677.

*Stenocorus deauratus*, femoribus posticis dentatis.  
*Geoff. Inf.* I. 229. 12.

*Cantharis arundines frequentans*, prima. *Raj. Inf.*  
100. I.

*Scarabaeus arboreus*, purpuro aureus, medius. *Frisch.*  
*Inf.* 12. p. 33. tab. 6. fig. 2.

Habitat in plantis aquaticis, Nymphaeis, Phel-  
landriis.

### 2. D. femoribus simplicibus.

*simplex.*

Habitat in Anglia.

*Antennae nigrae*, longitudine corporis. Abdominis  
apex et pedes rufi. Nimis affinis praecedenti.

52. LEPTURA. *Palpi filiformes.*  
*Maxilla unidentata, apice*  
*fetosa.*  
*Labium membranaceum,*  
*bifidum.*  
*Antennae setaceae.*

- melanura.* 1. L. nigra, elytris rubescensibus lividisve, sutura apiceque nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 637. 2. *Fn. Sv.* 671.  
*Stenocorus niger*, elytris rubescensibus lividisve.  
*Geoff. Inf.* I. 226. 7. tab. 4. fig. 1.  
*Cerambyx niger*, elytris flavis, extremitatibus nigris.  
*Raj. Inf.* 97. 6.  
*Capricornis exiguus*, vaginis rubescensibus, apice nigro.  
*Petiv. Gazoph.* tab. 30. fig. 5.  
*Leptura thorace nigro*, nitido, elytris obsolete fodiendeque flavescensibus. *Gadd. Diff.* 27.  
*Schaeff. Icon.* tab. 39. fig. 4.  
 Habitat in Europa: frequens in floribus.
- sanguinolenta.* 2. L. nigra, elytris sanguineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 638. 4.  
*Fn. Sv.* 679.  
*Leptura sanguinolenta.* *Scop. carn.* 150.  
*Schaeff. Icon.* tab. 39. fig. 9.  
 Habitat in Europa.
- villica.* 3. L. ferruginea, antennis elytrisque fuscis.  
 Habitat in Anglia. *Mus. Brit.*  
*L. melanurae paulo major.* Antennae nigrae, articulo primo rufo. Caput rufum, oculis nigris. Thorax rufus, angulis posticis acutis, subspinosis. Abdomen et pedes ferruginea.
- rubra.* 4. L. thorace, elytris tibiisque purpureis. *Linn. Syst. Nat.* II. 638. 3. *Fn. Sv.* 500.  
*Scarabaeus arboreus major*, purpureo ruber. *Frisch. Inf.* 12. tab. 3. *Ic.* 6. fig. 6.  
*Sultz. Inf.* tab. 5. fig. 30.  
*Schaeff. Icon.* tab. 39. fig. 2.  
 Habitat in Europa.  
*Simillima L. testacea.*

5. L. nigra, elytris testaceis, tibiis rufis, thorace postice rotundato. *Linn. Syst. Nat.* II. 638. 5. *Fn. Sv.* 680.  
*Schaeff. Icon.* tab. 39. fig. 3.  
 Habitat in Europae arboribus.
6. L. sericeo-virescens, antennis fusco viridique variis. *virens.*  
 Leptura virens viridi-flava, antennis luteo viridique flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 638. 7. *Fn. Sv.* 682.  
 Habitat in Europae arboribus.
7. L. corpore toto nigro. *aera.*  
 Stenocorus totus niger. *Geoff. Inf.* I. 228. 10.  
 Habitat in Germania.  
 Minor L. nigra. Tota nigra. Abdomen serico albo nitet.  
 Variat pedibus testaceis et nigris.
8. L. elytris attenuatis, corpore nigro, nitido, abdome rubro. *nigra.*  
 Stenocorus niger nitidus, abdomine fusco-rubente.  
*Geoff. Inf.* I. 227. 9.  
*Schaeff. Icon.* tab. 39. fig. 7.  
 Habitat in Europa.
9. L. lutea, thorace lineis duabus, elytris fasciis quatuor nigris. *laticornis.*  
 Habitat in Carolina. *Mus. Brit.*  
 Statura L. attenuatae, at triplo minor. Caput cum antennis mediocribus luteum. Thorax antice attenuatus, luteus, lineis duabus longitudinalibus nigris. Pedes flavi, femoribus posticis annulo nigro.
10. L. nigra, elytris lividis, maculis quatuor nigris. *4 macula-*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 638. 9. *Fn. Sv.* 684. *ta.*  
*Schaeff. elem.* tab. 118. fig. 2.  
 — — *Icon.* tab. I. fig. 7.  
 Habitat in Europa.
11. L. nigra, coleoptris testaceis, maculis sex nigris, *6 macula-*  
*margine connexis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 638. II. *ta.*  
*Fn. Sv.* 686.  
 Scarabaeus elytris pallidis, nigris maculis pectinis. *Raj.*  
*Inf.* 81. 18.  
 Habitat in Europa.

- attenuata.* 12. L. elytris attenuatis, flavis: fasciis quatuor nigris, pedibus testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 639. 13. *Fn. Sv.* 688.  
*Schaeff. Icon.* tab. 39. fig. 6.  
 Habitat in Europa.  
 Fasciae elytrorum variant, in primis anterior. Interdum plane deest, interdum interrupta, interdum integra.
- 4 fascia-* 13. L. nigra, elytris testaceis, fasciis quatuor dentatis, nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 639. 12. *Fn. Sv.* 687.  
*Cerambyx fasciatus.* *Scopol. carn.* 172.  
 Habitat in Europa.  
 Foeminam praecedentis credit *Scopoli.*
- sex gut-* 14. L. nigra, elytris maculis tribus flavis.  
*tata.* Habitat in Germania. *D. v. Hattorf.*  
 Corpus statura L. attenuatae, totum nigrum, elytris solis maculis tribus flavis, quarum anterior baseos ad futuram, reliquae duae in medio.
- sericea.* 15. L. viridi-coerulea, elytris subfastigiatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 638. 8. *Fn. Sv.* 683.  
*Schaeff. Icon.* tab. 84. fig. 1.  
 Habitat in Europa.
- collaris.* 16. L. thorace globoso, abdomineque rubris, elytris nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 639. 16. *Fn. Sv.* 691.  
*Scop. carn.* 159.  
*Stenocorus niger*, thorace rubro. *Geoff. Inf.* I. 228. II.  
*Schaeff. Icon.* tab. 58. fig. 9.  
 Habitat in Europa.
- virginea.* 17. L. thorace globoso, nigro, elytris violaceis, abdome rufo. *Linn. Syst. Nat.* II. 639. 15. *Fn. Sv.* 690.  
 Leptura nigra, elytris coerulecentibus, toto abdome rubro. *Gadd. Diff.* 26.  
*Schaeff. Icon.* tab. 58. fig. 8.  
 Habitat in Europa.

18. L. elytris dimidiatis, ferrugineis, immaculatis, antennis brevibus. *abbrevia-*  
*ta.*  
*Necydalis major.* *Linn. Syst. Nat.* II. 641. 1.  
*Musca Cerambyx major.* *Schaeff. monogr.* 1753. fig. 1. 2.  
*elem. tab. 13. fig. 2.* *Icon. tab. 10. fig. 10. 11.*  
*Habitat in Europa.*
19. L. elytris abbreviatis, abdōmine atro: fasciis fulvis. *variegata.*  
*Habitat in nova Hollandia.* *Mus. Dom. Banks.*  
*Magnitudo L. abbreviatae.* Antennae fuscae, longitudo corporis. Caput atrum, fronte slavecente. Thorax rotundatus, niger, margine antico et postico lineaque dorsali fulvis. Scutellum parvum, fulvum. Elytra fusca, ad suturam grisea, apice nigra. Pectus atrum, fulvo maculatum. Abdomen atrum, supra fascia baseos, pōne hanc subtus fascia, versus apicem annulus totum abdomen cingens, pone hunc fascia dorsalis, et tandem anus puncto fulvo terminatus. Pedes ferruginei, plantis fuscis.
20. L. elytris dimidiatis, testaceis: apice lineola alba, *dimidia-*  
*ta.*  
*Necydalis minor.* *Linn. Syst. Nat.* II. 641. 2. *Fn.*  
*Sv. 837.*  
*Musca Cerambyx minor.* *Schaeff. monogr.* 1753. fig. 6. 7.  
*Icon. tab. 95. fig. 5.*  
*Sultz. Inf. tab. 7. fig. 51.*  
*Habitat in Europa.*
21. L. elytris dimidiatis, testaceis, immaculatis, anten- *umbellata-*  
*nis longis.* *rum.*  
*Necydalis umbellatarum.* *Linn. Syst. Nat.* II. 641. 3.  
*Necydalis minima.* *Scop. carn.* 180.  
*Necydalis elytris apice nigris.* *Schreb. Inf.* 4.  
*Schaeff. Icon. tab. 95. fig. 4.*  
*Habitat in Germaniae umbellatis,*  
*L. dimidiata duplo minor.*

**53. LAMPYRIS.** *Palpi* quatuor anteriores  
subclavati, posteriores securiformes.

*Maxilla* bifida.

*Labium* cornuum.

*Antennae* filiformes.

*noctiluca.* 1. *L. oblonga*, fusca, clypeo cinereo. *Linn. Syst. Nat.* II. 643. 1. *Fn. Sv* 699.

*Cantharis mas coleopterus.* *Leche nov. sp.* p. 23. 47.  
Habitat in Europae borealis iuniperetis.

*splendi-  
dula.* 2. *L. oblonga*, fusca, clypeo apice hyalino.  
*Lampyris splendidula oblonguscula*, fusca, clypeo supra oculos fenestrato. *Linn. Syst. Nat.* II. 644. 3.  
*Lampyris foemina aptera.* *Geoff. Inf.* 1. 166. 1.  
*Scarabaeus Lampyris* sordide nigricans, corpore longo, angusto. *Raj. Inf.* 78. 15.  
*Noctiluca terrestris*, *Colum cephr.* 1. p. 38. f. 36.  
*Mouff. Inf.* p. 109. f. 1. *Mas.* f. 2. *foemina.*  
*Bradl. nct.* tab. 26. fig. 3. A. *mas* B. *foemina.*  
Habitat in sylvaticis, tempestate pluviosa in primis lucem spargens.

*obscura.* 3. *L. nigra*, clypeo utrinque macula rufa.

Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo omnino *L. noctilucae*. Clypeus rotundatus, integer, niger, lateribus depresso, macula magna rufa. Elytra fusca, immaculata. Abdomen et pedes nigra, immaculata.

*pyralis.* 4. *L. clypeo ruso*, medio nigro, elytris nigris, marginibus abdomineque albis.

*Lampyris pyralis*, oblonga, fusca, elytris margine rufescens, clypeo intra marginem purpurascente. *Linn. Syst. Nat.* II. 644. 4. *Mus. Lud. Ulr.* 78.  
Habitat in America meridionali.

Margo clypei ipse rufescens, uti margo elytrorum.

5. *L.*

5. L. oblonga, nigra, thoracis elytrorumque margine *margina-*  
omni, scutello abdominalisque postice flavis. *Linn.* *ta.*  
*Syst. Nat.* II. 644. 5.  
Habitat in America.  
Antennae fuscae, basi flavae. Pedes variegati.
6. L. ovata, elytris fuscis, macula marginali trianguli,  
flava. *Linn. Syst. Nat.* II. 644. 6.  
Habitat in America.  
Clypeus flavus, macula antica fusca. Anus flavus.
7. L. ovata, elytris fuscis, macula marginali ovata, lutea. *ignita.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 645. 7.  
Habitat in America.  
Clypeus maculis duabus anticis fuscis. Abdomen flavum.
8. L. oblonga, elytris fuscis, margine exteriore luteis, *lucida.*  
abdomine flavo. *Linn. Syst. Nat.* II. 645. 8.  
Cantharis lucida. *Sultz. Ins. tab.* 5. fig. 22?  
Habitat in America.  
Nimis affinis videtur L. noctilucae.
9. L. oblonga, subtestacea, abdomine atro, postice fla-  
vissimo. *Linn. Syst. Nat.* II. 645. 9. *phospho-*  
*rea.*  
Habitat in America.  
Antennae nigrae.
10. L. livida, thorace flavescente, abdomine postice *capensis.*  
flavissimo.  
Habitat in Cap. Bon. Spei. *Mus. Dom. Banks.*  
Magnitudo L. noctilucae. Antennae filiformes, fuscae.  
Caput nigrum, ore livido. Thorax transversus,  
flavescentia. Scutellum flavum. Elytra livida, ma-  
cula baseos fusca, margineque flavescente. Alae  
nigrae. Subtus livida, abdominalis ultimis duobus  
segmentis flavissimis. Pedes lividi, plantis fuscis.  
Variat thorace maculis duabus fuscis.
11. L. flavicans, capite elytrisque fuscis. *australis.*  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
Statura et magnitudo L. italicae. Caput atrum, an-  
tennis filiformibus. Thorax marginatus, laevis,  
nitidus, rufus. Scutellum ferrugineum. Elytra  
nigra. Subtus flavicans, abdominalis ultimis segmen-  
tis flavissimis. Pedes flavescentes, plantis nigris.

- italica.* 12. L. elytris fuscis, thorace transverso, rufo.  
*Lampyris italicica* elytris fuscis, clypeo antice transverso, rufo, medio nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 645. II.  
 Habitat in Italiae arboribus.  
 In nostra thorax immaculatus, ultima duo segmenta abdominis alba.
- mauritana.* 13. L. elytris lividis, corpore flavo. *Linn. Syst. Nat.* II. 645. 10.  
 Habitat in Africa.

#### 54. PYROCHROA. *Palpi* quatuor subfiliiformes.

*Maxilla* integra.

*Labium* corneum, lineare, integrum.

*Antennae* filiformes.

- coccinea.* 1. P. nigra, thorace elytrisque sanguineis, immaculatis.  
*Lampyris coccinea nigra*, thorace elytrisque sanguineis, elytris striatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 646. 18.  
*Fn. Sv. 705.*  
*Pyrochroa*. *Geoff. Inf.* I. 338. I. tab. 6. fig. 4.  
*Schaeff. Icon.* tab. 90. fig. 4.  
 Habitat in Europae sepibus.  
 Variat capite nigro aut rufo. Elytra in nostris nullo modo striata.

- sanguinea.* 2. P. nigra, thoracis lateribus elytrisque sanguineis.  
*Lampyris sanguinea*. *Linn. Syst. Nat.* II. 646. 17.  
*Fn. Sv. 704.*  
*Lampyris* elytris rubris, thorace rubro, nigra macula.  
*Geoff. Inf.* I. 168. 3.  
*Cassida sanguinea*. *Scopoli Ent.* 119.  
*Cantharis prioribus similis, quarta*. *Raj. Inf.* 101.  
*Searabaeus arboreus*, parvus, ruber, elytris longis, clypeo pectorali linea nigra. *Frisch. Inf.* 12. p. 41.  
 tab. 3. *Icon.* 7. fig. 2.  
*Schaeff. Icon.* tab. 24. fig. 1.  
 Habitat in Europae lapidofis.

3. *P. sanguinea*, elytris postice violaceis. *bicolor.*  
*Lampyris bicolor.* *Linn. Syst. Nat.* II. 646. 16.  
*Cantharis bicolor.* *Amoen. acad.* 6. 395. 21.  
 Habitat in Africa.
4. *P. atra*, thoracis margine flavo, elytris flavis, fascia reticulata. apiceque nigris.  
 Habitat in New York Americae.  
 Statura *P. bicoloris*, at duplo major. Antennae serratae, compressae, atrae. Clypeus rotundatus, planus, niger, margine lato, flavo. Elytra plana, postice latiora, nervis elevatis quatuor strigisque numerosis transversis reticulata, flava, fascia media apiceque late nigris. Subtus atra, sterno flavo.
5. *P. flava*, clytris macula marginali posticeque nigris, latissima. margine laterali maximo, dilatato.  
*Lampyris latissima.* *Linn. Syst. Nat.* II. 646. 14.  
 Habitat ad Sierra Leon. *D. Drury.*  
 Macula nigra in medio margine elytrorum. Os cylindricum, prominens; rostrum simulans.
6. *P. elytris coriaceis*, latissimis, testaceis, apice nigris. *palliata.*  
 Habitat in Cap. B. Sp. *D. Yeats.*  
 Statura et summa affinitas *P. latissimae*. Corpus nigrum. Rostrum cylindricum, uti in congeneribus. Thorax niger, antice macula utrinque testacea. Elytra striata, latissima, coriacea, testacea, apice nigra. Alae apice fuscae.
7. *P. nigra*, thoracis lateribus elytrisque flavis, poste- *rostrata.* ce nigris.  
*Lampyris rostrata* elytris testaceis, antice posticeque nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 646. 15. *Mus. Lud. Uhr.* 10. 78.  
 Habitat in Africa.  
 Rostrum exakte praecedentis, exsertum, cylindricum.  
 Margo thoracis testaceus.
8. *P. nigra*, thorace elytrisque rufescentibus, elytris ferraticornis. apice nigris.  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura

Statura praecedentis, at triplo minor. Antennae valde compressae, ferratae, nigrae. Thorax rufescens, marginibus subreflexis. Elytra sulcata, sulcis rugosis, rufescentia, apice nigra. Abdomen et pedes nigra. Femora basi testacea.

55. LYMEXYLON. *Palpi* extrorsum crassiores.

*Maxilla* bifida.

*Labium* lineare, apice rotundatum.

*Antennae* moniliformes.

- dermestoides.* 1. *L. testaceum*, oculis, alis pectoreque nigris.  
*Cantharis* dermestoides testacea, oculis alis pectoreque nigris, antennis longitudine thoracis. *Linn. Syst. Nat.* II. 650. 25. *Fn. Sv.* 702.  
*Habitat* in Europa, media.

- navale.* 2. *L. luteum*, elytris margine apiceque nigris.  
*Cantharis* navalis, thorace teretiusculo, corpore luteo, elytris margine apiceque nigris. *Linn. Syst. Nat.* 3. 650. 26. *Fn. Sv.* 718. *It. Wgoth.* 155. tab. 2.  
*Frisch. Ins.* 13. pag. 24. tab. 20.  
*Habitat* intra quercus lignum, quod destruit.

56. CVCVIUS. *Palpi* aequales, articulo ultimo truncato, crassiori.

*Labium* breve, bifidum, lacinii linearibus, distantibus.

*Antennae* moniliformes.

- depressus.* 1. *Cucujus.*  
*Habitat* in Germania. *D. v. Hattorf.*  
*Statura* depressa, et magnitudo Cantharidis. *Antennae* nigrae, moniliformes, pilosae, articulis undecim, ultimo acuto. *Caput* depresso, planum, rufum, ore

ore oculisque nigris, postice utrinque angulo obtuso globoso auctum. Thorax planus, subsulcatus, rufus, margine denticulato, tenuissime nigro. Elytra plana, rigida, rufa. Corpus subtus et pedes nigra.

57. CANTHARIS. *Palpi securiformes.**Maxilla bifida.**Labium integrum.**Antennae filiformes.*

1. C. thorace marginato, rubro, macula nigra, elytris *fusca*.  
fuscis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 647. 2. *Fn. Sv.* 700.

*Cantharis sepiarius major*, elytris nigricantibus. *Raj.*  
*Inf.* 84. 29.

*Cicindela elytris nigricantibus*, thorace rubro, nigra  
macula. *Geoff. Inf.* 1. 170. 1.

*Frisch. Inf.* 12. tab. 3. *Icon.* 6. fig. 5.

*Sultz. Inf.* tab. 5. fig. 33.

*Schaeff. Elem.* tab. 123. fig. 1.

Habitat frequens in Europaee sepibus.

Saevit in propriam speciem.

2. C. thorace marginato, tota testacea. *Linn. Syst. Nat.* 11. *livida.*  
647. 3. *Fn. Sv.* 701.

*Cicindela thorace rubro*, immaculato, geniculis posti-  
cis nigris. *Geoff. Inf.* 1. 171. 2.

*Cantharis sepiarius major*, e rufo flavicans, elytris  
non maculatis. *Raj. Inf.* 84. 28.

Habitat in Europa, America boreali.

Nimis affinis praecedenti.

3. C. thorace marginato, marginibus rubris, corpore *obscura*.  
nigro. *Linn. Syst. Nat.* 11. 648. 5. *Fn. Sv.* 706.

*Aet. Nidros.* 3. p. 396. tab. 6. fig. 5.

Habitat in Europa.

Variat thoracis margine rubro et pallide fusco, pedi-  
bus rubris et nigris.

4. C.

*lateralis.* 4. C. thorace marginato, rubro, corpore fusco, elytris  
margin'e exteriori flavescentibus. *Linn. Syst. Nat.* II.  
648. 6. *Fn. Sv.* 707.

Habitat in Europa.

Affinis praecedentibus.

*atra.* 5. C. thorace marginato, corpore toto atro. *Linn. Syst.*  
*Nat.* II. 649. 16.

Habitat in Europa boreali.

*marginalis.* 6. C. thorace marginato, nigra, thoracis elytrorumque  
marginibus rubris.

Habitat in America. *D. Eaton.*

Statura et fere magnitudo C. lividae. Antennae filiformes, nigrae. Caput nigrum, margine laterali maculaque antica rufis. Thorax marginatus, niger, latere exteriori rufo. Elytra nigra, margine omni rufo. Alae nigrae. Pedes nigri, femoribus rufis.

*ruficollis.* 7. C. atra, thorace abdomineque rufis.

Habitat in Anglia.

Summa affinitas C. fuscae, at duplo minor. Caput cum antennis ferratis atrum. Thorax marginatus, rufus, immaculatus. Elytra, alae et pectus atra. Abdomen rufum. Pedes nigri.

*2 punctata.* 8. C. thorace marginato, punctis duobus nigris, elytris  
testaceis, apice nigris.

Habitat Lipsiae.

Caput et antennae nigra, fronte testacea. Thorax marginatus, marginibus reflexis, testaceis, punctis duobus nigris. Elytra serico aureo splendentia, apice nigra. Abdomen nigrum, apice ferrugineum. Pedes testacei, geniculis posticorum nigris.

*melanura.* 9. C. thorace rotundato, corpore luteo, elytris apice  
nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 651. 27. *Fn. Sv.* 719.

Cicindela rubra, elytris testaceis, apice nigris. *Geoff.*  
*Ins.* I. 173. 5.

*Cantharis sepiarius* elytrorum apicibus nigris. *Raj. Ins.*  
84. 27.

Habitat in Europae hortis.

10. C. thorace marginato, rufo, macula nigra, corpore *minima*. fuso, elytris apice flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 649.  
 12. *Fn. Sv.* 713. *Scop. carn.* 128.  
*Necydalis* elytris puncto flavo. *Geoff. Inf.* I. 372. 1.  
 Habitat in Europa.
- II. C. thorace marginato, flavo, macula nigra, corpore *testacea*. nigro, elytris pedibusque lividis. *Linn. Syst. Nat.* II. 649. 15. *Fn. Sv.* 714.  
*Scop. carn.* 125.  
 Habitat in Europa.
12. C. thorace marginato, medio atro, elytris abbreviatis, nigris, apice flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 648. II.  
*Fn. Sv.* 712.  
*Cicindela fusca*, elytris apice flavis, thorace fuso. *Geoff. Inf.* I. 176. II.  
 Habitat in Europa.

58. MALACHIVS. *Palpi* filiformes, articulo ultimo setaceo.  
*Maxilla* unidentata.  
*Labium* rotundatum,  
 membranaceum.  
*Antennae* filiformes.

- I. M. corpore viridi-aeneo, elytris extrorsum sanguineis. *aeneus.*  
*Cantharis aenea* thorace marginato, corpore viridi-aeneo, elytris extrorsum undique rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 648. 7. *Fn. Sv.* 708.  
*Cicindela viridi-aenea*, clytris extrorsum rubris. *Geoff. Inf.* I. 174. 7.  
*Scarabaeus minor* corpore longiusculo, elytris rubicundis. *Raj. Inf.* 77. 12.  
*Schaeff. monog.* 1754. tab. 2. fig. 10. II.  
 — — *Icon.* tab. 19. fig. 12. 13.  
 Habitat in Europae plantis.  
 Exserit tentacula duo, basi connata, obtusa, sanguinea utrinque ad basin abdominis et duo alia ad apicem thoracis.

2. M.

- bipustula-* 2. M. aeneo-viridis, elytris apice rubris.  
*tus.* Cantharis bipustulata thorace marginato, corpore  
 aeneo-viridi, elytris apice rubris. *Linn. Syst. Nat.*  
 II. 648. 8. *Fn. Sv. 709.*
- Cicindela* aeneo-viridis, elytris apice rubris. *Geoff.*  
*Inf.* I. 175. 8.
- Cantharis* vix  $\frac{3}{4}$  unciae longa. *Raj. Inf.* 101. 7.  
 Habitat in Europa.  
 Larva rapax minimorum insectorum.
- pedicula-* 3. M. ater, elytris apice rubris.  
*rius.* Cantharis pedicularia thorace marginato, corpore  
 atro, elytris apice rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 648.  
 9. *Fn. Sv. 710.*  
 Habitat in Europa.  
 Pediculo paulo major.
- fasciatus.* 4. M. elytris nigris, fasciis duabus rubris.  
 Cantharis fasciata thorace subrotundo, virescente,  
 elytris nigris, fasciis duabus rubris. *Linn. Syst.*  
*Nat.* II. 648. 10. *Fn. Sv. 711.*
- Cicindela* elytris nigris, fasciis duabus rubris. *Geoff.*  
*Inf.* I. 177. 12.
- Cantharis* valde exigua. *Raj. Inf.* 102. 22.  
 Habitat in Europae muscis.

59. NECYDALIS. *Palpi* subfiliformes:*Maxilla* unidentata.*Labium* membranaceum,  
 late emarginatum.*Antennae* filiformes.

- viridissi-* 1. N. thorace teretiusculo, corpore viridi.  
*ma.* Cantharis viridissima. *Linn. Syst. Nat.* II. 650. 23.  
*Fn. Sv. 717.*
- Cicindela* viridi-coerulea. *Geoff. Inf.* I. 177. 14.  
 Habitat in Europae hortis frequens.
- coerule-* 2. N. thorace teretiusculo, corpore coeruleo, subopaco.  
*scens.* Cantharis coerulea. *Linn. Syst. Nat.* II. 650. 22.  
*Fn. Sv. 716.*  
 Habitat in Europa cum praecedente.

3. N. elytris subulatis, nigra, femoribus omnibus clavatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 642. 5. *atra.*  
 Habitat in Europa australi.  
 Tota nigra, opaca, immaculata.
4. N. elytris subulatis, nigris, basi flavis. *humura-*  
*Cantharis nigra*, elytris attenuatis, antice flavis. *lis.*  
*Geoff. Inf.* I. 342. 2.  
 Habitat in Anglia.  
 Duplo major N. Podagrariae. Corpus nigrum.  
 Elytra subulata, nigra, basi flavescentia absque  
 lineis aut margine elevatis. Pedes simpli-  
 ces, nigri.
5. N. elytris subulatis, nigra, femoribus omnibus clava- *rufa.*  
 tis, elytris antennisque rufis.  
*Necydalis rufa* elytris subulatis, nigra, femoribus  
 omnibus clavatis, elytris antennisque rufis. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 642. 6.  
*Leptura nigra*, elytris pedibusque rubescentibus, livi-  
 dis, coleoptris attenuatis. *Geoff. Inf.* I. 220. 22.  
*Schaeff. Icon.* tab. 94. fig. 8.  
 Habitat in Europa.  
 Elytra basi puncto nigro. Scutellum album.
6. N. elytris subulatis, coerulea, femoribus posticis cla- *coerulea.*  
 vatis, arcuatis.  
*Necydalis coerulea.* *Linn. Syst. Nat.* II. 642. 4.  
*Cantharis viridi-coerulea*, elytris attenuatis, femori-  
 bus posticis globosis. *Geoff. Inf.* I. 342. 3.  
*Cantharis nobilis.* *Scopoli Ent.* 145.  
*Schaeffer. Icon.* tab. 94. fig. 7.  
 Habitat in Oriente.  
 Variat pedibus simplicibus.
7. N. elytris subulatis, testaceis, corpore nigro, femo- *Podagra-*  
 ribus posticis clavatis, basi testaceis. *iae.*  
*Necydalis Podagrariae.* *Linn. Syst. Nat.* II. 642. 9.  
*Cantharis nigra*, elytris attenuatis, fulvis, femoribus  
 posticis globosis. *Geoff. Inf.* I. 343. 4.  
*Cantharis feinorata.* *Scopoli Ent.* 144.  
*Schaeffer. Icon.* tab. 85. fig. 7?  
 Habitat in Aegopodio Podagraria.

- simplex.* 8. *N. clytris subulatis, testaceis, pedibus simplicibus.*  
*Necydalis simplex.* *Linn. Syst. Nat.* II. 643. 10.  
*Cantharis phthysica.* *Scop. carn.* 144.  
*Habitat in Europa.*  
*Forte praecedentis varietas.*

60. ELATER. *Palpi securiformes.*  
*Maxilla unidentata, obtusa.*  
*Labium bifidum.*  
*Antennae filiformes.*

- speciosus.* 1. *E. albus, nigro maculatus.*  
*Elater speciosus albus, lineis punctis maculisque nigris.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 652. 2.  
*Habitat in India.*  
*Antennae breves, nigrae.*

- oculatus.* 2. *E. thorace oculis duobus atris, corpore nigro, albo maculato.*  
*Elater oculatus thorace ocellis binis atris, iridibus albis, corpore nigricante.* *Linn. Syst. Nat.* II. 651. 3.  
*Scarabaeus elasticus major, capite bimaculato.* *Petiv. Gazoph.* tab. 10. fig. 4.  
*Aet. Angl.* 246. p. 396. 13. et 271. p. 842. 32.  
*Habitat in America septentrionali.*

- noctilucus.* 3. *E. thoracis lateribus macula flava, glabra.*  
*Elater noctilucus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 657. 4. *Maf. Lud. Utr.* 82.  
*Elater major fuscus, phosphoricus.* *Brown. Iamaic.* 432. tab. 44. fig. 10.  
*Scarabaeus medius fuscus, thorace angulato, lucem emittente.* *Sloan. Iam.* 2. 206. tab. 237. fig. 1.  
*Cocujas.* *Mouff. Inf.* 112.  
*Habitat in America.*

- phosphorus.* 4. *E. thorace postice maculis duabus flavis.*  
*Elater phosphoreus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 652. 5.  
*Habitat in America.*  
*Nimis affinis praecedenti, quamvis duplo minor.*

5. E. ater, antennis pedibusque fuscis. *fusipes.*  
 Habitat in India orientali. *Koenig.*  
 Magnus, ater totus, solis antennis et pedibus fuscis.  
 Elytra striata.
6. E. ferrugineus, elytris mucronatis, antennis nigris. *ligneus,*  
*Linn. Syst. Nat. II. 652. 7. Amoen. acad. 6. 395. 24.*  
 Elater testaceus, thorace antice truncato, elytris posti-  
 ce acuminatis. *Gronov. Zooph. 477?*  
 Habitat in America meridionali.
7. E. thorace elytrisque ferrugineis, corpore thoracis-  
 que margine postico nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 654.* *ferrugi-*  
*neus.*  
 20. *Fn. Sv. 729.*  
 Elater thorace elytrisque rubris. *Geoff. Ins. I. 130. 1.*  
*tab. 2. fig. 4.*  
*Schaeff. Icon. tab. 19. fig. 1.*  
 Habitat in Europa.
8. E. viridi-aeneus, elytris sulcatis, sulcis villoso-albis. *porcatus.*  
 Elater porcatus, fuscus, elytris nigris, porcatis, sulcis  
 elevatis, glabris. *Linn. Syst. Nat. II. 652. 6?*  
 Habitat in America.  
 Pectoris sutura atra, nitida.
9. E. thorace atro, nitido, elytris nigris, striatis. *aterrimus.*  
 Elater aterrimus, ater, thorace opaco, punctato, elytris  
 striatis. *Linn. Syst. Nat. II. 653. 17. Fn. Sv. 726.*  
 Elater totus niger, nitidus. *Geoff. Ins. I. 136. 13.*  
 Habitat in Europa.
10. E. thorace obscure cinereo, elytris cinereo-nebu-  
 lofis, plantis rufis. *Linn. Syst. Nat. II. 655. 22. murinus.*  
*Fn. Sv. 738.*  
 Elater niger, elytris villoso-murinis. *Geoff. Ins. I.*  
*135. 10.*  
*Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 6.*  
 Habitat in Europa.
11. E. elytris aeneis, maculis pallidioribus confertis, *tessellatus.*  
 unguibus rubris. *Linn. Syst. Nat. II. 655. 29.*  
*Fn. Sv. 739.*  
 Elater niger, villoso-undatus. *Geoff. Ins. I. 135. 9.*  
 Elater thoracicus. *Scopoli Ent. 282.*

*Elater niger*, pilis minimis flavo-aeneis, junctim intermixtis. *Gadd. Sat.* 80.

*Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 7.*

Habitat in Europa.

*fasciatus.* 12. *E. thorace nigro pallidoque vario, elytris nigricantibus, fascia alba undulata.* *Linn. Syst. Nat.* II. 655.

27. *Fn. Sv.* 737.

*Scopol. carn.* 281.

Habitat in Europa.

*aeneus.* 13. *E. thorace elytrisque aeneis, pedibus sanguineis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 655. 31. *Fn. Sv.* 740.

*Elater nitens.* *Scopol. Ent.* 279.

Habitat in Europa.

*pectinicornis.* 14. *E. thorace elytrisque aeneis, antennis maris pectinatis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 655. 32. *Fn. Sv.* 741.

*Elater fusco-viridi-aeneus.* *Geoff. Inf.* I. 133. 7.

*Scarabaeus antennis articulatis septimus.* *Raj. Inf.* 92. 7.

*Scarabaeus e nigro virens, corniculis altero tantum versu pectinatis.* *Lister. Angl.* 387. 19.

*Sultz. Inf.* tab. 5. fig. 36.

*Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 4.*

— — *Elem. tab. II. fig. 1. et tab. 60.*

Habitat in Europa.

*cypreus.* 15. *E. cypreus, elytris dimidiato-flavis.*

Habitat in Anglia.

*Statura omnino et magnitudo E. pectinicornis, obscure cupreus, seu rufo-aeneus. Antennae nigrae, pectinatae. Elytra striata, basi testacea, apice cuprea.*

*cruciatus.* 16. *E. thorace nigro, lateribus ferrugineis, coleoptris flavis, cruce margineque nigris.* *Linn. Syst. Nat.* II. 653. 12. *Fn. Sv.* 722.

*Elater thorace nigro, circulo rubro, elytris fulvis, cruce nigra.* *Geoff. Inf.* I. 133. 6.

Habitat in Europa.

*syriacus.* 17. *E. thorace rufo, elytris fascia dupli alba, corpore nigro.* *Linn. Syst. Nat.* II. 653. II. *Mus. L. Uhr.* 83.

Habitat in Oriente.

*Minor.* *Fascia elytrorum altera ad basin, altera in medio.*

18. E. thorace testaceo, pubescente, elytris flavis, apice castaneus.  
nigris, corpore atro. *Linn. Syst. Nat.* II. 654. 18.  
*Fn. Sv.* 727.  
Elater thorace villoso, elytris testaceis, apice nigris.  
*Geoff. Ins.* I. 132. 4.  
Scarabaeus antennis articulatis. *Raj. Ins.* 92. 6.  
Scarabaeus ex fusco rufescens, s. castaneus. *Lift.*  
*loqu.* 387.  
*Schaeff. Icon.* tab. II. fig. 9. et tab. 31. fig. 4.  
Habitat in Europae campis.
19. E. niger, thorace glaberrimo, rubro, elytris testaceis. *lucens.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 654. 19. *Fn. Sv.* 728.  
*Schaeff. Icon.* tab. II. fig. 8.  
Habitat in Europa.  
Caput, scutellum, corpus et pedes nigra.
20. E. thorace rufo, medio fusco, elytris testaceis, linea-  
ribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 655. 13. *Fn. Sv.* 723.  
Habitat in Europa.  
Caput, corpus et scutellum nigra. Os antennarum,  
basis et tibiae pallidae.
21. E. piceus, thorace elytrisque obscure nigris.  
Elater obscurus thorace fusco, obscuro, elytris obscure  
testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 655. 25. *Fn. Sv.* 735.  
Habitat in Europae plantis.
22. E. thorace obscure-nigro, elytris striatis, fuscis, *flavipes.*  
pedibus testaceis.  
Habitat in America. *Dom. v. Robr.*  
Simillimus E. obscuro, pedibus tamen flavescensibus  
facillime distinguitur.
23. E. thorace atro, nitido, elytris, basi margineque  
exteriore lucidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 655. 26.  
*Fn. Sv.* 736.  
Habitat in ligno putrescente.
24. E. thorace fusco, elytris testaceis, margine undique *margina-*  
*nigro.* *Linn. Syst. Nat.* II. 654. 23. *Fn. Sv.* 733. *tus.*  
Habitat in Europa.

*mesomelus.* 25. E. thorace margineque elytrorum ferrugineis, corpore elytrisque nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 653. 16.  
*Fn. Sv.* 725.

Habitat in Europa.

*thoraci-* 26. E. niger, thorace toto rufo.

*cus.* Elater niger, thorace rufo. *Geoff. Inf.* I. 132. 5.

Habitat prope Henly Anglorum.

Nimis affinis videtur E. ruficollis, at paulo major.

Caput atrum, antennis nigris, ferratis. Thorax pubescens, totus rufus, nec uti in ruficollis postice niger, sola linea intermedia pectoris nigra. Elytra subpubescentia, striata, atra. Pedes nigri, plantis piceis. An mera varietas E. ruficollis?

*ruficollis.* 27. E. niger, thorace postice rubro, nitido.

Elater ruficollis thorace rubro, nitido, antice nigro, elytris corporeaque nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 653. 14. *Fn. Sv.* 724.

Scarabaeus elytris nigris, scapulis rubris. *Raj. Inf.* 92. 8.

Elater gramineus. *Scopol. Ent.* 290.

Habitat in Europae graminosis.

*brunneus.* 28. E. thorace rufo, medio nigro, elytris corporeaque ferrugineis.

Elater brunneus thorace nigro, utrinque rufo, elytris corporeaque ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 653. 10. *Fn. Sv.* 721.

Habitat in Europa.

*sanguineus.* 29. E. ater, elytris sanguineis.

Elater sanguineus thorace atro, elytris rubris, corpore nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 654. 21. *Fn. Sv.* 731. *Scop. carn.* 287.

Elater niger, elytris rubris. *Geoff. Inf.* I. 131. 2.

*Schaeff. Icon.* tab. 2. fig. 6.

Habitat in Europa.

Elytrorum summus apex niger.

30. E. thorace atro, elytris antice dimidiato rufis, *balteatus*.  
corpo nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 654. 22.  
*Fn. Sv.* 732.  
Scarabaeus minor, elytris bicoloribus e fulvo et nigro,  
saltatrix. *Raj. Inf.* 78. 23.  
Habitat in Europa.
31. E. thorace fusco, nitido, elytris cinereis, corpore *sputator*.  
nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 654. 24. *Fn. Sv.* 734.  
*Scop. carn.* 583.  
Habitat in Europa.
32. E. niger, elytris fuscis, lineatis. *friatus*.  
Habitat in Suecia.  
Medius. Caput et thorax obscure nigra. Elytra fusa,  
lineis quatuor pallidis, ad apicem coeuntibus. An-  
tennae ferrugineae. Pedes fusi.
33. E. thorace atro, nitido, elytris nigris. *Linn. Syst. minutus*.  
*Nat.* II. 656. 34. *Fn. Sv.* 744.  
Habitat in Europa.  
Parvus, niger, nitidus.
34. E. capite thoraceque atris, elytris nigris: maculis *pulchellus*.  
flavicantibus, pedibus flavis. *Linn. Syst. Nat.* II.  
656. 35. *Fn. Sv.* 745.  
Habitat in Europa.
35. E. thorace ferrugineo, elytris atris, fasciis duabus *festivus*.  
flavis.  
Habitat in Aegypto. *D. Forstkäbl.*  
Parvus. Statura E. pulchelli. Caput fuscum. Thorax  
laevis, rufescens. Elytra striata, nigra, fasciis  
duabus flavis, altera ad basin, altera versus apicem.
36. E. niger, nitidus, elytris puncto baseos rubro. *Linn. 2 pustula-*  
*Syst. Nat.* II. 652. 9. *tus.*  
Elater niger, elytrorum basi maculis rubris. *Geoff.*  
*Inf.* I. 136. 15.  
Habitat in Germania.

61. BUPRESTIS. *Palpi filiformes, articulo ultimo truncato, obtuso.*

*Maxilla unidentata, obtusa.*

*Labium cylindricum, acuminate.*

*Antennae filiformes, ferratae.*

*unidentata.* 1. B. elytris unidentatis, aeneis, margine aureo.  
ta. Habitat - - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Antennae breves, nigrae. Caput viride, fronte canaliculato, aureo. Thorax viridis, lineis tribus latis, cupro-aureis. Elytra glabra, viridia, nitida, margine aureo, apice unidentata. Corpus viride, nitens, plantis fuscis.

*gigantea.* 2. B. elytris bidentatis, rugosis, thorace laevi, corpore inaurato. *Linn. Syst. Nat. II. 659. I. Mus. L. U. 85.*

Cantharis maxima, elytris cuprei coloris, sulcatis. *Sloan. Iam. 2. p. 210. tab. 236. fig. 1. 2.*

Cerambyx Indiae orientalis maximus, *Grew. Mus. 165. tab. 13.*

*Sultz. Ins. tab. 6. fig. 38.*

*Merian. Sur. tab. 50. fig. inf.*

*Seb. Mus. 3. tab. 84. fig. 12.*

Habitat in America, Asia.

*vittata.* 3. B. elytris bidentatis, punctatis: lineis elevatis quatuor, viridi-aeneis, vitta lata, aurea.

Habitat in India. *Dom. Banks.*

Statura B. ignitae. Caput canaliculatum, viride, fronte aureo antennisque nigris. Thorax punctatus, macula utrinque aurea baseos. Elytra apice bidentata, subaenea, nitida, tomento ferrugineo tecta.

*fasciata.* 4. B. elytris truncatis, bidentatis, variolosis, viridibus: sutura aurea.

Habitat in America septentrionali. *Dom. Banks.*

Minor B. vittata, at statura eadem; oblonga. Caput planum, scabrum, antice aureum, emarginatum.

Thorax rotundatus, punctatus, viridi-aeneus.

Elytra bidentata, viridia, splendida, sutura aurea, punctis

punctis majoribus cicatrisantibus impressis, at lineae elevatae nullae. Subtus aeneus, punctatus, sterno antice posticeque emarginato.

5. B. elytris bidentatis, cupreis, punctis violaceis numerosis. *punctatis. sima.*

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Drury.*

Magnitudo et statura B. marianaæ. Corpus cupreum, nitidum, maculis plurimis violaceis sparsis.

6. B. elytris truncatis, bidentatis, viridibus, vitta coerulea, rulecente marginibusque aureis. *decora.*

Habitat in America. *Dom. Banks.*

Simillimus B. fastuosæ, at duplo minor. Caput viride - aureo - nitens, scabrum. Thorax aureus, postice rotundatus. Elytra truncata, subbidentata, viridia, vitta coerulecente in medio, margine exteriori et futura aureis. Subtus aureus, punctatus, sterno antice posticeque emarginato.

7. B. elytris bidentatis, obscura, ano tridentato. *lurida.*

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

Statura B. rusticae. Thorax elytraque rugosa, aeneo cinereoque variegata. Elytra apice bidentata, subtus aenea.

8. B. elytris truncatis, subbidentatis, cupreis: lineis elevatis quatuor. *striata.*

Habitat in Pensylvania. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Antennæ breves, nigrae. Caput et thorax obscure cuprea, scabra. Elytra lineis quatuor elevatis, quarum exteriores apice coeunt, interiores abbreviatae.

9. B. elytris tridentatis, thorace impresso, corpore inaurato. *Linn. Syst. Nat. II. 659. 3. Mus. L. U. 86. ignita.*

*Beetle. Grew. Mus. 166. tab. 13.*

*Petiv. Gazoph. tab. 20. fig. 8.*

*Rumpf. Iap. I. p. 132. tab. 10. fig. 7.*

Habitat in Indiis.

10. B. elytris truncatis, subtridentatis, nigro-aeneis: vittis duabus ferrugineis. *lineata.*

Habitat in America. *Dom. Banks.*

Statura et magnitudo B. rusticae. Caput obscure aeneum, margine antico pallido, fasciaque media rufa. Thorax punctatus, aeneus, margine exteriori antice rufo. Elytra terminata denticulis tribus obsoletis, obscure aenea, vittis duabus rufis, quarum exterior ad basin flexuosa, interior basi latior apicem elytri haud attingit. Subtus aenea, gula rubra. Sternum antice posticeque emarginatum. Primum abdominis segmentum fulco exaratum.

- ocellata.* 11. B. viridi-nitens, elytris tridentatis, maculis duabus aureis ocellariisque flava.

Habitat in Indiis.

Statura B. ignitae. Caput canaliculatum. Thorax punctatus, aureus, linea longitudinali coerulecente. Elytra tridentata, lineis tribus elevatis, viridia, maculis duabus aureis, altera ad basin, altera ad apicem, in medio vero macula magna subocellaris, flava, quae in quibusdam in fasciam fere excurrit, margines tamen haud attingit.

- sternicor-nis.* 12. B. elytris serrato-tridentatis, viridibus, punctis cinnereis impressis, sterno porrecto, conico. *Linn. Syst. Nat.* II. 660. 5. *Mus. Lud. Ulv.* 88.

Carabus orientalis, crassus. *Grew. Mus.* 167. tab. 13.

Habitat in India.

Corpus viridi-aeneum, nitens. Thorax variolosus. Varietatem vidi elytrorum punctis consolidatis, vix conspicuis, excepto puncto latiori baseos. Subtus aurea, laevis, macula ferruginea utrinque in pectore et duabus in ultimo abdominis segmento.

An distincta?

- Chrysis.* 13. B. elytris serrato-tridentatis, castaneis, sterno conico, porrecto.

Buprestis sternicornis β. *Linn. Syst. Nat.* II. 660. 5. *Mus. Lud. Ulv.* 88.

Habitat in India.

Simillimus B. sternicorni, cuius etiam varietatem Cl. Linnaeus dicit. Differt tamen elytris totis castaneis, immaculatis, laevis. Subtus viridi-aurea, immaculata.

14. B. elytris ferratis, sulcatis, corpore depresso, obscuro. *depressa.*  
 Habitat in Oriente. *D. Prof. Forskäbl.*
- Major E. chrysostigmatae. Thorax canaliculatus, punctatus, obscurus, utrinque angulatus. Elytra apice subtilissime ferrata, sulcis octo exarata, subtus magis cuprea.
15. B. elytris ferratis, longitudinaliter rugosis: maculis *mariana.* duabus impressis, thorace sulcato. *Linn. Syst. Nat.* II. 660. 6. *Fn. Sv.* 754. *Mus. Lud. Ulv.* 89.  
 Cantharis marianus viridis, perelegans, vaginis sulcatis, signaturis flavescentibus notatis. *Petiv. Gazzoph.* tab. 2. fig. 2.  
*Schaeff. Icon.* tab. 49. fig. 1.  
 Habitat in Europa, America.
16. B. elytris ferratis, viridibus: sulco abbreviato suturali impresso. *farinosa.*  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
 Magnitudo media. Antennae nigrae. Caput canaliculatum, fuscum, orbita oculorum aurea. Thorax obscure aeneus, dorso canaliculato, marginibus lunula impressis. Elytra rugosa, viridia, sulco longitudinali a medio ad apicem impressa. Corpus aeneum, polline ferrugineo adspersum.
17. B. elytris ferratis, porcatis, thorace angulato, corpore fusco, nitido. *porcata.*  
 Habitat in Oriente. *Forskäbl.*  
 Paulo major B. rustica. Thorax punctatus, dorso valde impresso lateribusque prominentia obtusa angulatis. Elytra ferrata, porcata vel lineis elevatis tribus spatio interjecto punctis concatenatis, in duplice serie striatis. Color totus fuscus, cupreornitidus.
18. B. elytris ferratis, longitudinaliter sulcatis, maculis duabus aureis impressis, thorace punctato. *Linn. Syst. Nat.* II. 660. 7. *Fn. Sv.* 755. *chrysostigma.*  
 Cucuius aureus elytrorum fossulis quatuor impressis, nitentibus. *Geoff. Ins.* I. 125. I.  
*Sulz. Ins.* tab. 6. fig. 39.  
 Habitat in Europa.

- impressa.* 19. B. elytris serratis, aeneis, punctis tribus impressis.  
 Habitat in Indiis: e *Musaeo D. Bernoulli* Basiliensis.  
 Magnitudo et statura B. rusticae. Totum corpus obscure aeneum. Punctum thorace utrinque impressum. Elytra margine toto serrata, punctis tribus distinctis impressis. Linea unica ad suturam elevata.
- ornata.* 20. B. elytris serratis, obscuris, albo-maculatis.  
 Habitat in Pensylvania. *Mus. Dom. Banks.*  
 Minor. Antennae breves. Caput et thorax nigra, immaculata, punctata. Elytra margine toto serrata, punctata, striata, obscura, maculis plurimis albis sparsis. Corpus nigrum.
- cylindri-ca.* 21. B. elytris serratis, striatis, corpore cylindrico, nigro.  
 Habitat in Oriente. *Forskahl.*  
 Parva. Oculi testacei. Thorax laevis, fuscus, cupreο parum nitens. Elytra serrata, striata, nigra. Corpus magis cylindricum, quam in reliquis.
- scabra.* 22. B. elytris integris, fronte sulcato, corpore scabro, aureo.  
 Habitat in Indiis. *D. Mallet.*  
 Magnitudo fere E. ignitae. Corpus totum cupreο aureum, scabrum, immaculatum. Caput sulco profundo exaratum. Oculi testacei.
- & guttata.* 23. B. elytris integris, maculis quatuor albis, corpore coeruleo. *Linn. Syst. Nat.* 11. 659. 2. *Fn. Sv.* 753.  
 Cucuius viridi-aeneus, punctis quatuor impressis albis. *Geoff. Ins.* 1. 126. 2.  
*Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 1.*  
 Habitat in Europa.
- fascicula-ris.* 24. B. elytris integerimis, striatis, punctis fasciculatis villosis, corpore inaurato, hirsuto. *Linn. Syst. Nat.* 11. 661. 12. *Mus. Lud. Uhr.* 90.  
 Scarabaeus amboinensis. *Seb. Mus.* 2. p. 22. tab. 20. fig. 5.  
 Scarabaeus viridis, aureus, papillis pilis albis obtusis, undique hirtus. *Petiv. Gazoph.* 4. tab. 13. fig. 5.  
*Sultz. Ins.* tab. 6. fig. 4.  
 Habitat ad Cap. E. S. Variat corpore nigro. *Mus. Dom. Banks.*

25. B. elytris integerrimis, pedibus ferrugineis, corpore hirsuto. *Linn. Syst. Nat.* II. 661. 13. *Mus. L. U.* 91.

Habitat in Africa.

Varietatis huius a colore plures.

26. B. elytris integris, sulcatis, aeneis, capite thorace que viridibus. *austriaca.*

Buprestis austriaca elytris striatis, bidentatis, capite thoraceque viridi, abdomine violaceo. *Linn. Syst. Nat.* II. 661. 9.

Mordella gigantea. *Scopoli carn.* 187.

Habitat Idriae. *D. Scopoli.*

Elytra in nostra truncata, nec bidentata.

27. B. elytris integris, viridibus, margine omni aureo, *splendens.* lineisque tribus elevatis.

Habitat in China.

Magnitudo B. rusticae. Corpus viride, nitens, elytrorum margine et futura aureis.

28. B. elytris emarginatis, striatis, obscure aeneis. *rustica.*

Buprestis rustica elytris striatis, fastigiatis, thorace punctato. *Linn. Syst. Nat.* II. 660. 8. *Fn. Sv.* 756.

Cucuius viridi-auratus, oblongus, thorace punctato, elytris striatis. *Geoff. Ins.* I. 126. 3.

Mordella rustica. *Scopoli carn.* 188.

Habitat in Europa.

29. B. atra, elytris integris, truncatis, thorace varioloso, dilatato. *Tenebrio-*

*nis.*

Buprestis Tenebrionis atra, elytris integris, lineato-punctatis, thorace varioloso, dilatato. *Linn. Syst. Nat.* II. 661. 11.

Habitat in Europa, Africa.

Thorax punctis elevatis, nitidis, planis, distinctus utrinque angulo rotundato prominet.

30. B. nigra, elytris fasciis cinereis, undulatis. *Linn. Rubi.*

*Syst. Nat.* II. 662. 14.

Habitat in Rubo, Cichorio.

31. B.

- bimaculata.* 31. B. elytris integerrimis, striatis, macula rubra, corpore fusco - viridi. *Linn. Syst. Nat.* II. 662. 16. *Mus. L. U. 92.*  
 Habitat in India.  
 Macula magna rubra in medio elytrorum.
- triflisis.* 32. B. elytris integerrimis, marginatis, corpore cupreо, abdomine punctis decem nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 662. 18. *Mus. L. U. 93.*  
 Habitat in Indiis.  
 Abdomen in singulo segmento utrinque puncto nigro.
- cuprea.* 33. B. elytris integerrimis, thoracis lateribus scabris, scutello tuberculari, corpore cupreо. *Linn. Syst. Nat.* II. 662. 20. *Mus. L. U. 94.*  
 Habitat in America.  
 Thoracis latera depressa, scabra. Scutellum puncto elevato prominet.
- nobilis.* 34. B. elytris integerrimis, fasciis linearibus duabus undatis, inauratis, corpore fuscо. *Linn. Syst. Nat.* II. 662. 21.  
 Habitat in Indiis.
- 4 punctata.* 35. B. elytris integerrimis, punctatis, thorace punctis quatuor impressis, corpore obscuro. *Linn. Syst. Nat.* II. 662. 22. *Fn. Sv. 759.*  
 Habitat in Europae floribus frequens in Caltha palustri.
- cruciata.* 36. B. coleoptris integerrimis, aureis, punctis duobus cruceque postica nigris.  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
 Corpus parvum. Caput aureum, splendens, canaliculatum, antennis nigris. Thorax aureus, nitens, immaculatus. Coleoptera integra, antice punctis duobus et postice cruce lata nigris. Corpus subtus viridi - aureum.
- biflriata.* 37. B. elytris integris, obscuris, thorace aureo, striis duabus nigris.  
 Cucuius aeneus, elytris fuscis, thorace rubro, fasciis fuscis. *Geoff. Ins.* I. 127. 4.  
 Habitat Lutetiis Parisiorum. *D. Mallet.*

Affinis

Affinis videtur B. festivae. Caput aureum, oculis nigris. Elytra integra, obscura, parum cupronitentia, striata. Thorax rufo-aureus, striis duabus latis, nigris.

38. B. elytris integerrimis, transverse rugosis, thorace subtrilobo, laevi, corpore ovato, nigro. *Linn. Syst. Nat. II. 663. 24. Fn. Sv. 760.*
- Cucuius* fuscocupreus, triangularis, fasciis undulatis, villoso-albidis. *Geoff. Ins. I. 128. 6.*  
Habitat in Europa, saepius capta in coryli foliis.
39. B. elytris integerrimis, linearibus, punctatis, corpore viridi, elongato. *Linn. Syst. Nat. II. 663. 25. Fn. Sv. 762.*
- Habitat in Europae betula alba.
40. B. elytris integerrimis, linearibus, corpore elongato, atro. *Linn. Syst. Nat. II. 663. 26.*
- Habitat in Germania.  
Simillima B. viridi, ut vix distinguitur nisi colore.
41. B. elytris integerrimis, maculis sex coeruleis, corpore viridissimo, elongato. *Linn. Syst. Nat. II. 663. 27.*
- Habitat in Africa.  
Statura praecedentis. Thorax punctis duobus, elytra sex coeruleis.
42. B. elytris integris, linearibus, viridibus, capite thoraceque aureis. *laeta.*  
Habitat Halae. *Schaller.*  
Corpus lineare, magnitudine et statura B. viridis. Caput et thorax rubra, aurea, nitida. Elytra viridia, integerrima, futura aurea. Pedes rufescentes.
43. B. elytris integerrimis, rugosis, corpore cyaneo. *cyanea.*  
Habitat Halae. *Schaller.*  
Statura et magnitudo B. viridis. Corpus totum cyanum, nitidum, oculis testaceis.
44. B. elytris integerrimis, nigris, maculis tribus flavis. *9 maculata.*  
Buprestis 9 maculata elytris integerrimis, maculis tribus longitudinalibus, fronte thoracisque lateribus luteis. *Linn. Syst. Nat. II. 662. 17?*
- Habi-

Habitat in - - - - Manduit.

Videtur B. 9 maculata *Linnaei*, quamvis caput et thorax nigra, immaculata. Macula interior elytrorum parva, reliquae duae majores transversales. Variat capite thoraceque maculatis.

**62. CICINDELA.** *Palpi sex filiformes: postici pilosi.*  
*Labium corneum, tridentatum.*  
*Antennae setaceae.*

*campestris.* 1. *C. viridis*, punctis quinque albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 657. 1. *Fn. Sv.* 746. *Scop. carn.* 181.

Buprestis inauratus, supra viridis, coleoptris punctis duodecim albis. *Geoff. Inf.* I. 153. 27.

*Cantharis quarta.* *Monff. Inf.* 145. fig. infim.

*Scarabaeus viridis*, cui decem maculae albae supra alarum thecas. *List. Sc. Angl.* 386. 17.

*Cantharis Monffeti minor*, quarta. *Ionst. Inf.* tab. 15. *Schaeff. Icon.* tab. 34. fig. 8. 9.

Habitat in Europae campis arenosis.

Larva mollis, alba, capite pedibusque sex ferrugineis, foveam magnitudine corporis in terra excavat, in qua latens insecta arripit. *Geoff.* Larvas etiam hirsutas venatur. *Raj.*

*hybrida.* 2. *C. subpurpurascens*, elytris fascia lunulisque duabus albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 657. 2. *Fn. Sv.* 747. *Scop. carn.* 183.

*Schaeff. Econ.* tab. 43.

— — *Icon.* tab. 35. fig. 10.

Habitat in Europae fabulosis.

*sylvatica.* 3. *C. nigra*, elytris fascia undata punctisque duobus albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 658. 8. *Fn. Sv.* 748.

Buprestis inauratus, supra fusco-viridis, coleoptris fasciis sex undulatis, albis. *Geoff. Inf.* I. 155. 28.

Habitat in Europae pinetis.

4. *C. elytris fuscis puncto baseos, fasciis tribus interruptis lineolaque apicis flavis.* *interrup-*  
*Habitat in Sierra Leon. Mus. Dom. Banks.* *pla.*
- Magnitudo C. campestris. Caput fuscum, antennis maxillisque porrectis, nigris. Oculi magni, testacei. Thorax rotundatus, fuscus, immaculatus. Elytra laevia, fusca, nitidula, puncto baseos flavo. Fascia prima consistit e lunula puncto que ad suturam, secunda e striga puncto que ad suturam et tertia denique e maculis duabus parvis. Lineola parva ad apicem. Subtus aenea, nitida.*
5. *C. subaenea, elytris albis, linea fusa triramosa.* *capensis.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 657. 3. Mus. Lud. Ulr. 84.*  
*Habitat ad Cap. B. Sp.*
6. *C. cuprea, elytris viridibus, puncto lunulaque apicum albis.* *germani-*  
*Linn. Syst. Nat. II. 657. 4. Scopoli ca.*  
*Carn. 182.*  
*Euprestis inauratus, supra fuso-viridis, coleoptris punctis sex albis.* *Geoff. Inf. I. 155. 29.*  
*Cicindela obscurior viridis, elytris punctis 4. lineolaque alba.* *Schreb. Inf. 10. 5.*  
*Habitat in Germaniae arenosis.*
7. *C. thorace fusco, bituberculato, elytris fuso viridi- que variis: margine tridentato, albo.* *tubercu-*  
*Habitat in nova Zelandia. Mus. Dom. Banks.* *lata.*  
*Magnitudo C. capensis. Caput fuscum, labio albido.*  
*Thorax fuscus, tuberculis duabus magnis, obtusis, dorsalibus. Elytra fusca, punctis atomisque viridibus impressis variegata. Margo lunulis tribus con- catenatis, albis, quarum media in medio strigam exserit, quae tamen suturam haud attingit. Subtus aenea.*
8. *C. subpurpurascens, labio elytrisque puncto albo.* *unipun-*  
*Habitat in America. D. Drury.* *Et. et. et.*  
*Statura et summa affinitas C. hybridae. Labium rotundatum, sinuatum, album. Corpus purpurascens, elytris puncto unico laterali, albo. Subtus vi- rescens.*

- sex punctata.* 9. *C. viridi-aenea*, elytrorum disco obscuriore, punctis tribus albis.  
 Habitat ad littora Malebarica. *Drury.*  
 Statura et magnitudo *C. campestris*. Caput viridinutens, vertice obscuriore. Thorax supra fuscus, lateribus, viridi pectore, coeruleo-nitidis. Elytra obliqua, disco fusco, punctis tribus albis. Abdomen et pedes viridia.
- sex guttata.* 10. *C. viridis*, nitida, elytris punctis tribus marginalibus, albis.  
 Habitat in Virginia.  
 Corpus viride, nitidissimum. Antennarum apex fuscus. Labium superius flavum.
- Catena.* 11. *C. viridi-aenea*, elytris albidis, punctis sex viridibus, concatenatis.  
 Habitat in India orientali. *Koenig.*  
 Statura et magnitudo *C. germanicae*. Caput mihi deest. Thorax rotundatus, obscurus, subtus aeneus, tomento albo tectus. Elytra albida, punctis tribus in medio et tribus ad suturam, omnibus concatenatis et inter se et cum sutura. Abdomen aeneum, lateribus laua albissima. Pedes aenei.
- marginalta.* 12. *C. viridis*, elytris margine fascia undata punctisque duobus albis.  
 Habitat in Virginia.  
 Corpus statura *C. campestris*, viride. Labium flavum, Margo elytrorum albus, qui dentes quatuor ad fasciam valde undatam et flexuosam exserit. Puncta adhuc duo alba ad basin.
- carolina.* 13. *C. viridis*, nitida; elytrorum apicibus, ore, antennis pedibusque flavis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 657. 6.  
 Habitat in Carolina.
- aequinoctialis.* 14. *C. flava*, elytris fasciis duabus nigris, latis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 658. 7. *Amoen. acad.* 6. 395. 22.  
 Habitat Surinami.
- maura.* 15. *C. nigra*, elytris punctis sex albis, tertio et quarto parallelo. *Linn. Syst. Nat.* 11. 658. 9.  
 Habitat in Oriente.

63. ELAPHRVS. *Palpi sex filiformes.*

*Labium rotundatum, acuminatum, integrum.*

*Antennae setaceae.*

1. E. viridi-aeneus, elytris punctis latis, excavatis. *riparius.*  
*Cicindela riparia. Linn. Syst. Nat. II. 658. 10. Fn.*  
*Sv. 749.*  
*Buprestis viridi-aeneus, elytris punctis latis, excavatis, mammilosis. Geoff. Inf. I. 156. 30.*  
*Scarabaeus parvus, inauratus. Lst. loqu. 385.*  
*Schaeff. Icon. tab. 86. fig. 4.*  
*Habitat in Europae humentibus.*  
*Colore saepius variat.*
  
2. E. obscure aeneus, elytris subnebulosis, pedibus luteis. *flavipes.*  
*Cicindela flavipes. Linn. Syst. Nat. II. 658. 11. Fn.*  
*Sv. 750.*  
*Habitat in Europa ad littora riparum.*
  
3. E. nigra, coleoptris punctis duobus fasciaque ferrugineis. *rufipennis.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 658. 12.*  
*Habitat in Sueciae rupibus.*
  
4. E. aeneus, nitidus, capite striato. *aquaticus.*  
*Cicindela aquatica. Linn. Syst. Nat. II. 658. 14. Fn.*  
*Sv. 752.*  
*Buprestis fusco-aeneus, capite profunde striato, elytrorum stria prima remotissima. Geoff. Inf. I. 157. 31.*  
*Cicindela pusilla. Schreb. Inf. 6.*  
*Lst. mut. tab. 31. fig. 13.*  
*Habitat ad Europae aquas.*
  
5. E. aeneus, nitidus, elytris punctatis, dorso glaberrimo. *semipunctatus.*  
*Habitat Halae Saxonum. Schaller.*  
*Statura et summa affinitas E. aquatae. Corpus totum aeneum, nitidum. Elytra striato-punctata, in medio ad futuram quasi polita, glaberrima. Pedes nigri.*

64. HYDROPHILVS. *Palpi filiformes.**Maxilla bifida.**Labium corneum, sub-*  
*emarginatum.**Antennae clava perfo-*  
*liata.*

- piceus.* 1. *H. niger*, sterno canaliculato, postice spinoso..  
*Hydrophilus niger*, elytris sulcatis, antennis fuscis.  
*Geoff. Inf.* 1. 182. 1. tab. 3. fig. 1.  
*Dytiscus piceus* antennis perfoliatis, corpore laevi,  
sterno carinato, postice spinoso. *Linn. Syst. Nat.* II.  
664. 1. *Fn. Sv.* 764.  
*Lyonet. Leff.* tab. 1. fig. 15. 16. 17.  
*Frisch. Germ.* 2. tab. 6.  
*Schaeff. Icon.* tab. 33. fig. 1. 2.  
Habitat in Europae aquis: piscibus infestus.
- caraboi-* 2. *H. niger*, nitidus, elytris substriatis.  
*Hydrophilus niger*, elytrorum punctis per strias di-  
gestis, antennis nigris. *Geoff. Inf.* 1. 183. 2.  
*Dytiscus caraboides* antennis perfoliatis, corpore gla-  
bro, striis aliquot recurvis. *Linn. Syst. Nat.* II.  
664. 2. *Fn. Sv.* 765.  
*Hydrocantharis aquaticus*, niger, subrotundus. *Raj.*  
*Inf.* 95. 7. *Roes.* 2. *aqu.* 1. tab. 4. fig. 1. 2.  
*Frisch. Inf.* 13. p. 24. tab. 21.  
*Sultz. Inf.* tab. 6. fig. 41.  
Habitat in Europae aquis.
- lateralis.* 3. *H. niger*, nitidus, thoracis elytrorumque margini-  
bus flavis.  
Habitat in America. *Mus. Tottianum.*  
*Statura H. caraboidis*, at duplo minor. Totus ater,  
laevis, nitidus, solo margine flavo. Subtus niger,  
sterno postice porrecto, acutissimo, puncto medio  
flavo. Pedes ferruginei.
- scarabaei.* 4. *H. niger*, elytris striatis, pedibus piceis.  
*oides.* *Scarabaeus aquaticus* muticus, piceus, elytris striatis,  
antennis flavescensibus, filiformibus. *Linn. Syst. Nat.*  
*Edit. X.* n. 56.

*Scarabaeus piceus.* *Geoff. Inf.* I. 85.

*Dytiscus scarabaeoides ovalis, convexus, ater, laevissimus, antennis filiformibus, triarticulatis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 664. 212. 3.

Habitat in Europae aquis.

*H. caraboidi duplo minor. Antennae omnino perfoliatae, at palpi prominentes, triarticulati, filiformes.*

5. *H. subrotundus, corpore glabro, atro.*

*orbicularis.*

Habitat in aquosis Germaniae.

Statura fere *H. scarabaeoidis*, at minor, et fere orbiculatus. Totus laevissimus, nitens.

6. *H. niger, ore, thoracis lateribus lineisque elytrorum collaris ferrugineis.*

Habitat in America. *Mus. Tottianum.*

Statura gibba, elevata, *H. luridi*. Corpus atrum, nitidum. Os lateraque thoracis ferruginea. Elytra nigra, margine lineisque aliquot abbreviatis, ferrugineis. Antennae perfoliatae et pedes fusci.

7. *H. elytris striatis, corpore cinereo, fusco.*

*luridus.*

*Dytiscus luridus* antennis perfoliatis, *luridis*, elytris punctis tribus fuscocentibus, thorace lateribus flavicante. *Linn. Syst. Nat.* II. 665. 5. *Fn. Sv.* 767.

Habitat in Europae aquis.

8. *H. ovatus, niger, elytris, pedibus, thoracisque lateribus griseis.* *minutus.*

*Chrysomela minuta.* *Linn. Syst. Nat.* II. 593. 50.  
*Fn. Sv.* 533.

*Scarabaeus totus rufo-niger, maculis nigrioribus.*

*Geoff. Inf.* I. 85. 27?

Habitat in Europae aquis.

9. *H. thorace atro, margine griseo, elytris fuscis, puncto postico albido.* *bipunctatus.*

Habitat in aquis Upsaliae.

Parva. Statura omnino hujus generis. Caput atrum, puncto utrinque marginali griseo. Thorax ater, nitidus, margine griseo. Elytra fusca, margine pallidiori et puncto distincto griseo versus apicem.

65. DYTISCVS. *Palpi sex filiformes.*

*Labium corneum, truncatum, integrum.*  
*Antennae setaceae.*

*latissimus.* 1. *D. niger*, elytrorum marginibus dilatatis, linea flava.  
*Linn. Syst. Nat. II. 665. 6. Fn. Sv. 768.*

*Scarabaeus aquaticus*, magnus, niger, margine luteo.  
*Frisch. Inf. 2. tab. 7. fig. I. 2.*

Habitat in Europae aquis.

*costalis.* 2. *D. niger*, capitis fascia, thoracis margine, elytrorumque stria costali ferrugineis.

Habitat Surinami. *D. Yeats.*

Statura et magnitudo *D. marginalis*. Caput nigrum, fascia supra os puncto utrinque impressa, ferruginea. Thorax niger, glaber, margine ferrugineo. Elytra glabra, striis tribus punctatis remotis, nigra, stria costali ferruginea.

*marginalis.* 3. *D. niger*, thoracis marginibus omnibus, elytrorumque exteriori flavis. *Linn. Syst. Nat. II. 665. 7. Fn. Sv. 769. Geoff. Inf. I. 186. 2.*

*Hydrocantharis nostras. Raj. Inf. 93. I.*

*Hydrocantharis. Monff. Inf. 164.*

*Roeß. Inf. 2. aquat. 2. p. 7. tab. I. fig. 9. 10.*

*List. mut. tab. 5. fig. 2.*

*Sulz. Inf. tab. 6. fig. 42.*

*Schaeff. Elem. tab. 7. fig. I.*

Habitat in Europae aquis.

Agilis in dorso incubans saltu se restituit. Si diu in sicco detineantur, aegre se immergunt. Ova oblonga, magna, alba.

*limbatus.* 4. *D. niger*, thoracis elytrorumque margine exteriori flavo.

Habitat in China. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et summa affinitas praecedentis, a quo tamen specie differre videtur. Thoracis margo posticus et anticus haud flavi. Elytra absque striis punctatis, margine flavo, apicem haud attingente. Sternum postice

postice abbreviatum; in praecedenti porrectum, emarginatum, subspinatum. Pedes nigri, femoribus anticis flavis.

5. D. fuscus, elytris sulcis dimidiatis decem. *Linn. Syst. Nat.* II. 665. 8. *Fn. Sv.* 772. *Geoff. Inf.* II. 187. 3. *semistriatus.*  
*Hydrocantharus* elytris striatis sive canaliculatis.  
*Raj. Inf.* 94. 2.  
*Frisch. Inf.* 2. tab. 7. fig. 4.  
*Roef. Inf.* 2. *aquat.* 1. tab. 1. fig. 10.  
*Bradl. nat.* tab. 26. fig. 2.  
Habitat in Europae aquis.  
An foemina D. marginalis?
6. D. elytris sulcis decem longitudinalibus, villosis. *sulcatus.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 666. 13. *Fn. Sv.* 773.  
*Geoff. Inf.* I. 189. 5.  
*Hydrocantharus* minor, corpore rotundo, plano.  
*Raj. Inf.* 94. 3 et 10.  
*Frisch. Inf.* 13. p. 13. tab. 7.  
*Roef. Inf.* 2. *aquat.* 1. tab. 3. fig. 7.  
*Bradl. nat.* tab. 26. fig. 2. A.  
*Schaeff. Icon.* tab. 3. fig. 3.  
Habitat in Europae, Americæ aquis.  
Maris elytra glabra.
7. D. fuscus, elytris transversim subtilissime striatis. *striatus.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 665. 9. *Fn. Sv.* 770.  
Habitat in Europae aquis.
8. D. niger, ore verticis punctisque duobus thoracisque marginibus rufis, elytris fuscis. *Lanio.*  
Habitat in Maderæ aquis. *Mus. Dom. Banks.*  
Statura et magnitudo D. striati. Caput nigrum, ore punctisque duobus inter oculos rufis. Thorax niger, margine rufescente. Elytra fusca, lineis duabus punctorum impressorum.
9. D. cinereus, elytrorum margine thoracisque mediate flavis. *cinerens.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 666. 11. *Fn. Sv.* 771.  
*Geoff. Inf.* I. 188. 4.  
*Hoeffnag. Inf.* 2. tab. 12.  
*Roef. Inf.* 2. *aqua.* 1. tab. 3. fig. 6.  
*Lift. mut.* tab. 5. fig. 1.

*Petiv. Gazoph.* tab. 70. fig. 3.

*Schaeff. Ion.* tab. 90. fig. 7.

Habitat in Europae aquis.

*silicticus.* 10. D. pallens, elytris griseis, puncto oblongo laterali nigro, impresso. *Linn. Syst. Nat.* II. 666. 12.

Habitat in Africa.

Magnitudo D. cinerei. Lineae duae elytrorum e punctis fuscis, vix conspicuae.

*10 punctata-* 11. D. ater, glaber, elytris punctis albis quinque. *tus.* Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo D. erythrocephali. Antennae breves, ferrugineae. Caput atrum, fronte pallescente. Thorax ater, glaber, macula utrinque marginali pallida. Elytra atra, glaberrima, punctis quinque albis 2. 2. 1. Pedes fusi.

*hirsutula-* 12. D. ater, laevis, capite postice punctis duobus, rubris. *tus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 667. 17.

Habitat in Europa boreali.

*cinctus.* 13. D. capite thoraceque flavis, elytris nigris, margine omni albo.

Habitat in America. *D. Mauduit.*

D. cinereo minor. Caput et thorax flava, immaculata. Elytra nigra, margine et sutura albis.

*Herrmani.* 14. D. gibbus, elytris fascia undata baseos ferruginea. *ni.* Habitat in aquis stagnantibus Alsatiae. *Prof. Herrmann.*

Statura D. erythrocephali. Caput obscure ferrugineum. Thorax niger, marginibus ferrugineis. Elytra laevia, nigra, fascia lata undata baseos ferruginea, quae ad marginem exteriorem paulo ulteriori extenditur. Punctum parvum, versus apicem ferrugineum.

*uliginosus.* 15. D. ater, nitidus, antennis, pedibus elytrorumque latere exteriore ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 667. 20. *Fu. Sv.* 776.

Habitat in Europae aquis.

16. *D. testaceus*, nigro • irroratus, capite pectore- *irroratus*  
que nigris.  
Habitat in America.  
Statura et magnitudo *D. einerei*. Caput nigrum, ore  
testaceo. Thorax glaber, laevis, nitens, testaceus,  
punctis duobus dorsilibus nigris. Pectus nigrum.  
Abdomen et pedes testacei.
17. *D. niger*, thorace nigro, fascia pallida, elytris albo  
nigroque variis. *Linn. Syst. Nat.* II. 666. 15. *Fn. Sv.* 777. *macula-*  
*Uddm. Diff.* 43. *tus.*  
Habitat in Europae aquis.
18. *D. ovato-oblongus*, capite pedibusque rufis. *Linn. erythroce-*  
*Syst. Nat.* II. 665. 14. *Fn. Sv.* 774. *phalus.*  
Habitat in Europae aquis.
19. *D. thorace rufo*, elytris cinereo nigroque striatis. *varius.*  
Habitat in Patagoniae aquis. *Mus. Dom. Banks.*  
Magnitudo *D. pallustris*. Caput nigrum, ore anten-  
nisque rufis. Thorax glaber, laevis, rufus. Ely-  
tra striis numerosissimis approximatis, nigris cine-  
reisque variegata. Sutura nigra, margo exterior  
cinereus. Subtus piceus, pedibus ferrugineis.
20. *D. thorace ferrugineo*, punctis duobus baseos nigris, *depressus*.  
elytris fuscis, ferrugineo-maculatis.  
Habitat in Sueciae aquis.  
Corpus parvum, depresso. Caput ferrugineum,  
oculis nigris. Thorax ferrugineus, margine an-  
tico, maculisque duabus baseos nigris. Elytra  
fusca, maculis tribus marginis et quibusdam discei  
ferrugineis.
21. *D. laevis*, elytris lituris duabus lateralibus, albis. *pallidus.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 667. 19. *Fn. Sv.* 775.  
Habitat in Europae aquis.  
Thorax ferrugineus.
22. *D. ovatus*, fuscus, capite thoraceque ferrugineis. *ovatus.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 667. 18. *Fn. Sv.* 2282.  
Habitat in Europae aquis.  
Caput et thorax picea, aut minus nigra. Subtus  
ferrugineus.

- signatus.* 23. D. niger, capite thoraceque rufis, signaturis nigris.  
Habitat in aquis Patagoniae. *Mus. Dom. Banks.*  
Afinis D. ovato. Caput rufum, fascia in medio inter oculos nigra. Thorax laevis, rufus, lineola transversali nigra, margines haud attingente. Elytra nigra, margine subrufescente. Pedes ferruginei.
- granula-* 24. D. niger, elytris lineis duabus flavescentibus, pedibus rufis. *Linn. Syst. Nat. II. 667. 22.*  
Habitat in Europa boreali.
- lineatus.* 25. D. ferrugineus, coleoptris fuscis, lineis quatuor flavescentibus.  
Habitat in aquis stagnantibus Alsatiæ. *D. Prof. Herrmann.*  
Caput ferrugineum, basi parum nigricans. Thorax laevis, ferrugineus. Coleoptera fusco cinereoque mixta (vel cinerea *Linnaei*) margine pallidiore. Per medium dorsi lineae quatuor distinctæ, albantes.
- minutus.* 26. D. flavesiens, elytris fuscis, margine flavo, maculato.  
*Dytiscus minutus* elytris fuscis, basi lateribusque pallidis, thorace flavo, immaculato, corpore ovato. *Linn. Syst. Nat. II. 667. 23. Fn. Sv. 778.*  
Habitat in Europa aquosis.

## 66. GYRINVS. *Palpi filiformes.*

*Maxilla cornea, unidentata, acutissima.*  
*Labium emarginatum.*  
*Antennæ cylindricæ.*

- natator.* 1. *G. substriatus.* *Geoff. Inf. I. 194. tab. 3. fig. 3. †. Linn. Syst. Nat. II. 567. 1. Fn. Sv. 779.*  
Scarabaeus aquaticus, subrotundus, e coeruleo-viridi colore splendente undique tinctus. *Raj. Inf. 87. 10.*  
*Dytiscus natator.* *Scopoli Ent. 299.*  
Scarabaeus niger, nostras, supra aquam velociter circumnatans. *Petiv. Gazoph. 21. tab. 13. fig. 9.*

Pulex

*Pulex aquaticus.* *Merret.* *pin.* 203.

*Roef.* *Inf.* 3. p. 195. tab. 31.

*Sultz.* *Inf.* tab. 6. fig. 43.

*Schaeff.* *Elem.* tab. 57.

Habitat in Europae lacubus.

Velocissime supra aquani per orbis cursitat, dum  
vero urinatur, bullam acream hydrargyri coloris  
secum trahit.

2. *G. virescens*, substriatus, elytris abbreviatis, uni- *australis.*  
dentatis.

Habitat in novae Hollandiae aquis. *Mus. Dom.* *Banks.*

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Supra  
virescens, obscure nitens. Elytra substriata, ab-  
domine breviora, truncata, dente unico laterali  
arniata. Subtus corpus atrum, pedibus quatuor  
posticis ferrugineis.

3. *G. ater*, laevis, opacus. *Linn.* *Syst. Nat.* II. 568. 2. *america-*  
*nus.*

Habitat in America. *Mus. Tottianum.*

Affinis praecedenti, at paulo major, et multo ob-  
scurior.

67. CARABVS. *Palpi sex*, articulo ulti-  
mo obtuso.

*Labium integrum*, trun-  
catum.

*Antennae filiformes.*

\* *Majores.*

1. *C. apterus*, ater, violaceo - nitens, elytris punctis *coriaceus.*  
intricatis, subrugosis. *Linn.* *Syst. Nat.* II. 668. 1.  
*Scop. carn.* 265.

Buprestis ater, elytris rugosis. *Geoff.* *Inf.* I. 141. 1.

*Sultz.* *Inf.* tab. 6. tab. 44.

*Schaeff.* *Icon.* tab. 36. fig. 1.

Habitat in Germania.

Affinis *C. violaceo.*

2. *C.*

*violaceus.* 2. *C. alatus, niger, thoracis elytrorumque marginibus violaceis.*

*Carabus violaceus alatus, elytris laeviusculis, nigris, margine aureo, thorace subviolaceo.* *Linn. Syst. Nat. 11. 669. 8. Fn. Sv. 787.*

*Scarabaeus major, e purpuro nigricans.* *Raj. Inf. 96. 1.*

*Scarabaeus maximus, ex viola nigricans.* *Lift. Scar. Angl. 389. 22.*

*Scarabaeus terrestris, nigricans.* *Frisch. Inf. 13. tab. 23. Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 1. et tab. 88. fig. 1.*

Habitat in Europae sylvis.

*10 gutta.* 3. *C. apterus, thorace angustato, ater, coleoptris novem sulcatis punctisque decem albis.* *Linn. Syst. Nat. 11. 669. 10. Mus. Lud. Ulv. 96.*

Habitat in Africa.

Maximus in hoc genere.

*6 gutta.* 4. *C. apterus, thorace postice angustato, elytris laevibus, atris, punctis duobus griseis.*

Habitat in Suratte Indiae. *Mus. Dom. Banks.*

*Magnus in hoc genere. Caput magnum, atrum, clypeo quadrato, integro. Maxillae corneae, porrectae, arcuatae, acutae. Antennae nigrae. Oculi testacei. Thorax obcordatus, postice attenuatus, niger, utrinque puncto magno griseo, piloso. Elytra connata, laevissima, atra, punctis duobus magnis pilosis, griseis. Pedes atri.*

*quadri-guttatus.* 5. *C. apterus, thorace postice attenuato, elytris sulcatis, atris: maculis duabus griseis remotis.*

Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Dom. Banks.*

*Statura et magnitudo C. 10 guttati. Antennae articulis undecim, filiformes. Caput magnum, atrum, fronte sulcis duabus impressa. Oculi testacei. Thorax canaliculatus, submarginatus, postice valde attenuatus, niger, tuberculis duabus magnis dorsalibus, piceis, et puncto parvo griseo utrinque ad marginem anticum. Elytra connata, sulcata, lineis elevatis carinatis, atra, maculis duabus parvis, griseis, altera ad basin, altera ad apicem. Corpus subitus atrum, abdomine basi utrinque impresso.*

6. C.

6. C. apterus, thorace postice angustato, ater, elytris rugoso-fulcatis. *tubidus.*

Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, at triplo minor. Antennae filiformes, nigrae, articulis undecimi. Caput magnum, atrum, fronte utrinque sulcato. Thorax cordatus, postice angustatus, lineisque duabus dorsalibus elevatis, quae tamen marginem anticum haud attingunt. Elytra connata, sulcata sulcis rugosis, atra, immaculata, postice ad suturam subacuminata. Corpus atrum.

7. C. apterus, niger, elytris laevibus, punctis aeneis, *hortensis.*  
excavatis, triplici serie. *Linn. Syst. Nat. II. 668. 3.*

*Fn. Sv. 783.*

*Stroem. Act. Nidros. 3. p. 401. tab. 6. fig. 7.*

Cerambyx purpurea, punctata. *Raj. Inf. 96. 2. List. mut. tab. 8. fig. 4.*

Habitat in Europae hortis et sylvis.

8. C. apterus, niger, elytris crenato-striatis, punctisque *calitus.*  
aureis, excavatis, triplici serie.

Habitat in America. *D. v. Kopr.*

Affinis C. hortensi, at elytra haud laevia, sed inter strias punctorum aureorum striae tres elevatae, crenatae. Antennae apice rufescentes.

9. C. apterus, elytris striatis, virescentibus, punctis *retusus.*  
aeneis, excavatis, triplici serie, basi retusis.

Habitat ad littora Patagoniae. *Mus. Dom. Banks.*

Summa affinitas C. hortensi. Antennae filiformes, fuscae, basi atrae. Caput virescens, ore atro. Thorax cordatus, viridis, basi utrinque impressus. Elytra crenato-striata, viridia, punctis aeneis, excavatis, triplici serie: basis elytrorum retusa. Corpus atrum.

10. C. apterus, ater, elytris basi retusis.

*Maderae.*

Habitat in Madera. *Mus. Dom. Banks.*

Summa affinitas et magnitudo praecedentis. Antennae filiformes, nigrae, apice fuscae. Thorax cordatus, basi utrinque impressus. Elytra vix striata, punctisque triplici serie viridibus minutissimis, impressa. Basis elytrorum retusa. Pedes nigri.

*convexus.* 11. *C. apterus*, ater, convexus, laevis, thorace postice emarginato.

Habitat in Germania.

*Corpus C. violaceo duplo minus, totum atrum, laeve.*

*auratus.* 12. *C. apterus*, elytris porcatis, laevibus, auratis, antennis pedibusque rufis.

*Carabus auratus apterus*, elytris porcatis: striis sulcis que laevibus, inauratis. *Linn. Syst. Nat.* II. 659. 7.  
*Fn. Sv.* 786.

*Buprestis viridis*, elytris obtuse sulcatis, non punctatis, pedibus antennisque ferrugineis. *Geoff. Ins.* I. 142. 2. tab. 2. fig. 5.

*Cerambyx dorso in longas regulas diviso; omnium pulcherrimus.* *Raj. Ins.* 96. 6.

*Schaeff. Icon.* tab. 51. fig. 1.

Habitat in locis suffocatis, sylvis.

*futuralis.* 13. *C. apterus*, elytris striatis, viridibus, sutura aurea.

Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*

*Statura C. aurati. Antennae fuscae, basi ferrugineae.*

*Caput viride, laeve, nitens, ore fusco. Thorax cordatus, viridis, margine aureo. Elytra substriata, viridia, striis tribus fere obsoletis punctorum convexorum ferrugineorum. Sutura aurea, nitens. Pectus virescens. Abdomen atrum. Pedes ferruginei, plantis nigris.*

*granula-*  
*tus.* 14. *C. apterus*, nigricans, elytris aeneis, striatis, interiectis punctis elevatis, longitudinalibus.

*Carabus granulatus apterus*, elytris longitudinaliter convexe punctatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 668. 2.  
*Fn. Sv.* 780.

Habitat in Europa.

*Nimis affinis C. clatrato, at elytra haud porcata five lineis tribus elevatis, sed striis plurimis exarata. Thorax postice emarginatus.*

*clatratus.* 15. *C. apterus*, nigricans, elytris aeneis porcatis, interiectis punctis excavatis longitudinalibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 669. 5. *Fn. Sv.* 782.

Habitat in Europa.

*Thorax obscure aeneus.*

16. C.

16. *C. apterus*, ater, elytris striatis, apice granulatis. *porcatus.*  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
 Medius. Antennae filiformes, nigrae. Thorax marginatus marginibus rotundatis, ater, immaculatus. Elytra nigra, striata, striis ad marginem exteriorem apicemque granulis elevatis, oblongis, interruptis. Corpus atrum, nitidum.
17. *C. apterus*, elytris porcatis, scabris, viridibus, margine aureo. *nitens.*  
*Carabus nitens apterus*, elytris porcatis: striis passim interruptis sulcisque scabriusculis inauratis. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 669. 6. *Fn. Sv.* 185.  
*Carabus nitens.* *Scop. carn.* 262.  
 Habitat in Europae sylvis.
18. *C. alatus*, elytris striatis, viridi-aeneis: punctis triplici ordine. *Inquisitor.*  
 Habitat in Europa.  
 Thorax lateribus rotundatus, postice integer.  
 Variat rarius elytris totis nigris.
19. *C. alatus*, elytris striatis, viridibus, punctis triplici *Scrutator.*  
 serie, thorace cyaneo: margine reflexo, inaurato.  
 Habitat in Virginia. *Mus. Dom. Banks.*  
 Simillimus praecedenti. Thorax violaceus, margine rotundato, subreflexo, aureo. Elytrorum margo aureus. Abdomen viride, aureo-maculatum.  
 Variat interdum ab domine toto violaceo.
20. *C. alatus*, violaceo-nitens, elytris aureis, striatis. *sycophanta.*  
*Carabus sycophanta* aureo-nitens, thorace coeruleo, *ta.*  
 elytris aureo-viridibus, striatis, abdomine subatro.  
*Linn. Syst. Nat.* II. 670. 12. *Mus. L. U.* 95. *Fn. Sv.* 790.  
*Buprestis nigro-violaceus*, elytris latis, aeneis, e viridi purpureis, singulo striis sexdecim. *Geoff. Ins.* I. 144. 5.  
*Reaum. Ins.* 2. tab. 37. fig. 18.  
*Rob. Icon.* tab. 20. fig. 2.  
*Schaeff. Elem.* tab. 2. fig. 1.  
 — — *Icon.* tab. 66. fig. 6.  
 Habitat in Europa.  
 Striae elytrorum crenatae.  
*Larva nigra* vicitat larvis Phalenaæ processionariae aliarumque.

*rostratus.* 21. *C. apterus*, elytris laevibus, nigris, thorace angustiori, capite angustissimo.

*Tenebrio rostratus apterus*, niger, elytris laevi scutulis, uniangulatis, thorace angustiore, capite angustissimo. *Linn. Syst. Nat.* II. 577. 20. *Fn. Sv.* 823.

Habitat in Europa.

Elytra deflexa, uti in *Tenebrionibus*.

*cephalotes.* 22. *C. apterus*, ater, laevissimus, thorace orbiculato, convexo.

*Carabus cephalotes apterus*, elytris atris, laevibus, thorace exerto, oblongo. *Linn. Syst. Nat.* II. 669. 9. *Fn. Sv.* 188.

*Scarabaens. Fisich. Ins.* 13. p. 25. tab. 22.

23. *Tenebrio gibbus apterus*, laevis, thorace orbiculato, convexo, antice truncato. *Linn. Syst. Nat.* II. 676. 18. *Fn. Sv.* 824.

Habitat in Europa.

Affinis *Scarites*.

*leucophtal-* 23. *C. apterus*, ater, elytris striatis.

*mus.* *Carabus leucophtalmus* elytris laevibus, striis obsoletis octo. *Linn. Syst. Nat.* II. 668. 4. *Fn. Sv.* 784.

*Buprestis ater*, elytro singulo striis octo laevibus, pedibus nigris. *Geoff. Ins.* I. 146. 7.

*Scarabaeus ex toto niger. List. Scar. Angl.* 390. 23.

Habitat in Europae quisquiliis.

\* \* *Minores.*

*striatulus.* 24. *C. niger*, thoracis basi utrinque punto impresso, elytris striatis, medio glabris.

Habitat in Patagoniae littoribus. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo *C. leucophtalmi*. Caput atrum, nitidum, lineola parva utrinque supra os impressum. Thorax cordatus, postice attenuatus, puncto utrinque impresso. Elytra striata striis mediis sensim abbreviatis, unde discus elytrorum glaber.

*caligino-* 25. *C. ater*, thorace quadrato, laevi, antennis piceis.

*sus.* Habitat in America. *Dom. Lewin.*

Major *C. leucophtalmi*. Corpus atrum, antennis piceis.

Thorax quadratus, planus. Elytra striata. Femora linea punctorum impressorum exarata. Digi

26. C.

26. *C. pallidus*, elytris maculis duabus dorsalibus atris. *arenarius.*  
 Habitat in arena mobili Cambriae. *Dom. Banks.*  
 Statura omnino *C. caliginosi*. Maxillae exsertae, pal-  
 lidae, apice nigrae. Caput pallidum, oculis testa-  
 ceis. Thorax obcordatus, antice posticeque trun-  
 catus, pallidus, inimaculatus. Elytra striata, pal-  
 lida, maculis duabus communibus angulatis, atris.  
 Pedes pallidi.
27. *C. ater*, elytris fulcatis, laevibus, antennis pedibus-  
 que rufis. *ruficornis.*  
*Buprestis niger*, elytro singulo striis octo laevibus,  
 pedibus ferrugineis. *Geoff. Inf. I. 146. 8.*  
*Scarabaeus niger*, pedibus corniculisque troceis. *Lister.*  
*Scar. Angl. 390. 24.*  
 Frequens in sylvis Europae.  
 Similis *C. leucophtalmo*, at paulo minor. Elytra  
 interdum colore fugaci-aureo nitent.
28. *C. supra niger*, subtus ferrugineus. *bicolor.*  
 Habitat in America. *Dom. Lewin.*  
 Statura et summa affinitas *C. ruficornis*, at corpus to-  
 tum subtus cum pedibus et antennis ferrugineum.  
 Elytra striata.
29. *C. thorace obcordato*, antennis tibiisque piceis, *piceus.*  
 elytris striatis.  
 Habitat in Europâ.  
 Pedes haud rufi, sed picei, femoribus nigris.
30. *C. capite thoraceque aeneis*, elytris striatis, obscu-*femoralis.*  
 ridibus, femoribus rufis.  
 Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mys. Dom. Banks.*  
 Magnitudo *C. ruficornis*. Caput aeneum, nitidum.  
 Antennæ filiformes, fuscae, articulo primo rufo.  
 Thorax aeneus, nitidus, utrinque lineola baseos  
 impressus. Elytra nigra, aeneo-splendentia; striata.  
 Corpus atrum, femoribus rufis.
31. *C. thorace postice utrinque impresso*, niger, femo-*madius.*  
 ribus rufis.  
 Habitat in Anglia: captus die VI. Maji in nemore  
 Richmondensi.

Statura et magnitudo C. leucophtalmi. Corpus atrum, quasi humore inunctum. Antennae apice fuscescentes. Thorax basi puncto majori utrinque excavatus. Abdomen obtusum.

Variat femoribus nigris; an distinctus?

*interrup-* 32. C. ater, thorace postice rotundato abdomineque *ptus.* remotis.

Habitat in Oriente. *Forstkähl.*

Minor C. leucophtalmo. Corpus totum atrum. Caput latitudine thoracis. Thorax antice emarginatus, postice rotundatus, ab abdomine remotus. Elytra striata.

*complanata-* 33. C. thorace orbiculato, rufus, elytris fasciis duabus *zus.* nigris.

Carabus complanatus pallidus, elytris fasciis duabus undulatis, nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 671. 17.

Habitat in St. Domingo.

Statura et magnitudo C. crepitantis. Caput prominens cum antennis rufum. Thorax rotundatus, canaliculatus, rufus, immaculatus. Elytra striata, truncata, rufa, fasciis duabus magnis undulatis, nigris.

*america-* 34. C. niger, thorace, pedibus antennisque ferrugineis. *nus.* Carabus americanus. *Linn. Syst. Nat.* II. 671. 19.

Habitat in America.

Affinis C. crepitanti, at quadruplo major et caput nigrum.

*crepitans.* 35. C. thorace, capite pedibusque ferrugineis, elytris nigris.

Carabus crepitans. *Linn. Syst. N.* II. 671. 18. *Fn. Sv.* 272.

Buprestis capite, thorace pedibusque rubris, elytris coeruleo-nigris. *Geoff. Ins.* I. 151. 19.

Cicindela capite, thorace pedibusque rufis, elytris nigro-coeruleis. *Roland. act. Holm.* 1750. p. 292. tab. 7. fig. 2.

*Schaeff. Icon.* tab. 10. fig. 13.

Habitat in Europae nemoribus.

36. C. niger, capite, thoracis maculis duabus elytris-  
que puncto baseos fascia media ferrugineis. *bimacula-*  
*tus.*  
Carabus bimaculatus niger, fascia communi t lava inter-  
rupta, antennis pedibusque testaceis. *Linn. Mant.* 532.  
Habitat in India orientali.  
Statura C. crepitantis, at paulo major. Caput cum  
antennis ferrugineum, maxillis maculaque verticis  
nigris. Thorax oblongus, niger, macula utrin-  
que magna ferruginea. Elytra striata, postice  
truncata, puncto parvo baseos et fascia lata in me-  
dio ferrugineis, quae tamen fascia futuram haud  
attингit. Apex elytrorum parum ferrugineus.  
Pedes ferruginei.
37. C. thorace orbiculato, cyaneus, ore, antennis tibiis-  
que rufis. *spinibar-*  
*bis.*  
Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*  
Statura C. cuprei. Differt ab hoc genere maxilla su-  
periori basi dilatata, et inferiori dorso spinis ciliato.  
Caput prominens, ore antennisque rufis.
38. C. thorace rotundato, elytris striatis punctisque im-  
pressis, antennis pilosis. *pilicornis.*  
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*  
Statura praecedentis. Antennae pilis longioribus hir-  
tae, ferrugineae, primo articulo aeneo. Thorax  
rotundatus, aeneus, postice utrinque impressus.  
Elytra aenea, striata, punctisque tribus impressis.  
Pedes rufi, femoribus nigris.  
Variat colore nigro et aeneo.
39. C. nigro-coeruleuscens, elytris striatis. *coerule-*  
*scens.*  
Carabus coeruleuscens nigro-coeruleus, antennis basi  
rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 672. 28. *Fn. Sv.* 800.  
*Schaeff. Icon. tab.* 18. fig. 3. 4.  
Habitat in Europa.  
Affinis C. vulgari.
40. C. cupreus, antennis basi rubris. *cupreus.*  
Carabus cupreus. *Linn. Syst. Nat.* II. 672. 29. *Fn. Sv.* 801.  
Buprestis totus viridi-cupreus, antennis nigris. *Geoff.*  
*Ins. I.* 161. 40.  
Habitat in Europae sylvis.  
Color exacte cupri fusi.

- Carnifex.* 41. C. alatus, viridi-aeneus, antennis pedibusque rufis, thorace angustato.  
 Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*  
 Parvus. Caput aeneum, nitens, ore antennisque ferrugineis. Thorax quadratus, antice posticeque truncatus, glaber, aeneus, postice utrinque impressus. Elytra aenea, striata, apice subretusa. Pedes omnes ferruginei.
- vulgaris.* 42. C. nigro-aeneus, pedibus antennisque nigris.  
 Carabus vulgaris. *Linn. Syst. Nat. II. 672. 27. Fn. Sv. 799. Scopoli carn. 268.*  
 Buprestis fusco-aeneus, elytris striatis, punctis quatuor impressis. *Geoff. Ins. I. 158.*  
*Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 2.*  
 Habitat in Europa.
- azureus.* 43. C. cyaneus, antennis pedibusque rubris.  
 Habitat in collibus arenosis Lipsiae.  
 Statura C. lati. Elytra striata.
- latus.* 44. C. niger, elytris striatis, crenatis, antennis pedibusque ferrugineis.  
 Carabus latus. *Linn. Syst. Nat. II. 672. 24.*  
 Habitat in Europa.  
 Affinis C. ruficorni, at duplo minor.
- lineola.* 45. C. thorace subaequali, ferrugineus, elytris linea-  
 la nigra.  
 Habitat in America septentrionali. *Mus. Dom. Banks.*  
 Statura et summa affinitas C. ferruginei. Elytra striata, thorace pallidiora, macula linearis nigra.
- ferrugi-  
neus.* 46. C. ferrugineus, elytris striatis, obscurioribus.  
 Carabus ferrugineus, thorace glaberrimo. *Linn. Syst. Nat. II. 672. 25. Fn. Sv. 798.*  
 Habitat in Europa.  
 Statura C. lati.
- pallens.* 47. C. pallidus, elytris striatis.  
 Habitat Dresdae.  
 Statura et magnitudo C. vulgaris. Totus pallidus.  
 Elytra striata.

48. *C. subaeneus*, elytris punctis vagis plurimis impressis. *Carabus multipunctatus*. *Linn. Syst. Nat.* II. 672. 32. *Fn. Sv.* 805. *Habitat in Europa.*
49. *C. ferrugineus*, thorace elytrisque aeneis. *aeneus.* *Habitat in Lipsiae hortis.* Statura et magnitudo *C. cuprei*. Caput cum antennis ferrugineum, oculis verticeque nigris. Thorax transversus, canaliculatus, aeneus, nitens. Elytra striata, aenea, nitida, immaculata. Subtus totus pallide ferrugineus.
50. *C. capite thoraceque viridibus, elytris cupreis.* *sex punctatus.* *Carabus sex punctatus subaeneus*, elytris punctis longitudinalibus sex impressis. *Linn. Syst. Nat.* II. 672. 35. *Fn. Sv.* 807. *Buprestis nitens*, capite thoraceque viridibus, elytris cupreis, punctatis. *Geoff. Inf.* I. 149. 14. *Goed. Inf.* 2. 126. tab. 31. *Habitat in Europa, America boreali.*
51. *C. viridis*, elytris, margine tibiisque testaceis. *marginatus.* *Carabus marginatus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 670. 16. *Fn. Sv.* 804. *Buprestis viridis*, pedibus elytrorumque margine exteriori pallidis. *Geoff. Inf.* I. 162. 41. *Habitat in Europa.* Variat colore nigro et viridi.
52. *C. niger*, thorace pedibusque ferrugineis. *melanocephalus.* *Carabus melanocephalus* thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque atris. *Linn. Syst. Nat.* II. 671. 22. *Fn. Sv.* 795. *Buprestis niger*, thorace, antennis pedibusque ferrugineis. *Geoff. Inf.* I. 162. 42. *Habitat in Europae suffocatis.* Variat antennis ferrugineis et fuscis.
53. *C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque cyaneis.* *cyanoccephalus.* *Carabus cyanoccephalus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 671. 21. *Fn. Sv.* 794.

Buprestis capite elytrisque coeruleis, thorace rubro.  
*Geoff. Ins.* I. 149.

Cantharis elytris et capite coeruleis, scapulis croceis.  
*Raj. Ins.* 89. I.

*Schaeff. Icon. tab. 10. fig. 14.*

Habitat in Europae sylvis.

*flexuosus.* 54. C. niger, elytris ferrugineis: macula media sinuata  
 punctoque apicis nigris.

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Parvus. Statura sequentis: corpore depresso. Thorax marginatus, niger, antice valde excisus pro receptione capitum. Scutellum nigrum. Elytra ferruginea, basi versus scutellum nigricantia; in medio macula flexuosa et postice puncto parvo nigris.

*crux ma-* 55. C. thorace orbiculato, rubro, coleoptris truncatis,  
*jar.* rubris, cruce nigra.

Carabus crux major thorace capiteque nigro, rubescente, coleoptris ferrugineis, cruce nigra. *Linn. Syst. Nat.* II. 673. 39.

Buprestis niger; thorace pedibusque rubris, elytris rubris, cruce nigra. *Geoff. Hist. Ins.* I. 150.

*Schaeff. Icon. tab. I. fig. 13.*

Habitat in Europae sylvis.

Antennae nigrae, basi rufae. Caput glabrum, atrum, nitens. Thorax glaber, rufus. Elytra apice truncata, abdomine paulo breviora, rufa, macula scutellari, fascia lata in medio, sutura et margine postico nigris.

*erux mi-* 56. C. thorace orbiculato, rufo, coleoptris apice nigris:  
*nor.* macula rufa.

Carabus crux minor thorace luteo, glabro, elytris postice nigris: maculis duabus flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 673. 40. *Fn. Sv.* 809.

*Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 8. et tab. 41. fig. 13.*

Habitat in Anglia. *D. Lee.*

Statura praecedentis, at paulo longior et angustior.

Caput atrum, nitidum. Thorax glaber, ruber, basi utrinque lineola parva impressa. Elytra striata, rufa, apice nigra, macula magna communis rufa. Abdomen atrum. Pedes toti rufi.

57. C. nigricans, antennis pedibusque pallidis, elytris *velox.*  
obtusissimis. *Linn. Syst. Nat. II. 672. 213. 31. Fn.*  
*Sv. 803.*

Habitat in Europae arena.

Elytra striata, obtusissima et fere truncata.

58. C. thorace rotundato, ferrugineus, vertice ano- *rufescens.*  
que nigris.

Habitat in Anglia. *Mus. D. Hunter.*

Parvus, totus ferrugineus, solo vertice capitinis ano-  
que nigris.

59. C. thorace orbiculato elytrisque nigris, maculis *2 pustula-*  
duabus rufis. *tus.*

Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*

Statura omnino et magnitudo C. crucis majoris. An-  
tennae thorace longiores, nigrae. Thorax rotun-  
datus, ater, villosus, punctatus. Elytra obtusa,  
crenato - striata, villosa, nigra, maculis duabus  
magnis rubris, quarum anterior major ad margi-  
nem exteriorem, posterior orbiculata.

60. C. thorace orbiculato, rufo, elytris flavis: maculis *lunatus.*  
tribus nigris.

Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*

Antennae nigrae, basi ferrugineae. Caput cyaneo-  
nigrum, nitens. Thorax orbiculatus, subcanalicu-  
latus, laevis, glaber, rufus. Elytra glabra, sub-  
striata, flava, puncto minori orbiculato ad basin  
et duobus majoribus margine exteriori connatis ad  
apicem. Abdomen atrum. Pedes rufi, femoribus  
apice nigris.

61. C. thorace, elytris antice margineque, antennis pe- *vaporar-*  
dibusque ferrugineis. *riorum.*

Carabus vaporariorum. *Linn. Syst. Nat. II. 671. 23.*  
*Fn. Sv. 796.*

Habitat in Europa.

62. C. niger, elytris antice pedibusque testaceis. *meridia-*  
Carabus meridianus. *Linn. Syst. Nat. II. 673. 36.* *nus.*

Habitat in Europá.

Parvus est, a C. vaporariorum diversissimus.

- Comma.** 63, C. niger, thorace fuscō, elytris griseis, macula linearī nigra.  
 Habitat in America, *Dom. Drury*,  
 Statura C. quadrimaculati. Caput atrum, nitidum.  
 Thorax orbiculatus, ferrugineo - fuscus. Elytra  
 striata, grisea, macula longā linearī nigra versus  
 futuram, Pedes pallidi,
- 4 macula-** 64. C. thorace ferrugineo, glabro, elytris obtusissimis,  
*tus.* fuscis; maculis duabus albis,  
 Carabus quadrimaculatus. *Linn. Syst. Nat.* II. 673. 40.  
*Fn. Sv.* 809.  
 Buprestis niger, thorace plano, ferrugineo, elytris  
 laevibus, maculis quatuor albis. *Geoff. Ins.* I. 152. 24.  
 Habitat in Europae quisquiliis,
- 4 gutta-** 65. C. thorace rotundato, atro, elytris nigris, punctis  
*tus.* quatuor albis,  
 Habitat in Anglia,  
 Differt manifeste a C. quadrimacula. Elytra haud  
 obtusa, thorax valde rotundatus, ater. Tibiae  
 pallidae,
- ustulatus,** 66. C. thorace nigro, elytris obscuris, pallido - bifasciatis,  
 Carabus ustulatus, *Linn. Syst. Nat.* II. 673. 38. *Fn.*  
*Sv.* 810.  
 Habitat in Europa,  
 Fascia postica undata,  
 Variat maculis magnis obsoletis, rubro - pallidis,
- atricapil-** 67. C. thorace rotundato, rufo, elytris obtusis, testaceis,  
*lus.* capite atro.  
 Carabus atricapillus flavus, capite nigro, elytris ob-  
 tussimis, *Linn. Syst. Nat.* II. 673. 42.  
 Habitat in Europa,
- testaceus,** 68. C. capite thoraceque ferrugineis, elytris testaceis,  
 Carabus testaceus pallide testaceus, elytris glabris,  
*Linn. Syst. Nat.* II. 673. 37. *Fn. Sv.* 812.  
 Buprestis testaceus, capite nigro. *Geoff. Ins.* I. 153. 25.  
 Habitat in Europa.  
 Magnitudo C. meridiani,

69. C. aeneus, antennis nigris, tibiis pallidis. *bipunctatus.*  
 Carabus bipunctatus subaeneus, elytris punctis duobus impressis. *Linn. Syst. Nat. II. 672. 33. Fn. Sv. 806.*  
 Habitat in Europa.  
 Minimus, vix duplo major pediculo.
68. SCARITES. *Palpi sex filiformes.*  
*Labium corneum, dentatum.*  
*Antennae moniliformes.*
1. S. ater, pedibus anticis palmato-digitatis, capite fulcato. *subterraneus.*  
 Habitat in America. *Dom. Lewin:*  
 Magnitudo Carabi leucophtalmi; totus ater. Caput porrectum, apice sulcis duobus exaratum. Antennae piceae, moniliformes, articulo primo longissimo. Thorax convexus, brevis, glaber, nitens, postice rotundatus. Elytra striata. Pedes antici femoribus validis, tibiis sex dentatis.
2. S. cyaneus, glaberrimus, antennis pedibusque nigris. *cyaneus.*  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
 Caput magnum, exsertum, cyaneum; fronte lineis duabus impressis. Maxillae exsertae, nigrae, dentatae. Antennae moniliformes, nigrae. Thorax canaliculatus, cyaneus, postice rotundatus. Elytra thorace addito capite breviora, connata, cyanea, glaberrima, basi retusa. Pedes nigri, tibiis anticis dentatis.
3. S. piceus, tibiis anticis palmato-digitatis. *arenarius.*  
 Tenebrio Fosfor. *Linn. Syst. Nat. II. 675. 7. Fn. Sv. 817.*  
 Habitat in Europae collibus arenosis.  
 Praecedenti quadruplo minor.
4. S. testaceus, thorace oblongo, angulis quinque denticulatis. *Cursor.*  
 Tenebrio Cursor. *Linn. Syst. Nat. II. 675. 8. Fn. Sv. 817.*  
 Habitat in Europa,

250 I. ELEVTERATA. Sepidium:

*Arabs.* 5. S. niger, thorace ferrato, antennis pedibusque testaceis.  
Habitat in Oriente. *Forskäbl.*

Statura et magnitudo S. cursoris, at duplo fere major.  
Antennae longitudine corporis. Elytra striata.

*clavicornis.* 6. S. piceus, antennis clavatis.

Tenebrio minutus alatus, niger, thorace marginato,  
antennis clavatis, pedibusque piceis. *Linn. Syst.  
Nat. II. 1675. 12.*

Habitat in Suecia.

Statura et magnitudo S. fossoris. Corpus oblongum,  
piccum. Thorax laevis, elytra striata.

69. SEPIDIVM. *Palpi filiformes.*

*Maxilla brevis, unidentata.*

*Labium corneum, breve,  
ad basin emarginatum.*

*Antennae filiformes.*

*tricuspidatum.* 1. S. thorace tricuspidato, corpore griseo.  
Habitat in Arabia. *Forskäbl.*

Magnitudo media: cinereum. Antennae articulis undecim cylindricis. Thorax gibbus, carinatus, dentibus tribus validis, obtusis, quorum alter in margine anteriore obtusior caput tegit. Elytra connata, obtusa, linea media lateralique elevatis, muricatis.

*cristatum.* 2. S. thorace tricuspidato, cristato, corpore variegato.  
Habitat in Aegypto. *Forskäbl.*

Affinis S. tricuspidato, at paulo minus. Caput planum, griseum. Thorax tricuspidatus, spina anterius cristata fissa, niger, lineis tribus albis. Elytra albo nigroque varia, lineis duabus carinatis, postice spinosis. Pedes grisei.

70. PIMELIA. *Palpi filiformes.**Maxilla unidentata.**Labium membranaceum,*  
rotundatum, subemarginatum.*Antennae filiformes.*

- 1.
- P. atra, glabra, elytris striis quatuor rufis.*

*striata.*

Habitat in Indiis.

Gibba, atra. Antennae nigrae, apice fuscae. Elytra connata, glabra, atra, striis quatuor obscure rufis, quae intra apicem coeunt. Pedes inermes, nigri.

- 2.
- P. atra, corpore muricato, hispido.*

*bispida.*Habitat in Arabia. *Forskäbl.*

Corpus obscure nigrum. Antennae hispidae, articulo secundo majori. Thorax rotundatus, pilosus. Elytra connata, punctis elevatis muricata, pilisque erectis hispida. Pedes inermes.

- 3.
- P. atra, elytris connatis, muricatis, pedibus longioribus.*
- longipes.*

Habitat in Aegypto. *Forskäbl.*

Thorax brevis, rotundatus, ater, glaber, canaliculatus. Elytra connata, gibba, atra, muricata. Pedes in primis postici elongati.

- 4.
- P. nigra, coleoptris obtusis: striis muricatis.*

*muricata.*Tenebrio muricatus. *Linn. Syst. Nat. II. 676. 17.*  
*Mus. L. Ulv. 100.*Tenebrio atra, aptera, rotundata, elytris fulcis tribus elevatis. *Geoff. Inf. I. 352?*

Habitat in Europa australi.

Statura P. hirsutae, at paulo minor.

- 5.
- P. atra, elytris scabris, antennis pedibusque fuscis.*

*scabra.*Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium. Caput atrum, antennis filiformibus, fuscis. Thorax gibbus, ater, glaber, laevis. Elytra atra, punctis parvis numerosis elevatis, scabra. Pedes omnes obscure fusi.

6. P.

- angulata.* 6. P. elytris spinosis, linea elevata laterali, ferrata.  
Habitat in Oriente. *Forskäbl.*  
Reliquis crassior, tota atra, nitens. Thorax rotundatus, lateribus scabris. Elytra connata, obtusa, spinis majoribus elevatis in tres series digestis. Inter has lineae quatuor spinarum minorum. Linea lateralis valde prominet ferrata.
- rugosa.* 7. P. thorace scabro, elytris rugosis, antice angustioribus.  
Habitat in Oriente. *Forskäbl.*  
Praecedentium statura, tota atra opaca. Thorax elytris angustior, rotundatus, immarginatus. Coleoptra connata, lineis tribus elevatis, et spatio interjecto rugoso. Basis elytrorum angustior.
- spinosa.* 8. P. thorace marginato, marginibus antice posticeque spinosis, elytris striis elevatis, laevibus.  
*Tenebrio spinosus.* *Linn. Syst. Nat. II. 677. 24. Mus. Lud. Ulr. 101.*  
Habitat in Europa australi, Oriente.  
Diversa facies a praecedentibus. Thorax valde marginatus, antice posticeque acuminatus.
- reflexa.* 9. P. thorace marginato, marginibus reflexis, elytris muriçatis: linea laterali carinata, laevi.  
Habitat in Oriente. *Forskäbl.*  
Statura et summa affinitas P. spinosae: tota atra. Thorax antice lunatus, lateribus valde marginatus. Elytra connata, striis duabus punctorum elevatorum et linea laterali valde carinata.
- carinata.* 10. P. nigra, thorace orbiculato, elytris lineis elevatis tribus, laevibus.  
Habitat in Gallia.  
Statura omnino P. spinosae: tota atra. Thorax rotundatus, lateribus gibbis. Elytra connata, striis tribus carinatis.
- collaris.* 11. P. nigra, elytris laevibus, uniangulatis, thorace angustiore, capite depressiusculo, carinato.  
*Tenebrio collaris apterus,* niger, elytris laeviusculis, uniangulatis, thorace angustiore, capite depressiusculo, carinato. *Linn. Syst. Nat. II. 677. 21.*  
Habi-

Habitat in Europa australi.

E geniculis oleum flavescens exsudat. Statura P.  
spinosae.

12. P. thorace rotundato, elytris glaberrimis. *glabra.*  
 Habitat in Oriente. *Forskähl.*  
 Similis P. rugosae, at duplo minor: tota atra, nitida.  
 Thorax rotundatus, laevis. Elytra connata, obtusa, glaberrima.
13. P. glabra, thorace postice angustato, elytris acuminatis. *angustata.*  
 Habitat in Oriente. *Forskähl.*  
 Statura P. glabrae: tota atra, glabra, nitida. Thorax  
 rotundatus, postice angustior. Elytra connata, acuminata, subtilissime punctato-striata.
14. P. glabra, thorace orbiculato, elytris acuminatis. *orbiculata.*  
 Habitat in Oriente. *Forskähl.*  
 Magnitudo et statura P. angustatae, tota atra, glabra.  
 Thorax elytris angustior, orbiculatus. Elytra connata, glaberrima, postice acutiuscula.

71. SCAURUS. *Palpi* inaequales, filiformes.  
*Maxilla* obconica, unidentata.  
*Labium* truncatum, integrum.  
*Antennae* moniliformes.

- I. Scaurus. *atratus.*  
 Habitat in Aegypto. *Forskähl.*  
 Media, tota atra, glabra, thorax suborbicularis, planus, punctatus, capite addito longitudine fere elytrorum. Elytra connata, obtusa, striato-punctata. Dens crassus, validus, alius versus apicem femorum et alius ad basem tibiarum pedum anteriorum.

72. BLAPS. *Palpi quatuor clavati.*  
*Maxilla recta, bifida.*  
*Labium membranaceum, fisi-*  
*sum.*  
*Antennae apice moniliformes.*

*Gigas.* 1. B. nigra, thorace rotundato, elytris laevibus, obtusis.  
*Tenebrio Gigas.* *Linn. Syst. Nat.* II. 676. 14.

Habitat in Europa australi.

Simillima B. mortisagae, at paulo major. Thorax  
 magis rotundatus, elevatus, laevissimus. Elytra  
 obtusa, absque punctis et striis.

*fulcata.* 2. B. coleoptris mucronatis, sulcatis.  
 Habitat in Oriente. *D. Prof. Forskäh.*

Statura et color omnino B. mortisagae, at duplo fere  
 major. Elytra connata, mucronata, sulcis octo v.  
 novem laevibus exarata.

*mortisaga.* 3. B. atra, coleoptris mucronatis, laevibus.  
*Tenebrio mortisaga aptera,* thorace aequali, co-  
 leoptris laevibus, mucronatis. *Linn. Syst. Nat.* II.  
 676. 15. *Fn. Sv.* 822.

*Tenebrio atra, aptera, coleoptris laevibus, pone*  
*acuminatis.* *Geoff. Inf.* I. 346.

*Scarabaeus major totus niger, abdome longo, elytris*  
*veluti caudatis.* *Raj. Inf.* 90. 12.

*Scarabaeus ex toto niger, minime nitens, foetidus.*  
*Lister. Scar. Angl.* 388. 21.

*Frisch. Inf.* 13. tab. 25.

*Scarabaeus impennis, tardipes.* *Petiv. Gazoph.* tab.  
 24. fig. 7.

*Blatta foetida.* *Mouff. Inf.* 139.

*Schaeff. Icon.* tab. 37. fig. 6. et tab. 60. fig. 13.  
 Habitat in Europae umbrosis, suffocatis.

*excavata.* 4. B. thorace postice angulato, elytris excavato-puncta-  
 tis, acutiusculis.

*Petiv. Gazoph.* tab. 92. fig. 14.

*Ait. Angl.* 271. 861. 13.

*Habitat Madraspatario.* *Mus. Brit.*

B. inor.

**B.** mortisagae minor et planior. Thorax laevis, ater, marginatus, postice subsinuatus, angulis acutis. Elytra atra, punctis late excavatis striata.

**73. TENEBRIÖ.** *Palpi* quatuor inaequales, anteriores subclavati, posteriores filiformes.

*Maxilla* bifida.

*Labium* truncatum, cornuum, integrum.

*Antennae* moniliformes.

**1.** *T.* ater, glaber, elytris striatis, tibiis posticis ferratis. *serratus.*  
Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Dom. Banks.*

Duplo major *T. molitori*. Antennæ moniliformes, extrorsum subcrassiores. Caput magnuni, exsertum, atrum, basi attenuatum. Thorax ater, glaber, nitens. Elytra atra, striata. Pedes atri, femoribus canaliculatis. Tibiae posticae, incurvae, clavatae, intus ferratae.

**2.** *T. oblongus*, piceus, elytris striatis. *Molitor.*

*Tenebrio molitor* alatus, niger totus, femoribus anticus crassioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 674. 2. *Fn. Sv.* 875. *Scop. carn.* 259.

*Tenebrio atra*, oblonga, elytris striis novem laevibus.

*Geoff. Inf.* I. 349. 6.

*Frisch. Inf.* 4. p. 1. tab. 3.

*Sulz. Inf.* 7. fig. 52.

*Vermis farinarius.* *Raj. Inf.* p. 4. larva.

*Schaeff. Icon.* tab. 66. fig. 1.

Habitat in farina pistorum, pane sicco.

Larva alba, mollis; lusciniarum gratissimus cibus.

**3.** *T. violaceus*, antennis pedibusque piceis. *Linn. Syst. chalybeus.*  
*Nat.* II. 674. 3.

Habitat in Guinea.

Affinis *T. molitori*.

4. *T.*

- arratus.* 4. T. oblongus, ater, elytris sulcatis, acutiusculis.  
 Habitat in America meridionali. *Muf. Brit.*  
 Affinis praecedentibus: totus ater. Thorax marginatus, rotundatus, angulis anticis rotundatis, posticis acutis. Elytra crenato-striata.
- abbreviat-*  
*tus.* 5. T. ovatus, ater, elytris striatis, capite tuberculato.  
 Habitat in India. *Muf. Brit.*  
 Statura T. atrati, at duplo brevior. Thorax parum marginatus, laevis, glaber, angulis rotundatis. Tuberculum parvum, elevatum, utrinque in clypeo capitis rotundatum. Ultimus antennarum articulus globosus. Elytra crenato-striata.
- cornutus.* 6. T. thoracis marginibus crenatis angulisque prominulis, thorace bicorni.  
 Habitat Smirnae. *Dom. Drury.*  
 Statura T. molitoris, at duplo major. Antennae moniliformes. Caput cornubus duobus recurvis, apice refractis, longitudine capitis; dente utrinque parvo ante oculos. Thorax submarginatus margine crenato, antice retusus, angulis prominentibus. Elytra striata, picea. Femora antica crassiora tibiis, apice lamina orbiculata, prominente.
- sanguini-*  
*pes.* 7. T. ater, antennis pedibusque sanguineis.  
 Habitat in nova Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*  
 Duplo minor T. molitore. Caput obtusum, atrum, nitidum, antennis moniliformibus, extrorsum crassioribus. Thorax ater, glaber, nitens. Elytra atra, striata. Pedes sanguinei, tibiis quatuor anticis extus ferratis.
- caraboi-*  
*des.* 8. T. niger, thorace ovali marginato, elytris striatis.  
 Tenebrio caraboides. *Linn. Syst. Nat. II. 677. 25.*  
*Fn. Sv. 825.*  
 Platycerus fuscus, elytris striatis. *Geff. Inf. I. 64. 5.*  
 Habitat in Europa.

74. HELOPS. *Palpi* quatuor; anteriores securiformes, posteriores clavati.

*Labium* corneum, integrum.  
*Antennae* moniliformes.

1. *H. coerulescens*, thorace suborbiculato, elytris striatis. *coeruleus.*

*Tenebrio coeruleus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 677. 19.  
*Mus. Lud. Ulv.* 98.

*List. Angl. app.* 4. fig. 14.

*Petiv. Gazoph. tab.* 22. fig. 6.

Habitat in Europa australi.

Antennae pedesque nigrae.

2. *H. aeneus*, elytris striatis, acuminatis.

*lanipes.*

*Tenebrio nigro-cuprea* elytro singulo striis octo,  
coleoptris pone acuminatis. *Geoff. Ins.* I. 349. 5.

*Tenebrio aeneus.* *Scopoli Ent.* 255.

*Tenebrio lanipes* alatus, aeneus, elytris subbisido-mucronatis, plantis subtus hirsutis. *Linn. Mant.*  
I. 533.

Habitat in Germania.

Obscure aeneus. Antennae nigrae. Thorax quadratus. Elytra striata terminantur acumine.

3. *H. niger*, digitis ferrugineis, palpis porrectis.

*serratus.*

Habitat in Anglia.

Corpus oblongum, magnitudine *H. aenei*. Thorax planus, puncto baseos utrinque impresso. Elytra substriata, obtusa, paulo aeneo colore tincta.

4. *H. ater*, elytris fascia abbreviata, aurea.

*equestris.*

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Antennae nigrae, filiformes, articulis obconicis. Palpi anteriores porrecti, securiformes. Thorax rotundatus, gibbus, pubescens, ater, immaculatus. Elytra pubescens, laevia, atra: ante medium fascia aurea, quae tamen suturam haud attingit. Pedes nigri, inermes.

*rufipes.* 5. H. niger, elytris, antennis pedibusque ferrugineis.  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
Minor H. lanipede. Caput nigrum, obscurum, an-  
tennis filiformibus, ferrugineis. Thorax niger,  
mirime nitens, postice utrinque punctis duobus  
impressis. Elytra striata, ferruginea. Corpus ni-  
grum. Pedes ferruginei.

*Juridus.* 6. H. niger, pedibus fuscis.  
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*  
Statura et magnitudo praecedentis. Antennae filiformes, fuscae. Caput et thorax obscure nigra, mi-  
nime nitida, thoracis basi punto parvo utrinque  
impresso. Elytra striata. Pedes fuscii.

*ater.* 7. H. ater, elytris striatis.  
Habitat Lipsiae.  
Thorax antice rotundatus, postice truncatus. Elytra  
striata.

*quisqui-  
lius.* 8. H. niger, antennis pedibusque ferrugineis.  
Tenebrio quisquilius, niger, ore pedibus ferrugineis.  
*Linn. Syst. Nat. II. 676. 13. Fn. Sv. 821.*  
Habitat in Europae quisquiliis.  
Subtus totus ferrugineus.

*glaber.* 9. H. ater, laevis.  
Habitat in Europae quisquiliis.  
Minor H. quisquilio, totus ater, glaber, laevissimus.

75. ERODIVS. *Palpi quatuor filiformes.*  
*Maxilla cornea, bifida,*  
*truncata, obtusa.*  
*Labium corneum, emar-*  
*ginatum.*  
*Antennae moniliformes.*

*gibbus.* 1. E. gibbus ater, elytris lineis elevatis tribus.  
Habitat in Arabia. *Forskäbl.*  
Medius, valde gibbus, ater. Thorax rotundatus,  
ater, margine anteriore pilis flavescentibus, ciliatus.  
Elytra connata, obtusa, lineis tribus elevatis, lae-  
vibus. Tibiae anticae dente medio apicisque valido.  
2. E.

2. *E. ater*, elytris linea elevata, unica. *planus.*  
*Habitat in Arabia. Forskähl.*  
*E gibbo duplo minor, totus ater. Elytra connata,*  
*linea dorsali elevata. Pedes inermes.*
3. *E. ater*, elytris laevissimis. *minutus.*  
*Habitat in Oriente. Forskähl.*  
*Reliquis multo minor, totus ater, glaberrimus. Tho-*  
*rax dorso punctis duobus impressis. Elytra connata.*  
*Pedes inermes.*

76. MELOE. *Palpi* subfiliformes.  
*Maxilla recta bifida.*  
*Labium corneum, emarginatum.*  
*Antennae moniliformes.*

1. *M. corpore violaceo.* *Linn. Syst. Nat.* II. 679. 1. *Proscarabaeus.*  
*Fn. Sv. 826.* *Meloe. Geoff. Inf.* I. 377.  
*Scarabaeus mollis, e nigra viola nitens. Lister. Scar.*  
*Angl. 392. 27.*  
*Proscarabaeus. Monuff. Inf.* 162. fig. med.  
*Proscarabaei foemina. Ionst. Inf.* p. 74. tab. 14.  
*Vermis majalis. Clut. hemerob.* 81. 73.  
*Frisch. Inf.* 6. tab. 6. fig. 5.  
*Hoeffnag. Inf.* 2. tab. 9.  
*Schaeff. Icon.* tab. 3. fig. 5.  
*Habitat in Europae campis apricis, arenosis.*  
*Tactus oleum limpidissimum flavicans et poris praec-*  
*fertim geniculis pedum exsudat.*  
*Ova suave orentia. Lister.*

2. *M. segmentis dorsalibus, abdominis rubris.* *Linn. Syst. majalis.*  
*Nat.* II. 679. 2.  
*Proscarabaeus alter. Frisch. Inf.* 6. tab. 6. fig. 4.  
*Schaeff. Icon.* tab. 3. fig. 6.  
*Habitat in Europa australi.*  
*Affinis praecedenti.*

**77. LYTTA.** *Palpi* quatuor; postice clavati.

*Maxilla* bifida.

*Labium* truncatum.

*Antennae* filiformes.

- vesicato-  
ria.** 1. L. viridis, antennis nigris.  
Meloe vesicatorius alatus, viridissimus, nitens, antennis nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 679. 3. *Fn. Sv.* 827. *Scop. carn.* 185.  
Cantharis viridi-aurata, antennis nigris. *Geoff. Ins.* I. 341. 1. tab. 6. fig. 5.  
Cantharis vulgaris officinarum. *Raj. Ins.* I. 341. *Mouff. Ins.* 144.  
*Ions. Ins.* 76. tab. 7.  
*Schaeff. Icon.* tab. 47. fig. 1.  
Habitat in ligistro, fraxino, sambuco, syringa.  
Officinalis pro Vesicatorio.
- margina-  
ta.** 2. L. atra, elytrorum marginibus cinerascentibus.  
Habitat ad C. B. S.  
Simillima praecedenti, at duplo fere minor, supra tota atra, opaca, subtus et margo elytrorum exterior pubescens, cinerea.
- vittata.** 3. L. elytris nigris: marginibus vittaue flavis.  
Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*  
Statura exacte praecedentis. Caput flavescens, vertice maculis duabus nigris. Thorax niger, lineis tribus flavis. Elytra nigra, margine omni vittaue media flavis. Abdomen et pedes nigra.
- atrata.** 4. L. atra, immaculata.  
Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*  
Statura omnino praecedentis, at duplo minor et tota atra.
- afer.** 5. L. nigra, thorace rufo.  
Meloe afer alatus, niger, thorace rufo. *Linn. Syst. Nat.* II. 680. 10.  
Habitat in Africa.  
Affinis L. atratae, at thorax totus rufus.

78. MYLABRIS. *Palpi filiformes.*

*Maxilla cornea, compressa, bifida.*

*Labium membranaceum, subemarginatum.*

*Antennae moniliformes.*

1. *M. nigra, elytris fascia media flava.*

*fasciata.*

Habitat in Indiis. *Dom. Torstensen.*

Statura M. cichorei, at major. Caput nigrum, oculis testaceis. Thorax niger, macula utrinque marginali ferruginea. Elytra nigra, fascia media lata, lutea. Alae hyalinae, costa venisque ferrugineis.

2. *M. nigra, elytris flavis, fasciis tribus nigris.*

*cichorei.*

Meloe cichorei alatus, niger, thorace hirsuto, elytris fasciis tribus flavis, antennis clavatis. *Linn. Syst. Nat. 11. 680. 5. Mus. Lud. Ulv 103.*

*Chrysomela cichorei. Hasselqu. Itin. 410. 101.*

*Cantharis fasciata. Imperat. nat. 78.*

Habitat in totius Orientis cichoreis.

Officinalis in China.

Variat antennis apice flavis et totis nigris.

3. *M. nigra, elytris maculis sex flavis, prima arcuata.*

*capensis.*

Meloe capensis alatus, niger, elytris maculis sex flavis, prima arcuata, antennis clavatis. *Linn. Syst. Nat. 11. 180. 7. Mus. Lud. Ulv. 104.*

Habitat ad Cap. B. Sp.

Nimis affinis M. cichorei, quamvis duplo minor.

4. *M. nigra, coleoptris flavis, fascia punctoque communis fusca.*

*3 maculata.*

Habitat in Oriente. *Forstkahl.*

Statura praecedentis, at quadruplo minor, tota atra, laevis. Coleoptra flava, macula communis in medio dorso et fascia postica fusca, quae tamen marginem exteriorem haud attingit.

79. CEROCOMA. *Palpi aequales, filiformes.*  
*Maxilla inferior linearis,*  
*integra.*  
*Labium inferius membranaceum, bifidum.*  
*Antennae moniliformes,*  
*irregulares.*

*Schaefferi.* 1. Cerocoma.

Meloe Schaefferi alatus, viridis, pedibus luteis, antennis mari abbreviatis, clavatis, brevibus, irregulibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 681. 12.

Cerocoma. *Geoff. Ins.* I. p. 358. n. 1.

*Schaeff. Elem.* tab. 37.

— — *Icon.* tab. 53. fig. 8. 9.

Habitat in Europa australi.

Facies omnino Meloe vesicatorii, sed duplo minor: elytra flexilia, pilosa. Antennae vere moniliformes, ultimo articulo majori.

80. MORDELLA. *Palpi quatuor, anteriores clavati, posteriores filiformes.*

*Maxilla bifida.*

*Labium membranaceum,*  
*bifidum.*

*Antennae moniliformes.*

*ferruginea.* 1. M. antennis pectinatis, rufa, pectore, ano pedibusque nigris.

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Statura omnino M. paradoxae. Antennae nigrae, pectinatae. Corpus ferrugineum, solo pectore, ano et pedibus nigris. Elytra acuminata, alae fuscae.

*paradoxa.* 2. M. antennis pectinatis, thoracis lateribus elytrisque testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 682. I. *Fn. Sv.* 831.

Habitat in Europa.

Reliquis major: proprii forte generis.

3. *M. antennis pectinatis, rufa, elytris nigris.* *pectinata.*  
*Habitat in America. Dom. Drury.*
- Statura et summa affinitas M. paradoxae. Antennae fasciculato - pectinatae, nigrae. Caput magnum, rufum, oculis nigris. Thorax antice angustatus, glaber, rufus, postice loco scutelli acuminatus. Elytra attenuata, nigra, a basi ad medium litura cinerea. Alae nigrae. Abdomen breve, gibbum, rufum, testum utrinque squama baseos ovata. Pedes rufi, geniculis nigris.*
- Conveniunt haec et M. paradoxae et M. ferruginea habitu et structura cum hoc genere. Differunt antennis. Forte distinctum genus, mihi haud rite notum.*
4. *M. atra, thorace ferrugineo, elytris testaceis: maculis sex maculata.*  
*Habitat in America. Mus. D. Hunter.*  
*Corpus magnum. Caput nigrum, fronte elevata, ferruginea. Antennae vix pectinatae. Thorax obscure ferrugineus. Elytra testacea, maculis tribus nigris, altera baseos, altera media et tertia apicis. Abdomen et pedes atra, tibiis piceis.*
5. *M. ano aculeato, corpore atro, immaculato.* *aculeata.*  
*Mordella aculeata atra, ano spina terminato. Linn.*  
*Syst. Nut. II. 682. 2. Fn. Sv. 832.*  
*Mordella atro-caudata, unicolor. Geoff. Inf. I. 353. 1.*  
*Mordella. Schaeff. Elem. tab. 84.*  
*Sulz. Inf. tab. 7. fig. 46.*  
*Habitat in floribus semiflosculosis, umbellatis Europae frequens.*
6. *M. ano aculeato, nigra, elytris fasciis duabus cinereis.* *fasciata.*  
*Mordella atra, caudata, fasciis villoso-aureis. Geoff.*  
*Inf. I. 354. 2.*  
*Habitat in Europae australioris floribus.*  
*Simillima praecedenti, cum qua etiam conjunxit celeb. Linné. Differt tamen elytris basi fascia que media villoso-cinereis, nitentibus.*
7. *M. ano aculeato, elytris nigris, punctis quatuor flavis, primo lunato.* *3 punctata.*  
*Habitat in America septentrionali. Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino praecedentium. Caput fuscum. Thorax villoso-flavescens, antice punctis quatuor, postice strigis undatis, fuscis. Elytra atra, truncata, punctis quatuor flavis, quorum primum baseos lunatum. Corpus griseum, ano aculeo atro.

*abdominalis.* 8. M. ano aculeato, nigra, thorace abdomineque fulvis. Habitat in Germania. *D. v. Hattorf.*

Statura omnino praecedentium. Caput, pectus, elytra, spina analis, pedes atra. Thorax et abdomen fulva, immaculata, nitida.

*humeralis.* 9. M. atra, ore, lateribus thoracis pedibusque flavis.

Mordella humeralis atra, lateribus thoracis baseosque elytrorum flavescens. *Linn. Syst. Nat. II. 682. 3.*  
*Fn. Sv. 833?*

Habitat in Europae floribus.

*frontalis.* 10. M. atra, fronte pedibusque flavescens. *Linn. Syst. Nat. II. 682. 4.* *Fn. Sv. 834.*

Habitat in Europae floribus.

*thoracica.* 11. M. atra, capite thoraceque flavis. *Linn. Syst. Nat. II. 682. 5.* *Fn. Sv. 835.*

Habitat in Europa.

*flava.* 12. M. flava, elytrorum apicibus nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 682. 6.* *Fn. Sv. 836.*

Habitat in floribus umbellatorum frequens.

## 81. STAPHYLINYS. *Palpi filiformes.*

*Maxilla unidentata.*

*Labium membranaceum,*  
trifidum.

*Antennae moniliformes.*

*hirtus.* 1. S. hirsutus, niger, thorace abdomineque postice flavis. *Linn. Syst. Nat. II. 683. 1.* *Fn. Sv. 839.*

Staphylinus niger villosus, capite, thorace quoque pilis fulvo-aureis. *Geoff. Inf. I. 363. 7.*

*Schaeff. monogr. 1754. tab. 2. fig. 12.*

— — *Icon. tab. 36. fig. 6.*

Habitat in locis arenosis Europae.

I. ELEVTERATA. *Staphylinus.* 265

2. *S. pubescens*, cinereus, nigro-nebulosus. *Linn. Syst. murinus.*  
*Nat.* II. 683. 2. *Fn. Sv.* 840.  
*Schaeff. Icon.* tab. 4. fig. 11.  
 Habitat in cadaveribus, fimo.  
 Elytra subtus coerulea.
3. *S. pubescens*, niger, fasciis cinereis. *Linn. Syst. Nat.* *maxillo-*  
 II. 683. 3. *Fn. Sv.* 841.  
*Staphylinus ater* extremo antennarum articulo lunu-  
 lato. *Geoff. Inf.* I. 360. 1. tab. 7. fig. 1.  
*Staphylinus major* totus niger. *Raj. Inf.* 109. 1.  
*Scarabaeus majusculus* niger, forcipibus infestis.  
*Lst. loqu.* 391.  
*Ionst. Inf.* tab. 17. fig. 1. 2. 3.  
*Bocc. Minf.* 2. tab. 31. fig. A. A.  
*Schaeff. Icon.* tab. 20. fig. 1.  
 Habitat in Europae sylvis, viettans rapina.  
 Adultior totus ater, glaber evadit.
4. *S. ater*, nitidus, capite utrinque macula fulva. *oculatus.*  
 Habitat in nova Hollandia et Zelandia. *Muf. D. Banks.*  
 Magnitudo *S. erythropteri*. Totus ater, glaber, ni-  
 tens; capite utrinque macula magna fulva, quae  
 subtus fasciam constituit.
5. *S. ater*, elytris, antennis pedibusque rufis. *Linn. Syst. erythro-*  
*Nat.* II. 683. 4. *Fn. Sv.* 842. *Scop. carn.* 306. *pterus.*  
*Staphylinus ater*, non nitens, elytris pedibusque rufis.  
*Geoff. Inf.* I. 364. 9.  
*Scarabaeus rapax* elytris brevibus. *Frisch. Inf.* 5. 49.  
 tab. 25.  
*Stroem. Act. Nidros.* 3. p. 404. tab. 5. fig. 8.  
*Schaeff. Icon.* tab. 2. fig. 2.  
 — — *Elem.* tab. 117.  
 Habitat saepius in fimo.
6. *S. ater*, capite rufo, elytris violaceis. *erythroce-*  
 Habitat in nova Hollandia. *Muf. Dom. Banks.* *phalus.*  
 Magnitudo *S. politi*. Antennae moniliformes, nigrae.  
 Caput magnum, rufum, ore punctoque frontali  
 nigris. Thorax glaber, nitidus, ater, margine an-  
 tico in medio rufo. Scutellum atrum. Elytra cyanea.  
 Abdomen et pedes atra.

- politus.* 7. S. niger, thorace elytrisque nitidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 683. 5. *Fn. Sv.* 843. *Scop. carn.* 304.  
*Schaeff. Icon.* tab. 39. fig. 12.  
 Habitat in Europae cadaveribus.  
 Recens odorem spargit ambrosiacum.
- margina-* 8. S. ater, thoracis lateribus pedibusque flavis.  
*sus.* Habitat in Anglia: captus die 11. Maj. in horto Musæ Brittannici.  
 Statura et magnitudo S. politi, at paulo minor. Totus ater, glaber, nitens, at thoracis latera et pedes omnes flavescunt.
- flavescens.* 9. S. ater, pedibus rufis, elytrorum margine flavo. *Linn. Syst. Nat.* II. 684. 13. *Fn. Sv.* 850.  
 Habitat in Europa.  
 Statura praecedentis.
- obtusus.* 10. S. testaceus, elytris antice anoque nigris.  
 Staphylinus obtusus testaceus, elytris antice fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 684. 9.  
 Habitat in Germania, Anglia.
- pustula-* 11. S. niger, elytris punto ferrugineo. *Linn. Syst. Nat.* II. 685. 16. *Fn. Sv.* 847.  
*tus.* Habitat in Europa.
- fuscipes.* 12. S. ater, elytris pedibusque testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 685. 23. *Fn. Sv.* 857.  
 Habitat in Europa.  
 Parvus, brevis et crassus, ater, nitidus, elytris pedibusque testaceis.
- bypuorum.* 13. S. ater, laevis, thoracis lateribus, elytris pedibusque testaceis.  
 Habitat in Anglia.  
 Statura S. fuscipedis, at paulo minor. Ater, glaber, laevis, nitens. Thoracis latera in primis basi testacea. Elytra testacea, immaculata, scutello tamen nigro.
- merda-* 14. S. ater, thorace, elytris pedibusque rufis.  
*rius.* Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*  
 Parvus. Antennæ ferrugineæ, apicē fuscae. Caput atrum. Thorax rufus, scutellum nigrum. Elytra rufa. Abdomen nigrum.

15. *S. thorace rufo, elytris fuscis, puncto baseos marginique postico albis.* *atricapilus.*
- Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
- Parvus. Antennae extrorsum crassiores, apice fuscae, ultimo articulo ferrugineo. Caput atrum, nitidum. Thorax rufus, glaber, immaculatus. Elytra fusca, puncto baseos marginique postico albis. Abdomen ferrugineum, apice fuscum.*
16. *S. niger, thorace, elytris pedibusque testaceis.* *Linn. chrysomeloides.*  
*Syst. Nat. II. 685. 21. Fn. Sv. 855. Geoff. Ins. I. 368. 18. linus.*
- Habitat in Europa.
17. *S. ater, glaber, pedibus rufis.* *Linn. Syst. Nat. II. rufipes.*  
*685. 24. Fn. Sv. 858.*
- Staphylinus niger, thorace marginato, laevi, pedibus rufis.* *Geoff. Ins. I. 367.*
- Habitat in Europa.
- Variat colore omnino testaceo et nigro, pedibus testaceis.
18. *S. flavus, immaculatus.* *Linn. Syst. Nat. II. 685. 20. caraboides.*  
*Fn. Sv. 854.*
- Habitat in Europa.
19. *S. niger, thorace elytrisque rugosis.* *rugosus.*
- Habitat in Anglia.
- Valde affinis *S. piceo*, at paulo major: totus niger. Caput planum. Thorax depresso, longitudinaliter rugosus. Elytra rugosa, nigra. Pedes nigri. Variat elytris testaceis.
20. *S. niger, thorace depresso, lineis elevatis tribus, elytris piceis.* *Linn. Syst. Nat. II. 686. 25. picens.*
- Habitat in Europa.
22. **OXYPORVS.** *Palpi inaequales, anteriores filiformes, posteriores securiformes.*  
*Labium emarginatum cum mucrone.*  
*Antennae moniliformes.*
23. *O. rufus, capite, elytrorum abdominisque posticis nigris.* *rufus.*  
*Staphylinus rufus. Linn. Syst. Nat. II. 684. 6. Fn. Sv. 844.*  
*Staphy-*

268 I. ELEVTERATA. *Oxyporus. Paederus.*

*Staphylinus flavus capite, elytris abdomineque postice nigris.* *Geoff. Ins.* 1. 370. 22.

*Staphylinus pallide rufus, elytris coerulecentibus, capite et apice abdominalis nigris.* *Gadd. sat.* 80.

*Schaeff. Icon.* tab. 35. fig. 3.

Habitat in Europa.

*lunulatus.* 2. *O. flavus, elytris nigris: basi apiceque pallidis.*

*Staphylinus lunulatus rufus, capite abdominalis elytrorumque posticis nigris, femoribus totis rufis.* *Linn. Syst. Nat.* 11. 689. 7. *Fn. Sv.* 845.

Habitat in Europa.

Caput et abdominalis apex nigra.

*flavipes.* 3. *O. niger, elytris tibiisque fuscis.*

*Staphylinus flavipes.* *Linn. Syst. Nat.* 11. 685. 22. *Fn. Sv.* 856.

Habitat in Europa.

83. PAEDERVS. *Palpi inaequales,*  
*anteriores clavati,*  
*posteriores filiformes.*  
*Labium lineare, integrum.*  
*Antennae moniliformes.*

*riparius.* 1. *P. rufus, elytris coeruleis, capite abdominalisque apice nigris.*

*Staphylinus riparius.* *Linn. Syst. Nat.* 11. 684. 8. *Fn. Sv.* 846. *Geoff. Ins.* 1. 369. 21.


*Staphylinus gregarius.* *Scop. carn.* 308.

*Schaeff. Icon.* tab. 71. fig. 3.

Habitat in Europa.

*elongatus.* 2. *P. niger, elytris postice pedibusque fulvis.*

*Staphylinus elongatus.* *Linn. Syst. Nat.* 11. 685. 14.  
Habitat in Europa.



---

## II. V L O N A T A.

*Os palpis quatuor.*

*Maxilla inferior galeata.*

---

### 84. FORFICULA. *Palpi filiformes.*

*Labium trifidum.*

*Antennae setaceae.*

1. F. elytris apice albis, antennis 14 articulatis. *Linn.* *auricula-*  
*Syst. Nat.* II. 686. 1. *Fn. Sv.* 860. *Geoff. Inf.* I. 375.  
*Scop. carn.* 312. *ria.*

*Scarabaeus*, *subrufus*, *cauda furcata*. *Lister. Scar.*  
*Angl.* 391. 25.

*Vermis auricularius*. *Frisch. Inf.* 8. p. 31. tab. 15.  
 fig. 1. 2.

*Forficula* f. *auricularia vulgaris*. *Mouff. Inf.* 171. fig. inf.

*Forficula*. *Ionst. Inf.* tab. 16. fig. 2.

*Forficula vulgaris*. *Petiv. Gazoph.* tab. 74. fig. 5.

*Merian. Inf.* tab. 30.

*Sulz. Inf.* tab. 7. fig. 50.

*Schaeff. Elem.* tab. 63.

Habitat in Europa.

2. F. elytris testaceis, immaculatis, antennis 10 articu-  
 latis. *Linn. Syst. Nat.* II. 686. 2. *Fn. Sv.* 861. *minor.*  
*Geoff. Inf.* I. 376.

Habitat in Europa.

Antennarum apex albicat.

3. F. forcipe flexuosa, elytris punctis duobus flavis. *flexuosa.*  
 Habitat Cajennae. *D. Mauduit.*  
 Corpus magnitudine F. auriculariae, fuscum. Forceps  
 flexuosa, basi ferruginea.

4. F.

*dentata.* 4. F. antennis decem articulatis, fusca, thoracis marginibus pedibusque pallidis, forcipe basi dentata.

Habitat in insula Madera. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo F. auriculariae. Antennae fuscae, primo articulo pallido. Caput fuscum. Thorax planus, marginatus, fuscus, margine pallido. Elytra fusca, obscura. Abdominis ultimum segmentum quadridentatum. Forceps magna, arcuata, nigra, basi pallida multidentata.

*parallelia.* 5. F. nigra, thoracis marginibus, elytris pedibusque pallidis, forcipe recta inermi.

Habitat in insula Madera. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, at minor. Antennae fuscae articulis 12, primo pallido. Thorax planus, depresso, niger, margine pallido. Elytra truncata, pallida. Forceps recta, acuta, inermis, apice nigra. Pedes pallidi.

*Morio.* 6. F. atra, antennis fascia alba.

Habitat in insula Otahcita maris pacifici. *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Antennae longae, 18 articulatae, nigrae, articulo 1, 4 et 15. albis. Thorax planus, ater, postice rotundatus. Elytra truncata, atra, immaculata. Alae hyalinae, apice atrae. Abdomen atrum, forcipe magna incurva, denticulis baseos minutissimis. Pedes nigri, plantis ferrugineis.

*pallipes.* 7. F. forcipe elongata, unidentata, nigra, pedibus albis.

Habitat in insulis promontorii viridis. *Mus. Dom. Banks.*

Magna, supra nigra. Antennae desunt. Thorax quadratus, postice rotundatus, niger, margine exteriori albido. Elytra fusca. Alae albae, linea apicis fusca. Forceps fere longitudine abdominis, ferruginea, unidentata, apice nigra. Pedes albi.

85. BLATTA. *Palpi filiformes.**Maxilla inferior apice fissa.**Labium membranaceum,**bifidum: lacinis filis,**pinna exteriore majori.**Antennae setaceae.*

1. B. livida, thoracis clypeo macula quadrata, fusca. *gigantea.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 687. 1. Mus. Lud. Ulr. 106.*  
*Gronov. Zooph. 633. tab. 16. fig. 3.*  
*Seb. Mus. 3. tab. 77. fig. 1. 2.*  
 Habitat in America, Asia.
2. B. atra, thoracis margine antico albo. *Linn. Syst. Nat. aegyptia-*  
*II. 687. 2. Mus. Lud. Uhr. 107. ca.*  
*Gron. Zooph. 637. tab. 15. fig. 2.*  
 Habitat in Aegypto. *Forskäbl.*
3. B. livida, thoracis margine antico albo. *Linn. Syst. surina-*  
*Nat. II. 687. 3. mensis.*  
 Habitat Surinami.
4. B. ferruginea, thoracis clypeo postice exalbido. *Linn. america-*  
*Syst. Nat. II. 687. 4. na.*  
*Blatta fusco-flavescens, elytris fulco ovato impressis,*  
*abdomine longioribus. Geoff. Inf. I. 381. 2.*  
*Blatta molendinaria ab insula Jamaica allata, major.*  
*Raj. Inf. 68.*  
*Merian. sur. I. tab. I.*  
 Habitat in America, et nuper Londini incepit in  
 Europeaque australi.
5. B. ferruginea, thorace atro: annulo albo, elytris basi  
*lineola alba.* *australa-*  
*Capta frequens in nave e mari pacifico et regionibus*  
*incognitis revertente.* *stiae.*  
 Magnitudo et statura B. americanae. Caput afrm,.  
 margine baseos albo. Thorax ater, nitens, annulo  
 magno albo. Margo tamen omnis ater. Elytra  
 ferruginea, striata, linea longitudinali alba ad mar-  
 ginem exteriorem baseos.

6. B.

- indica.* 6. *B. grisea*, thorace atro: margine antico albo.  
Habitat in India orientali. *Koenig.*  
Caput atrum, ore orbitaque oculorum albis. Thorax  
ater, glaber, nitens, margine antico albo. Elytra  
striata, grisea, linea baseos nigra. Abdomen  
fuscum, pedes cinerei.
- nivea.* 7. *B. alba*, antennis flavis. *Linn. Syst. Nat. II. 688. 5.*  
Habitat in America.
- rrorata.* 8. *B. pallida*, thorace elytrisque fuscō irroratis, alis  
disco nigro.  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
Corpus medium, pallidum, fronte subferrugineo,  
margine postico fuscō. Thoracis clypeus rotundatus,  
integer, pallidus, macula media punctisque  
numerosis sparsis nigris. Elytra grisea, linea baseos  
abbreviata punctisque parvis numerosissimis nigris.  
Alae nigrae, apice pallidae.
- viridis.* 9. *B. viridis*, antennis, thoracisque linea laterali flavis,  
alis albis.  
Habitat in America. *Mus. Tottianum.*  
Parva. Statura *B. niveae*. Oculi atri et punctum fulvum  
inter oculos. Antennae corpore breviores, flavae.  
Clypeus subrotundus, viridis, linea utrinque laterali  
flava. Alae albae, immaculatae. Corpus viride.
- brasiliensis.* 10. *B. pallida*, abdomine atro.  
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*  
Paulo major *B. lapponica*. Tota pallida, abdomine  
subtus atro. Antennae fuscae.
- petiveriana.* 11. *B. nigra*, elytris maculis quatuor flavescentibus.  
*Cassida petiveriana. Linn. Syst. Nat. II. 578. 28.*  
*Lib. Mus. 4. 951 21.*  
Habitat in India.  
Statura Cassidae, at antennae setaceae.
- orientalis.* 12. *B. ferruginea*, fusca, immaculata, elytris sulco oblongo. *Linn. Syst. Nat. II. 688. 7. Fu. Sv. 862. Geoff. Inf. I. 380. tab. 7. fig. 5.*  
*Blatta prima seu mollis Mouffeti. Raj. Inf. 68. 1.*  
*Blatta molendinaria. Mouff. Inf. 138. f. 2. 3.*

*Scarabaeus alter testudinatus, minor, atque alatus.*

*Column. ecphr. I. p. 40. tab. 36.*

*Grylli. Ionst. Inf. tab. 13. fig. A.*

*Blatta lucifuga s. molendinaria. Frisch. Inf. 5. p. 11.  
tab. 3.*

*Sultz. Inf. tab. 7. fig. 47.*

Habitat in America. Hospitatur nunc in Oriente adiacenteque Europa. Consumit panem, cibaria, calceos etc. velocissime cursitans. Foemina aptera, larvae simillima, parit ovum magnitudine dimidii abdominis subcylindricum, carina crenulata. *Linn.*

13. *B. thorace flavescente, elytris testaceis, apice nigris. variegata.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo *B. laponicae*. Antennae nigrae. Caput nigrum, postice flavescentes. Thoracis clypeus rotundatus, flavescentes. Elytra et alae testacea, apice nigra. Pectus atrum. Abdomen atrum, margine fasciisque quatuor, marginem haud attingentibus, flavis. Pedes atri, tibiis rufis.

14. *B. flavescentes, elytris nigro-maculatis. Linn. Syst. laponica,  
Nat. II. 688. 8. Fn. Sv. 863.*

Blatta flavescentes, elytris ad angulum acutis, striatis,  
*Geoff. Inf. I. 381.*

*Schaeff. Elem. tab. 26. fig. 2.*

— — *Icon. tab. 88. fig. 2. 3.*

Habitat in Europa consumens cibaria.

Thorax niger, margine flavescente.

Variat multo breviori thorace toto flavescente.

15. *B. livida, thorace lineis duabus atris, parallelis. germanica.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 688. 9.*

Habitat in Europa et in regionibus Australasiae incognitae, in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis *B. laponicae*.

86. MANTIS. *Palpi subaequales.*

*Maxilla inferior compressa,*  
*acutissima.*

*Labium bifidum: laciniis*  
*fissis; pinnis aqualibus.*

*Antennae setaceae.*

- Gigas.* 1. M. thorace teretiusculo, scabro, elytris brevissimis,  
pedibus spinosis. *Linn. Syst. Nat.* II. 689. I. *Mus.*  
*Lud. Ulr.* 109.

*Aruinatia.* *Marg. bras.* 251.

*Bradl. nat.* tab. 27. fig. 6.

*Petiv. Gazoph.* tab. 60. fig. 2.

*Seb. Mus.* 4. tab. 77. fig. 1. 2.

Habitat in Asia.

- necydalois-* 2. M. thorace scabro, elytris ovatis, angulatis, brevissi-  
*des.* mis, alis elongatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 691. 14.

*Roef. Ins.* 2. tab. 19.

Habitat in Asia.

Manifeste differt a M. gigante. Elytra ovata, brevissi-  
ma, linea media elevata, acuta, flexuosa. Alae  
longitudine abdominis, fuscae. Eadem videtur  
cum Manti phthisica. *Linn.*

- spinosa.* 3. M. capite thoraceque spinosis, elytris brevissimis, acutis.  
Habitat in Indiis.

Statura M. Gongylodis, at triplo minor. Antennae  
filiformes, longitudine corporis. Caput vertice  
spinis quatuor vel sex anticis longioribus, divari-  
catis. Thorax fuscus, scaber, antice spina utrin-  
que duplii armatus. Elytra brevissima, acuta, fusca.  
Alae longitudine abdominis, convolutae, fuscae.  
Femora antica inermia, reliqua spinosa.

- spinosa.* 4. M. thorace teretiusculo, antice bispinoso, elytris bre-  
vissimis: margine flavo.

Habitat in America. *Mus. Dom. Hunter.*

Statura M. Gigantis, at multo minor. Antennae fla-  
vescentes. Caput viride, vertice utrinque spina  
elevata brevi, obtusa. Thorax linearis, rotundatus,  
viridis,

viridis, dorso flavescente, antice spinis duabus validis, nigris. Elytra brevia, medio gibba, viridia, margine exteriori flavo. Alae magnae rufescentes, margine exteriori viridi. Abdomen lineare, virescens. Pedes virescentes, spinosi.

5. *M. linearis, nigra, elytris brevissimis, gibbis: lateribus flavis.*

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Antennae corpore longiores, setaceae, nigrae. Caput nigrum, utrinque lineolis duabus parvis, flavis. Thorax cylindricus, linearis, niger, lateribus subflavis. Elytra brevissima, in medio gibba, dente elevato, nigra, margine exteriori flavo. Alae magnae nigrae, margine flavo. Pedes nigri. Pectus pallidum.

6. *M. thorace brevissimo, apice dilatato, femoribus anticis spina terminatis, reliquis lobo. Linn. Syst. Nat. gongylodes. II. 690. 4. Mus. Lud. Ulr. 112.*

*Gryllus thorace linearis, alatum longitudine: margine denticulis ciliato. Linn. Am. Acad. I. p. 504.*

*Mantis. Aldr. Ins. tab. 13. fig. 21.*

*Gaayara. Margraf. Bras. 246.*

*Roeß. Ins. II. Gryll. tab. 7.*

*Sultz. Ins. I. tab. 8. fig. 56.*

*Aet. Angl. 301. tab. 20. fig. 3.*

*Seb. Mus. 4. tab. 68. fig. 9 — 12.*

*Aub. miscell. tab. 65. fig. 2.*

Habitat in Africa.

Caput vertice subulato, bifido.

7. *M. thorace marginato, dentato, elytris albo viridis que variis, margine albo punctato. mendica.*

Habitat Alexandriae. *D. Forskähl.*

Caput flavescentes, fronte cornuta. Thorax valde marginatus, margine dentato. Elytra variegata, margine crassiori, linea distincta punctorum alborum. Pedes flavescentes, fasciis obscurioribus.

- strumaria.* 8. M. thorace utrinque membranaceo, dilatato, obscurato. *Linn. Syst. Nat.* II. 691. 13.  
*Roes. Inf.* 2. *Gryll. tab.* 3.  
*Merian. Inf. Scriniam.* tab. 27.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 69. fig. 7. 8.  
Habitat in Indiis.
- tricolor.* 9. M. thorace lateribus expanso, lobato, capite cornuto, pedibus anticis latissimis. *Linn. Syst. Nat.* II. 691. 12.  
*Mus. Lud. Ulr.* 117.  
Habitat in India.  
Oculi in cornicula auriformia acuta desinunt. Elytra pallida, albo-maculata. Alae basi rubrae, medio fuscae, apice albae.
- caneella-* 10. M. thorace utrinque dilatato, membranaceo, plano. *ta.*  
Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*  
Statura M. strumariae, at obscure fuscata. Thorax haud rotundatus, at omnino planus.
- ficifolia.* 11. M. thorace denticulato, femoribus ovatis, membranaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 689. 3. *Mus. L. U.* III.  
*Roes. Inf.* 2. *Gryll. tab.* 17.  
*Edw. Av.* tab. 258.  
Habitat in Indiis.  
Corpus reliquis latius, depresso.
- pe<sup>c</sup>tinicorn-* 12. M. thorace laevi, vertice subulato, antennis pectinatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 691. 10.  
*Gryllus pectinicornis.* *Linn. Am. acad.* 6. p. 396. 27.  
Habitat in China.  
Antennis mox distinguitur.
- irrorata.* 13. M. thorace laevi, subcarinato, elytris viridibus: punctis ferrugineis, vagis. *Linn. Syst. Nat.* II. 690. 7.  
*Am. acad.* 6. 397. 29.  
Habitat in America.  
Elytra alaeque breviora.
- oratoria.* 14. M. thorace laevi, elytris viridibus, immaculatis.  
Mantis oratoria thorace laevi, elytris viridibus, alis macula nigra antice rufescentibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 690. 6. *Mus. L. U.* II.

*Mantis. Geoff. Inf. 1. 399. 1. tab. 8. fig. 4.*

*Roef. Inf. 2. tab. 1. 2.*

*Mo'ffer. Inf. 118. fig. 3.*

*Ald. ov. Inf. 4. tab. 3. fig. 10.*

6. *Mantis religiosa thorace laevi, subcarinato, elytrisque viridibus, immaculatis. Linn. Syst. Nat. II. 690. 5.*

*Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 1. 2.*

*Schaeff Elem. tab. 81.*

*Seb. Mus. 4. tab. 67. fig. 7. 8.*

Habitat in Oriente, Europa australi.

In Gallia australi infantibus viam monstrare creditur: *Reaumur.*

15. *M. thorace subciliato, elytris virecentibus: ocello precaria ferrugineo. Linn. Syst. Nat. II. 691. 8. Mus. Lud.*

*Utr. 114.*

*Merian. Surin. tab. 66.*

*Seb. Mus. 4. tab 67. fig. 3—6.*

Habitat in America, Africa.

Ocellus ferrugineus, antice dimidiato albus.

16. *M. thorace ciliato, elytris hyalinis: margine viridi, byalina. fronte bidentata.*

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Caput fuscum, antennis serratis fronteque dentibus duobus, validis, approximatis, acutis. Thorax linearis, carinatus, lateribus ciliatis, fuscus. Abdomen fuscum, segmentorum marginibus atris. Elytra hyalina, margine exteriore viridi. Alae hyalinae, apice fuscae.

17. *M. thorace scabro, elytris viridibus: fasciis nigris, bidens. alis fuscis: disco atro.*

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Caput fuscum, fronte dentibus duobus, acutis, approximatis. Thorax linearis, griseus, punctis elevatis nigris, seaber. Elytra viridia, fasciis duabus obliquis fuscis, apice attenuata. Alae fuscae, disco atro. Pedes fusi. Femora antice pallida, apice nigra. Tibiae secundi paris lobatae.

18. *M. thorace scabro, crenato, latitudine capitis, antice ministralis ferrugineo, elytris viridibus.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura M. precariae. Caput obscure flavescens, antennis fuscis. Thorax latitudine capitidis carinatus, scaber, lateribus tenuissime crenatis, antice ferrugineus. Elytra viridia, margine exteriori subferrugineo. Pedes ferruginei, femoribus anticis fulvis. Abdomen fuscum, ano pallido.

- urbana.* 19. M. thorace integro, elytris viridibus; puncto fascia que ferrugineis.

Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*

Statura M. precariae, at minor. Tota viridis, puncto ferrugineo ad basin elytrorum et fascia in medio, quae utrinque lineola nigra terminatur.

- pagana.* 20. M. alis reticulatis, albis; macula lateraliter ferruginea. Habitat in Orleans Galliae. *D. Mallet.*

Parva. Statura M. urbanae. Antennae breves. Caput ferrugineum, oculis prominulis nigris. Thorax cylindricus, integer ferrugineus. Alae omnes albae, subhyalinae, reticulatae, macula magna laterali ferruginea.

- minuta.* 21. M. thorace cylindrico, flavescente, elytris hyalinis: costa virescente.

Habitat in - - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Parva. Caput flavescens. Thorax cylindricus, muticus, flavescens. Elytra alaque hyalina, margine exteriori virescente. Abdomen subfalcatum, virescens, dorso flavescente. Pedes virescentes.

### 87. ACRYDIUM. *Palpi* filiformes.

*Labium* cylindricum,  
apice fissum.

*Antennae* filiformes.

- i puncta-*  
*tum.* 1. A. thoracis scutello abdominis longitudine, Acrydium elytris nullis, thorace producto, ab domine aequali. *Geoff. Ins.* I. 394. 5.  
Gryllus bipunctatus. *Linn. Syst. Nat.* II. 693. 7. *Fn. Sv.* 884. *Scop. carn.* 316.  
Habitat in Europa.

2. A.

2. *A. thoracis scutello abdome longiore.* *subula-*  
*Acrydium elytris nullis, thorace producto, abdome* *tum.*  
*longiore.* *Geoff. Inf. 1. 395. 6.*  
*Gryllus subulatus.* *Linn. Syst. Nat. II. 693. 8. Fn. Sv. 865.*  
*Habitat cum praecedente.*  
*Praecedenti nimis affine, cuius forte varietas.*

88. TRUXALIS. *Palpi inaequales, filiformes.*

*Galea truncata, fornicata.*  
*Labium inferius bifidum.*  
*Antennae ensiformes.*

1. *T. capite conico, corpore viridi.* *nasutus.*  
*Gryllus nasutus.* *Linn. Syst. Nat. II. 692. 1. Mus.*  
*Lud. Utr. 118.*  
*Mantis africana.* *Monff. Inf. 119.*  
*Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 4.*  
*Sultz. Inf. tab. 8. fig. 57.*
2. *Gryllus turritus capite corneo, antennis ensiformibus,* *alis hyalinis.* *Linn. Syst. Nat. ed. 10. 427.*  
*Habitat in Africa.*  
*Animalculum valde distinctum, capite porrecto,*  
*conico, apice antennis, basiore instructo.*

2. *T. capite prominulo, viridis, antennis compressis,* *brevicornis.*  
*longitudine thoracis.*  
*Gryllus brevicornis.* *Linn. Syst. Nat. II. 692. 2.*  
*Amoen. acad. 6. 398. 37.*  
*Habitat in America.*

89. ACHETA. *Palpi filiformes.*

*Maxilla apice fissa.*  
*Labium quadrifidum.*  
*Antennae setaceae.*

1. *A. alis caudatis, elytris longioribus, pedibus anticis* *gryllotalpa.*  
*palmatis.*  
*Gryllus gryllotalpa.* *Linn. Syst. Nat. II. 693. 10. Fn.*  
*Sv. 806. Geoff. Inf. 1. 387. 1. Scop. carn. 317.*  
*S 4* *Gryllo-*

- Gryllotalpa. *Raj. Inf.* 64.  
 Gryllotalpa. *Ionst. Inf.* tab. 12. fig. ultima.  
*Caresby Carol.* 1. tab. 8.  
*Roef. Inf.* *Gryll.* tab. 14. 15.  
*Frisch. Inf.* 11. tab. 5.  
*Sulz. Inf.* tab. 9. fig. 59.  
*Schaeff. Icon.* tab. 37. fig. 1.  
 Habitat in Europae, Americae borealis cultis: hor-  
 torum hostis.  
 Nidum e gleba struunt, quam aura sicca et calida  
 attollere perperam affirmat *Goedart* 1. p. 127.  
 Allicitur fimo equino, pellitur porcino. *Scopoli.*

- domestica.* 2. A. alis caudatis, elytro longioribus, corpore glauco.  
 Gryllus domesticus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 694. 12. *Fn.*  
*Sv.* 868. *Scopoli carn.* 318.  
 Gryllus pedibus anticis simplicibus. *Geoff. Inf.* 1. 389. 2.  
 Gryllus domesticus. *Raj. Inf.* 62.  
 Gryllus domesticus. *Mouff. Inf.* 135.  
 Grylli Mouffeti. *Ionst. Inf.* tab. 12.  
*Roef. Inf.* 2. *Gryll.* tab. 12.  
 Hospitatur in Europae muris domesticis, tota nocte  
 stridens, praesertim instanti pluvia.  
 Vesicitur sanie et liquore carnium. *Raj.* Laetatur  
 calore fornacum.  
 Blattis non cohabitari affirmat *Poda.*  
 Necatur pillulis ex Arsenico et radice Dauci recentis  
 farina tritici mixtis. Nymphae laeti incoctae  
 radicibus. *Linn.*

- affimilis.* 3. A. alis caudatis, elytro longioribus, abdomine stylis  
 duobus apice fissis.  
 Habitat in Jamaica.  
 Statura A. domesticae. Antennae pallidæ. Thorax  
 et caput nigra, margine pallido. Elytra fusca, ro-  
 tundata. Abdomen nigrum. Styli duo filiformes,  
 apice bifidi, longitudine abdominalis. Pedes fusi.

- brasiliensis.* 4. A. alis caudatis, elytris longioribus, fusca, dorso  
 pallidiore, cauda ascende, longitudine corporis.  
 Habitat in Brasilia. *Muf. Dom. Banks.*  
 Major A. domestica. Caput fuscum, vertice pallidiore.  
 Thorax supra pallescens, lateribus fuscis. Elytra  
 rotun-

rotundata, fusca, dorso pallidiore. Macula atra, lateralis. Alae caudatae, fuscae. Abdomen fuscum, ense ascende flavescente, apice fuso.

5. A. alis caudatis, elytris longioribus, albis, corpore *orientalis*. atro, capite pedibusque testaceis.

Habitat Tranquebariae. *D. Koenig.*

Minor A. domestica. Caput testaceum. Thorax rotundatus, ater. Elytra atra. Alae elytris duplo longiores, albae, apice fuscescentes. Abdomen atrum, cauda stylisque brevioribus. Pedes simplices, flavescentes.

6. A. alis caudatis, elytris longloribus, nigra, elytris *capensis*. basi flavis.

Habitat in Cap. Bon. Spei. *Mus. Dom. Banks.*

Caput atrum, punctis tribus inter oculos flavis. Thorax rotundatus, ater, immaculatus. Elytra fusca, basi flava, apice rotundata. Alae magnae, caudatae, albidae. Corpus atrum, femoribus posticis basi rufescensibus.

7. A. alis elytro brevioribus, corpore nigro, stylo linearis. *campestris.*

*Gryllus campestris. Linn. Syst. Nat. II. 695. 13. Mus. Lud. Ulr. 124. Scopoli carn. 319.*

*Gryllus campestris Mouffeti. Raj. Inf. 63.*

*Roef. Inf. II. Gryll. tab. 13.*

*Frijch. Inf. I. tab. I.*

*Schaeff. Elem. tab. 66.*

Habitat in Europa australiori.

Stridet a primo die Maji ad aequinoctium, domestica facta pellit priorem. *Scopoli.*

Conjunxit *Geoffroy* hanc cum domestica, at vix jure.

8. A. alis caudatis, elytris longioribus, albis, costa fusca, elytris nigris, albo maculatis. *bosipes.*

Habitat in America. *D. Eaton.*

Statura omnino A. domesticae, at triplo minor. Antennae setaceae, corpore paulo longiores, fuscae. Caput et thorax nigra, immaculata. Elytra brevia, flexilia, nigra, stria longitudinali lineolisque transversis, abbreviatis, numerosis, albis. Alae caudatae, elytris duplo longiores, albae, marginē exteriori fusco.

fusco. Abdomen nigrum. Cauda biseta enseque recurvo, fere longitudine corporis. Pedes fusci, tibiis posticis apice spinosis.

**minuta.** 9. A. thorace rotundato, flavescentia, alis caudatis, cauda biseta, tibiis posticis trispinosis.

*Gryllus minutus.* Linn. Syst. Nat. II. 694. II.  
Habitat in America.

90. LOCVSTA. *Palpi inaequales, obtusi.*  
*Maxilla apice tridentata.*  
*Labium bifidum, laciniis*  
*interne seta subulata*  
*instructis.*  
*Antennae setaceae.*

**citrifolia.** 1. L. thorace tetragono: angulis crenatis.

*Gryllus citrifolius.* Linn. Syst. Nat. II. 695. 16. Mus.  
Lud. Ulr. 125. Gronov. Zooph. 657.  
Roef. Ins. II. Gryll. tab. 16. fig. 1.  
Habitat in Indiis.

**laurifolia.** 2. L. thorace tetragono, laevi, alis lanceolatis, elytro obtusiore longioribus.

*Gryllus laurifolius.* Linn. Syst. Nat. II. 695. 17. Mus.  
Lud. Ulr. 126.

*Locusta maxima viridis,* alis latissimis. Sloan. Lam. 2.  
p. 201. tab. 236, fig. 1.

Tucurubi. Margr. Bras. 246.

Habitat in America, nova Hollandia. Mus. D. Banks.  
Elytra dorso gibba.

**myrtifo.** 3. L. thorace subtetragono, laevi, alis deflexis, elytro longioribus, ense brevissimo, recurvo.

*Gryllus myrtifolius* thorace subtetragono, laevi, alis deflexis, elytro longioribus, tibiis muticis. Linn.  
Syst. Nat. II. 696. 18.

Habitat in America.

L. laurifolia duplo minor. Anus maris lamina clavata, furcata, foeminae ensis brevissimus, recurvus.

4. L. thorace deflexo, elytris concavis, apice rotundatis, ala longioribus. *camelli-folia.*

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Medius. Antennae setaceae. Caput magnum, virescens.

Thorax segmentis tribus, lateribus deflexis, postice rotundatus. Elytra magna, concava, viridia, nervosa, apice rotundata. Alae magnae, virescentes. Abdomen virescens, ense adscendente, viridi, apice fuscum. Pedes virides, femoribus spinosis.

5. L. thorace tetragono, laevi, elytris sublinearibus, fuscum - punctatis, alis brevioribus. *thymifolia.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Nimis praecedenti affinis. Thorax quadratus, virescens, linea laterali fusca, postice emarginatus. Elytra linearia, concava, punctis parvis fuscis irrorata, alis breviora, obtusiora. Alae albidae, apice virescentes.

Variat colore viridi et ferrugineo.

6. L. thorace deflexo, elytris concavis, viridibus: basi ocello dorsali vitreo. *perspicillata.*

Habitat in America. *Mus. Dom. Hunter.*

Statura omnino praecedentis. Caput pallidum, antennae setaceis, fuscis. Thorax deflexus, virescens, postice rotundatus. Elytra magna, concava, viridia, nervosa, apice rotundata, basi margine interiori plano, ocello magno, vitreo. Pedes virides, spinosi. Anus dentibus sex validis, incurvis, enseque ascendeante extrorsum crassiore.

7. L. thorace rotundato, elytris viridi-hyalinis, alis brevioribus, pedibus anticis spinosis. *spinipes.*

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Parva. Antennae setaceae, longitudine corporis. Caput pallescens, oculis valde ante verticem prominentibus. Thorax rotundatus, laevis. Elytra viridi-hyalina, obtusa, alis breviora. Corpus fuscum. Femora et tibiae anticae spinis plurimis elongatis armata.

- maxillofa.** 8. L. viridis, antennis maxillisque flavis.  
 Habitat in America. Dom. v. Rohr.  
 Caput virile, vertice elevato, subtus acuminato, apice  
 puncto flavo. Antennae longitudine corporis et  
 maxillae flavae. Thorax glaber, postice utrinque  
 sinuatus. Elytra alaeque corpore duplo longiora.  
 Femora postica subtus dentata. Tibiae flavescentes.
- elongata.** 9. L. thorace subquadrato, laevi, elytris aliquo griseis,  
 corpore longioribus.  
*Gryllus elongatus.* Linn. Syst. Nat. II. 696. 20. Mus.  
*Lud. Utr.* 127.  
*Ross. Ins.* II. Gryll. tab. 18. fig. 7.  
 Habitat in India.  
 Elytra grisea, maculis fuscis. Alae immaculatae.
- specularis.** 10. L. thorace rotundato, elytris griseis: basi ocello  
 dorsali vitreo, antennis longissimis.  
 Habitat in America. Mus. D. Hunter.  
 Magnus. Antennae setaceae, fuscae, corpore triplo  
 longiores. Thorax rotundatus, fuscus, linea laterali  
 atra. Elytra grisea, basi margine interiori  
 plano, ocello magno vitreo. Alae magnae, griseae.  
 Pedes spinosi.
- ocellata.** 11. L. thorace rotundato, alis ocello notatis.  
*Gryllus ocellatus.* Linn. Syst. Nat. II. 696. 22. Mus.  
*Lud. Utr.* 129. Gron. Zooph. 649.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 73. fig. 7. 8.  
 Habitat in Indiis.
- lanceola-** 12. L. thorace rotundato, laevi; elytris oblongis, alae  
 aequalibus, fronte porrecta, lanceolata: subtus  
 unidentata.  
 Habitat in Sierra Leon Africæ. Mus. Dom. Banks.  
 Major L. conocephala, et frons inter oculos prominet,  
 capite longior, basi subtus viridis, tibiis apice acutis.  
 Thorax postice utrinque sinuatus.
- acuminata.** 13. L. thorace rotundato, vertice subulato, alis virescen-  
 tibus, longitudine corporis.  
*Gryllus acuminatus.* Linn. Syst. Nat. II. 696. 23. Mus.  
*Lud. Utr.* 130.  
*Sloan. Iam.* 2. 202. tab. 236. fig. 3.  
 Habitat in America.

14. L. thorace rotundato, laevi, elytris oblongis, ala *conocephala*-  
brevioribus, capite conico, obtuso. *la.*  
*Gryllus conocephalus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 696. 19.  
 Habitat in Africa.  
 Corpus viride, capite thoraceque linea dorsali fusca,  
*Ensis ferrugineus.*
15. L. vertice acuminato: subtus puncto ocellari nigro, *triops*.  
elytris alac aequalibus.  
*Gryllus triops* thorace rotundato, vertice acuminato,  
subtus puncto ocellari nigro, alis viridibus. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 697. 24. *Mus. Lud. Ulr.* 131.  
 Habitat in Indiis.
16. L. viridis, thorace subtriarticulato: articulis utrin- *squarrofa*.  
que tricuspidatis, alis rubris, nigro - punctatis.  
*Linn. Mant.* I. 533.  
*Drury. Inf.* I. tab. 49. fig. 1.  
 Habitat in Africa.
17. L. thorace spinis erectis coronato, elytris variolofo- *coronata*.  
concavis.  
*Gryllus coronatus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 697. 26.  
 Habitat in Indiis.  
 Antennae luteo griseoque variae, corpore longiores.  
 Elytra grisea, punctis magnis excavatis,  
 fuscis. Alae fuscae.
18. L. thorace rotundato, laevi, elytris abdomine dimi- *melano-*  
dio brevioribus, alis nigris. *ptera.*  
*Gryllus melanopterus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 697. 28.  
*Mus. Lud. Ulr.* 134.  
 Habitat in Indiis.  
 Elytra brevissima, ovata. Alae nigrae, antice mar-  
 gine testaceo.
19. L. thorace rotundato, laevi, elytris coriaceis, alis *coriacea*.  
pallidis, antennis longissimis.  
*Gryllus coriaceus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 697. 30. *Mus.*  
*Lud. Ulr.* 136.  
 Habitat in Indiis.  
 Color supra flavescens.

*albifrons.* 20. L. thorace postice rotundato, laevi, clytris cinereo nigroque variis, capite pallido.

Habitat in Madera. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnum, fuscum. Caput obtusum, pallidum, antennis longis, setaceis, fuscis. Thorax fuscus, in margine pallido, postice rotundatus. Elytra longitudine alarum, obtusa, nigro cinereoque varia. Alae fuscae. Foemina abdome ense recto, apice ferrato nigro.

*Falx.* 21. L. thorace laevi, postice rotundato, fusca, capite pallido, ene falcato, atro.

Habitat in Madera. *Mus. Dom. Banks.*

Caput obtusum, pallidum, maxillis apice atris. Thorax laevis, fuscus, postice rotundatus. Elytra grisea, cinereo fuscoque maculata. Abdomen fuscum, ene parvo falcato, atro. Pedes fusi.

*viridissima.* 22. L. alis viridibus, immaculatis, antennis longissimis. Locusta cauda ensifera, curva. *Geoffr. Inf.* I. 397. 1.

*Gryllus viridissimus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 698. 31. *Fn. Sv.* 869. *Scop. carn.* 320.

*Agrigoneus.* *List. Coed.* p. 301. tab. 121.

*Robert. Icon.* tab. 27.

*Frisch. Inf.* 12. tab. 2. fig. 4.

*Roef. Inf.* 2. *Gryll.* tab. 10. 11.

*Schaeff. Elem.* tab. 79.

*Goedart. Inf.* 65. tab. 40.

*Zinann. Obs.* tab. 7. fig. 7.

Habitat in Europae graminosis.

*verrucivora.* 23. L. alis viridibus, fusco - maculatis, antennis longitudine corporis.

Locusta cauda ensifera, recta. *Geoffr. Inf.* I. 398. 2.

*Gryllus verrucirorus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 698. 33.

*Scopoli carn.* 321.

Locusta viridis, major. *Raj. Inf.* 61.

Locusta major viridis. *Frisch. Inf.* 12. tab. 1. *Icon.* 2. f. 1.

*Jenst. Inf.* tab. 11. fig. 1. 2. 3.

*Merian. Inf.* tab. 176.

*Sultz. Inf.* tab. 9. fig. 61.

*Roef. Inf.* 2. *Gryll.* tab. 8. .

*Schaeff. Icon.* tab. 62. fig. 5.

Habi-

Habitat in Europae graminosis.

Rustici huic insecto verrucas manus admovent, quas praemordet et evomit in vulnus liquorem, unde verruca contabescit. *Linn.*

24. L. thorace viridi, flavo, lineato, fronte acuminata, *varia.*  
antennis longissimis.

*Goedart. Inf. II. p. 142. tab. 40.*

Habitat Lipsiae.

Simillimus L. viridissimae, at quadruplo minor. Antennae corpore duplo longiores, flavescentes. Caput vertice elevato, acuto. Thorax viridis, linea dorsali flavicante, puncto utrinque baseos nigro. Elytra viridia, immaculata. Ensis longitudine corporis ascendens.

25. L. thorace spinoso, corpore aptero.

*Gryllus Pupus apterus, thorace spinoso, femoribus punctatis. Linn. Syst. Nat. II. 699. 34. Amoen. Acad. I. 322.*

Locusta-Talpa capensis, pedibus longis. *Petiv. Gazoph.* tab. 12. fig. 7.

*Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 6. fig. 3.*

*Kundm. prompt. 118. et 184.*

Habitat in Aethiopia.

Scutellum magnum, rotundatum, spinis ciliatum.

Femora postica subtus quadridentata.

*Pupa.*

91. G R Y L L V S. *Labium bifidum, ovatum,*  
*laciiniis fornicatis.*

*Antennae filiformes.*

1. G. thorace carinato, integro, corpore aptero. *Linn. Elephas.*  
*Syst. Nat. II. 699. 35.*

*Roef. Inf. II. Gryll. tab. 6. fig. 2.*

Habitat in Africa.

2. G. thoracis carina margineque postico elytrorumque *succinctus.*  
margin'e dorsali flavis, gula cornuta. *Linn. Syst.*  
*Nat. II. 699. 36. Am. acad. 6. 398. 36.*

Habitat in Indiis.

Antennae luteae. Tibiae posticae, spinis luteis, apice atris.

3. G.

- eristatus.* 3. G. thorace cristato : carina quadridifida, alis apice fuscis.  
*Linn. Syst. Nat. II. 699. 37. Mus. Lud. Ulr. 137.*  
*Amoen. acad. I. 21. tab. 17. fig. 4.*  
*Gronov. Zooph. 658.*  
*Gryllus ex Aegypto. Olear. Mus. tab. 17. fig. 5.*  
*Gryllus arabicus. Hasselqu. It. 413.*  
*Frisch. Inf. 9. tab. 1. fig. 1.*  
*Roef. Inf. II. Gryll. tab. 5.*  
*Edw. Av. tab. 312.*  
*Habitat in Arabia.*  
*Arabis esculentus.*
- carinatus.* 4. G. thorace cristato : carina trifida, alis fascia nigra.  
*Habitat in Oriente. Forstkäbl.*  
*G. cristato crassior. Thorax scaber, carina trifida, lobo postico acuto. Elytra virescentia. Alae concolores, fascia versus apicem atra. Femora postica utrinque carinata, scabra, lineisque elevatis reticulata. Tibiae spinosissimae.*
- Lunus.* 5. G. thoracis segmento crista semiorbiculata, elytris nigris: fasciis albis. *Linn. Syst. Nat. II. 693. 9.*  
*Linn. Amoen. acad. 6. 397. 30.*  
*Habitat in America meridionali.*  
*Alae nigrae, immaculatae.*
- serratus.* 6. G. thorace cymbiformi, carinato, serrato, postice producto, acuto.  
*Gryllus serratus thorace cymbiformi, carinato, denticulato, capite acuminato, abdome coeruleo.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 693. 5. Mus. L. U. 121.*  
*Gronov. Zooph. 642.*  
*Roef. Inf. Gryll. tab. 16. fig. 2. antennas setaceas perperam depingit.*  
*Sultz. Inf. tab. 8. fig. 58.*  
*Habitat ad Cap. B. Sp.*
- miliaris.* 7. G. thorace subquadrato, verrucoso, elytris punctis callosis, albis. *Linn. Syst. Nat. II. 700. 39. Mus. Lud. Ulr. 142.*  
*Habitat in America.*  
*Nimis affinis videtur G. morbilloso, at puncta omnia rotunda, alba, regularia. Scutellum rotundatum, margine dentato.*

8. G. thorace quadrato, rubro, verrucoso, elytris fuscis *morbillo-*  
albo punctatis, alis rufis. *Linn. Syst. Nat.* II. 700. *fus.*  
*Mus. Lud. Utr.* 142.

*Gronov. Zool. 179.* 662.

*Roef. Inf.* II. *Gryll.* 18. fig. 6. perperam antennas pin-  
git setaceas.

Habitat ad Cap. B. Sp.

Antennae nigrae, filiformes.

9. G. thorace subcarinato, scabro, capite obtuso, femo- *haemato-*  
ribus piloso-ciliatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 700. 40. *pus.*  
*Mus. L. Utr.* 143.

Habitat in Indiis.

Elytra cinerea. Alae hyalinae, venis nigris reticulatae.

10. G. elytris viridibus, albo punctatis; apice rufescen- *pictus.*  
tibus, corpore coeruleo flavoque variegato.

Habitat Cajennae. *D. Mallet.*

Statura et magnitudo G. miliaris. Antennae filiformes, coeruleae, annulis tribus flavis, longitudine thoracis. Frons elevata, submarginata. Caput coeruleum, lineis sex flavis. Thorax coeruleus, flavo-maculatus. Abdomen flavo nigroque annulatum. Elytra viridia, albo punctata, apice subrufescens. Alae rubrae, immaculatae. Pedes antici flavo coeruleoque variegati. Femora postica coerulea, striis duabus apiceque flavis. Tibiae flavae.

11. G. thorace segmentis tribus, fronte impressa, maxilli- *tartari-*  
lis concoloribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 700. 42. *Mus.*  
*Lud. Utr.* 139.

Habitat in Africa.

Affinis sequenti. Ambo elytris cinerascentibus fusco-  
maculatis.

12. G. thorace subcarinato: segmento unico, maxillis *migrato-*  
coeruleis. *Linn. Syst. Nat.* II. 700. 41. *Fu. Sv.* 871.  
*Scop. carn.* 323.

*Gryllus migratorius. Frisch. Inf.* 9. tab. I. fig. 8.

*Roef. Inf.* *Gryll.* tab. 24.

*Edu. Av.* 208. tab. 208.

Habitat in Tartaria, inde migrans variis annis in  
Europam, destruens vegetabilia omnia.

- variegatus.* 13. G. thorace lineato, flavo, elytris viridibus, alis coeruleis. *Linn. Syst. Nat.* II. 700. 43. *Mus. Lud. Ulr.* 144.  
*Habitat in America.*  
*Antennae nigrae, annulis rubris. Frons rubra, maxulis atris.*
- vocans.* 14. G. thorace carinato, elytris pallidis, maculis ocellaribus, fuscis, alis basi ferrugineis.  
*Habitat in nova Hollandia. Mus. Dom. Banks.*  
*Caput pallide testaceum, maxillis atris. Stemmata tria aurea, duo supra antennas, et tertium in medio frontis. Thorax carinatus, ferrugineus, postice acutiusculus, margine flavescente. Elytra rotundata, pallida, maculis ocellaribus numerosis, parvis, fuscis. Alae basi ferrugineae.*
- muscus.* 15. G. thorace carinato, elytris antice nigris, fascia alba, postice griseis nigro variis.  
*Habitat in nova Hollandia. Mus. Dom. Banks.*  
*Magnitudo G. striduli. Caput fuscum, lateribus pallescensibus. Maxillae coerulecentes. Thorax carinatus, fuscus, postice acutiusculus. Elytra antice nigra, fascia alba, postice cinerea, maculis nigris. Tibiae posticae sanguineae, basi flavae.*
- tuberculatus.* 16. G. thorace scabro, alis rufis, apice cinereis, femoribus posticis supra infraque carinatis.  
*Habitat in Jutlandiae arenosis.*  
*Affinis G. stridulus, at duplo major. Thorax subcarinatus, punctis elevatis, scaber. Elytra fusco cinerreoque nebulosa. Femora postica fusca, supra infraque valde carinata, acuta. Tibiae flavae.*
- stridulus.* 17. G. thorace carinato, alis rubris, extimo nigris.  
*Linn. Syst. Nat. II. 701. 47. Fn. Sv. 872.*  
*Acrydium elytris nebulosum, alis rubris, externe nigris.*  
*Geoff. Inf. I. 393. 4.*  
*Frisch. Inf. 9. tab. I. fig. 2.*  
*Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 21. fig. I.*  
*Schaeff. Elem. tab. 15.*  
*— — Icon. tab. 27. fig. 10. II.*  
*Habitat in Europae siccis arenosis.*

Variat

Variat corpore nigro toto, et nigro flavoque variegato.

Setae duae parvae in abdominis penultimo segmento.

18. *G. thorace lineis quatuor flavis, alis coeruleis, elytris viridibus.* *Linn. Syst. Nat. II. 700. 45. Mus. surinamensis. Lud. Ulv. 146.*

Habitat in America meridionali.

Femora basi sanguinea.

19. *G. fuscus, thorace carinato, alis rubris: apice hyalinis.* *Linn. Syst. Nat. II. 701. 46. Mus. L. U. 147. Scop. carn. 327.* *italicus.*

*Roef. Inf. II. Gryll. tab. 21. fig. 6.*

Habitat in Europa australi.

20. *G. testaceus, alis sanguineis, apice hyalinis, femoribus posticis nigro-punctatis.* *germanicus.*

*Roef. Inf. II. Gryll. tab. 21. fig. 7.*

Habitat in Germaniae aquis.

Corpus majus *G. italicico.* Thorax subcarinatus, testaceus. Elytra testacea, fusco-maculata. Femora postica transversum striata, nigroque punctata, maculaque semilunari atra utrinque ad apicem. Tibiae sanguineae.

21. *G. thorace carinato, elytris costa viridi, alis nigris, basi virescentibus.* *virginianus.*

Habitat in America boreali. *D. Levin.*

Parvus. Statura *G. grossi.* Thorax valde carinatus, obscure rufescens. Elytra obscure rufescentia, margine exteriori laete viridi.

22. *G. thorace subcarinato, alis nigris: margine postico cinereo.* *carolinus.* *Linn. Syst. Nat. II. 701. 49.*

Locustella carolina, elytris fuscis, alis inferioribus nigris, ad extremitates luteis. *Catisb. carol. 2. p. 89. tab. 89.*

Habitat in America.

Elytra obscura, punctis fuscis irrorata. Tibiae posticae cinereae.

- coeruleo-* **23.** *G. thorace subcarinato, alis virescenti-coeruleis: fascia nigra.* *Linn. Syst. Nat. II. 700. 44. Mus. Lud. Ulr. 145.*  
*scens.* *Acrydium elytris nebulosum, alis coeruleis, extimo nigro.* *Geoff. Ins. I. 392. 2. Scopol. carn. 325.*  
*Frisch. Ins. 9. tab. 1. fig. 3.*  
*Sultz. Ins. tab. 9. fig. 60.*  
*Schueff. Icon. tab. 27. fig. 6. 7.*  
*Roef. Ins. II. Gryll. tab. 21. fig. 4.*  
*Habitat in Europa australi.*  
*Alae apice cinereae.*
- flavus.* **24.** *G. thorace carinato, alis flavis, fascia nigra, apice cinereis.*  
*Gryllus flavus thorace subcarinato, alis disco flavo, fascia nigra apice hyalinis.* *Linn. Syst. Nat. II. 702. 52.*  
*Locusta capensis alis inferioribus luteis.* *Petriv. Gazoph. 6. tab. 3. fig. 6.*  
*Habitat in regione Pedemontana.* *D. Allioni.*  
*Statura G. italicici. Antennae breves, flavescentes.*  
*Caput obtusum, nigrum, fronte lineolis duabus flavis. Thorax carinatus, niger. Elytra fusca, fascia una ulterave baseos albicante, apice cinerea. Alae basi flavae, in medio fascia lata nigra, apice cinereae.*
- cyanipes.* **25.** *G. fuscus, linea dorsali flava, tibiis posticis flavis, apice cyaneis.*  
*Habitat in America.*  
*Corpus magnitudine G. grossi. Antennae flavescentes, apice fuscae, linea dorsalis flavescens a vertice ad medium elytrorum. Elytra alaeque nebulosae. Tibiae posticæ flavae, apice cyaneæ.*
- rufisticus.* **26.** *G. griseus, elytris basi fuscis, flavo maculatis, apice cinereo fuscoque variis.*  
*Habitat in America.*  
*Statura G. grossi. Thorax griseus, interdum linea dorsali flava maculisque lateralibus nigris. Elytra basi fusca, linea dorsali grisea maculisque aliquot lateralibus flavis, apice cinerea, maculis variis fuscis. Alae cinereae, fusco reticulatae.*

27. G. thorace fusco: margine puncto que utrinque tibiisque flavis. *lateralis.*  
 Habitat in America.  
 Statura et magnitudo G. cyanipedis. Thorax laevis, obscurus, margine et puncto supra marginem lacte flavis. Elytra alaeque fuscantes. Tibiae posticae omnino flavae.
28. G. femoribus sanguineis, elytris virescentibus: antennis cylindricis. *Linn. Syst. Nat. II. 702. 58.* *Fn. Sv. 877.*  
 Acrydium femoribus sanguineis, alis subfuscis, reticulatis. *Geoff. Ins. I. 393.*  
*Friseb. Ins. 9. p. 5. tab. 4.*  
 Habitat in Europae siccis, arenosis.
29. G. thorace cruciato, fuscus, femoribus tibiisque *captiva.* posticis fascia alba.  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*  
 Caput fuscum, lineis nigris. Thorax fuscus, cruce alba. Elytra fusa, dorso pallidiore. Pedes fusi. Femora postica compressa, nigra, fascia apicis alba. Tibiae nigrae, fascia baseos alba.
30. G. fuscus, ab domine rufo, antennis subclavatis. *rufus.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 702. 56.* *Fn. Sv. 876.*  
*Scopoli Carn. 329.*  
 Habitat in Europae arenosis.
31. G. corpore incarnato, aptero. *Linn. Syst. Nat. II. pedestris.*  
*703. 60.* *Fn. Sv. 878.*  
 Habitat in Europa.  
 Insectum perfectum, teste celeberrimo *Linné.*
32. G. alarum rudimentis ocello atro, oculis aureis. *perspicillatus.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 703. 61.* *Amoen. acad. 6. 398. 34.*  
 Habitat in Indiis.  
 Antennae filiformes, corpore breviores.  
 An potius larva?



---

### III. S Y N I S T A T A.

*Os palpis quatuor.*

*Maxilla inferior connata cum labio.*

---

92. MONOCVLVS. *Palpi quatuor postici auriformes.*

*Antennae saepius ramosae.*

- *Polyphe-* 1. M. testa plana, convexa: sutura lunata; postica dentata, cauda subulata longissima. *Linn. Syst. Nat. II. 1057. 1. Mus. Lud. Ulr. 460.*

*Xiphosura. Gron. Zooph. 953.*

*Ionst. ex sangu. tab. 7. fig. 1. 2.*

*Olear. Mus. tab. 28. fig. 1. 2.*

*Worm. Mus. tab. 249.*

*Rumph. Mus. 21. tab. 12.*

*Knorr. del. tab. F. 1.*

*Kaempf. Iap. tab. 13. fig. 8.*

*Schaeff. Monogr. 1756. tab. 7.*

*Cancer Molluccanus. Seb. Mus. 3. tab. 17. fig. 1.*

Habitat in India. Insectorum omnium facile maximum evadens.

*piscinus. 2. M. testa cordata, plana. Linn. Syst. Nat. II. 1057. 2. Fn. Sv. 2045.*

*Loeffl. act. Ups. 1750. 42.*

*Bastler. Suhf. 137. tab. 8. fig. 9. 10.*

*Binocularis. Geoff. Inf. 2. 660. tab. 21. fig. 3.*

*Stroem. Sundm. tab. 1. fig. 4. 5. 6.*

Habitat in Oceano.

Duae hujus sunt varietates. *Stylatus antennis corpore longioribus. Muticus absque exsertis antennis.*

3. M.

3. M. antennis trifidis, cauda bifida. 160. 3. [Apus.]  
 Monoculus Apus testa subcompressa, antice retusa,  
 postice truncata, cauda bifeta. *Linn. Syst. Nat.* II.  
 1058. 3. *Fn. Sv.* 2046.

Binoculus cauda bifeta. *Geoff. Inf.* 2. 660. 1.

Apus caneriformis. *Schaeff. Monogr.* 1756. tab. 1-6.

*Frisch. Inf.* 10. tab. 1.

*AET. angl.* 40. 150. tab. 1. fig. 2.

*Schaeff. Elem.* tab. 29. fig. 1.

*Sulz. Inf.* tab. 24. fig. 153.

Habitat in Europae fossis, piscinis.

4. M. antennis dichotomis, cauda inflexa, acuta. *Linn.* *Pulex.*  
*Syst. Nat.* II. 1058. 4.

*Geoff. Inf.* 2. 655. 1.

Pulex aquaticus. *Schaeff. mon.* 1755. tab. 1. fig. 1-8.

*Swamm. bibl.* tab. 31. fig. 1. 2. 3.

*Ioblot. micr.* 1. p. 2. tab. 13. fig. P. Q. R.

*Leidermull. micr. sc.* 146. tab. 72. fig. 2.

Habitat in Europae aquis dulcibus.

Copia hujus pluviam sanguineam aemulat.

5. M. antennis dichotomis, cauda reflexa. *Linn. Syst. Pediculus.*  
*Nat.* II. 1058. 5. *Fn. Sv.* 2048.

*Geoff. Inf.* 2. 656. 2.

Habitat in Europae aquis dulcibus.

6. M. antennis quaternis, cauda recta bifida. *Linn. Syst. quadricor-*  
*Nat.* II. 1058. 6. *Fn. Sv.* 2049. *nis.*

*Geoff. Inf.* 2. 656. 3.

*Bakr. microsc.* tab. 9. fig. 1. 2.

*Blank. Inf.* 149. tab. 13. fig. B.

*Ioblot. micr.* 1. p. 2. tab. 14. fig. 6. D.

*de Geer. AET. Holm.* 1747 tab. 6. fig. 2.

*Koenf. Inf.* 3. tab. 98. fig. 1. 2. 4.

*Leuwenh. arc.* 142. fig. 1.

Habitat in Europae aquis stagnantibus frequens.

Antennae caudaque rufescunt.

7. M. antennis capillaribus multiplicibus, testa bivalvi. *concha-*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 1059. 7. *Fn. Sv.* 2050. *ebus.*

*Geoff. Inf.* 2. 657. 4.

Habitat in aquis stagnantibus, velocissime antennis ex-  
 fertis natans.

93. ONISCVS. *Labium quadrifidum: lacinis intermediis palpigeris.*

*Antennae setaceae.*

*parado-*  
*xus.*

1. O. antennis quaternis, segmentorum lateribus falcato-spinosis.

Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*

Statura magna, lata, depressa Monoculi. Antennae quaternae, articulo primo et secundo longioribus, compressis, reliquis brevissimis, setaceis. Oculi duo distincti in capitis segmento. Segmenta corporis sex anteriora latissima, lateribus retro falcatis, acutis, 7. 8. 9. breviora, angustiora lateribus haud exsertis. Cauda magna, ovata, lineis tribus dorsibus elevatis, apice utrinque foliolo brevi, obtuso. Pedes 14 unguiculati.

Affinis Monoculis. An Protypon Entomolithi paradoxi?

*umbrica-*  
*tus.*

2. O. antennis quaternis, compressis, pedibus unguiculatis: femoribus posticis carinatis.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnum, oblongum, pallidum. Antennae quatuor breves. Segmenta corporis septem anteriores subaequalia, 8 breve, angustatum, 9-12. brevia imbricata. Cauda lata, obtusa, interdum emarginata utrinque foliolis duobus, brevibus, subulatis. Pedes quatuordecim unguiculo arcuato, valido, acuto. Femora octo postica carinata.

*Afilus.*

3. O. abdomine foliolis duobus obtecto, cauda semiovali. *Linn. Syst. Nat. II. 1059. I. Fn. Sv. 2052. Mus. Adolph. Frid. I. 88.*

*Afilus s. Oestrum. Bell. aquat. 443.*

*Pediculus marinus. Rond. pis. 576.*

*Gronov. Zooph. 997.*

*Bast. subf. 2. 144. tab. 13. fig. 3.*

Habitat in Oceano, viviparus.

4. *O. abdomine foliis sex obtecto, cauda retusa.* *Linn.* *Oesfrum.*  
*Syst. Nat.* II. 1059. 2. *Fn. Sv.* 2053. *Mus. A. F.* 89.  
*Animalculum crustaceum.* *Margr. bras.* 155. fig. 3. 4.  
*Stroem.* *Sundm.* 165. 2. tab. 1. fig. 2. 3.  
Habitat in Oceano.
5. *O. antennis quaternis, cauda oblonga, acuta.* *Entomon.*  
*Oniscus Entomon* *abdomine subtus nudo, cauda subula-*  
*tata.* *Linn.* *Syst. Nat.* II. 1060. 5. *Fn. Sv.* 2055.  
*Asellus marinus cornubiensis* *alius.* *Raj. Inf.* 43.  
*Entomon pyramidale.* *Klein.* tab. 38. fig. 1. 2.  
*Periv. Gazoph.* 992.  
Habitat in Oceano.  
Natat velocissime, viicitat canceris minoribus.
6. *O. cauda rotundata: stylis bifurcatis, antennis quaternis.* *aquaticus.*  
*Oniscus aquaticus lanceolatus, cauda rotundata, stylis*  
*bifurcatis.* *Linn.* *Syst. Nat.* II. 1061. II. *Fn. Sv.* 2061.  
*Asellus cauda bifida, stylis bifurcatis, articulis septem.*  
*Geoff. Inf.* 2. 672. 1.  
*Asellus aquaticus* *Gesneri.* *Raj. Inf.* 43. 1.  
*Frisch. Inf.* 10. tab. 5.  
*Schueff. Elem.* tab. 22.  
Habitat in aquis Europae.
7. *O. semicylindricus, cauda ovato-oblonga, acuminata.* *marinus.*  
*Oniscus marinus semicylindricus, cauda ovato-oblon-*  
*ga, integra.* *Linn.* *Syst. Nat.* II. 1060. 7. *Fn. Sv.* 2057.  
*Linn.* *It. Wgoth.* 190.  
Habitat in Oceano Norwegico.  
Antennae setaceae. Cauda apice acuminata.
8. *O. oblongus, cauda tridentata, pedibus subcheli-*  
*formibus.*  
*Oniscus depressus, oblongus, pedibus omnibus subche-*  
*liformibus.* *Pall. Miscell.* 194. tab. 14. fig. 16. 17. bon.  
*Oniscus longus, teres* *Bast. subf.* 2. 143. tab. 13. fig. 2. mal.  
Habitat inter fucos maris Atlantici.
9. *O. semicylindricus, caudis duabus longitudine cor-*  
*poris.* *Linn.* *Syst. Nat.* II. 1060. 8. *Fn. Sv.* 2062. *2 cauda-*  
*tus.*  
Habitat in Oceano Norwegico.

- scopulo-* 10. *O. luteus: strigis fuscis.* *Linn. Syst. Nat. II. 1061. 10.*  
*vum.* *Fn. Sv. 2060.*  
*Linn. Wgotb. 190.*  
*Stroem. Sundm. 166. 3.*

Habitat in Oceano Norwegico.

- Pfora.* 11. *O. abdomine subtus nudo, cauda semiovali, acuta.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 1060. 3. Fn. Sv. 2054.*  
Habitat in Oceano Norwegico.

- Physodes.* 12. *O. abdomine subtus nudo, cauda ovata, antennis*  
*quaternis.*  
*Oniscus Physodes abdomine subtus nudo, cauda ovata.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 1060. 4.*

Habitat in Oceano, Terra del Fuego. *Mus. D. Banks.*

- spinofus.* 13. *O. oblongus, corpore spinoso, pellucido.*  
Habitat in Oceano Atlantico. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus medium, gelatinoso-membranaceum, pellucidum. Caput magnum, rotundatum, obtusum, marginibus spinulosis. Oculi maximi, contigui. Antennae duae simplices, setaceae. Segmenta corporis undecim sensim angustiora, carinata, carina spinulosa. Abdomen subtus foliolis sex ovatis obtectibus. Cauda brevis, foliolis quatuor bifidis. Pedum septem paria, 1. 2. brevia, chelata, approximata, 3. 4. 5. 6. longiora, angulata, angulis spinulosis, articulo ultimo subulato, simplici, 7. breve, articulo ultimo clavato, unguiculato.

- gibbosus.* 14. *O. oblongus, gibbus, antennis plicatis, longissimis.*  
Habitat in Oceano Lusitanico. *Fig. piæt. in Mus. Bankiano.*

Corpus parvum, glabrum, laeve, flavescens, punctis fuscis irroratum. Caput crassum, obtusum, oculis duobus maximis approximatis, macula magna viridi. Antennae duae setaceae, sub corpore inflexae et plicatae, corpore triplo longiores. Thorax gibbus, segmentis septem, primo brevissimo. Abdomen segmentis quatuor. Cauda foliolis tribus, acuminate, fissis. Pedes 14. intermediis sublongioribus.

15. *O.*

15. *O. oblongus*, stylis caudalibus senis, antennis quaternis. *quadricornis.*  
 Habitat in mari Atlantico. *Mus. Banks.*
- Corpus parvum, gibbum, glabrum. Caput retusum.  
 Oculi maximi, macula magna lunata; viridi. Antennae quatuor setaceae, longitudine corporis.  
 Corpus segmentis duodecim, ultimo planiusculo, ovato, integro. Cauda exserta, stylis sex acutis, integris. Abdomen subtus foliatum. Pedes 14. subaequales.
16. *O. ovalis*, segmentis distinctis, pedibus tertii quartique paris linearibus, muticis. *Linn. Syst. Nat. II.* 1060. 6. *Fn. Sv. 2056. Mus. A. F. I. 89.*  
 Habitat in balaenis.  
 Ab hoc genere differre videtur mihi haud rite notus.
17. *O. ovalis*, cauda bifida: stylis bifidis. *Linn. Syst. Nat. oceanicus.*  
 II. 1061. 12.  
*Oniscus* stylis caudae utrinque binis. *Stroem. Sundm.* 202. tab. I. fig. 14. 15.  
*Oniscus* corpore lato, pedibus natatoriis, cauda utraque bifeta. *Aet. helv. 5. 371. tab. 5. fig. 463.*  
*Baster Subf. 26. 145. tab. 13. fig. 4.*  
*Gronov. Zoolph. 994. tab. 17. fig. 2.*  
 Habitat in Oceano.
18. *O. ovalis*, cauda obtusa: stylis duobus simplicibus. *Asellus.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 1061. 14. Fn. Sv. 2058.*  
*Oniscus* cauda obtusa, bifurca. *Geoff. Inf. 2. 670. 2.*  
*Asellus asininus s. vulgaris. Raj. Inf. 41. 1.*  
*Scopol. carn. 1142.*  
*Matth. Diosc. 257.*  
*Aldr. Inf. 632.*  
*Mo ff. Inf. 202.*  
*Schneff. Eem. tab. 92.*  
*Gronov. Zoolph. 993.*  
*Sultz. Inf. tab. 24. fig. 154.*  
 Habitat in domibus, muris, lignis putridis.
19. *O. ovalis*, cauda obtusa, integra. *Linn. Syst. Nat. II.* 1061. 15. *Fn. Sv. 2059. Geoff. Inf. 2. 670. 1.* *Armadillo.*  
*Asellus lividus. Raj. Inf. 42.*  
*Scop. carn. 1144.*  
 Habitat sub Europae lapidibus.

94. LEPISMA. *Palpi inaequales.*

*Labium rotundatum, membranaceum, emarginatum.*

*Antennae setaceae.*

- saccharina.* 1. *L. squamata, argentea, cauda triplici.*  
*Lepisma saccharina squamosa, cauda triplici.* *Linn.*  
*Syst. Nat. II. 1012. 1. Fn. Sv. 1925.*  
*Forbicina plana.* *Geoff. Inf. 2. 613. 1.*  
*Forbicina.* *Aldr. Inf. 570. tab. 2. fig. 5.*  
*Setoura subargentea,* *cauda setosa, setis hirsutis.*  
*Brown. Iam. 425.*  
*Sultz. Inf. tab. 22. fig. 142.*  
*Schueff. Elem. tab. 75.*  
*Adam. microf. tab. 28. fig. 147.*  
*Habitat in America inter saccharum, nunc in Europa*  
*frequens inter utensilia, libros, vestesque.*
- polypoda.* 2. *L. saltatoria, cauda triplici, abdominis segmentis*  
*subtus utrinque villosis.*  
*Lepisma polypoda scutata, cauda triplici.* *Linn. Syst.*  
*Nat. II. 1012. 2.*  
*Forbicina teres saltatrix.* *Geoff. Inf. 2. 614. 2.*  
*Habitat in Europae littoribus lapidosis.*  
*Praecedenti duplo major, squamis varie coloratis,*  
*nitens.*
- lineata.* 3. *L. cauda triplici, corpore fusco: vittis duabus albis.*  
*Habitat in Helvetiae muris: capt. d. 1. Maj.*  
*Antennae setaceae, longitudine corporis. Thorax*  
*tectus scutis tribus postice emarginatis. Corpus*  
*squamosum, supra fuscum s. nigrum, cinereo irro-*  
*ratum, vittis duabus longitudinalibus, albis. Cauda*  
*triplex pilis villosis, intermedia breviore. Setulae*  
*aliquot sub cauda. Subtus argentea, pectore scutis*  
*tribus tecto. Pedes breves, femoribus compressis.*
- villofa.* 4. *L. fusca, cauda triplici villosa.*  
*Habitat in China. Drury.*  
*Statura L. saccharinae, at brevior et crassior. Caput*  
*vilosum; albidum. Corpus ovatum, supra fuscum,*  
*subtus*

subtus albidum. Cauda setis tribus valde villosis, intermedia longiore et subtus fetulac duae brevissimae, uti in L. saccharina. Pedes breves, albi.

95. PODVRA. *Palpi* subclavati.*Labium* bifidum.*Antennae* setaceae.

1. P. subglobosa, viridis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1013. 1. *viridis.*  
*Fn. Sv.* 1922.

Podura viridis, capite flavescente, antennis in medio fractis. *Geoff. Inf.* 2. 607. 2.

Habitat in Europae plantis, frequens in Polygoni, Fagopyri foliis primordialibus.

2. P. subglobosa, atra, antennis longitudine corporis, *polypoda.*  
apice albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1013. 2. *Fn. Sv.* 1928.

Habitat in Europae plantis.

3. P. globosa, fusca, nitida, antennis longis: articulis plurimis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1013. 3. *Fn. Sv.* 1929.

*Act. Holm.* 1743. 296. tab. 7.

Habitat in Europae terrestribus.

4. P. teres, fusco-coerulea, nitida. *Linn. Syst. Nat.* II. *plumbea.*  
1013. 4. *Fn. Sv.* 1930.

Podura plumbea. *Geoff. Inf.* 2. 610.  
*Sulz. Inf.* tab. 22. fig. 143.

Habitat in Europae plantis.

5. P. ovata, flava, dorso maculis duabus ferrugineis. *minuta.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 1013. 5.

Habitat in Europa.

6. P. oblonga, cinerea, signaturis nigris. *Linn. Syst. nivalis.*  
*Nat.* II. 1013. 6. *Fn. Sv.* 1931.

Pulex nivis. E. N. 6. Dec. 2. ann. 3. obs. 197.  
*de Geer Act. Ups.* 1740. 54. tab. 2.

Habitat in Europae nemoribus, lignis, hyeme frequens  
in vestigiis hominum et mammalium supra nives.

- vaga.* 7. *P. oblonga, nigra, abdomine antennisque fascia alba.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 1013. 7.*  
*Habitat in Europa.*
- arborea.* 8. *P. oblonga, nigra, pedibus furcaque albis.* *Linn. Syst. Nat. II. 1014. 8.* *Fn. Sv. 1932.*  
*de Geer Aet. Ups. 1740. 49. tab. I.*  
*— — Aet. Holm. 1750. 272. tab. I.*  
*Podura nigra, thoracis limbo antennarumque basi flavis, pedibus furcaque pallidis.* *Geoff. Inf. 2. 609. 6.*  
*Habitat in Europae sylvis.*
- villosa.* 9. *P. oblonga, villosa, fusco nigroque variegata.* *Linn. Syst. Nat. II. 1014. 9.*  
*Podura fusco nigroque variegata, villosa.* *Geoff. Inf. 2. 608. tab. 20. fig. 2.*  
*Habitat in Europa australiori.*
- cincta.* 10. *P. cylindrica, grisea, cingulo atro, antice albo.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 1014. 10.* *Fn. Sv. 1933.*  
*Habitat in Europa.*
- annulata.* 11. *P. livida, annulis nigris.*  
*Podura livido - lutea, annulis transversis, nigris.*  
*Geoff. Inf. 2. 609. 5.*  
*Habitat in Europa.*
- lignorum.* 12. *P. plumbea, capite, thorace, pedibus furcaque pallidis.*  
*Habitat in Europae lignis antiquis.*  
*Parva. Caput pallidum, ore antennisque nigris.*  
*Thorax subrotundus, pallidus, immaculatus. Abdomen plumbeum, furca nivea. Pedes pallidi.*
- puffila.* 13. *P. cylindrica, aenea, furca alba.* *Linn. Syst. Nat. II. 1014. II.*  
*Habitat in Europa.*
- aquatica.* 14. *P. nigra, aquatica.* *Linn. Syst. Nat. II. 1014. 12.*  
*Fn. Sv. 1934.*  
*Geoff. Inf. 2. 610. 8.*  
*de Geer Aet. Ups. 1740. 57. tab. 3.*  
*— — Aet. Holm. 1750. 279. tab. 3. 4.*  
*Lederm. epist. 15. tab. 7.*  
*Habitat in Europae aquosis, horis matutinis per phalanges decorticat aquas stagnantes.* *Linn. 15. P.*

15. P. terrestris, alba. *Linn. Syst. Nat.* II. 1014. 13. *funetaria.*  
*Fn. Sv.* 1935.  
*Podura funetaria. Scop. carn.* 1935.  
 Habitat in Europae terra praegnante, frequens pri-  
 mo vere. Cauda mutica. Haud salit.
16. P. alba, cauda bifida, extensa. *Linn. Syst. Nat.* II. *ambulans.*  
 1014. 14. *Fn. Sv.* 1936.  
 Habitat sub Europae muscis.

96. E P H E M E R A. *Maxillae superiores*  
*nullae.*  
*Antennae subulatae.*

\* *Cauda trifeta.*

1. E. cauda trifeta, alis fusco reticulatis maculatisque, *vulgata.*  
 corpore fusco.  
*Ephemera vulgata cauda trifeta, alis nebuloso-macu-*  
*latis. Linn. Syst. Nat.* II. 906. 1. *Fn. Sv.* 1472.  
*Ephemera alis nebuloso-maculatis, cauda trifeta.*  
*Geoff. Inf.* 2. 238. 1.  
*Sultz. Inf.* tab. 17. fig. 103.  
*Scop. carn.* 683.  
 Habitat in Europae aquis.  
 Tanta ejus copia in Carniola, ut ad agros stercoran-  
 dos a rusticis adhibeatur. *Scop.*
2. E. cauda trifeta, alis hyalinis reticulatis, corpore lu- *lutea.*  
 teo. *Linn. Syst. Nat.* II. 906. 2.  
 Habitat in Europa.
3. E. cauda trifeta, alis albis: margine exteriori fusco, *margina-*  
*corpo nigro. Linn. Syst. Nat.* II. 906. 3. *ta.*  
 Habitat in Suecia.
4. E. cauda trifeta, alis nigris: posticis albis. *Linn. Syst. vespertina.*  
*Nat.* II. 906. 4. *Fn. Sv.* 1480.  
*Ephemera nigra, cauda trifeta. Geoff. Inf.* 2. 239. 4.  
 Habitat in Europae aquosis.

\*\* *Cauda*

\* \* *Cauda bifeta.*

- venosa.* 5. E. cauda bifeta, alis albis, reticulatis, corpore fusco. Habitat in Daniae paludosis.  
Statura E. marginatae, at paulo major et cauda tantum bifeta.
- bioculata.* 6. E. cauda bifeta, alis albis, reticulatis, capite tuberculis duobus luteis.  
Ephemera bioculata cauda bifeta, alis albis, reticulatis, abdomine diaphano. *Linn. Syst. Nat.* II. 906. 5. *Fn. Sv.* 1473.  
Habitat in Europae aquis.  
Caudae albae, fusco punctatae, corpore longiores.
- vigra.* 7. E. cauda bifeta, corpore nigro, alis nigricantibus: posticis minimis. *Linn. Syst. Nat.* II. 907. 7. *Fn. Sv.* 1478.  
Habitat in Europa.
- boraria.* 8. E. cauda bifeta, alis albis, margine crassiore, nigricantibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 907. 9. *Fn. Sv.* 1476.  
Ephemera alis albis, margine crassiore, nigricantibus, cauda bifeta. *Geoff. Inf.* 2. 240. 8.  
Ephemera minima. *Swammerd. quart.* 87.  
Habitat in Europae aquis.  
Esca piscium, ex hac et congeneribus praestantissima.
- culicifor.* 9. E. cauda bifeta, alis albis, corpore fusco. *Linn. Syst. Nat.* II. 907. 8. *Fn. Sv.* 1475.  
*Geoff. Inf.* 2. 240. 6.  
*Pod. Inf. tab.* I. fig. 10.  
Habitat in Europae aquosis.
- striata.* 10. E. cauda bifeta, alis hyalinis, striatis, thorace fusco, abdomine albo. *Linn. Syst. Nat.* II. 907. 10.  
Ephemera mutica. *Linn. Fn. Sv.* 1479.  
Ephemera thorace fusco, abdomine albo, cauda bifeta, alis fuscis, striatis. *Geoff. Inf.* 2. 240. 7.  
Habitat in Europa.
- diptera.* 11. E. cauda bifeta, alis duabus: costa marginali fusca, cinereo - maculata. *Linn. Syst. Nat.* II. 907. 11. *Fn. Sv.* 1477.  
Habitat in Europa.

97. SEMBLIS. *Palpi filiformes.**Maxilla bifida.**Labium membranaceum,  
integrum.**Antennae setaceae.*

1. S. nigra, alis albis: maculis nigris sparsis.

*Phalaenoides.**Phryganea Phalaenoides. Linn. Syst. Nat. II. 908. 3.**Phryganea nigra, alis albo-pallidis: maculis plurimis  
nigris. Uddm. Diff. 53. fig. 16.**Habitat in Europa boreali, Finnlandia.*

2. S. cauda biseta: setis longitudine corporis.

*bi cauda-  
ta.**Phryganea bi caudata cauda biseta, alis venoso-reticu-  
latis. Linn. Syst. Nat. II. 908. 1. Fn. Sv. 1489.**Phryganea maxima. Scop. carn. 705.**Perla fusca capite thoraceque linea longitudinali flava,  
alis fusco-reticulatis. Geoff. Inf. 2. 231. 1.**Reaum. Inf. 3. tab. 13. fig. 12.**Sulz. Inf. tab. 17. fig. 6.**Habitat in Europae aquosis. Ova sub ventre circumfert.**Totum corpus virescens.*

3. S. cauda biseta: setis truncatis, abbreviatis.

*nebulosa.**Phryganea nebulosa cauda biseta, alis subcinereis. Linn.  
Syst. Nat. II. 908. 2. Fn. Sv. 1499.**Perla nigro-fusca, alis subcinereis, pallidis, caudae  
setis truncatis. Geoff. Inf. 2. 232. 3.**Habitat in Europa.*

4. S. ecaudata, alis reticulatis.

*lutaria.**Heimerobius lutarius niger, alis albidis, striatis, albo  
maculatis. Linn. Syst. Nat. II. 913. 14. Fn. Sv. 1513.**Hoeffn. piët. tab. 12.**Roef. Inf. 2. aqu. 2. tab. 13.**Schaeff. Elem. tab. 97.**— — Ikon. tab. 37. fig. 9. 10.**Habitat in Europae plateis lutosis.*

**98. PHRYGANEAE.** *Maxillae totae connatae cum labio inferiori.*

*Antennae setaceae.*

*reticulata.* 1. P. nigra, alis subferrugineis, atro reticulatis. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 908. 4. *Fn. Sv.* 1482.

Habitat in Europa.

*striata.* 2. P. alis testaceis, nervoso striatis. *Linn. Syst. Nat.* II.  
908. 5. *Fn. Sv.* 1483.

*Geoff. Inf.* 2. 246. 1. tab. 13. fig. 5.

*Frisch. Inf.* 13. tab. 3.

*Alb. Inf.* 763.

*Reaum. Inf.* 3. tab. 13. fig. 8. 9. II.

Habitat in Europa.

*analis.* 3. P. alis fuscis: macula anali alba, nucha hirta, aurea.  
Habitat in Suecia.

Caput et antennae nigrae. Nucha tecta hirsutie aurea.  
Alae fuscae, puncto albo ad angulum ani.

*fusca.* 4. P. alis fuscis, immaculatis, pedibus flavis.  
Phryganea fusca, immaculata, alis inferioribus hyalinis. *Linn. Syst. Nat.* II. 910. 20. *Fn. Sv.* 1500  
Habitat in Europa.  
Alae immaculatae. Pedes omnes flavescentes.

*pilosa.* 5. P. alis fuscis, immaculatis, capite thoraceque hirtis.  
Habitat in Suecia.  
Corpus totum cum alis dilute fuscum.

*grandis.* 6. P. alis fusco-testaceis, cinereo-maculatis.  
Phryganea grandis alis cinereo-testaceis: lineolis duabus longitudinalibus nigris: puncto albo. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 909. 7. *Fn. Sv.* 1485.  
*Roeß. Inf.* 2. *aquat.* 2. tab. 17.  
*Reaum. Inf.* 3. tab. 14. fig. 4.  
Habitat in Europae aquis intra cylindrum ex ramentis  
longitudinalibus ligneis.

III. SYNISTATA. Phryganea. 307

7. P. alis griseis: macula laterali rhombica alba. *rhombica.*  
*Phryganea rhombica* alis flavescentibus, deflexo-com-  
 pressis: macula rhombea laterali alba. *Linn. Syst.*  
*Nat.* II. 909. 8. *Fn. Sv.* 1486. *Geoff. Inf.* 2. 246. 2.  
*Reaum. Inf.* 3. tab. 14. fig. 5.  
*Roef. Inf.* 2. *aqu.* 2. tab. 16.  
*Schaeff. Elem.* tab. 100.  
 — — *Icon.* tab. 90. fig. 5. 6.  
 Habitat in Europae aquosis intra cylindrum ex rami-  
 lis gramineis transversis.
8. P. alis fuscis: macula laterali dupli flava. *Linn. Syst.* *bimacula-*  
*Nat.* II. 909. 9. *Fn. Sv.* 1486. *ta.*  
 Habitat in Europae aquosis.
9. P. alis nigris, antennis longissimis. *Linn. Syst.* *Nat.* *nigra.*  
 II. 909. 11.  
*Geoff. Inf.* 2. 250. 10.  
*Raj. Inf.* 275.  
 Habitat in Europae rivulis.
10. P. alis nigris, postice violaceis. *Linn. Syst.* *Nat.* II. *azurea.*  
 909. 12. *Fn. Sv.* 1491.  
 Habitat in Europae borealis aquosis.  
 Parva. Alae posticae oblique-violaceae.
11. P. nigricans, alis margine omni flavo. *Linn. Syst.* *margina-*  
*Nat.* II. 910. 14. *ta.*  
 Habitat in Suecia.  
 Thorax tomentosus, testaceus.
12. P. alis fuscis: utroque margine lineolis duabus *bilineata.*  
 transversis, albidis. *Linn. Syst.* *Nat.* II. 910. 19.  
*Fn. Sv.* 1496.  
 Habitat in Europa boreali.
13. P. nigra, alis fuscis: fasciis quatuor niveis, anterio-  
 ribus interruptis, posteriori marginali punctata. *interrupta.*  
 Habitat in Anglia.  
 Statura praecedentis. Antennae corpore longiores,  
 albo nigroque annulatae. Caput et thorax nigra,  
 palpis pallidis. Alae anteriores fuscae, fasciis tri-  
 bus interruptis niveis margineque postico albo pun-  
 cato: posteriores cinereae. Pedes pallidi.

- hirta.* 14. P. fusca, alis anticis hirtis, antennis longitudine corporis.

Habitat Oxoniae.

Media. Antennae longitudine corporis, albae, fusco annulatae, primo articulo longiori, hirto. Caput et thorax fusca, immaculata, hirta. Alae anticae rotundatae, hirtae, fuscae, maculis duabus obscurioribus obsoletis, altera ad marginem tenuiorem, altera in medio alae. Alae posticae glabrae, fuscae. Pedes pallidi.

- longicornis.* 15. P. alis fuscis: strigis duabus undatis, obscurioribus, antennis longissimis.

Phryganea longicornis alis superioribus nebulosis, antennis corpore triplo longioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 910. 15. *Fn. Sv.* 1492.

Phryganea alis superioribus nebulosis, nigro-punctatis, antennis corpore triplo longioribus. *Geoff. Inf.* 2. 249. 7.

Habitat in Europa.

- fasciata.* 16. P. nigra, alis testaceis, fasciis quatuor nigris, antennis longissimis.

Habitat in Angliae aquosis.

Antennae longissimae, albo nigroquae annulatae. Caput, thorax et abdomen nigra. Alae obscure testaceae, fasciis quatuor latis nigris, quarum postica terminalis. Pedes pallidi, femoribus posticis nigris.

- filosa.* 17. P. alis rotundatis, fuscis, immaculatis, antennis corpore triplo longioribus.

Phryganea filosa alis cylindrico-incumbentibus, fluorescentibus, antennis corpore triplo longioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 910. 16. *Fn. Sv.* 1493?

Habitat in Anglia.

Antennae longissimae, albo fuscoque annulatae, articulo primo piloso. Alae anticae fuscae, posticae nigro-hyalinae. Abdomen nigrum, pedibus pallidis.

- minuta.* 18. P. fusco cinereoque variegata, palpis villosis.

Phryganea minuta nigra, palpis villosis, capite longioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 911. 23. *Fn. Sv.* 1501.

Habitat in Europa.

99. HEMEROBIVS. *Palpi filiformes.*

*Maxilla recta, apice fissa.  
Labium corneum, forniciatum.*

*Antennae setaceae.*

1. *H. antennis pectinatis, alis albidis: signaturis nervis-pe<sup>c</sup>tinoris que fuscis albo subarticulatis.* *Linn. Syst. Nat. II. vis.*

*911. I. Amoen. acad. 6. 412.*

*Habitat in America septentrionali.*

*Statura Myrmeleonis, at antennae setaceae, pectinatae.*

2. *H. luteo-viridis, alis hyalinis: vasis viridibus.* *Linn. perla.*  
*Syst. Nat. II. 911. 2. Fn. Sv. 1504. Geoff. Inf. 2.*  
*253. I. tab. 13. fig. 6.*

*Musca quadripennis, corpore luteo-viridi, alis per-amplis, e flavo pariter virentibus.* *Raj. Inf. 274.*

*Hemerobius Chrysops.* *Scop. carn. 708.*

*Musca Chrysops.* *Mouff. Inf. 937.*

*Perla merdam olens.* *Petiv. Mus. 4. 6.*

*Goed. Inf. 2. 40. tab. 14.*

*Alb. Inf. tab. 64.*

*Merian europ. 3. 49. tab. 8.*

*Vall. nat. I. 77. tab. 2.*

*Reaum. Inf. 3. tab. 33. fig. 2. 5. 6.*

*Roef. Inf. 3. tab. 21. fig. 4. 5.*

*Schoeff. Icon. tab. 5. fig. 7.*

*Habitat in Europa, vivitans aphidibus. Ova stipiti capillari insidentia.*

3. *H. albus, alis hyalinis, oculis aeneis.* *Linn. Syst. albus.*  
*Nat. II. 911. 3. Fn. Sv. 1506.*

*Habitat in Europae plantis.*

*Praecedenti nimis affinis.*

4. *H. viridi nigroque varius, alis hyalinis, maculis reticulatis.* *Linn. Syst. Nat. II. 912. 4. Fn. Sv. 1505.*  
*Hemerobius luteus, alis aqueis, vasis fusco punctatis.*

*Geoff. Inf. 2. 254. 2.*

*Frisch. Inf. 4. 40. tab. 23.*

*Reaum. Inf. 3. tab. 33. fig. 14 - 16.*

*Roef. Inf. 3. tab. 21. fig. 3.*

*Habitat in Europa.*

- Phalaenoi-* 5. *H. testaceus*, alis basi mucronatis, postice excisis.  
*des.* *Linn. Syst. Nat.* II. 912. 5. *Fn. Sv.* 1508.  
*Hemerobius.* *Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 11. 12.*  
 Habitat in Europa.  
 Alae testaceae, striga obliqua punctoque fuscis.
- hirtus.* 6. *H. flavescens*, alis albis: strigis fuscis.  
*Hemerobius hirtus* alis albis, fuso reticulatis: fasciis  
 duabus fuscouscentibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 912. 6.  
*Fn. Sv.* 1507.  
 Habitat in Europae humulo, corylo.
- Humuli.* 7. *H. alis albis*: punctis sparsis fuscis, antennis albo  
 nigroque annulatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 912. 10.  
*Fn. Sv.* 1510.  
 Habitat in lupuletis Upsaliensibus.
- striatulus.* 8. *H. fuscus*, flavo-maculatus, alis fusco-striatis, posti-  
 cis immaculatis.  
 Major *H. 2 punctato*. Antennae corpore longiores,  
 fuscae. Caput flavum, ore oculisque fuscis. Thor-  
 rax fuscus, pectore pedibusque flavis. Abdomen  
 fuscum, lateribus fuscouscentibus. Alae antice albae,  
 fusco-striatae, posticae immaculatae.
- 6 puncta-* 9. *H. alis albis*: maculis fuscis, postice punctis sex distin-  
*tus.* etis, antennis fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 913. 12.  
*Fn. Sv.* 1511.  
*Phryganea fuscata*, alis albis, fuso maculatis. *Geoff.*  
*Inf.* 2. 250. 10.  
 Habitat in Europa.
- flavicans.* 10. *H. niger*, thorace abdomineque flavis. *Linn. Syst.*  
*Nat.* II. 913. 13. *Fn. Sv.* 1512.  
 Habitat in Europa.
- 2 puncta-* 11. *H. flavo fuscoque varius*, alis punctis duobus nigris.  
*tus.* *Linn. Fn. Sv.* 1514.  
 Habitat in Europa.  
 Puncta duo alarum nigra, posteriore majore.
- abdomi-* 12. *H. fuscus*, abdomine flavo: ano nigro.  
*nalis.* Habitat in Anglia.  
 Pedicello minor. Antennae breves, fuscae. Alae albae,  
 fuso maculatae.

13. *H. apterus*, ore rubro, oculis luteis. *pulsato-*  
*Termes pulsatorium abdomine oblongo, ore rubro,* *rius.*  
*oculis luteis. Linn. Syst. Nat. II. 1015. 2. Fn.*  
*Sv. 1937.*
- Pediculus ligni antiqui. Geoff. Inf. 2. 601. 12.*  
*Bradl. nat. tab. 27. fig. 3.*  
*A&t. Angl. 270. p. 231 et 291. p. 1586 et 245. p. 376.*  
*Roland. A&t. Holm. 1754. p. 152.*  
*Sulz. Inf. tab. 22. fig. 144.*  
*Schaeff. Elem. tab. 126.*
- Habitat in Europa, America, frequens in domibus,*  
*invisus vestibus, herbariis, museis.*
- Foemina horologii instar pulsatoria in ligneis festucis.*
14. *H. apterus*, ore pallido, oculis fuscis. *fatidicus.*  
*Termes fatidicum abdomine ovato, ore pallido, oculis*  
*fuscis. Linn. Syst. Nat. II. 1016. 3. Fn. Sv. 1938.*  
*Frisch. Inf. II. p. 2. tab. 10.*
- Habitat in Europa.*  
*Nimis praecedenti affinis.*

## 100. MYRMELEON.

*Palpi sex inaequales: in-*  
*feriores longiores, arti-*  
*culis ultimis duobus ex-*  
*trorsum crassioribus.*

*Antennae clavatae.*

1. *M. alis griseis fusco maculatis, corpore nigro flavo-*  
*que variegato.* *libelluloides.*  
*Myrmeleon libelluloides alis nigro punctatis macula-*  
*tisque. Linn. Syst. Nat. II. 913. 1. Drur. Inf. I.*  
*tab. 46. fig. 1.*
- Hemerobius libelluloides. Mus. Lud. Ulr. 401.*  
*Musca rarissima ad libellas referenda. Raj. Inf. 53.*  
*Libella turcica major, alis locustae. Petiv. Gazoph. 6.*  
*tab. 3. fig. 1.*
- Habitat ad Cap. B. S.*  
*An Hemerobius speciosus Linnaei ejusdem speciei?*

*formicarium.* 2. M. alis fusco nebulosis: macula alba marginali postica. *Linn. Syst. Nat.* II. 914. 3.

*Formica leo.* *Geoff. Inf.* 2. 258. tab. 14. fig. 1.

*Vallifn. op.* I. p. 77. tab. 2.

*Reaum. Inf.* 4. tab. 14. fig. 18. 19. et tab. 11. fig. 6. 8. et tab. 32. 33. 34.

*Roeß. Inf.* 3. tab. 17 — 20.

*Sulz. Inf.* tab. 17. fig. 105.

*Schaeff. Elem.* tab. 65.

— — *Icon.* tab. 22. fig. 1. 2.

*Pod. Inf.* tab. 1. fig. 8.

Habitat in Europae arenosis. Larva retrograda sub fovea excavata, formicis vicitans.

*catta.* 3. M. alis hyalinis, fusco submaculatis, nervis nigro punctatis.

Habitat in Madera. *Mus. Bankianum.*

Affinis praecedenti. Corpus fuscum, flavo maculatum.

Pedes flavi, femoribus posticis annulo nigro. Alae magnae, hyalinae, nervis nigro punctatis. Macula oblonga, fusca ad marginem tenuiorem alae anterioris et una alterave versus apicem. Alae posticæ immaculatae.

*formica.* 4. M. alis immaculatis, corpore fusco.

*lynx.* Myrmeleon Formicalynx alis immaculatis, hyalinis, antennis fetaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 914. 4.

*Roeß. Inf.* 3. tab. 21. fig. 2.

Habitat in Africa, America.

Antennæ in nostro clavatae uti in congeneribus.

*sigrinum.* 5. M. alis hyalinis, immaculatis, corpore fusco: thoracis margine pedibusque flavis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Antennæ clavatae, nigrae. Caput fuscum, ore flavo.

Thorax obscurus, margine antico et laterali flavo.

Abdomen fuscum. Pedes flavi. Alae hyalinae, nitidae, immaculatae.

101. ASCALAPHVS. *Palpi sex subaequales, filiformes.*  
*Antennae clavatae.*

1. Ascalaphus.

*barbarus.*

*Myrmeleon barbarum* alis hyalinis, antennis longitudine corporis: clava suborbiculata. *Linn. Syst. Nat.* II. 914. 5.

*Libelluloides* f. *Libellula spuria*. *Schaeff. Monogr.* 1763.

*Elem. tab. 77. Icon. 50. I. 2. 3.*

*Seb. Mus. 3. tab. 86. fig. 2.*

Habitat in Europa, Africa.

Antennae longitudine corporis, apice clavatae. Alae hyalinae, reticulatae, basi flavescentes.

102. PANORPA. *Os porrectum, corneum,*  
*palmis filiformibus.*

*Maxilla bifida.*

*Antennae filiformes.*

1. P. alis aequalibus, nigro maculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. *communis.*  
 915. I. *Fn. Sv.* 1516.

*Panorpa. Geoff. Inf.* 2. 260. tab. 14. fig. 2.

*Musca scoriura. Aldr. Inf.* 386. fig. 8. 9.

387. fig. 5. 5.

*Scorpio Musca. Frisch. Inf.* 9. tab. 14. t.g. I.

*Mouff. Inf.* 62. fig. 3. 4.

*Reaum. Inf.* 4. tab. 8. fig. 9.

*Schaeff. Elem.* tab. 93.

— — *Icon.* tab. 88. 7.

*Sultz. Inf.* tab. 17. fig. 106.

*Aet. Nidros.* 3. 414. tab. 6. fig. 10.

Habitat in Europa, viettans rapina in primis Dipteronum.

Mas cauda chelifera, foemina inermi.

2. P. alis aequalibus, hyalinis, apice fuscis. *Linn. Syst. germanica.*  
 Nat. II. 915. 2.

Habitat in Germania.

Vix a praecedente satis distincta.

*hyemalis.* 3. P. alis subulatis, subincurvatis, ciliatis, foemina aptera. *Linn. Syst. Nat.* II. 915. 3.

Habitat Halae Saxonum mense regelationis.

Statura praecedentium, at pediculo vix duplo major.

*tipularia.* 4. P. alis immaculatis, abdomine falcato, pedibus longissimis.

Panorpa italica lutea, alis aequalibus: puncto marginali, abdomine falcato. *Muller. Act. Taurin.* T. 3. 194.

Habitat in agro Paedemontano. *D. Allioni.*

Figura omnino Tipulae, at alae quatuor et rostrum hujus generis.

*Coa.* 5. P. alis erectis: posticis sublinearibus longissimis.

*Linn. Syst. Nat.* II. 915. 4.

Ephemera Coa. *Hasselqu. It.* 423.

*Act. Holm.* 1747. p. 176. tab. 6. fig. 1.

Habitat in insulis Archipelagi.

Alae flavescentes, anticae fusco maculatae.

### 103. RAPHIDIA. *Palpi subaequales, filiformes.*

*Maxilla cornea, subintegra.*

*Labium breve, cornuum.*

*Antennae filiformes.*

*Ophiopsis.* 1. R. thorace cylindrico. *Linn. Syst. N.* II. 916. 1. *Fn. Sv.* 1517.

Raphidia. *Geoff. Inf.* 2. 233. 1.

*Scopoli carn.* 711.

*Roef. Inf.* 2. tab. 21. fig. 6. 7.

*Schaeff. Elem.* tab. 107.

— — *Icon.* tab. 95. fig. 1. 2.

Habitat in Europae pinetis.

Puppa agilis, currens, matri simillima, at aptera.

*Mantispa.* 2. R. pedibus anticis thoraci antice annexis, antennis thorace brevioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 916. 2.

*Poda Inf.* 101. tab. 1. fig. 15.

*Scop. carn.* 712.

Habitat in Styria.

Tarde progreditur nempe uno et tibiis complicatis, solis femorum geniculis insistens; quibus explicatis ad ascendendum utitur. *Linn.*

104. CYNIPS. *Palpi inaequales, subcapitati.*  
*Labium corneum, integrum.*  
*Antennae filiformes.*

1. *C. nigra*, abdomine ferrugineo postice nigro, pedibus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 917. 1. *Fn. Sv.* 1518.  
*Diplolepis Bedeguaris niger*, abdomine ferrugineo, apice nigro, pedibus rufis. *Geoff. Inf.* 2. 310. 2.  
*Blank. Inf. tab.* 16. fig. V — Z.  
*Reaum. Inf.* 3. tab. 46. fig. 5 — 8. et tab. 47. fig. 1 — 4.  
 Habitat in *Bedeguar rosarum* hispido.
2. *C. fuscus*, thorace villoso. *Cynips Glechomae hederaceae*. *Linn. Syst. Nat.* II. 917. 3. *Fn. Sv.* 1520.  
*Cynips totus fuscus*, thorace villoso. *Geoff. Inf.* 2. 303. 20.  
*Reaum. Inf.* 3. tab. 42. fig. 1 — 5.  
*Welsch. becast.* tab. 127. fig. 1.  
 Habitat in *glechomae hederaceae gallis globosis*, *scabris foliorum*.
3. *C. nigra*, antennarum basi pedibusque flavescentibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 917. 4. *Fn. Sv.* 1522.  
*Cynips niger*, pedibus fulvo flavis, gallarum fungiformium *quercus baccarum*. *Geoff. Inf.* 2. 300. 9.  
*Uddm. Diff.* 81. tab. 1. fig. 14.  
*Reaum. Inf.* 3. p. 192. tab. 42. fig. 8.  
 Habitat in *gallis foliorum quercus pellucidis subglobosis* paginae inferiori infertis, magnitudine pisii, exiens media aestate.
4. *C. nigra*, thorace lineato, pedibus griseis, femoribus subtus nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 918. 5. *Fn. Sv.* 1521.  
*Diplolepis fuscus gallae globosae glabrae et durae foliorum quercus*. *Geoff. Inf.* 2. 309. 1.  
*Frisch. Inf.* 2. tab. 3. fig. 5.  
*Sultz. Inf.* tab. 18. fig. 108.  
*Reaum. Inf.* 3. tab. 39. fig. 14 — 17.  
*Blank. Inf.* tab. 16. fig. A — H.  
*Roe. Inf.* 3. tab. 52. 53.  
 Habitat in *gallis foliorum quercus paginac inferioris, avellanae magnitudine*.

5. C.

- quercus inferus.* 5. C. atra, antennis pedibusque pallidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 918. 6.  
*Habitat in gallis globosis, opacis, rubris, foliorum quercus paginae inferiori innatis.*  
*Alae hyalinae absque venis aut puncto costali.*
- quercus petioli.* 6. C. nigra, pedibus albidis: femoribus fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 918. 7. *Fn. Sv.* 1523.  
*Cynips fuscus, nitens, capite nigro, abdominis apice villoso, gallae racemosae quercus.* *Geoff. Inf.* 2. 301. II.  
*Roeſch. Inf.* 3. tab. 35. 36.  
*Reaum. Inf.* 3. tab. 35. fig. 3.  
*Habitat in gallis utrinque convexis petiolorum quercus.*
- quercus pedunculi.* 7. C. grisea, alis cruce linearī. *Linn. Syst. Nat.* II. 918. 8.  
*Fn. Sv.* 1524.  
*Cynips gallae pomiformis extremitatis ramorum quercus.* *Geoff. Inf.* 2. 302. 16.  
*Reaum. Inf.* 3. tab. 40. fig. 1 — 6.  
*Habitat in quercus floribus masculis, gallis granulatis in catenas nodorum.*
- quercus vamuli.* 8. C. pallida, alis abdomineque nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 918. 10. *Fn. Sv.* 1527.  
*Habitat in gallis lanatis albis quercus ramulorum.*
- fagi.* 9. C. atra, immaculata.  
*Cynips fagi sylvaticae.* *Linn. Syst. Nat.* II. 919. 12.  
*Fn. Sv.* 1528.  
*Frisch. Inf.* 2. tab. 5.  
*Habitat in gallis pyriformibus paginae superioris foliorum fagi sylvaticae.*
- viminalis.* 10. C. flava, thorace nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 919. 13.  
*Fn. Sv.* 1529.  
*Roeſch. Inf.* 2. *Vesp.* tab. 10. fig. 5 — 7.  
*Habitat in salicis viminalis foliis sub costa.*
- capreae.* 11. C. viridis, nitida, pedibus pallidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 919. 14. *Fn. Sv.* 1531.  
*Frisch. Inf.* 4. 39. tab. 22.  
*Habitat in salicis gallis ferrugineis hordeiformibus foliis innatis, nec non in aliis excrementiis ramorum.*

12. C. atra, thoracis tergo virescente. *Linn. Syst. Nat.* II. 919. 15. *Fn. Sv.* 1532. *salieis strobili.*  
*Schulze de rosis salicinis. A&T. Dresd.* I.  
 Habitat in salicis glabrae apicibus ramulorum strobili-formibus e foliolis.

13. C nigra, pedibus pallidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 919. 16. *amerinae.*  
*Fn. Sv.* 1530.  
 Habitat in salicis pentandrae gallis inaequalibus ramos terminantibus.

14. C. Ficus Caricae. *Linn. Syst. Nat.* II. 919. 17. *Linn. pfenes.*  
*Amoen. Acad.* I. 41.  
*Hasselqu. It.* 424. III. 112.  
*Ponted. antb.* tab. II. fig. 12. 13. 14.  
 Habitat in grossis Ficus Caricae orientalis.

15. C. Ficus Sycomori. *Linn. Syst. Nat.* II. 919. 18. *Mus. sycomori.*  
*Lud. Utr.* 404.  
*Hasselqu. It.* 426. 113.  
 Habitat in Aegypti Ficus Sycomori grossis.  
 Corpus nigrum aculeo exerto, debili. An hujus generis?

105. TENTHREDO. *Palpi filiformes.*  
*Labium trifidum.*

\* *Antennis clavatis.*

1. T. antennis clavatis, luteis, corpore atro, femoribus *femorata.* posticis maximis. *Linn. Syst. Nat.* II. 920. 1. *Fn. Sv.* 1533.  
 Crabro niger, segmento primo margine inciso, lunula flava. *Geoff. Ins.* 2. 263. tab. 14. fig. 4.  
*Alb. Ins.* tab. 69.  
 Habitat in Europae alnetis.
2. T. antennis clavatis, nigris, corpore villoso, atro. *lucorum.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 921. 6. *Fn. Sv.* 1537.  
 Habitat in betula, alno.

3. T.

*lutea.* 3. *T. antennis clavatis, abdominis segmentis plerisque flavis.* *Linn. Syst. Nat. II. 921. 3. Fn. Sv. 1534.*

*Roeſ. Inf. 2. Vesp. tab. 13.*

*Goed. Inf. 1. tab. 64.*

*Frisch. Inf. 4. tab. 25.*

Habitat in falice, alno, betula.

Larva glabra, viridis, linea dorsali nigra.

*amerinae.* 4. *T. antennis clavatis, corpore cinereo, abdomine subtus rufo, labio albo.* *Linn. Syst. Nat. II. 921. 4. Fn. Sv. 1536.*

*Tenthredo amerinae. Scop. carn. 720.*

*Roeſ. Inf. 2. Vesp. tab. 1.*

Habitat in salice.

*marginalia.* 5. *T. antennis clavatis apice lutescentibus, corpore nigro, abdominis segmentis posterioribus margine albis.* *Linn. Syst. Nat. II. 920. 2.*

Habitat in Europa, Anglia.

*Descriptio Linnaei optimia.*

*vitellinae.* 6. *T. antennis clavatis, nigris, abdomine supra nigro: lateribus rufis, femoribus posticis dentatis.*

*Tenthredo vitellinae antennis clavatis, ore elabiato, abdomine rufo, dorso nigro, femoribus posticis dentatis.* *Linn. Syst. Nat. II. 921. 5. Fn. Sv. 1535.*

*Sstroem. Sundm. 171. tab. 10. fig. II.*

Habitat in betula, salice.

*Corpus magnum, hirtum, nigrum. Abdomen supra nigrum segmentis omnibus, excepto primo, macula laterali ferruginea; subtus ferrugineum, maculis lateribus nigris. Femora nigra, postica quatuor dentata. Tibiae ferrugineae. Alae obscurae, margine postico fusco.*

*fasciata.* 7. *T. antennis clavatis nigris, atra, alis anticis fascia fusca.*

*Tenthredo fasciata antennis clavatis nigris, abdome glabro atro, alis superioribus fascia fusca.* *Linn. Syst. Nat. II. 921. 7. Fn. Sv. 1538.*

Habitat in Europa.

*Corpus atrum. Fascia parva alba ad basin primi segmenti abdominalis. Alae anticae albae, fascia media fusca; posticae immaculatae.*

8. *T. antennis clavatis, luteis, thorace atro, abdomine sericea.*  
*aeneo.* Linn. Syst. Nat. II. 921. 8.  
*Schaeff. Elem. tab. 51.*
8. *Tenthredo nitens antennis clavatis, luteis, abdomine viridi, coerulecente, nitente.* Linn. Syst. Nat. II. 922. 10. Fn. Sv. 1539. Foemina praecedentis.  
*Sultz. Inf. tab. 18. fig. 109.*  
*Habitat in Europa sylvis.*
9. *T. antennis clavatis, corpore glabro, nigro.* obscura.  
*Habitat in Suecia.*  
*Praecedentibus minor. Corpus totum nigrum, immaculatum, alis solis albicantibus.*
- \* \* *Antennis pectinatis.*
10. *T. antennis pennatis, obtusis, thorace glabro.* Linn. Juniperi.  
*Syst. Nat. II. 923. 15. Fn. Sv. 1541.*  
*Uddm. Diff. 91. fig. 12.*  
*Tenthredo pterophorus. Sultz. Inf. tab. 18. fig. 110.*  
*Habitat in Junipero.*  
*Larva viridis, nigro-punctata.*  
*Abdomen totum nigrum.*
11. *T. antennis pennatis, lanceolatis, thorace subvilloso.* Pini.  
*Linn. Syst. Nat. II. 922. 14. Fn. Sv. 1540.*  
*Tenthredo nigra, antennis uno versu pectinatis, tibiis tarisque flavis.* Geoff. Inf. 2. 286. 33.  
*Uddm. Diff. 90. fig. 13.*  
*Habitat in pino.*  
*Larva coerulea, extremitatibus fulvis. Abdomen subitus uti et pedes flavum.*
- \* \* \* *Antennis filiformibus, articulis septem.*
12. *T. antennis septemodiis, abdomine cingulis quinque flavis: primo remotiore.* Linn. Syst. Nat. II. scrophulae. 923. 17. Fn. Sv. 1545.  
*Tenthredo nigra, segmentorum abdominalium marginibus, excepto secundo et tertio, flavis.* Geoff. Inf. 2. 277. 13.  
*Reaum. Inf. 5. tab. 13. fig. 12 — 23.*  
*Blakw. herb. tab. 87. fig. 10.*  
*Habitat in scrophulariis.*  
*Larva 22 poda, nivea, nigro-punctata.*

- salicis.* 13. T. antennis septemnodiis, corpore variegato.  
*Tenthredo salicis* antennis septemnodiis, corpore flavo, vertice capitinis thoracisque nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 924. 21. *Fn. Sv.* 1548.
- Tenthredo flava, capite thoraceque supra nigris. *Geoff. Inf.* 2. 281. 20.  
*Reaum. Inf.* 5. tab. II. fig. 10.
- Habitat in salicibus.  
Scutellum niveum.
- viridis.* 14. T. antennis septemnodiis, corpore viridi, abdome supra fusco. *Linn. Syst. Nat.* II. 924. 27. *Fn. Sv.* 1554.
- Tenthredo viridis*, capite thoraceque supra characteribus nigris. *Geoff. Inf.* 2. 271. 1.
- Habitat in betula.  
Colore variat, mox magis viridis, mox magis fuscus.
- cerasi.* 15. T. antennis septemnodiis, corpore nigro, scutello pedibusque flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 923. 20. *Fn. Sv.* 1547.
- Tenthredo nigra*, pedibus flavis. *Geoff. Inf.* 2. 286.  
*Scop. carn.* 735.  
*Reaum. Inf.* 5. tab. 12. fig. 1—5.
- Habitat in cerasi foliis.
- nassata.* 16. T. antennis septemnodiis, lutea, scutello punctoque alarum albis.  
*Tenthredo nassata* antennis septemnodiis, corpore luteo, scutello albo, alis fuso-reticulatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 926. 38.
- Habitat in Europa.  
Corpus ferrugineo-luteum. Os flavescens. Oculi et aculeus nigri. Scutellum album et sub scutello macula nigra punctis quatuor albis. Alae stigmate marginali albo, adjacente majori nigro. Pedes lutei.
- ovata.* 17. T. antennis septemnodiis, corpore atro, thorace rubro. *Linn. Syst. Nat.* II. 924. 28. *Fn. Sv.* 1553.
- Habitat in Europa, folia alni exedens.  
Pedes antici pallidiores.

18. T.

### III. SYNISTATA. Tenthredo. 321

18. *T. antennis septemnodiis, violacea, abdomine flavo,* *alis macula fusca.* *coeruleo-*  
*scens.*

Habitat in Anglia.

Antennae breves, nigrae. Caput et thorax obscure violacea, immaculata, nitida. Abdomen flavum, ano violaceo. Alae anticae hyalinae, macula magna marginis exterioris fusca, quae fere fasciam constituit, at postice obsoletior. Costa alae a basi ad maculam flavescens. Pedes nigri, tibiis femorumque posticarum basi ferrugineis. Affinis *T. rosae.*

19. *T. antennis septemnodiis, nigra, abdomine segmentis tribus pedibusque ferrugineis.* *pavida.*

Habitat in Suecia. *D. Solander.*

Major *T. abietis.* Caput nigrum, ore albicante. Scutellum nigrum, utrinque puncto minimo ferrugineo. Abdomen nigrum, segmentis 3. 4. 5. ferrugineis. Pedes ferruginei, femoribus extus nigris.

20. *T. antennis septemnodiis, corpore nigro, abdominis segmentis quatuor ferrugineis.* *Linn. Syst. Nat. II.* 923. 18. *Fn. Sv. 1545.* *Abietis.*

*Tenthredo nigra, abdominis medio ferrugineo.* *Geoff. Inf. 2. 285. 29.*

*Frisch. Inf. 2. tab. I. fig. 21—24.*

Habitat in pino, abiete.

21. *T. antennis septemnodiis, corpore nigro, thorace antice abdomineque rufis.* *germanica.*

Habitat in Germania.

Statura omnino *T. abietis.* Thorax antice et totum abdomen rufa.

22. *T. antennis septemnodiis, corpore atro, abdomine supra infraque livido.* *Linn. Syst. Nat. II.* 925. 33. *lividus.*  
*Fn. Sv. 1557.*

Habitat in Europa.

23. *T. antennis septemnodiis, corpore atro, pedibus rubris.* *Linn. Syst. Nat. II.* 924. 26. *Fn. Sv. 1554.* *aatra.*

*Tenthredo nigra pedibus ferrugineis.* *Geoff. Inf. 2. 283.*  
*Scopoli carn. 729.*

Habitat in Europa.

*2 cinēta.* 24. *T. antennis septemnodiis, nigra, abdominis cingulo tibiisque flavis.*

Tenthredo bicinēta antennis septemnodiis, corpore atro, abdominis cingulo, ano, ore tibiisque flavis. *Linn. Syst. Nat. II. 925. 31.*

*β.* *Tenthredo livida antennis septemnodiis, corpore atro, abdominis cingulo albo.* *Linn. Syst. Nat. II. 925. 32. Fn. Sv. 1556.*

Habitat in Europa.

Affinis *T. viridi.*

*costalis.* 25. *T. antennis septemnodiis, nigra, alarum costa ferruginea.*

Habitat in Germania. *de Hattorf.*

Statura brevis *T. rosae.* Corpus nigrum, ano strigis aliquot albidis. Costa alarum anteriorum, a basi ad punctum ordinarium fuscum, ferruginea.

*Rosae.* 26. *T. antennis septemnodiis, nigra, abdomine flavo, alarum anteriorum costa nigra.*

Tenthredo rosae antennis septemnodiis, corpore flavo, costa alarum superiorum longitudinali nigra. *Linn. Syst. Nat. II. 925. 30. Fn. Sv. 1555.*

Tenthredo crocea thorace supra, capite alarumque margine exteriori nigris. *Geoff. Inf. 2. 272. 4.*

*Scopoli Carn. 722.*

*Roef. Inf. 2. Vesp. tab. 2.*

*Reaum. Inf. 5. tab. 14. fig. 10 — 12.*

Habitat in rosis.

Variat colore thoracis interdum toto nigro, interdum flavo maculato.

*Capreae.* 27. *T. antennis septemnodiis, flava, capite, thorace abdomineque supra nigris, alis puncto flavo.*

Tenthredo salicis Capreæ. *Linn. Syst. Nat. II. 928. 55.*  
*Fn. Sv. 1572.*

Tenthredo novemnodia flava, capite thoraceque supra nigro. *Geoff. Inf. 2. 281.*

*Goed. Inf. 1. tab. 19.*

*Alb. Inf. tab. 59. fig. g. h.*

*Frisch. Inf. 6. tab. 4.*

*Reaum. Inf. 5. tab. 11. fig. 5. 6.*

— — 1. tab. 1. fig. 18.

Habi-

Habitat in salicibus.

Larva cyanea, segmentis tribus primis ultimisque fulvis, maculis nigris ordinibus 9.

28. T. antennis septemnodiis, pedibus posticis compressis, *septentrionalis*. *Linn. Syst. Nat.* II. 926. 36. *Fn. Sv.* 1558. *nalis.*

Habitat in alno.

Corpus glabrum, nigrum, abdominis segmentis quatuor intermediis rufis. Femora atra. Tibiae basi fascia alba.

29. T. antennis septemnodiis, corpore atro: punctis 12. *12 punctata.*  
albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 926. 39. *Fn. Sv.* 1559.

Habitat in Europa.

30. T. antennis septemnodiis, atra, abdome medio *blanda.*  
rufo, femoribus posticis macula alba.

Habitat in Anglia. *Mus. Bankianum*

Magna. Caput nigrum, macula pallida sub antennis.

Thorax niger. Abdomen nigrum, segmentis 2. 3. 4  
et 5. antice nigris. Pedes nigri, femoribus posticis  
basi macula oblonga, nivea.

31. T. antennis septemnodiis, atra, thorace utrinque *opaca.*  
macula apicis rufa.

Habitat in Suecia.

Statura praecedentis tota atra, at macula triangularis  
rufa utrinque in apice thoracis.

32. T. antennis septemnodiis, corpore toto nigro. *Linn. nigra.*  
*Syst. Nat.* II. 925. 34.

Habitat Upsaliae.

\* \* \* \* *Antennis setaceis; articulis plurimis.*

33. T. antennis setaceis, corpore coeruleo, capite rubro. *erythrocephala.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 926. 40. *Fn. Sv.* 1560.  
*Uddm. Diff.* 89.

Habitat in pino sylvestri.

Mas ater, ore tibiisque anticis luteis.

34. T. antennis setaceis, corpore nigro, pedibus thoraceque characteribus flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 926.  
41. *Fn. Sv.* 1561. *sylvatica.*

Habitat in Europa.

- Cynosbati.* 35. T. antennis setaceis, corpore atro, pedibus ferrugineis: posticis albo nigroque annulatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 927. 43. *Fn. Sv.* 1563.  
*Geoff. Inf.* 2. 287. 36.  
*Reaum. Inf.* 5. tab. 15. fig. 1—6.  
 Habitat in Europae rosa.
- Populi.* 36. T. antennis setaceis, atro-coerulescens, ore, palpis tibiisque flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 927. 44.  
 Habitat in populo.  
 Abdomen luteum, dorso maculis atris, transversis, opacis.
- vnefra.* 37. T. antennis setaceis, capite nigro, albo variegato, pedibus testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 927. 45.  
 Habitat in Suecia.  
 Scutellum lateribus flavum.
- Betulae.* 38. T. antennis setaceis, corpore rubro, thorace, ano oculisque nigris, alis postice fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 927. 47. *Fn. Sv.* 1565.  
 Habitat in betula.
- saltuum.* 39. T. antennis setaceis, corpore nigro, abdomine luteo. *Linn. Syst. Nat.* II. 927. 48. *Fn. Sv.* 1566.  
 Habitat in Europa.  
 Corpus nigrum, abdomine solo luteo. Alae nigrae.
- flava.* 40. T. flava, macula alarum ferruginea. *Linn. Syst. Nut.* II. 927. 49. *Fn. Sv.* 1567.  
*Reaum. Inf.* 5. tab. 10. fig. 6. 7.  
 Habitat in Europa.
- lucorum.* 41. antennis setaceis, abdominis medio rufo, scutello punctoque alarum albis.  
 Habitat in Anglia.  
 Magnitudo T. abietis. Caput et antennae nigrae, ore flavescente. Thorax ater, lineola ante alas scutelloque albis. Abdomen nigrum, segmento 3. 4. 5 rubris. Pedes rufi. Alae hyalinae, puncto ordinario marginali nigro et in hoc stigma album.

106. SIREX. *Palpi inaequales,  
postiores longiores,  
extrorsum crassiores.  
Antennae subfiliformes.*

1. S. abdomine, basi apiceque flavo, corpore nigro. *gigas.*

Sirex gigas abdomen ferrugineo: segmentis 3. 4. 5. 6. nigris, thorace villoso. *Linn. Syst. Nat. II. 928. I. Fn. Sv. 1573.*

Uroceros. *Geoff. Inf. 2. 265. tab. 14. fig. 3.*

*Linn. Act. Holm. 1739. tab. 3. fig. 7.*

*Reaum. Inf. 6. tab. 31. fig. 1. 2.*

*de Geer Inf. 1. tab. 36. fig. 1. 2.*

*Roef. Inf. 2. Vespa. tab. 8. 9.*

*Sultz. Inf. tab. 18. fig. 114.*

*Poda Inf. tab. 1. fig. 6.*

*Schaeff. Elem. tab. 1. fig. 2.*

— — tab. 13. fig. 7.

— *Icon. tab. 10. fig. 2. 3.*

*Seb. Mus. 4. tab. 53. 15.*

Habitat in Europae arboribus coniferis.

2. S. thorace villoso, ferrugineo, abdomine nigro: lateribus flavo maculatis. *columba.*

Sirex Columba abdomen nigro: fasciis testaceis.

*Linn. Syst. Nat. II. 929. 2. Amoen. Acad. 6. 412. 88.*

Habitat in America. *Mus. Bankianum.*

Magnitudo praecedentis. Antennae breves, nigrae, basi ferrugineae. Thorax villosum, subtus niger, supra ferrugineus, annulo dorsali nigro. Abdomen cylindricum, nigrum, maculis utrinque sex marginalibus flavis; subtus nigrum, strigis flavis. Cornu breve, acutum, conicum, flavum. Alae fuscae, margine exteriori flavescente. Aculeus ferrugineus. Pedes flavi, femoribus posterioribus nigris.

*spectrum.* 3. S. abdomine atro, thorace villoso, litura ante alas lutea. *Linn. Syst. Nat.* II. 929. 3. *Fn. Sv.* 1574.

*Scop. carn.* 740.

*Amoen. acad.* 3. 325.

*de Geer Ins.* I. tab. 36. fig. 6.

*Schaeff. Icon.* tab. 4. fig. 9. 10.

Habitat in Europae lignis putridis.

*juvencus.* 4. S. abdomine atro, coerulescente, thorace unicolore, villoso. *Linn. Syst. Nat.* II. 929. 4. *Fn. Sv.* 1575.

*Scop. carn.* 741.

*de Geer Ins.* I. tab. 36. fig. 7.

Habitat in sylvis.

Aculeus corniculo sesquilongior.

*camelus.* 5. S. abdomine atro, lateribus albo maculato, thorace laevi. *Linn. Syst. Nat.* II. 929. 5. *Fn. Sv.* 1576.

*Scopoli carn.* 742.

*Ud. im. Diff.* 82.

Habitat in ligno putrido.

Antennae nigrae.

*mariscus.* 6. S. abdomine testaceo: segmentis duobus ultimis nigris, thorace villoso. *Linn. Syst. Nat.* II. 929. 6. *Fn. Sv.* 1577.

Habitat in Europa.

Aculeus omnino nullus. *Corniculus brevissimus.*

Thorax antice valde angustatus.

*pygmaeus.* 7. S. abdomine nigro: punctis duobus fasciisque tribus luteis: media interrupta. *Linn. Syst. Nat.* II. 929. 7.

Habitat in Europa.

Antennae fere longitudine corporis.

*tabidus.* 8. S. niger, abdominis apice utrinque flavo, punctato, tibiis anticis testaceis.

Habitat in Anglia. *Mus. Bankianum.*

Parvus, linearis. Antennae filiformes, corpore breviore. Thorax ater, postice macula scutellari virescente. Abdomen subcompressum, segmentis tribus posticis utrinque puncto flavo. Pedes nigri, tibiis anticis testaceis.

**107. ICHNEVMON.** *Labium cylindricum, apice membranaceum, emarginatum, medio palpigerum.*

*Antennae setaceae.*

\* *Scutello albido; antennis albo annulatis.*

1. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdomine *fugillatorius.* atro: segmentis duobus utrinque puncto albo. *Linn. Syst. Nat. II. 930. 1. Fn. Sv. 1578.*  
Ichneumon niger, pedibus ferrugineis, thoracis apice maculisque abdominis quatuor albis, antennarum medio albis. *Geoff. Inf. 2. 345. 54.*  
Habitat in Europa.
2. I. scutello albo, thorace immaculato, abdominis *raptorius.* segmento secundo tertio quartoque luteis, reliquis apice albis. *Linn. Syst. Nat. II. 930. 2. Fn. Sv. 1579.*  
Ichneumon niger, abdomine antice ferrugineo, postice nigro, punctis tribus albis, thorace, apice annuloque antennarum albis. *Geoff. Inf. 2. 342. 49.*  
Habitat in Europa.  
Ultima abdominis segmenta terminantur puncto dorsali albo.
3. I. scutello albido, thorace immaculato, abdominis *farcitorius.* segmento tertio posterius secundoque ferrugineis, sexto flavo. *Linn. Syst. Nat. II. 930. 3. Fn. Sv. 1580.*  
Vespa-Ichneumon abdomine nigro duobus luteis circulis diviso. *Raj. Inf. 255. 15.*  
*Sulz. Inf. tab. 18. fig. 15.*  
Habitat in Europa.
4. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis *extenso-* segmento secundo tertioque ferrugineis, ultimis apice *rius.* albidis. *Linn. Syst. Nat. II. 930. 4. Fn. Sv. 1581.*  
Vespa-Ichneumon thorace nigro cum puncto in dorso albo, abdomine anteriore rubro, posteriore nigro, pedibus rubris. *Raj. Inf. 253. 8.*  
*Schaeff. Icon. tab. 43. fig. 1. 2.*  
Habitat in Europa.  
Praecedenti nimis affinis.

- quaefito-* 5. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdominis tribus ultimis segmentis macula dorsali alba. *Linn.* *Syst. Nat.* II. 930. 5. *Fn. Sv.* 1582.  
Habitat in Europa.  
Margo posticus segmenti secundi abdominis parum ferrugineus.
- culpato-* 6. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis segmento secundo tertioque ferrugineis, reliquis nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 931. 6. *Fn. Sv.* 1583.  
Habitat in Europa.  
Thorax in nostro immaculatus.
- mutato-* 7. I. scutello flavo, thorace maculato, abdomine atro: segmentorum marginibus flavis.  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*  
Antennae porrectae, nigrae, in medio annulo lato, albo primoque articulo flavo. Caput et thorax atra, flavo-maculata. Abdomen atrum, segmentorum marginibus omnibus flavis. Aculeus exsertus, niger, seta intermedia rufescente. Pedes rufi, posticorum geniculis nigris plantisque albis.
- irrorato-* 8. I. scutello flavicante, niger, thorace maculato, abdominis primo segmento puncto, reliquis margine albis.  
Habitat in America.  
Parvus. Caput nigrum, fronte orbitaque oculorum albis. Antennae porrectae, nigrae, ante apicem albae. Thorax elevatus, ater, punctis duobus anticus, duobus ante alas, tribus sub alis, scutello et punctis tribus sub scutello albis. Abdomen clavatum, atrum, segmento primo incurvo, puncto dorsali albo. Segmenta reliqua margine alba. Aculeus longitudine corporis et sub aculeo spina acuta brevis prominet. Pedes albi, femoribus tibiisque posticis nigris.
- infracto-* 9. I. scutello flavo, thorace maculato, abdominis segmentis margine flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 931. 7. *Fn. Sv.* 1584.  
Habitat in Europa.  
Antennae convolutae, in medio albo annulatae, primoque articulo subtus flavo. Thorax niger, lineola antica,

antica, puncto sub alis scutelloque albis. Abdomen atrum, fasciis quinque flavis. Pedes flavi, femoribus nigris.

10. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdominis segmento secundo ferrugineo, reliquis margine albis. *ambulatorius.*

Habitat in Anglia. *Mus. Bankianum.*

Affinis praecedenti. Caput nigrum, antennis ultra medium flavis. Thorax niger, linea antica, puncto ante alas scutelloque flavis. Abdomen atrum, segmento secundo rufo, 3. 4. 5. margine albis. Pedes rufi.

11. I. scutello albo, thorace immaculato, abdomine nigro, apice albo. *Linn. Syst. Nat. II. 931. 9. Fn. Sv. 1586. Schueff. Icon. tab. 61. fig. 4.* *saturatorius.*

*de Geer Ins. I. tab. 23. fig. 6.*

Habitat in Europa.

12. I. scutello albo, corpore atro.

*Ichneumon molitorius* scutello flavescente, thorace immaculato, abdominis apice tibiarumque basi albis. *molitorius.*

*Linn. Syst. Nat. II. 931. 10. Fn. Sv. 1588.*

Habitat in Europa.

Pedes colore variant, mox nigri, mox rufi, mox nigri tibiis basi albis.

13. I. scutello albo, thorace immaculato, abdomine luteo, ferrugineo, apice nigro. *Linn. Syst. Nat. II. 931. II. Fn. Sv. 1588. crispatorius.*

Habitat in Europa.

14. I. scutello albo, thorace immaculato, abdomine rubro, apice nigro: puncto albo. *motatorius.*

Habitat Hafniae.

Parvus. Antennae nigrae, albo annulatae. Caput et thorax atra, immaculata, scutello solo albo. Aculeus abdominis brevissimus.

\* \* *Scutello albo, antennis nigris totis.*

15. I. scutello albo, thorace maculato, abdominis segmento secundo tertioque luteis. *Linn. Syst. Nat. II. 931. 13. Fn. Sv. 1590. lucifatorius.*

*Ichneumon niger*, fronte, thoracis apice, tibiis ex parte abdominalisque medio flavis. *Geoff. Inf.* 2. 347. 59.  
Habitat in Europa: in nova Zelandia. *Mus. Banks.*  
*Zelandicus puncto* albo sub alis.

*luctatorius*. 16. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdominis segmento secundo rufo.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Bankianum.*

Antennae convolutae, totae nigrae. Thorax niger, puncto flavo sub alis. Scutellum flavidum. Abdomen atrum, nitidum, segmento secundo toto rufo. Pedes rufi.

*fasciatotrius*. 17. I. scutello albo, thorace maculato, abdomine nigro: segmento secundo basi, tertio sextoque flavis.

Habitat in Anglia.

Magnitudo I. luctatorii. Caput nigrum, sub antennis flavidum. Antennae supra nigrae, subtus flavae. Thorax niger, puncto ante alas et sub alis flavo. Abdomen nigrum, segmento secundo dimidiato, flavo, 3 totum flavidum, 4 nigrum, 5 margine flavo, 6 totum flavidum. Pedes flavi, anticis quatuor macula femorum nigra, posticis femoribus tibiisque apice nigris.

*undulatorius*. 18. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdominis segmentis omnibus margine flavis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 932. 14. *Fn. Sv.* 1591.

Habitat in Europa.

Thorax lineola ante alas punctisque duobus sub scutello flavis. Antennae subtus flavae.

*vaginatoriuss*. 19. I. scutello albo, thorace maculato, abdomine nigro: fasciis quinque albis: tertia interrupta.

*Ichneumon vaginatorius* scutello flavicante, thorace maculato, abdominis segmentis margine flavis: primo quintoque unicolore. *Linn. Syst. Nat.* 11. 932. 15. *Fn. Sv.* 1592.

Habitat in Europa.

Primum segmentum punctis duobus albis.

*annulatortrius*. 20. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdominis segmentis quatuor anticis margine flavis.

Habitat in Anglia. *Mus. Banks.*

**Medius.** Caput nigrum, fronte flava. Antennae supra nigrae, subtus flavae. Thorax lineola ante alas, puncto sub alis maculisque duabus sub scutello flavis. Abdominis segmenta 1. 2. 3. 4. atra, margine albido, reliqua atra, immaculata. Pedes ferruginei, femoribus tibiisque posticis apice nigris.

21. I. scutello flavicante, thorace submaculato, postice bidentato, abdominis secundo tertioque segmento antice flavo. *bidentoriu-*

Habitat in Europa.

Antennae supra nigrae, subtus flavescentes. Caput nigrum, fronte flava. Thorax niger, puncto sub alis scutelloque flavis, postice utrinque unidentatus. Abdomen nigrum, segmento secundo tertioque antice flavis.

22. I. scutello albo, thorace maculato, abdominis segmen- *persuasio-*  
tis omnibus utrinque punctis duobus albis. *Linn.* *riu-*  
*Syst. Nat.* II. 932. 16. *Fn. Sv.* 1593.  
*de Geer Ins.* I. tab. 36. fig. 8.  
*Schueff. Icon.* tab. 80. fig. 2.

Habitat in Europa.

23. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdomine atro: segmentis primis quatuor utrinque puncto albo. *Linn. Syst. Nat.* II. 932. 18. *Fn. Sv.* 1595. *designator-*  
*riu-*

Habitat in Europa.

Affinis I. fugillatorio.

24. I. scutello flavicante, thorace maculato: punctis *edictorius.*  
utrinque duobus abdomineque toto atro. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 932. 19. *Fn. Sv.* 1596.

Habitat in Europa boreali.

25. I. scutello flavo, thorace maculato, abdomine flavo, apice nigro. *dubiro-*  
*riu-*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

**Medius.** Antennae porrectae; nigrae. Caput nigrum, immaculatum. Thorax dorso atro, limbo omni flavo. Abdomen flavum, ultimis duobus segmentis nigris. Aculeus exsertus, brevis, niger. Alae flavescentes, anticis fascia media apiceque fuscis, posticis apice fuscis. Pedes flavi, postici nigri, tibiarum basi flavescente.

- fusorius.* 26. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdomine luteo. *Linn. Syst. Nat.* II. 933. 21. *Fn. Sv.* 1598.  
 β. *Ichneumon pisorius* scutello flavicante, thorace maculato, abdomine toto luteo. *Linn. Syst. Nat.* II. 931. 12. *Fn. Sv.* 1589.  
*Schaeff. Elem. tab.* 12. fig. 1.  
 — — *Icon. tab.* 6. fig. 12.  
 Habitat in Europae sylvis.  
 β. vix differt, nisi antennarum annulo albo.
- delirato-* 27. I. scutello flavicante, thorace maculato: punctis  
*rius.* utrinque tribus, abdomine toto atro, tibiis albis.  
*Linn. Syst. Nat.* II. 932. 20. *Fn. Sv.* 1597.  
 Habitat in Europa.  
 Affinis I. molitorio.
- fusorius.* 28. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdomine atro, pedibus rufis. *Linn. Syst. Nat.* II. 933. 22. *Fn. Sv.* 1599.  
 Habitat in Europa.  
 Affinis I. quaeſitorio.
- falcato-* 29. I. scutello flavicante, thorace variegato, abdomine  
*rius.* subfalcato, ferrugineo, basi apiceque nigro.  
 Habitat Hafniae.  
 Antennae nigrae, subtus flavae. Caput nigrum, sub antennis flavidum, linea media punctisque duobus nigris. Thorax nigro flavoque varius. Abdomen breve, ferrugineum, basi apiceque nigrum. Pedes flavi.
- follicito-* 30. I. scutello flavo, thorace immaculato, abdominis  
*rius.* segmento primo secundo tertioque rufis.  
 Habitat in nova Zelandia. *Mys. Banks.*  
 Antennae porrectae, nigrae. Caput nigrum, fronte flava. Thorax niger, immaculatus. Abdomen atrum, primis tribus segmentis rufis. Pedes rufi.
- cinctorius.* 31. scutello albo, thorace immaculato, abdomine atro: fascia anali nivea.  
 Habitat in Anglia.  
 Antennae nigrae, basi subpiceae. Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen atrum, secundo segmento puncto dorsali obsoleto picco et sexto fascia nivea. Aculeus exsertus, brevis. Pedes ferruginei.

32. I. scutello flavo, ferrugineus, abdominis ultimo segmento fascia atra. *decoratorius.*  
*Habitat in nova Zelandia. Mus. Bankiam.*  
 Parvus. Antennae porrectae, nigrae. Corpus totum obscure ferrugineum, scutello flavo. Alae hyalinae, subflavescentes.
- \* \* \* *Scutello thorace concolore, antennis fascia annulatis.*
33. I. niger, abdomine medio piceo, tibiis anticis clava- *reluctator.*  
 tis. *Linn. Syst. Nat. II. 933. 27. Fn. Sv. 1603.*  
*Habitat in Europa.*
34. I. ater totus, antennis fascia alba. *Linn. Syst. Nat. II. comitor.*  
 933. 24. *Fn. Sv. 1600.*  
*Ichneumon totus ater, antennis medio albis. Geoff. Inf. 338.*  
*Reaum. Inf. 6. tab. 29. fig. 1 — 4.*  
*de Geer Inf. I. tab. 24: fig. 10.*  
*Habitat in Europa.*
35. I. niger, abdominis striga alba, pedibus ferrugineis, *restaura-*  
 antennis fasciat. *tor.*  
*Habitat Hafniae.*  
 Parvus. Antennae longitudine corporis, nigrae, an-  
 nulo albo. Caput et thorax atra. Abdomen atrum,  
 postice striga alba. Aculeus exsertus, brevis, niger.  
 Pedes ferruginei.
36. I. niger, abdomine clavato: fasciis tribus pallidis, *caudator.*  
 femoribus rufis.  
*Habitat in nova Hollandia. Mus. Banks.*  
 Medius. Antennae porrectae, nigrae, annulo albo.  
 Caput et thorax atra, nitida, immaculata. Abdo-  
 men tenui, apice incrassatum, nigrum, segmentis  
 1. 2. 3. antice pallidis. Aculeus exsertus, rufus,  
 seta unica corniculisque duobus abbreviatis, recur-  
 vis, albis, apice nigris.
37. I. niger, abdominis quatuor segmentis intermediis *debellator.*  
 rufis, femoribus clavatis, nigris.  
*Habitat in Suecia. Solander.*  
 Major. Antennae basi flavescentes. Abdominis segmen-  
 tum primum et ultima nigra. Femora omnia  
 brevia, clavata.

*migrator.* 38. I. niger, abdomine ferrugineo apice nigro, antennis fasciatis.

Ichneumon niger, abdomine ferrugineo, apice nigro, tibiis antennisque annulo albo. *Geoff. Inf.* 2. 343. 50.  
Habitat in Europa.

Affinis I. peregrinatori *Linn.* at apex abdominis concolor et pedes haud clavati.

*profligata.* 39. I. niger, abdomine ferrugineo: petiolo nigro, pedibus rufis.

Ichneumon niger, abdomine toto ferrugineo, antennis annulo albo. *Geoff. Inf.* 2. 341. 46.

Habitat in Europa.

Parvus. Antennae nigrae, in medio ferrugineae.

Caput et thorax nigra, innaculata. Abdomen ferrugineum, aculeo exerto, brevissimo, nigro.

*incubitor.* 40. I. niger, abdomine ferrugineo: apice nigro, macula alba, alis hyalinis, antennis fasciatis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 933. 26. *Fn. Sv.* 1602.

Ichneumon abdomine ferrugineo, apice nigro, antennis annulo albo. *Geoff. Inf.* 2. 341. 48. tab. 16. fig. 1.

Habitat in Europa.

\*\*\*\*\* *Scutello thorace concolore, antennis nigris totis.*

*desertor.* 41. I. luteus, alis fuscis: fascia alba.

Ichneumon desertor corpore luteo, alis fuscis: fasciis duabus albis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 334. 29. *Fn. Sv.* 1605. *Schaeff. Icon.* tab. 20. fig. 2. 3.

Habitat in Europa.

*ariolator.* 42. I. thorace bispinoso, rufo, abdomine atro: strigis quatuor albis.

Ichneumon ariolator thorace ferrugineo, bispinoso, alis fasciis binis fuscis, abdomine fasciis quatuor albis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 933. 23.

Habitat in America. v. *Kohr.*

Statura et magnitudo I. turionellae. Antennae nigrae, longitudine corporis. Thorax rufus, postice sub scutello spinulis duabus parvis, erectis, niveis. Abdomen atrum, nitidum, strigis quatuor tenuissimis albis. Aculeus exsbertus, abdomine brevior. Alae fuscae. Pedes ferruginei.

43. I. luteus, alis anticis: fascia apiceque fuscis, anten-  
nis aculeoquo nigris. *proficifica-*  
*tor.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Antennae porrectae, nigrae. Caput nigrum, oculis  
magnis, flavis. Thorax et abdomen lutea, immacu-  
lata. Alae luteae; apice fuscae et praeterea  
fascia fusca in medio anticarum. Aculeus exsertus,  
brevis, niger. Pedes flavi, plantis posticis fuscis.

44. I. luteus, alis anticis: fascia apiceque fuscis, anten-  
nis ano quo nigris. *hospitator.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Statura omnino praecedentis, at duplo minor et ulti-  
ma duo segmenta abdominis atra.

45. I. ferrugineus, antennis ano pedibusque posticis *defensor.*  
nigris, alis subfuscis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Statura praecedentis. Antennae porrectae, nigrae,  
longitudine corporis. Caput et thorax ferruginea,  
immaculata. Abdomen pallidius, ano atro. Pedes  
antici ferruginei, postici nigri. Alae obscurae,  
anticis stigmate nigro.

Variat interdum pedibus omnibus nigris.

46. I. ater, capite rufo, alis nigris.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Medius. Caput rufum, immaculatum, antennis por-  
rectis nigris. Thorax ater, immaculatus. Abdomen  
atrum, segmentorum marginibus albidis. Aculeus  
exsertus, niger. Pedes atri. Alae atrae, immaculatae.

*capitator.*

47. I. ater, thorace rufo, alis fuscis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Major. Antennae setaceae, nigrae. Caput nigrum, im-  
maculatum. Thorax totus rufus. Abdomen atrum,  
basi subtus pallidum. Aculeus parvus, exsertus.  
Pedes nigri. Alae fuscescentes.

*mutator.*

48. I. ater, alis nigris: lunula hyalina, abdomine *denigra-*  
coccineo.

Ichneumon denigrator corpore atro, alis nigris: lu-  
nula hyalina, abdomine testaceo subfessili. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 934. 28. *Fn. Sv.* 1604.

Ichneu-

*Ichneumon niger abdomine coccineo.* *Geoff. Inf.* 2.  
*352. 69. Schaeff. Icon. tab. 20. fig. 4. 5.*  
*Habitat in Europa.*

*corrusca-* 49. I. corpore artubusque atris, alis fusco-hyalinis.  
*tor.* *Linn. Syst. Nat.* 11. 934. 31. *Fn. Sv.* 1606.  
*Habitat in Europa.*

*rutilator.* 50. I. niger, antennis subtus, abdomine pedibusque  
 quatuor anticis rufis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 934. 35.  
*Fn. Sv.* 1607.  
*Habitat in Europa.*

*manifesta-* 51. I. ater, immaculatus, abdomine sessili, cylindrico, pe-  
 tor. *dibus rufis. Linn. Syst. Nat.* 11. 934. 32. *Fn. Sv.* 1608.  
*Ichneumon ater, pedibus rufis, setis ani corpore duplo*  
*longioribus. Geoff. Inf.* 2. 323. 5.  
*Vespa - Ichneumon tota nigra praeter pedes, qui*  
*crocei sunt. Raj. Inf.* 256. 19.  
*Musca tripilis corpore tenui et praelongo, setis a cau-*  
*da longissime excurrentibus. Raj. Inf.* 261. 1.  
*Reaum. Inf.* 6. tab. 29. fig. 16.  
*de Geer Inf.* 1. tab. 36. fig. 9.  
*Habitat in locis Europae glareosis.*

*compun-* 52. I. ater, ore pedibusque rufis, abdomine petiolato.  
*ctor.* *Ichneumon compunctor corpore atro, immaculato,*  
*abdomine subpetiolato longo, pedibus rufis, palpis*  
*setaceis. Linn. Syst. Nat.* 11. 934. 33. *Fn. Sv.* 1609.  
*Ichneumon ater, pedibus rufis, setis ani longitudine*  
*corporis, abdomine laevi. Geoff. Inf.* 2. 324. 6.  
*Schaeff. Icon. tab. 49. fig. 4.*  
*Habitat in Papilionum pupis.*

*irritator.* 53. I. niger, abdomine ferrugineo: primo segmento  
 toto, reliquis punctis duobus nigris.

*Habitat in America. Mus. Banks.*

*Statura I. manifestatoris, at duplo minor. Caput cum*  
*antennis setaceis porrectis, nigrum. Thorax ele-*  
*vatus, ater, nitens, puncto flavo ante alas. Ab-*  
*domen ferrugineum, primo segmento toto nigro,*  
*reliquis utrinque puncto lateral i nigro tuberculis-*  
*que duobus dorsalibus elevatis, glabris, abdomine*  
*concoloribus. Ultimum segmentum immaculatum.*

*Aculeus*

*Aculeus niger, longitudine corporis. Alae hyalinae, puncto marginali nigro. Pedes ferruginei, femoribus posticis nigris tibiisque anticus flavis.*

54. I. niger, abdomine ferrugineo, basi apiceque nigro, pedum posticorum patellis solis nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 934. 34. Fn. Sv. 1609.*

Habitat in Europa.

55. I. niger, abdominis segmento secundo tertio quarto elongator. pedibusque rufis: femoribus posticis nigris.

Habitat in Anglia.

Medius. Abdomen longum, cylindricum, nigrum, segmento 2. 3. 4. rufis. Pedes rufi, femoribus quatuor posticis nigris.

56. I. corpore nigro, abdomine ferrugineo, basi apiceque nigro, pedibus posticis nigris: plantis albis. *Linn. Syst. Nat. II. 934. 35. Fn. Sv. 1611.*

Habitat in Europa.

57. I. niger, abdomine subfalcato: basi subtus incarnata, venator. pedibus rufis.

Ichneumon venator corpore atro, immaculato, abdome basi subtus incarnata, pedibus rufis, aculeo retractili. *Linn. Syst. Nat. II. 935. 36. Fn. Sv. 1612.*

Habitat in Europa.

58. I. niger, abdomine subcylindrico, pedibus rufis, extensor. aculeo corpore longiori.

Ichneumon extensor corpore nigro, immaculato, abdome cylindrico, pedibus rufis, palpis setaceis. *Linn. Syst. Nat. II. 935. 37. Fn. Sv. 1613.*

Ichneumon linearis, antennis longitudine corporis, tentaculis setaceis, femoribus clavatis. *Geoff. Inf. 2. 359. 86.*

Habitat in Europa.

59. I. niger, abdominis lateribus pedibusque rufis.

Habitat in Germania. v. *Hattorf.*

Statura I. Turionellae, cuius forte varietas. Antennae nigrae, setaceae, longitudine fere corporis. Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen cylindricum, sessile, nigrum, marginibus segmentorum subalbidis.

Y

Latera

macula-

tor.

Latera abdominis rufa. Aculeus exsertus, niger, abdomine brevior. Pedes rufi, tibiis posticis albo maculatis. Alae hyalinae, puncto marginali nigro.

- Turionellae.* 60. I. niger, pedibus rufis: tibiis posticis nigris, albo annulatis.

Ichneumon *Turionellae* niger, abdomine cylindrico, macula alarum fusca albae inserta, tibiis posterioribus albo annulatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 935. 40. *Fn. Sv.* 1615.

Habitat in Phalaenarum larvis.

- oculator.* 61. I. ater, abdominis basi utrinque puncto flavo, thorace postice bidentato.

Habitat in Anglia. *Mus. Bankianum.*

Minutus. Antennae porrectae, nigrae, longitudine corporis. Thorax ater, immaculatus, scaber, postice retusus, utrinque denticulo valido armatus. Scutellum elevatum, gibbum, triangulare. Abdomen oblongum, nigrum, basi utrinque puncto magno, orbiculato, flavo. Alae hyalinae, puncto marginali flavo. Pedes rufi.

- Resinellae.* 62. I. niger, pedibus flavis, abdomine sessili, cylindrico, incurvo, antennis basi luteis. *Linn. Syst. Nat.* II. 936. 43. *Fn. Sv.* 1618.

Habitat in Phalaenae Resinellae larvis.

- praeroga-* 63. I. niger, abdomine oblongo, obtuso, ore pedibusque pallidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 936. 44. *Fn. Sv.* 1619.

Habitat in larva Phalaenae salicis.

Parvus. Alis hyalinis, puncto marginali nigro. Antennae totae nigrae.

- fomenta-* 64. I. niger, abdomine falcato: segmentis tertio quartoque basi flavescentibus, pedibus testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 936. 46.

Habitat in Suecia.

- mensura-* 65. I. niger, abdominis segmento secundo tertioque ferrugineis: triangulo dorsali nigro.

Habitat in Saxonia.

Medius. Caput et thorax nigra, immaculata. Abdomen nigrum, segmento secundo tertioque rufis et insingu-

singulis hisce segmentis triangulum dorsale nigrum.  
Aculeus niger, corpore longior. Pedes ferruginei.  
Alae hyalinae, stigmate flavescente.

66. I. niger, thorace variegato, abdomine clavato: fasciis *variegator.*  
tribus flavis.

Habitat in Suecia.

Antennae nigrae, subtus flavescentes. Caput nigrum,  
fronte flava, lineola media nigra. Thorax nigro  
flavoque varius. Abdomen breve, clavatum, atrum,  
supra infraque fasciis tribus flavis. Alae hyalinae.  
Pedes flavi.

67. I. niger, abdominis primo segmento ferrugineo, *gravida-*  
abdomen dimidium obtegente. *Linn. Syst. Nat. II. tor.*  
936. 48. *Fn. Sv. 1622.*

Habitat in Europa.

68. I. niger, abdomine falcato, toto ferrugineo. *Linn. itculator;*  
*Syst. Nat. II. 936. 49. Fn. Sv. 1623.*

Ichneumon niger, pedibus abdomineque ferrugineis.

*Geoff. Inf. 2. 357. 80.*

*Reaum. Inf. 6. tab. 30. fig. 9.*

Habitat in Europa.

69. I. niger, thorace maculato, abdomine falcato: *falcator.*  
segmento secundo tertio quartoque rufis.

Habitat in Suecia.

Affinis I. pugillatori, at duplo major. Antennae, ca-  
put, thorax nigra, puncto parvo flavo ante alas.  
Abdomen falcatum, nigrum, medio rufum. Pedes  
rufi, femoribus nigris.

70. I. thorace immaculato, abdomine falcato, rufo, basi *pugillator.*  
apiceque nigro, pedibus tenuibus, ferrugineis.  
*Linn. Syst. Nat. II. 936. 50 Fn. Sv. 1624.*

Ichneumon niger, abdomine falcato, pedibus abdomi-  
nisque medio flavis. *Geoff. Inf. 2. 332. 24.*

Vespa - Ichneumon major et longior, abdomine multo  
tenuiore, ligamento pectori annexo. *Raj. Inf. 255. 17.*  
*de Geer Inf. 1. tab. 6. fig. 12.*

Habitat in Phalaenae ziczac larva.

Frontis macula flava,

*irrorator.* 71. I. ater, alis anticis apice nigris: puncto albo, abdome clavato: apice macula villosa, aurea.

Ichneumon ater, alis extremo fuscis, abdominis apice villoso, ferrugineo. *Geoff. Inf.* 2. 337. 36.

Habitat in Europa australiori.

Corpus atrum, tibiis posticis basi ferrugineis. Abdomen subreticulatum, clavatum, apice macula nitente, aurea. Alae hyalinae, anticae apice fuscae, puncto minutissimo, albo.

*rufpator.* 72. I. niger, pedibus ferrugineis, femoribus clavatis: posticis dentatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 937. 51. *Fn. Sv.* 1625.

Ichneumon niger, pedibus ferrugineis, femoribus posticis crassis, denticulo armatis. *Geoff. Inf.* 2. 326. 12.

Habitat in Europa.

*jaculator.* 73. I. niger, abdomine falcato, medio rufo, tibiis posticis clavatis, basi apiceque albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 937. 52. *Fn. Sv.* 1626.

Ichneumon totus niger, tibiis posticis clavatis, abdomine longo, tenui, falcato. *Geoff. Inf.* 2. 328. 16.

Vespa - Ichneumon thorace crassio, nigro, abdomine a longo et tenuiori filo incipiente et in caudam crassam desinente. *Raj. Inf.* 253. 5.

*de Geer Inf.* 1. tab. 36. fig. 10.

*Mouff. Inf.* tab. 121.

*Reaum. Inf.* 4. tab. 10. fig. 14.

Habitat in apum sphegumque larvis.

*affector.* 74. I. niger, abdomine falcato: maculis tribus lateralibus rufis, tibiis posticis clavatis, nigris.

Ichneumon affector niger, abdomine falcato: segmento secundo tertio quartoque latere rufis, tibiis posticis clavatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 937. 53. *Fn. Sv.* 1627.

Ichneumon niger, tibiis posticis clavatis, abdomine tenui, falcato, circa medium fulvo. *Geoff. Inf.* 2. 329. 17.

*Scopoli carn.* 756.

Habitat in Europa.

\*\*\*\*\* *An.*

\*\*\*\*\* *Antennis luteis.*

75. I. lutens, thorace stiato, abdomine falcato. *Linn.* *luteus.*  
*Syst. Nat.* II. 937. 55. *Fn. Sv.* 1628.

Ichneumon luteus totus. *Geoff. Inf.* 2. 330.

Vespa-Ichneumon major, tota fulva, alis amplis, anterioribus nota fulva. *Raj. Inf.* 253. 6.

*Goed. Inf.* 2. tab. 37.

*Schaeff. Icon.* tab. 1. fig. 12.

Habitat in Europae larvis. In nova Hollandia, Zelandia. *Mus. Bankianum.*

76. I. luteus, vertice atro, abdomine apice fusco. *flavus.*

Habitat in America. *v. Rohr.*

Statura omnino praecedentis. Caput flavum, puncto verticis atro. Antennae porrectae, luteae. Corpus luteum, ultimis duobus segmentis fuscis s. obscuris. Alae hyalinae, puncto parvo luteo ad marginem crassiorem.

77. I. luteus, alis nigris. *fulvus.*

Habitat in America. *Drury.*

Medius. Totus luteus. Abdomen sessile, planum, segmentis distinctis. Alae nigrae, puncto parvo luteo in medio marginis crassioris.

78. I. niger, abdomine falcato, antennis pedibusque amictus. ferrugineis.

Habitat in Anglia. *Mus. Banks.*

Magnus. Antennae flavae. Caput nigrum, fronte macula flava. Thorax ater, immaculatus. Alae obscurae. Abdomen falcatum, ferrugineum. Pedes ferruginei, apice albidi.

79. I. luteus, pectore nigro, abdomine falcato: ano *glaucopetrus.* nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 938. 57. *Fn. Sv.* 1630.

*Schaeff. Icon.* tab. 82. fig. 3.

Habitat in Europa.

80. I. niger, abdomine falcato, antice flavo, pedibus circumfle-  
posticis nigro-geniculatis, scutello flavo. *Linn. Syst. xus.*

*Nat.* II. 938. 59. *Fn. Sv.* 1631.

Habitat in Europa.

- formica-* 81. I. niger, antennis pedibusque ferrugineis, alis hyalinis, stigmate nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 938. 61.  
Habitat in praedio *Linn.* Hammarby dicto.
- mutilla-* 82. I. flavescens, abdomine fascia atra, alis fusco-maculatis.  
Habitat Hafniae.  
Statura praecedentis. Corpus totum flavescens, thorace tamen obscuriore. Abdomen petiolatum, fascia media nigra. Aculeus exsertus, longitudine corporis.
- cinctus.* 83. I. ater, antennis pedibusque ferrugineis, alis albissimis, fasciis duabus nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 938. 60.  
*Fn. Sv.* 1632.  
Ichneumon niger, alis albissimis, fascia dupli nigra, posteriori majore. *Geoff. Inf.* 2. 359. 85.  
Habitat in Europa.
- \*\*\*\*\* *Minnti. Antennis filiformibus, abdomine ovato, sessili.*
- muscarum.* 84. I. auratus, pedibus flavis, saltatoriis. *Linn. Syst. Nat.* II. 938. 62. *Fn. Sv.* 1636.  
*de Geer Inf.* 1. tab. 32. fig. 19. 20.  
Habitat in larvis muscarum aphidivorarum.
- Bedegua-* 85. I. viridis, nitens, abdomine aureo. *Linn. Syst. Nat.* II. 939. 63. *Fn. Sv.* 1634.  
Cynips thorace viridi-aeneo, abdomine aureo, setis ani corpore longioribus. *Geoff. Inf.* 2. 296. 1.  
*Roef. Inf.* 3. tab. 53. fig. F. H.  
*Blank. Inf.* 188. 12.  
Habitat in larvis gallarum rosae, quercus.
- gallarum.* 86. I. fusco-aeneus, abdomine nigro, tibiis pallidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 939. 64. *Fn. Sv.* 1638.  
Habitat in cynipedis quercus ramuli larvis.
- Juniperi.* 87. I. auratus, viridis, antennis nigris, alis hyalinis. *Linn. Syst. Nat.* II. 939. 65. *Fn. Sv.* 1635.  
Habitat in Tipulae juniperinae larva.
- Piparum.* 88. I. auratus, coeruleus, abdomine viridi, nitido, pedibus pallidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 939. 66. *Fn. Sv.* 1636.

Cynips

**Cynips viridi-sericeus**, abdomine aureo, pedibus pallidis, chrysalidum papilionum. *Geoff. Inf.* 2. 305. 24.  
Ichneumon Antiopae. *Scop. carn.* 765.

*de Geer Inf.* tab. 30. fig. 8.

*Roef. Inf.* 2. *Vesp.* tab. 3.

Habitat in pupis papilionum et muscarum.

Pedes terminantur puncto nigro.

89. I. auratus, viridis, abdomine fusco: basi cingulo **Cynipedis.**  
pallido, pedibus flavescensibus. *Linn. Syst. Nat.* II.  
939. 68. *Fn. Sv.* 1639.

Habitat in larvis Cynipedum et Phalaenarum.

90. I. nigro-aeneus, abdomine coerulecente, pedibus **Coccorum.**  
lividis. *Linn. Syst. Nat.* II. 939. 69. *Fn. Sv.* 1640.  
*de Geer Inf.* 1. tab. 35. fig. 17.

Habitat in Europae coccis.

91. I. niger, capite rufo, oculis viridibus. *Linn. Syst. fecalis.*  
*Nat.* II. 939. 70. *Fn. Sv.* 1641.

Habitat in larvis spicarum fecalis.

Conf. Ichneumon agricolator niger, capite ferrugineo,  
abdomine sessili. *Linn. Syst. Nat.* II. 937. 54. Forte  
hujus varietas.

92. I. niger, alis hirsutis: macula lunari nigra. *Linn. subcutaneus.*  
*Syst. Nat.* II. 940. 71. *Fn. Sv.* 1642.  
*de Geer Inf.* 1. tab. 30. fig. 21.

Habitat in larvis subcutaneis.

93. I. niger, abdomine conico, acutissimo, femoribus **conicus.**  
clavatis, acutissimis.

Habitat in Daniae nemoribus.

Parva: tota atra, femoribus solis ferrugineis. Alae  
obscureae.

94. I. niger, pedibus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. **globatus.**  
940. 74. *Fn. Sv.* 1647.

Ichneumon serico conglobato, albo. *Geoff. Inf.* 2. 320. 1.

Vespa-Ichneumon erucigera, parva. *Raj. Inf.* 255. 13.

*Merian. eur.* tab. 22.

*Frisch. Inf.* 6. tab. 10.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 35. fig. 5. 6.

*Derham. theor.* I. 8. c. 6. n. 1.

Habitat in culmis intra folliculum communem, bombycinum, subrotundum, album.

- glomeratus.* 95. I. niger, pedibus flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 940. 75.  
*Fn. Sv.* 1646.  
 Ichneumon ferico conglobato, flavo. *Geoff. Inf.* 2. 321. 2.  
 Vespa - Ichneumon parva, tripilis, antennis praelongis,  
 erucigera s. erucae brassicariae. *Raj. Inf.* 254. 12.  
*Gord. Inf.* 1. 59. 11.  
*Reaum. Inf.* 2. tab. 33. fig. 2. 7. 8.  
*Merian. ent.* tab. 48.  
*de Geer Inf.* 1. tab. 16. fig. 6.  
*Roes. Inf.* 2. *Vesp.* 4. tab. 3.  
 Habitat in larvis papilionum: exeuntes proprios folli-  
 culos flavos nectunt, intra quos excluduntur. Ob-  
 servant papilionis pupam, nuper exuta larva, in  
 quam ova immittunt. *Linn. l. c.*
- Aphidum.* 96. I. niger, abdomine basi pedibusque anticus genubus-  
 que posticis flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 940. 72.  
*Fn. Sv.* 1643.  
 Ichneumon Aphidum. *Geoff. Inf.* 2. 322. 4.  
*Frisch. Inf.* 11. tab. 19.  
 Habitat in Aphidibus.
- agilis.* 97. I. apterus, niger, pedibus rufis.  
 Habitat in Sueciae hortis.  
 Parvus, ater. Ad basin abdominis fascia obsoleta,  
 rufa. Pedes rufi.
- cursitans.* 98. I. apterus, niger, abdomine antice pedibusque fer-  
 rugineis.  
 Habitat in Sueciae hortis.  
 Antennae flavae, apice nigrae. Caput et thorax nigra,  
 immaculata. Abdomen basi rufum, apice nigrum,  
 aculeo exerto brevi. Pedes ferruginei.
- Acarorum.* 99. I. apterus, rufus, capite abdomineque postico nigris.  
*Mutilla Acarorum.* *Linn. Syst. Nat.* II. 968. 9. *Fn.*  
*Sv.* 1729.  
 Habitat in Europa boreali.  
 Pedes ferruginei.
- pedestris.* 100. I. apterus, niger, abdomine rufo, basi apiceque nigro.  
 Habitat in Suecia.  
 Corpus nigrum, abdominis segmento secundo et tertio  
 rufis. Pedes rufi.

101. I. apterus, rufus, capite abdomineque rufis. *formicæ.*  
*Mutilla formicaria.* *Linn. Syst. Nat. II. 968. 10. viii.*  
*Fn. Sv. 1728.*  
*Habitat in Sueciae hortis.*

108. EVANIA. *Palpi postici incurvi.*  
*Labium brève, conicum,*  
*integrum.*  
*Antennæ filiformes.*

1. E. atra, abdomine petiolato, brevissimo, dorso thoracis imposito. *Appendigaster.*

*Sphecodes Appendigaster atra, abdomine petiolato, brevissimo, pedibus posticis longissimis.* *Linn. Syst. Nat. II. 943. 12.*

*Reaum. Inf. 6. tab. 31. fig. 13.*  
*Brown. Iam. tab. 44. fig. 6.*

*Habitat in Europa australi, capite. B. S. in nova Hollandia.* *Mus. Banks.*

2. E. thorace maculato, abdominis primo segmento *maculata.* punctis duobus, secundo margine albis.

*Habitat in Anglia.* *Mus. Bankianum.*

*Corpus parvum, breve. Antennæ porrectæ, nigrae, Caput nigrum, linea utrinque longitudinali inter oculos alba. Thorax elevatus, gibbus, niger, margine antico, scutello, puncto utrinque sub alis albis. Abdomen breve, conicum, nigrum, primo segmento utrinque puncto albo, secundo margine albo. Lineolæ duae brevissimæ, albae supra anum. Pedes rufi, femoribus basi nigris, punto albo, postici elongati, geniculis nigris. Alae hyalinae.*

109. SPHEX. *Os lingua inflexa, trifida.*  
*Labium emarginatum, utrinque seta porrecta, subulata.*  
*Antennae subfiliformes.*

\* *Abdomine petiolato.*

*sabulosa.* 1. *S. nigra, hirta, abdominis petiolo biarticulato: segmento secundo tertioque ferrugineis.* *Linn. Syst. Nat. II. 941. I. Fn. Sv. 1648.*

*Ichneumon niger, abdomen fulvo, postice nigro, petiolo longissimo.* *Geoff. Inf. 2. 349. 63.*  
*Scop. carn. 770.*

*Frisch. Inf. 2. tab. I. fig. 6. 7.*

*Sulz. Inf. tab. 19. fig. 120.*

*Schaeff. Icon. 83. fig. I.*

Habitat in terra sabulosa Europae, ubi canis instar pedibus anterioribus cuniculum fodit larvamque Phalaenae s. Araneae semimortuam in eo sepelit, cui ovulum concredit, quo facto orificio terra claudit. *Linn.*

*Thomae.* 2. *S. nigra, abdome rufo: petiolo maculaque dorsali nigris.*

Habitat in insula Thomae Americae.

Statura s. fabulosae, abdome rufo, petiolo elongato et macula magna secundi segmenti nigris.

*pensylvanica.* 3. *S. nigra, abdome petiolato, atro, alis subviolaceis.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 941. 3. Amoen. Acad. 6. 412. 89.*

Habitat in Pensylvania et nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
*Tota atra, alis solis violaceis, apice pallidioribus.*

*violacea.* 4. *S. cyanea, alis albis apice fuscis, antennis nigris.*

Habitat in Capite Bonae Spei.

Frons tomento argenteo nitet.

*cyanea.* 5. *S. coerulea, alis cyaneis, apice fuscis, antennis nigris.*  
*Sphex coerulea, alis fuscis.* *Linn. Syst. Nat. II. 941. 2.*

*Amoen. Acad. 6. 412. 90.*

Habitat in America septentrionali.

6. *S. laevis*, atra, abdomine petiolato, labio segmentorum marginibus lucidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 942. II.  
*Fn. Sv.* 1650.

Habitat Upsaliae in parietum ligneorum foraminibus.  
 Larva apoda, pallida.

7. *S. abdomine petiolato*, nigro: primo segmento lunula flava. *lunata*.

*Sphex asiatica ferruginea*, thorace variegato, abdominis petiolo macula utrinque ad basin flava. *Linn. Syst. Nat.* II. 942. 5. *Mus. Lud. Ulv.* 405?

Habitat in insula Antigua. *Drury*.

Magnitudo *S. fabulosae*. Antennae nigrae, articulo primo flavo. Caput nigrum. Thorax niger, lineola apicis, punctis duobus ante alas, scutello maculaque magna supra basin petioli flavis. Abdomen nigrum, primo segmento lunula flava. Pedes flavo nigroque variegati.

8. *S. nigra*, laevis, antennis, tibiis aliquae testaceis: his capensis. apice nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 942. 4. *Mus. Lud. Ulv.* 407.

Habitat in Africa.

9. *S. nigra*, abdomine petiolato, ferrugineo, alis fuscis. fervens. *Linn. Syst. Nat.* II. 942. 6. *Mus. Lud. Ulv.* 406.

Habitat in India.

Nigra, abdomine rufo: petiolo nigro.

10. *S. abdomine petiolato*, nigro: segmento primo toto, jamaicensis. reliquis margine, flavis.

Habitat in Jamaica.

Caput nigrum, antennarum primo articulo flavo. Thorax niger apice, lineola ante alas, puncto sub alis, scutello et macula magna baseos flavis. Abdominis petiolus elongatus, niger. Primum segmentum flavum, macula baseos ferruginea, reliqua margine flavo. Pedes antici flavi, postici nigri, geniculis flavis.

11. *S. atra*, thorace hirto, immaculato, petiolo uniarticulato, flavo, longitudine abdominalis. *Spirifex. Linn. Syst. Nat.* II. 942. 9.

*Reaum. Ins.* 6. tab. 28. fig. 5.

*Schaeff. Icon.* tab. 38. fig. 1.

*S. Sphex*

*β. Sphex aegyptia nigra*, petiolo abdominis pedumque articulis dimidiatis, flavis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 942.  
10. *Mus. Lud. Vir.* 406.

Habitat in Europa australi, Aegypto, in cylindris spiralibus sub tectis.

*elavus.* 12. *S. nigra*, thorace maculato, abdomine coerulescente: petiolo elongato, rufo, fascia nigra.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Statura praecedentis. Antennae nigrae, primo articulo rufo. Caput nigrum, tomento cinerascente. Thorax niger, puncto cinereo distincto sub alis. Abdomen subrotundum, coerulescens, primo segmento ferrugineo. Petiolus elongatus, filiformis in medio, subitus denticulo parvo armatus, rufus, fascia media nigra. Pedes rufi.

*lobata.* 13. *S. viridi-cyanea*, thoracis lobo anteriore distincto, alis subferrugineis.

Habitat in Africa. *Mus. Bankianum.*

Magna. Labium inferius emarginatum, prominens, maxillis longius. Antennae fuscae, longitudine thoracis. Maxillae superiores cornicae, arcuatae, medio unidentatae. Thorax elevatus, rotundatus, pone alas productus, viridis, nitens. Locus anticus distinctus, antice porrectus, attenuatus, postice canaliculatus. Abdomen ovatum, glabrum, nitidissimum, viridi-violaceum. Alae subferrugineae, absque puncto marginali. Pedes virides, apicibus fuscis.

*ichneumo-nea.* 14. *S. fulva*, ab domine nigro, basi ferrugineo. *Apis ichneumonea* rostro corneo, recto, ab domine petiolato, thoracis futuris aureo-nitentibus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 959. 36.

Habitat in America.

Antennae fuscae, primo articulo fulvo. Caput et thorax tomento aureo-nitentia. Pedes ferruginei.

\* \* *Abdomine sessili.*

*vespifor-mis.* 15. *S. nigra*, ab domine apice ferrugineo, alis cyaneis.

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Caput cum antennis ferrugineum, stemmatibus tribus verti-

verticis nigris. Thorax niger. Abdomen sessile, ferrugineum, basi nigrum. Alae cyaneae, apice subcinerascentes.

16. S. atra, immaculata, alis nigris. *morio.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Major S. fusca: tota atra, immaculata. Thorax postice utrinque unidentatus.

Aliam vidimus simillimam fronte cinerascente articuloque primo antennarum ferrugineo.

17. S. atro-cyanea, thoracis lobo antico fulvo. *collaris.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Caput nigrum. Thorax atro-cyaneus, lobo antico toto fulvo; postice utrinque denticulis duobus: posteriore minore. Abdomen cyaneum, immaculatum. Alae cyaneae.

18. S. atra, fronte thoracisque lobo antico flavis. *frontalis.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Praecedenti affinis. Antennae nigrae. Caput nigrum, fronte flavo. Thorax niger, lobo antico flavo: Abdomen et pedes atra, immaculata. Alae fuscae, limbo obscuriore.

19. S. glabra, atra, abdomine sessili, lobi ferrugineo. *fusca.*

Sphe. fusca atra, laevis, abdominis segmentis tribus primis subferrugineis. *Linn. Syst. Nat. II. 944. 16.*

*Fn. Sv. 1652.*

Ichneumon ater, abdomine subsessili, segmentis tribus anticis rufis, alis nigricantibus. *Geoff. Ins. 2. 354. 74.*

Vespa-Ichneumon major, capite, thorace et pedibus nigris, abdominis anteriore parte rubra, posteriore nigra. *Raj. Ins. 254. 9.*

Habitat in Europae fabuletis, larvas attrahens, sepeliens.

20. S. nigra, pubescens, alis fuscis, abdomine antice ferrugineo: cingulis nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 943. 15.* *Fn. Sv. 1651.* *Frisch. Ins. 2. tab. I. fig. 13.* *viatica.*

Habitat in Europae fabuletis, larvas imposito ovo sepeliens.

21. S.

*cingulata.* 21. *S. nigra*, fronte, thoracis striga antica abdominisque segmentorum marginibus cinereis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Statura omnino *S. nigrae*. Antennae nigræ. Caput nigrum, fronte cinerascente. Thorax niger, striga antica punctisque duobus inter alas cinereis. Abdomen atrum, marginibus segmentorum cinereis. Pedes atri. Alae fuscae, apicibus obscurioribus.

*nigra.* 22. *S. nigra*, abdomine sessili, segmentorum marginibus lucidis.

Habitat in Europa.

*gibba.* 23. *S. nigra*, abdominē ferrugineo, apice fuscō, alis anticis apice fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 946. 33. *Fn. Sv.* 1658.

*Scop. carn.* 570.

Habitat in Europa.

*fasciata.* 24. *S. nigra*, antennis rufis, alis albis: fasciis duabus fuscis. Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Antennae rufae, apice fuscae. Corpus totum nigrum, cinereo-nitens. Alae albidae, anticae fasciis duabus dorsalibus apiceque fuscis. Posticae immaculatae.

*cinerea.* 25. *S. cinerea*, abdominis segmentis basi atris, alis apice fuscis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Parva. Caput cinereum, antennis nigris. Thorax cinerascens. Abdominis segmenta basi atra, apice cinerea. Pedes cinerascentes. Alae albidae, anticis apice fuscis.

*tropica.* 26. *S. nigra*, abdominis segmento secundo ferrugineo.

*Sphex tropica nigra*, oculis albis, abdominis segmento secundo latiori, ferrugineo. *Linn. Syst. Nat.* II. 945. 27. *Mus. Lud. Ulr.* 408.

Habitat in America.

Totum corpus nigrum, immaculatum, excepto secundo abdominis segmento ferrugineo.

*fugax.* 27. *S. thorace tomentoso*, aureo, abdomine ferrugineo, alis flavescensibus: fascia fusca.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Bankianum.*

Medius

**Medius.** Antennae porrectae, nigrae. Caput et thorax tomento aureo tecta. Abdomen obscure ferrugineum, immaculatum. Alae flavescentes, anticis fascia media dentata fusca, apice subhyalinae. Pedes ferruginei.

28. *S. ferruginea*, thorace postice aureo, alis flavescensibus. *Habitat in nova Hollandia. Mus. Banks.*

*nitida.*

Affinis praecedenti. Antennae convolutae, nigrae, basi ferrugineae. Caput ferrugineum, immaculatum. Thorax ferrugineus, postice tomento aureo tectus. Abdomen ferrugineum, immaculatum. Alae flavescentes, apice subhyalinae. Pedes ferruginei.

29. *S. atra*, abdominis segmentis utrinque puncto albo, alis apice fuscis. *Linn. Syst. Nat. II. 945. 29. Fn. Sv. 1659.* *Habitat in Europae fabuletis.*

*rufipes.*

30. *S. atra*, capite thoraceque rufis.

*Habitat in nova Hollandia. Mus. Bankianum.*

*nigricornis.*

Minor. Caput rufum, labio superiori cinerascente. Antennae nigrae. Thorax immaculatus. Abdomen pedesque atra. Alae obscurae.

31. *S. nigra*, abdomine rufo apice atro, alis apice fuscis, *exaltata*, puncto albo.

*Habitat in Europa.*

Magnitudo *S. rufipedis*. Antennae convolutae, nigrae. Caput et thorax nigra, immaculata. Alae anticae apice fuscae, puncto magno orbiculato, albo; posticae immaculatae. Pedes nigri.

32. *S. atra*, thorace fascia antica cinerea, abdomine rufo, *abdominalis*, alis apice fuscis.

*Habitat in Brasilia. Mus. Banks.*

Affinis sequenti, at triplo minor. Antennae nigrae. Caput nigrum, fronte tomento cinerascente. Fascia thoracis semicircularis, marginalis, cinerea. Pedes atri. Alae albidae, apice fuscae.

33. *S. nigra*, thorace antice fascia cinerea, abdomine turcica, rufo, alis nigris.

*Habitat in Brasilia. Mus. Bankianum.*

Media. Antennae nigrae. Caput nigrum, fronte tomento cinerascente. Pedes atri. Alae nigrae.

- villoso.* 34. *S. nigra*, abdomine villoso, testaceo, alis atris.  
 Habitat ad littora Malabarica. *Koenig.*  
 Parva. Antennae, caput et thorax nigra. Alae atrae,  
 apice parum pallidiores. Abdomen sessile, villo-  
 sum, totum testaceum..
- flava.* 35. *S. atra*, capite, dorso anoque ferrugineis, alis flavis,  
 apice fuscis.  
 Habitat in India orientali.  
 Statura *S. cyaneae*. Antennae convolutae, ferrugi-  
 neae. Caput et thorax obscure ferruginea, pectore  
 atro. Abdomen atrum, ano s. ultimo segmento  
 ferrugineo. Alae flavae, apice fuscae.
- bicolor.* 36. *S. atra*, capite, abdominis apice alisque flavis: his  
 apice fuscis.  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*  
 Magna. Antennae convolutae, flavae. Caput flavum,  
 maxillis apice nigris. Thorax tomentosus, ater,  
 postice denticulis utrinque duobus. Abdomen fla-  
 vum, segmento primo toto et secundo dimidiato  
 atro. Pedes flavi, femoribus atris. Tibiae posti-  
 cae linea scabra dorsali exaratae. Alae flavae,  
 apice fuscae.
- ruficornis.* 37. *S. cyanea*, antennis rufis.  
 Habitat in America meridionali.  
 Corpus et alae cyaneae. Antennae rufae, articulo  
 primo cyaneo. Pedes nigri.
- coerulea.* 38. *S. coerulea*, alis apice albicantibus.  
*Sphex coerulea*, alis ferrugineis basi nigris. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 947. 38.  
*Sphex rubra*. *Drury Ins.* 2. tab. 39. fig. 6.  
 Habitat in America meridionali.  
 Variat alis ferrugineis basi nigris et nigris ma-  
 cula media ferruginea. Apex alarum semper  
 albicat.

**no. TIPHIA.** *Maxilla membranacea, rotundata.*

*Labium breve, corneum, tridentatum, medio palpigerum.*

*Antennae subpetiolatae.*

1. *T. nigra, femoribus quatuor posticis angulatis, rufis.* *femorata.*

Habitat in Anglia.

**Parva:** statura apis, at lingua absolute nulla. Caput, cum antennis filiformibus, nigrum. Thorax punctatus, subpubescens, niger, immaculatus. Abdomen oblongum, atrum, nitidum. Femora quatuor postica brevia, compressa, angulata, rufa. Tibiae obscure ferrugineae, plantis fuscis. Alae abdomine breviores, fuscae.

2. *T. nigra, thorace maculato, abdomine fasciis quinque flavis, secunda interrupta.* *s. cincta.*

Habitat in Europa, Anglia. *Banks.*

Antennae breves, flavescentes, apice fuscae. Thorax niger, punctis duobus anticis, striga inter alas scutelloque flavis. Abdomen nigrum, fasciis quinque flavis, secunda interrupta. Pedes flavi, femoribus brevibus, angulatis.

3. *T. nigra, abdomine utrinque maculis quinque flavis, anno pedibusque rufis.* *haemorrhoidalis.*

Habitat in America. *v. Rohr.*

Statura *T. femoratae.* Antennae breves, arcuatae, nigrae. Caput nigrum, flavo maculatum. Thorax niger, striga apicis, puncto ante alas, tribus sub alis, scutello et punctis duobus sub scutello flavis. Abdomen glabrum, nitidum, atrum, macula utrinque flava in singulo segmento. Anus s. ultimum segmentum ferrugineum. Pedes rufi.

4. *T. nigra, thorace macula dorsali rufa.* *ephippium.*

Habitat in America. *v. Rohr.*

Major praecedenti, nigra, excepta sola macula quadrata, rufa in medio thoracis. Alae fuscae.

*radula.* 5. *T. nigra, hirta, thorace antice rufescente, abdominis segmento secundo tertioque flavis.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Magna in hoc genere. Antennae nigrae. Caput nigrum, fronte tomento cinereo. Thorax hirtus, ater, antice ferrugineus, villosus, postice retusus. Abdomen atrum, marginibus segmentorum ciliatis, ciliis tertii quartique segmenti aureis, reliquorum albis. Segmentum secundum et tertium flavum. Pedes nigri, femoribus angulatis. Alae cyaneae.

*tricincta.* 6. *T. nigra, abdomine fasciis tribus flavis: ano pedibusque ferrugineis.*

Habitat in America. *v. Rohr.*

Caput nigrum, fronte villoso, ferruginea. Antennae nigrae, primo articulo ferrugineo. Thorax niger, punctis utrinque duobus ad latera scutelli. Abdomen nigrum, fasciis tribus flavis, quarum duas posteriores in medio sinuatae. Anus pedesque rufescentes. Alae albae, costa ferruginea.

*collaris.* 7. *T. atra, thorace antice cinereo, villoso, postice retuso, alis cyaneis.*

Habitat ad littora Malabarica. *Koenig.*

Statura T. femoratae. Corpus atrum. Thorax antice cinereo tomentosus, postice valde retusus. Abdomen obtusum. Alae cyaneae.

*pedestris.* 8. *T. aptera, nigra, flavo variegata, thorace compresso.*  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Antennae breves, nigrae, articulo primo latiore. Caput supra nigrum, fronte flava, subtus flavum. Thorax lateribus compressus, niger, dorso flavo, areo nigro. Pectus flavum. Abdomen flavum, prioribus quatuor segmentis nigris, fascia lata flava, secunda interrupta; quartum segmentum nigrum, macula laterali flava. Anus prominens, deflexus, bivalvis, valvulis ovatis, obtusis aculeoque brevi, acutissimo. Pedes breves, flavi, femoribus compressis, carinatis, nigris.

III. SCOLIA. *Os* lingua brevi, inflexa, trifida.

*Labium* porrectum, apice membranaceum, integrum, medio palpigerum.  
*Antennae* subpetiolatae.

1. *S. hirta, nigra, alis ferrugineis, apice fuscis.* *atrata.*

Habitat in America. *Drury.*

Magna, tota atra, immaculata pilisque vagis adspersa.

Abdomen ovatum, sessile. Alae ferrugineae, nitidae, apicibus fuscis.

2. *S. hirta, nigra, abdomine maculis quatuor fulvis.* *4 macula-*

*Sphecia maculata. Drury Inf. 2. tab. 39. fig. 2.* *ta.*

Habitat in America boreali.

Caput et thorax atra, pilis rarioribus hirta. Alae fuscae, violaceo colore nitentes. Abdomen oblongum, segmento secundo tertioque maculis duabus magnis, orbiculatis, flavis. Margines segmentorum ciliati.

3. *S. atra, fronte flava, abdomine maculis quatuor flavis.* *flavifrons.*

Habitat in Italia. *Allioni.*

Summa affinitas praecedentis, at caput multo majus, fronte flava, macula media oblonga, fusca. Thorax ater, scutello punctis duobus flavis.

4. *S. hirta, ferruginea, alis apice fuscis.* *ferrugi-*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.* *nea.*

Magna. Antennae ferrugineae. Corpus totum pilis ferrugineis hirtum. Alae ferrugineae, apice fuscae, An proprii generis?

5. *S. hirta, nigra, abdominalis fasciis quatuor flavis.* *radula.*

*Sphecia plumipes. Drury Inf. 1. tab. 44. fig. 5.*

Habitat in America septentrionali.

Antennae nigrae, primo articulo longiori distincto, reliquis brevissimis. Thorax hirtus, niger, flavo maculatus. Abdomen oblongum, cyaneum, fasciis quatuor flavis, prima baseos, secunda tertiaque latioribus, bidentatis, quarta versus apicem tenuiori. Alae obscurae.

*bicincta.* 6. S. hirta, atra, abdomine fasciis duabus ferrugineis.

Habitat in America. *Mus. Bankianum.*

Magnitudo praecedentis. Antennae nigrae. Caput et thorax atra, immaculata. Thorax postice valde retusus. Abdomen sessile, hirtum, atrum, fasciis duabus latis, ferrugineis ad basin secundi tertiique segmenti. Fasciae haec abdomen haud subtus cingunt. Alae et pedes nigri.

*verticalis.* 7. S. hirta, atra, vertice fulva.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Media. Antennae nigrae. Corpus totum hirtum, atrum, vertice solo fulvo, stemmatibus tribus nigris. Alae coerulecentes.

*4 punctata.* 8. S. atra, abdomine punctis quatuor albis.

Habitat in Italia.

Minor praecedentibus. Corpus totum nigrum, hirtum.

Puncto duo alba utrinque in dorso abdominalis. Alae ferrugineae, apice fuscae.

*sex cincta.* 9. S. nigra, flavo maculata, abdomine atro: strigis sex flavis.

Habitat in America. *v. Rohr.*

Antennae nigrae. Caput nigrum, labio ferrugineo.

Thorax niger, strigis duabus apicis, anteriore interrupta, punctis duobus sub alis, tribus loco scutelli et duobus sub scutello flavis. Abdomen atrum, nitidum, fasciis sex flavis. Anus aculeo parvo, recurvo. Pedes ferruginei.

*7 cincta.* 10. S. cinereo - hirta, abdomine coerulescente: fasciis septem flavis, ano tridentato.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Antennae nigrae. Caput cinereo - hirtum, labio flavo maxillisque apice atris. Thorax cinereo - hirtus, lobo antico fasciisque duabus scutelli flavis. Abdomen coerulescens, nitidum, fasciis septem flavis. Anus dentibus tribus validis, recurvis. Alae albidæ. Pedes flavi, tibiis posticis subtus, femoribus supra coeruleis.

**112. CHRYSIS.** *Labium porrectum, maxilla multo longius, apice membranaceum.*  
*Antennae filiformes.*

1. *C. viridis, nitida, ano coeruleo, quadridentato.* *splendida.*  
 Habitat ad littora Malabarica. *Koenig.* In nova Hollandia. *Banks.*  
 Magna. Caput viride, nitens, oculis fuscis. Vertex impressus. Thorax gibbus, punctatus sulcisque duobus exaratus. Scutellum porrectum, concavum. Abdomen rotundatum, ano coeruleo, quadridentato. Pedes virides, plantis fuscis.
2. *C. viridis, nitida, ano coeruleo, sexdentato.* *sinaragdu-*  
 Habitat in America septentrionali. *Mus. Bankianum.* *la.*  
 Affinis praecedenti, at anus sex dentatus.
3. *C. viridis, nitens, abdomine utrinque macula ocellari aurea, ano coeruleo, sex dentato.* *oculata.*  
 Habitat ad littora Malabarica. *Koenig.*  
 Statura omnino praecedentis. Caput viride, antennis nigris oculisque fuscis. Thorax gibbus, punctatus, viridis, postice sub alis utrinque unidentatus. Abdomen rotundatum, viride, versus apicem utrinque macula aurea splendidissima. Anus coeruleus, sex dentatus. Pedes virides, plantis fuscis.
4. *C. viridis, nitida, abdominis secundo segmento utrinque ocello coerulecente, scutello prominulo, acuto.* *lincea.*  
 Habitat in Sierra Leon Africæ. *Drury.*  
 Magnitudo praecedentis. Corpus viride, nitidissimum. Caput canaliculatum, antennis fuscis. Thorax valde gibbus, scutello porrecto, acuto, subspinoso. Abdominis secundum segmentum utrinque ocello parvo, coerulecente, pupilla fulva. Anus quadridentatus, subcoerulescens. Pedes virides, plantis nigris.
5. *C. glabra, nitida, thorace abdominalisque primo segmento viridibus, reliquis carneis, ano serrato.* *carnes.*  
 Habitat in Italia. *Allioni.*

Magnitudo C. ignitae. Caput viride, labio villoso, argenteo, splendente. Antennae nigrae. Thorax scaber, viridis, postice utrinque acuminatus. Punctum callosum, carneum ante alas. Scutellum prominens, obtusum. Abdomen carneum, nitidum, segmento primo viridi. Anus denticulis plurimis minoribus ferratus.

*ignita.* 6. C. glabra, nitida, thorace viridi, abdomine aureo: apice quadridentato. *Linn. Syst. Nat.* II. 947. 1.  
*Fn. Sv.* 1665.

Vespa thorace viridi, coeruleo, abdomine inaurato, pone cupreo, dentato. *Geoff. Inf.* 2. 382. 20.

*Friech. Inf.* 9. tab. 10. fig. 1.

*Sultz. Inf.* tab. 19. fig. 121.

*Schaeff. Elem.* tab. 40.

— — *Icon.* tab. 74. fig. 7. 8.

Habitat in Europae muris.

*bidentata.* 7. C. glabra, nitida, cyanea, thorace bidentato abdminisque segmentis duobus primis aureis. *Linn. Syst. Nat.* II. 947. 2.

Habitat in Europa.

Anus dentibus tribus brevissimis. Plantae fuscae.

*succincta.* 8. C. glabra, nitens, viridis, thorace fascia coccinea, abdomine aureo, subtridentato. *Linn. Syst. Nat.* II. 947. 3.

Habitat in Europa.

*lucidula.* 9. C. glabra, nitens, viridis, thorace antice abdomineque aureis, ano integro.

Vespa viridi-coerulea, abdomine thoracisque antica parte ruberrimis. *Geoff. Inf.* 2. 382. 19.

*Sphex nobilis.* *Scop. carn.* 792.

Habitat in Europa.

Parva. Caput viride, antennis oculisque nigris.

Thorax scaber, viridis, antice rufus, postice utrinque acuminatus. Abdomen aureum, ano integro. Alae fuscae, puncto marginali nigro.

10. C. glabra, nitens, thorace viridi, abdomine aureo: ano bidentato. *Linn. Syst. Nat.* II. 948. 4. *Fn. Sv.* 1666. *aurata.*
- Vespa thorace viridi-coeruleo, abdomine aurato, cupero, pone inermi. *Geoff. Inf.* 2. 383. 21.  
*Schaeff. Icon.* tab. 42. fig. 5. 6.
- Habitat in Europae muris.
11. C. glabra, nitens, thorace abdomineque coeruleis, ano tridentato. *Linn. Syst. Nat.* II. 948. 5. *Fn.* *Sv.* 1667. *cyanæa.*
- Vespa coerulea, nitens. *Geoff. Inf.* 2. 384. 23.  
*Scop. carn.* 697.  
*Schaeff. Icon.* tab. 81. fig. 5.
- Habitat in Europæ muris.
12. C. viridis, nitens, abdomine coeruleo: ano quadridentato. *amethystina.*  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*  
Statura praecedentium. Antennæ fuscae, basi virides.  
Thorax viridis, scutello prominulo, concavo.  
Alae obscuræ.
13. C. viridis, nitens, thorace postice bidentato, ano quadridentato. *nitidula.*  
Habitat in America. *Mus. Bankianum.*  
Corpus totum glabrum, nitidum, viride.
14. C. aurea, abdomine ferrugineo, apice cyaneo. *semiaurata.*  
Sphex semiaurata viridis, nitida, abdomine ferrugineo, apice nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 946. 35.  
*Fn. Sv.* 1661.
- Habitat in Europa boreali.
15. C. atra, abdomine brevissimo, pedibus posticis clavatis, denticulatis, rufis. *fispes.*  
Sphex fispes. *Linn. Syst. Nat.* II. 943. 13. *Fn. Sv.* 1657.  
Habitat in Europa.

113. THYNNVS. *Os lingua brevissima, involuta.*

*Labium* linguam constitutens trifidum, lacinia intermedia emarginata.

*Antennae cylindricae, articulo primo crassiore.*

*dentatus.* 1. *T. abdomine atro:* segmento secundo, tertio quartoque punctis duobus albis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Statura et magnitudo vespae vulgaris. Antennae porrectae, fuscae, basi piceae. Labium flavum, dentatum. Maxillae flavae, apice nigrae. Thorax niger, striga antica, lobo postico scutelloque flavis. In medio dorsi lineolae duae impressae, abbreviatae. Abdomen glabrum, atrum, primo segmento basi, 2. 3. 4. punctis duobus flavis, reliquis immaculatis. Anus denticulis septem parvis serratus.

*emarginatus.* 2. *T. abdomine nigro:* segmentis fascia interrupta flava, scutello emarginato.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Statura omnino praecedentis, at paulo minor. Antennae cylindricae, nigrae. Caput flavum, lineis duabus frontalibus strigaque verticali nigris. Thorax planus, obscure ferrugineus, antice striga flava, postice strigis duabus atris. Scutellum late emarginatum. Abdomen nigrum, primo segmento et ultimo immaculato, reliquis fascia in medio interrupta, flava. Anus dentibus septem.

*integer.* 3. *T. ater,* abdominis segmentis margine villoso-cinereis, ano integro.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Praecedentibus minor. Antennae nigrae. Caput nigrum, fronte tomento cinereo, splendente. Thorax ater, immaculatus, scutello truncato, obtuso. Abdomen cylindricum, segmentis in medio atris, margine omni villoso, cinereo. Anus integer, aculeo parvo, recurvo.

114. LEVCOSPI. *Os* palpis aequalibus  
brevibus.

*Labium* maxillis longius,  
emarginatum.

*Antennae* extrorsum crass.  
fiores.

1. Leucospis.

*dorsigera.*

Habitat in Italia. *Allioni.*

Caput atrum. Antennae longitudine thoracis, rectae,  
extrorsum paulo crassiores, articulis cylindricis,  
approximatis, brevibus, primo subtus flavo. Tho-  
rax elevatus, valde gibbus, ater, antice linea du-  
plici transversali, lateribus conuata, flava. Punctum  
utrinque sub alis et scutellum flava. Abdomen  
sessile, compressum, dorso canaliculatum, nigrum,  
fasciis duabus, puncto inter fascias anoque flavis.  
Aculeus duplex niger, sub abdomine insertus, refle-  
xus, longitudine abdominalis, in ejus canalem dor-  
salem reconditur. Pedes flavi, nigro maculati;  
postici femoribus incrassatis, dentatis, macula magna  
nigra. Tibiae flavae.

115. BEMBYX. *Os* lingua inflexa, quin-  
quefida.

*Labium* superius porre-  
ctum, obtegens.

*Antennae* filiformes.

1. B. labio superiori rotundato, integro, corpore nigro *signata.*  
flavoque vario.

Vespa signata thorace supra nigro, lineis quatuor  
fasciolisque duabus flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 952. 24.

*Mus. Lud. Ulr.* 410.

Habitat in America.

2. B. labio superiori integro, abdominalis segmentis atris:  
punctis quatuor flavis. *punctata.*

Habitat in Brasilia. *Mus. Rankianum.*

Statura praecedentis. Labium nigrum, linea utriusque flava. Caput nigrum, lineola verticis flava. Antennae nigrae, primo articulo subtus flavo. Thorax ater. Abdomen atrum, segmentis quatuor anterioribus punctis quatuor flavis; lateralibus duplo majoribus. Segmentum 5. punctis duobus flavis, 6. immaculatum, 7. utrinque lineola flava. Subtus atrum, utrinque lineola e punctis flavis. Pedes nigri.

*rostrata.* 3. B. labio superiori conico, fisso, abdomine atro, fasciis glaucis, repandis.

Apis rostrata labio superiori conico, inflexo, abdominis fasciis glaucis, repandis. Linn. Syst. Nat. 11. 957. 25. Fn. Sv. 1700. Linn. It. Gotl. 336.

Habitat in Europae monticulis arenosis; in singulis nidis unico pullo.

116. V E S P A. *Labium* porrectum, maxillis longius, emarginatum, utrinque seta instructum.  
*Antennae* filiformes.

*cincta.* 1. V. nigra, thorace obscure maculato, abdomine atro: fascia ferruginea.

Habitat ad littora Malabarica. Koenig.

Magna, statura V. crabronis. Caput nigrum, antennis fuscis. Thorax niger, maculis duabus utrinque ante alas scutelloque obscuris. Abdomen atrum, fascia in medio lata, ferruginea. Alae ferrugineae, basi nigrae. Pedes nigri.

Varietas minor thorace immaculato, e Capite Bonae Spei. Mus. Bankianum.

*ephippium.* 2. V. abdome ferrugineo: segmento secundo majori, atro, scutello tridentato.

Habitat in nova Hollandia. Mus. Bankianum.

Antennae ferrugineae, primo articulo fusco. Caput ferrugineum, oculis nigris. Thorax niger, lobo antico ferrugineo, postice utrinque unidentatus. Scutellum ferrugineum, denticulis tribus erectis, validis.

validis. Abdomen ferrugineum, segmento secundo majori, atro. Alae anticae ferrugineae, apice violaceae, posticae apice immaculatae.

3. V. ferruginea, abdomine fascia flava, utrinque bipunctata. *Vespa orientalis.*

*Vespa orientalis* fusca, abdominis segmento tertio quartoque flavis: punctis duobus nigris. *Linn. Mant.* 540.

*Vespa turcica.* *Drury Inf.* 2. tab. 39. fig. 1?

Habitat in Oriente.

4. V. ferruginea, abdomine atro: fasciis tribus interruptis, flavis. *Vespa tricincta.*

Habitat in America. *Mus. Bankianum.*

Major *V. crabrone.* Antennae nigrae, articulo primo ferrugineo. Caput ferrugineum, labio superiori flavo verticeque fuscum. Thorax subpubescens, ferrugineus. Alae subferrugineae. Abdomen atrum, segmento primo et secundo fascia lata flava, in medio interrupta, lateribus sinuata. Segmentum tertium fascia tenuiori flava, in medio interrupta. Tibiae ferrugineae, tibiarum dorso serrato.

5. V. nigricans, abdominis primo et secundo segmento basi ferrugineis, sexto toto flavo. *Vespa analis.*

Habitat in Cap. B. S. *Mus. Bankianum.*

Magna. Antennae fuscae, apice ferrugineae. Caput nigrum, vertice piceo. Thorax nigro piceoque varius. Abdomen nigrum, segmento primo et secundo basi ferrugineis, qui color in secundo segmento bidentatus. Segmentum 3. 4. 5. nigra, utrinque puncto obsolete ferrugineo, sextum totum flavum, immaculatum. Alae ferrugineae, costa baseos nigra. Pedes fuscii.

6. V. thorace lineolis nigris tribus, corpore ferrugineo, alis anticis nigricantibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 948. I. *Vespa carolina.*

Habitat in America.

Magnitudo *V. crabronis.*

7. V. ferruginea, abdomine alisque atris, maxillis porrectis, capite longioribus. *Vespa cornuta.*

*Vespa cornuta* rostro corneo, subulato, abdomine atro: segmento secundo majore. *Linn. Syst. Nat.* II. 951. 20. *Mus. Lud. Ulr.* 409.

*Apis cornuta. Drury Inf. 2. tab. 48. fig. 3.*

Habitat in Africa.

*Thorax ferrugineus, macula dorsali nigra. Abdomen atrum, immaculatum.*

*crabro.* 8. *V. thorace nigro, antice rufo, immaculato, abdominis incisuris puncto nigro duplice, contiguo. Linn. Syst. Nat. II. 948. 3. Geoff. Inf. 2. 368.*

*Scop. carn. 824.*

*Mouff. Inf. 50.*

*Raj. Inf. 250.*

*Frisch. Inf. 9. tab. II. fig. 1.*

*Swamm. Bibl. tab. 26. fig. 9.*

*Reaum. Inf. 6. tab. 18. fig. 1.*

— — 4. tab. 10. fig. 9.

*Schaeff. Icon. tab. 53. fig. 5.*

Habitat sub arborum radicibus. Apibus insidiatur.

*vulgaris.* 9. *V. thorace utrinque lineola interrupta, scutello quadrimaculato, abdominis incisuris punctis nigris distinctis. Linn. Syst. Nat. II. 949. 4. Fn. Sv. 1671.*

*Vespa thorace lineolis trium parium differentium flavescientium. Geoff. Inf. 2. 369.*

*Vespa vulgaris. Raj. Inf. 250.*

*Scop. carn. 825.*

*Reaum. Inf. 6. tab. 12. fig. 7. 8.*

*Frisch. Inf. 9. tab. 12. fig. 2.*

*Swamm. Bibl. tab. 26. fig. 8.*

*Schaeff. Elem. tab. 130.*

— — *Icon. tab. 35. fig. 4.*

Habitat sub Europae tectis: praedatur muscas, furatur mel apum.

*rufa.* 10. *V. thorace utrinque lineola, scutello bipunctato, abdome flavo, antice ferrugineo. Linn. Syst. Nat. II. 948. 5. Fn. Sv. 1672.*

Habitat in Europa.

Praecedenti affinis.

*maculata.* 11. *V. nigra, thorace albo, maculato, scutello quadrimaculato, abdomine postice albo. Linn. Syst. Nat. II. 948. 2. Amoen. acad. 6. 412. 91.*

Habitat in America septentrionali.

**A**ntennae subtus ferrugineae. Abdominis tria ultima segmenta alba et in singulo segmento supra subtusque puncta tria nigra.

12. V. nigra, thorace flavo-maculato, abdomine fasciis *arenaria*. sex dentatis, luteis, prima linearis interrupta.

Habitat in Americae arenosis, favos struens planos, horizontales, incumbentes; cellis hexagono-prismaticis, deorsum spectantibus. Delectatur fructibus dulcibus eorumque succis expressis. *Mus. Banks.*

Statura V. vulgaris, at duplo minor. Caput nigrum, ore fronteque flavis. Thorax niger, lineola utrinque ante alas punctoque sub alis flavis. Scutellum quadripunctatum. Abdomen nigrum, segmentorum marginibus dentato-flavis, excepto primo linearis integro.

13. V. thoracis dorso nigro: lineis duabus flavis, scutello *lineata*. flavo: lineola nigra.

Habitat in America. *Drury.*

Affinis videtur V. vulgari. Antennae nigrae, articulo primo flavo. Caput flavum, fronte punctoque medio labii nigris. Thorax lateribus flavis, pectore dorsoque nigris, lineis duabus flavis. Scutellum flavum, linea media nigra. Abdomen ferrugineum, segmentis basi parum nigricante, et utrinque puncto nigro. Pedes flavi.

14. V. flava, thoracis dorso nigro: punctis quatuor *carnifex*, ferrugineis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

Major V. annulari. Antennae flavae, basi fuscantes. Caput flavum, vertice nigro, striga terminali ferruginea. Maxillae ferrugineae, margine atro. Thorax flavius, dorso nigro, punctis quatuor obscure ferrugineis, interioribus majoribus. Abdomen flavius, segmento secundo basi fusco. Alae ferrugineae. Pedes obscuri.

15. V. fusca, capite ferrugineo, antennis medio nigris. *Ianio.*

Habitat in Brasilia. *Mus. Bankianum.*

Statura praecedentis. Antennae ferrugineae, ante apicem nigrae. Thorax fuscus, lobo antico subferrugineo.

gineo. Abdomen fuscum. Alae nigricantes. Pedes ferruginei, femoribus fuscis.

- annularis.* 16. V. fusca, genubus antennarum apicibus marginaque primi segmenti flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 950. 9.  
*Amoen. acad.* 6. 413. 93.  
Habitat in America boreali.

- sepida.* 17. V. nigra, thorace, lobo antico punctisque duobus, abdomine apice ferrugineis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Statura V. annularis. Antennae ferrugineae. Caput nigrum, labio ferrugineo. Thorax niger, lobo antico punctisque duobus magnis dorsalibus ferrugineis. Abdominis segmentum 1. nigrum, 2. 3. nigra, margine ferrugineo, reliqua tota ferruginea. Alae ferrugineae. Pedes ferruginei, femoribus nigris.

- calida.* 18. V. nigra, abdomine apice fulvo.

Vespa calida nigra, abdominis apice antennisque fulvis. *Linn. Syst. Nat.* II. 952. 27.

Habitat ad Sierra Leon Africæ.

Corpus magnum, nigrum. Antennae in nostra fuscae. Scutellum bidentatum, et sub scutello dentes quatuor validi. Abdomen apice fulvum. Alae violaceae.

- haemorrhoidalis.* 19. V. nigra, thorace antice abdomineque postice ferrugineis, alis flavis, basi atris.

Habitat ad Cap. B. S. *Mus. Banks.*

Statura V. calidae. Antennae ferrugineae. Caput nigrum, labio punctoque medio frontis ferrugineis. Thorax niger, lobo antico ferrugineo, postice retusus. Abdomen nigrum, segmento 1. immaculato, 2. 3. margine, reliquis totis ferrugineis. Alae anticae flavae, basi atrae, posticae fuscae.

- albifrons.* 20. V. atra, labio abdominalisque fascia niveis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Antennae nigrae, articulo primo subtus albo. Caput nigrum, labio albo. Thorax ater, punctis duobus minutissimis albis in margine antico. Abdomen atrum, secundi segmenti margine late niveo. Pedes atri. Alae obscurae.

21. V. nigra, abdomine ferrugineo: segmento secundo *concinna*.  
toto atro.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Statura V. tepidae. Caput nigrum, fronte fulva.  
Thorax niger, immaculatus. Abdomen supra fer-  
ruginosum, primo segmento basi, secundo toto atris:  
subtus atrum, tertio segmento margine albo.  
Alae albidae, margine exteriori laete violaceo.  
Pedes nigri.

22. V. atra, scutello abdominalisque fascia baseos albis. *uncinata*.

Vespa quadridens atra, thorace quadridentato, scutello  
primoque segmento abdominis niveis. *Linn. Synt.*  
*Nat. 11. 951. 15. Amoen. acad. 6. 413. 92.* Convenit  
descriptio Linneana; at thorax in nostra inermis.

Habitat in America.

Statura V. maculatae. Antennae nigrae, uncinatae.  
Caput nigrum, fronte flava. Thorax niger, lobo  
antico scutelloque niveis. Abdomen atrum, margine  
primi segmenti niveo. Alae cyaneae.

23. V. nigra, labio pedibusque rufis.

*rufipes.*

Habitat in insulis Oceani pacifici. *Mus. Banks.*

Parva. Caput nigrum, labio primoque antennarum  
articulo subtus ferrugineis. Thorax immaculatus,  
postice retusus. Abdomen atrum, glabrum, imma-  
culatum. Pedes ferruginei. Alae margine exteriori  
coerulecentes.

24. V. thorace postice lineolis duabus flavis, abdomine *margina-*  
*ferrugineo*: segmento primo tertioque nigris: *lis*.  
margine flavo.

Habitat in Cap. B. S. *Mus. Banks.*

Parva. Caput ferrugineum, vertice fusco. Thorax ni-  
ger, lobo antico scutelloque ferrugineis. Sub scu-  
tello lineolae duae flavae. Abdominis primum  
segmentum nigrum, margine flavo, secundum fer-  
ruginosum, margine flavo, tertium iterum nigrum,  
margine flavo, reliqua ferruginea. Alae obscurae.  
Pedes ferruginei.

25. V. ferruginea, abdominis primo segmento macula *dorsalis*.  
nigra margineque flavo.

Habitat in America. *Lewin.*

Statu-

Statura et magnitudo V. uncinatae. Antennae nigrae, basi ferrugineae. Caput ferrugineum, vertice nigro. Thorax ferrugineus, macula dorsali nigra lineolis-que duabus ferrugineis obsoletis. Scutellum ferru-gineum. Abdomen ferrugineum primo segmento macula cyathiforni nigra margineque flavo. Ter-tium segmentum macula magna dorsali atra. Alae fuscae. Pedes ferruginei.

*parietum.* 26. V. nigra, thorace punctis duobus, scutello bipun-ctato, abdomine fasciis quinque flavis: prima re-motissima. *Linn. Syst. Nat.* II. 949. 6. *Fn. Sv.* 1673. et 1679.

Vespa nigra, abdomine fasciis quinque flavis, prima remotissima. *Geoff. Inf.* 2. 376.

*Roef. Inf.* 2. *Vesp. tab.* 17. fig. 8.

*Frisch. Inf.* 9. *tab.* 12. fig. 1.

Habitat in foraminibus parietum ligneorum.

*muraria.* 27. V. nigra, thorace maculis duabus luteis, abdominis fasciis quatuor flavis, prima remotissima. *Linn. Syst. Nat.* II. 950. 8. *Fn. Sv.* 1674.

*Scop. carn.* 828.

*Frisch. Inf.* 9. *tab.* 12. fig. 8. 9.

*Schaeff. Icon.* *tab.* 24. fig. 3.

Habitat in Europæ muris.

Scutellum immaculatum.

*spinipes.* 28. V. nigra, abdomine fasciis quinque flavis, femori-bus intermediis denticulatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 950. 10. *Fn. Sv.* 1682.

Habitat in Europa boreali.

Antennæ supra nigrae, infra ferrugineae.

*bidens.* 29. V. nigra, thorace bispinoso, thoracis segmentis tri-bus margine luteis. *Linn. Syst. Nat.* IV. 951. 16.

Habitat in Europa boreali.

*arvensis.* 30. V. abdominis fasciis quatuor flavis, tertia inter-rupta. *Linn. Syst. Nat.* II. 950. 12. *Fn. Sv.* 1678.

*Schaeff. Icon.* *tab.* 93. 8.

Habitat in Europa.

31. V. nigra; thorace lineola punctis duobus scutelloque flavis, abdomine fasciis quatuor flavis: prima interrupta. *Vespa campestris nigra*, thorace lituris quatuor abdominalisque fasciis quatuor flavis: prima interrupta. *Linn. Syst. Nat. II. 950. 13. Fn. Sv. 1677.*  
Habitat in Europa.
32. V. ferruginea, abdomine fasciis quinque flavis, antennis medio nigris, apice flavis. *Vespa tricolor.*  
Habitat in Jamaica.  
Statura V. arvensis. Caput ferrugineum, maxillis annuloque verticis flavis. Antennae basi ferrugineae, medio nigrae, apice flavae. Thorax obscure ferrugineus, margine antico lineolaque ante alas flavis. Primum segmentum abdominis nigrescit, reliqua ferruginea, marginibus flavis. Pedes flavi, femoribus nigris. Alae ferrugineae.
33. V. thorace maculato, abdomine fasciis quatuor punctisque duobus primi segmenti flavis. *bipunctata.*  
Habitat in Germania. *de Hattorf.*  
Media. Antennae nigrae, primo articulo subtus flavo. Caput nigrum, maxillis, striga orbitaque oculorum flavis. Thorax niger, striga antica, puncto sub alis scutelloque flavis. Abdomen atrum, nitidum, primo segmento utrinque puncto, reliquis fascia flavis. Pedes flavi, femoribus basi nigris.
34. V. thorace maculato, abdomine fasciis tribus punctisque duobus primi segmenti flavis. *flavipes.*  
Habitat in America. *Lewin.*  
Statura V. parietum. Antennae nigrae, subtus rufae, primo articulo flavo. Caput nigrum, labio flavo, macula nigra. Thorax niger, margine antico, punctis tribus ante alas scutelloque flavis. Abdomen nigrum, fasciis tribus flavis, quarum postica tenuissima. Puncta praeterea duo in primo segmento. Alae fuscae. Pedes flavi.
35. V. nigra, thorace postice utrinque subspinoso, alis violaceis. *Vespa cinereascens.*  
Habitat in America. *v. Robr.*

Statura V. parietinae. Corpus totum nigrum, certo situ cinereo-nitens. Thorax postice utrinque muronatus. Alae anticae obscure violaceae.

*flavescens.* 36. V. ferruginea, alis apice macula fusca.

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Parva. Caput ferrugineum, antennis rufis. Thorax ferrugineus, macula ante alas flava, puncto ferrugineo. Abdomen ferrugineum, segmentorum marginibus flavescensibus. Alae plicatae, ferrugineae, macula apicis nigra.

*gibbosa.* 37. V. capite thoraceque maculatis, abdomine varioloso, quadrifasciato: primo segmento gibboso.

Habitat in America. *Lewin.*

Statura praecedentis, at minor. Antennae nigrae, articulo primo flavo. Caput nigrum, labio, fronte, orbita oculorum, punctisque duobus verticis flavis. Thorax punctatus, ater, margine antico punctis duobus ante alas, scutelloque flavis. Abdomen variolosum, nigrum, fasciis quatuor flavis. Segmentum primum subglobosum. Pedes flavi, femoribus nigris. Alae obscurae.

*america-na.* 38. V. scutello fasciis duabus lineolisque quatuor flavis, abdomine fasciis flavis, ano fusco.

Habitat in America.

Antennae ferrugineae, medio nigrae. Caput nigrum, maxillis flavis. Thorax niger, margine antico punctisque sub alis flavis. Scutellum antice fasciis duabus, postice lineolis quatuor flavis. Abdomen atrum, fasciis quatuor flavis, ano fusco. Pedes nigro flavoque varii.

*coarctata.* 39. V. abdominalis primo segmento infundibuliformi, secundo campanulato, maximo. *Linn. Syst. Nat. II. 950. II. Fn. Sv. 1676.*

Vespa nigra, abdominalis articulo primo infundibuliformi, secundo campanulato, maximo. *Geoff. Inf. 2. 377. tab. 16. fig. 2.*

*Scop. carn. 830.*

*Frisch. Inf. 9. tab. 9.*

Habitat in Europae hortis.

Abdomen nigrum, fasciis flavis.

40. V. nigra, flavo-variegata, abdominis petiolo incurvo; maculis quatuor flavis. *arcuata.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Statura praecedentis, at major. Antennae nigrae.

Caput nigrum, fronte orbitaque oculorum flavis. Thorax niger, lobo antico, macula magna sub alis, alia ante alas puncto nigro foeta, duabus lineolisque duabus dorsalibus flavis. Scutellum nigrum, maculis duabus marginaque postico flavis. Sub scutello thorax flavus; cruce nigra. Abdominis petiolus elongatus, incurvus, ater, maculis duabus in medio, duabus ante apicem flavis. Segmentum secundum maximum, fasciis duabus, reliquis unica, omnibus interruptis flavis. Subtus segmenta nigra, utrinque puncto flavo. Pedes nigri, tibiis flavis.

41. V. nigra, flavo variegata, abdominis petiolo ferrugineo, apice nigro: maculis duabus flavis. *campaniformis.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Praecedenti paulo minor. Antennae ferrugineae, apice fuscescentes. Caput nigrum, fronte orbitaque oculorum flavis. Lingua ferruginea. Thorax niger, lobo antico, macula magna sub alis puncto parvo ante alas flavis. Scutellum flavum, fascia nigra. Thorax sub scutello flavus, fulco medio nigro. Abdominis petiolus elongatus, incurvus, ferrugineus, apice niger, utrinque puncto flavo. Segmentum secundum maximum, maculis duabus baseos marginaque flavis. Segmenta reliqua margine flavo. Pedes flavi.

42. V. abdome flavo, basi nigro, petiolo incurvo, ferrugineo: fasciis duabus nigris. *pyriformis.*

Habitat in China. *Drury.*

Caput nigrum, antennis ferrugineis fronteque flava. Thorax gibbus, antice flavus, postice niger, puncto calloso ante alas, maculis duabus sub alis scutelloque ferrugineis. Abdominis petiolus elongatus, incurvus, ferrugineus, fasciis duabus nigris. Abdominis primum segmentum campaniforme, maximum, basi nigrum, maculis duabus magnis ferrugineis, apice flavum. Segmenta reliqua parva, flava.

Alae valde plicatae, ferrugineae, apice cinereas.  
Pedes ferruginei, femoribus posticis nigris.

*grisea.* 43. V. cinerea, abdominis petiolo ferrugineo.

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Banks.*

Magna. Antennæ fuscae. Caput cinereum, maxillis ferrugineis. Thorax cinereus, nitens, immaculatus. Abdominis petiolus elongatus, incurvus, ferrugineus. Segmentum secundum campaniforme, basi attenuatum, ferrugineum, apice cinereum, macula utrinque flava. Segmentum 3. 4. cinerea, macula utrinque flava; reliqua immaculata. Pedes fusci, femoribus ferrugineis. Alae albidae, margine exteriori ferrugineo.

*attenuata.* 44. V. abdominis ferruginei petiolo nigro: fascia flava.

Habitat in America. *Drury.*

Antennæ ferrugineae, apice nigrae. Caput nigrum, labio flavo. Thorax obscure ferrugineus, immaculatus. Abdominis petiolus elongatus, incurvus, ater, fascia apicis flava. Abdomen ferrugineum, segmento secundo majori, tertio et quarto coarctatis, brevissimis, quarto et quinto cylindricis, ano acuto.

*cyanæa.* 45. V. coerulea, ore ferrugineo, alis fusci.

Habitat in Brasilia. Nidus cordatus, cortice tenuissimo tectus. *Mus. Banks.*

Antennæ nigrae. Caput coeruleum, ore ferrugineo. Thorax coeruleus, immaculatus. Abdomen coeruleum, immaculatum, petiolo brevi, campanulato. Alae obscuræ. Pedes fusci.

*conica.* 46. V. nigra, thorace antice ferrugineo, abdome conico, flavo: segmento secundo et sexto basi nigris.

Habitat in America.

Antennæ nigrae, primo articulo subtus flavo. Caput nigrum, labio flavo. Thorax niger, antice scutelloque ferrugineus. Abdomen petiolatum, petiolo nigro; secundum segmentum maximum, basi nigrum, apice flavum: reliqua flava, excepto sexto basi atro. Pedes ferruginei.

47. V. nigra, abdominis petiolo pedibusque rufis. *arietis.*

Habitat in America. *v. Rohr.*

Minor V. coarctatae. Antennae uncinatae, nigrae, macula sesquialtera flavicante in singulo articulo, exceptis anticis duobus. Caput et thorax nigra, immaculata. Abdominis petiolus elongatus, medio gibbus, ferrugineus. Abdomen globosum, atrum. Alae fuscae, subcoerulecentes.

48. V. scutello quadripunctato, abdominis segmentis *biglumis.*

margine albis: secundo punctis duobus albis. *Linn.*  
*Syst. Nat. II. 951. 17. Fn. Sv. 1680.*

Habitat in Europa, nidum e fistulis aggregatis ad latera rupium struens.

Scutellum in nostro specimine inerme.

49. V. nigra, abdome flavo: segmentis triangulo dorsali nigro. *triangulum.*

Habitat Hafniae.

Statura Crabronis. Caput nigrum, ore flavo. Thorax immaculatus. Pedes rufi.

## 117. CRABRO. *Palporum articuli compressi,* *rhomboidales.*

*Labium breve, corneum,*  
*apice palpigerum.*

*Antennae filiformes.*

1. C. abdome fasciis duabus flavis, ano tridentato, alis nigris, margine albis. *tridens-*

*tus.*

Habitat in Europa australi.

Caput nigrum, ore pube argentea, splendente. Thorax niger, immaculatus. Abdomen nigrum, fasciis duabus latis flavis. Anus dentibus tribus incurvis, acutis. Pedes nigri. Alae fuscac, margine postico albo.

2. C. thorace postice bidentato, abdome fasciis tribus flavis. *spinofus.*

Habitat in Europa australi.

Caput et antennae nigrae, ore argenteo. Thorax niger, lineola antica flava, postice utrinque dente valido armatus. Abdomen nigrum, fasciis tribus flavis. Pedes nigri, tibiis piceis.

*fessorius.* 3. C. thorace immaculato, abdomine maculis utrinque quinque lutescentibus, pedibus nigris.

*Sphex fossoria.* *Linn. Syst. Nat.* II. 946. 32. *Fn. Sv.* 1662.  
Habitat in Europae montibus fabulosis.  
Maculae abdominalis posticæ connatae in fasciam.

*subterra-* 4. C. thorace maculato, abdomine utrinque maculis quinque flavis, pedibus ferrugineis.

Habitat Hafniae.

Caput nigrum, labio argenteo primoque antennarum articulo subtus flavo. Thorax niger, puncto parvo sub alis et duobus loco scutelli. Abdomen atrum, glabrum, nitidum, maculis utrinque quinque oblongis luteis, quarum ultimæ connatae. Pedes omnes ferruginei.

*sexcinctus.* 5. C. thorace maculato, abdomine fasciis sex flavis, primis interruptis.

Habitat in Germania. *v. Hattorf.*

Affinis sequenti. Caput nigrum, labio argenteo, nitido. Antennae nigrae, primo articulo subtus flavo. Thorax niger, fascia interrupta apicis, puncto sub alis et alio calloso ante alas flavis. Abdomen atrum, nitidum, fasciis sex flavis, primis tribus interruptis. Pedes flavi, femoribus nigris.

Alium vidi in *Museo Bankiano* fasciis sex, tertia quartaque interruptis. An distinctus?

*cribra-* 6. C. niger, abdomine fasciis flavis: intermediis interruptis, tibiis anticis clypeis concavis.

*Sphex cribraria.* *Linn. Syst. Nat.* II. 945. 23. *Fn. Sv.* 1675.

*Vespa-Ichneumon* antennis reflexis, pedibus anterioribus velut clypeatis. *Raj. Inf.* 255. 14.

*Apis* tibiis anticis lamella cribriformi. *Uddm. Diff.* 94. *Roland. Act. Holm.* 1751. p. 56. tab. 3. fig. 1.

Habitat in Europæ floribus.

Sexus alter pedibus simplicibus, alter clypeatis ad arctiorem cohaesionem in copula.

7. C. niger, abdomine punctis flavis, pedibus anticis concavo-clypeatis. *clypeatus.*

*Sphex clypeata.* Linn. *Syst. Nat.* II. 945. 24.

Apis nigra, abdomine fasciis sex flavis, primis duabus interruptis, tibiis anticis lamellis integris. Schreb.

*Ins. II. tab. I. fig. 8.*

Habitat Halae Saxonum.

8. C. niger, abdominis fasciis tribus flavis, primis interrup- *vagus.*

Fn. Sv. 1661.

*Scop. carn.* 785.

Habitat in Europa.

Thorax in nostro specimine immaculatus.

9. C. niger, scutello flavo, abdominis segmentis tribus *mystaceus.*

margine flavis, primo interrumpo, tibiis ferrugineis.

*Sphex mystacea.* Linn. *Syst. Nat.* II. 944. 21. Fn.

Sv. 1653.

Habitat in Europa.

10. C. flavus, nigro-maculatus, femoribus posticis erastis- *femoratus.*

fissimis, denticulatis, flavis.

Habitat in America. v. Rohr.

Parvus. Antennae cylindricae, approximatae, nigrae.

Caput flavidum, puncto verticis nigro. Thorax postice gibbus, flavidus, dorso nigro-maculato. Abdomen breve, conicum, flavidum, strigis abbreviatis quatuor anque nigris. Pedes flavi, femoribus posticis incrassatis, magnitudine abdominis, subtus denticulatis, flavis, basi apiceque puncto nigro. Tibiae tenues, incurvae. Forte genere differt.

11. C. ater, scutello, punctis duobus sub scutello, abdo- *tricinctus.*

minisque fasciis tribus flavis.

Habitat in America. v. Rohr.

Statura C. fossorii, at triplo minor. Caput nigrum, labio orbitaque oculorum flavidus. Thorax niger, striga antica, puncto ante alas et sub alis, scutello punctisque duobus majoribus sub scutello flavidus. Abdomen atrum, nitidum, strigis tribus flavis. Alae macula fusca. Pedes nigri, flavo maculati.

*uniglumis.* 12. C. scutello mucronato, abdominis segmentis tribus punctis duobus albis.

Vespa uniglumis. *Linn. Syst. Nat.* II. 951. 18. *Fn. Sv.* 1681.

Habitat in Europae floribus in primis umbellatis.

*Labium argenteum.* Thorax immaculatus, niger.  
Pedes nigri, tibiis ferrugineis.

*leucostoma.* 13. C. ater, glaber, labio argenteo.

Vespa leucostoma atra, glabra, labio argenteo, palmis fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 946. 36. *Fn. Sv.* 1663.

Habitat in Europa.

Antennae filiformes, primo articulo majori. *Labium argenteo-pubescentia.*

## 118. ANDRENA. *Os lingua trifida.*

*Labium cylindricum, maxillis longius, utrinque setis duabus membranaceis.*

*coeruleo-* 1. A. fusca, subvillosa, abdomine coerulecente: incisurarum marginibus albieantibus.

*scens.* Apis coeruleo-sens. *Linn. Syst. Nat.* II. 955. 21. *Fn. Sv.* 1696.

Habitat in Europa.

*aenea.* 2. A. aenea, griseo-sens - pubescens.

Apis aenea. *Linn. Syst. Nat.* II. 955. 20. *Fn. Sv.* 1695.

Apis tota viridi-cuprea. *Geoff. Ins.* 2. 415. 15.

Habitat in Europa.

*heluola.* 3. A. thorace ferrugineo, abdomine cinerascente.

Apis heluola rufa, villosa, oblonga, subtus albida.

*Linn. Syst. Nat.* II. 955. 16. *Fn. Sv.* 1693.

Habitat in Europa.

*bicolor.* 4. A. thorace villoso, ferrugineo, abdomine atro, immaculato.

Habitat in Daniae nemoribus.

Affinis A. succinctae, at abdomen immaculatum.

5. A. thorace nigro, postice villoso, ferrugineo, abdome atro: segmentorum marginibus niveis. *tricolor.*

Habitat in America.

Media. Antennae cylindricae, nigrae, primo articulo subtus flavo. Os flavum. Thorax antice glaber, niger, postice hirtus, ferrugineus. Abdomen atrum, segmentis omnibus margine niveis.

6. A. atra abdomine, segmentorum marginibus niveis. *nigrita.*

Habitat in America.

Statura praecedentis, at tota atra, solis segmentorum marginibus albis.

7. A. cinereo-pubescent, abdomine atro: fasciis quatuor albis. *fasciata.*

Habitat in America.

Thorax villis densis cinereis tectus. Abdomen glabrum, atrum, segmentorum marginibus albis. Pedes nigri, tibiis posticis villoso-cinereis.

8. A. subpubescens, fusca, abdomine fasciis quatuor coeruleis. *zonata.*

*Apis zonata. Linn. Syst. Nat. II. 955. 19. Mus. L. U. 415.*  
Habitat in Indiis.

9. A. nigra, ano ferrugineo.

Habitat in Sueciae nemoribus.

Media. Labium tomento cinereo. Tibiae posticae rufae.

10. A. nigra, abdomine flavo, basi nigro, lingua longissima. *gulosa.*

Habitat ad Cap. B. S. *Drury.*

Caput et thorax pilis brevibus, nigris, hispida. Lingua longitudine corporis. Pedes nigri, tibiis posticis compressis, dorso acutissimo.

11. A. abdomine fusco: cingulis quinque albidis, ano bidentato. *bidentata.*

Habitat in America, nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Nidum in muris struens e foliis convolutis arborum. Labium superius hirtum, flavum, emarginatum. Antennae nigrae, longitudine thoracis. Thorax niger, cinereo-pubescent. Alae albae. Abdomen nigrum, cingulis albis quinque anque bidentato. Pedes fuscis.

*virescens.* 12. A. capite thoraceque viridi-aeneis, abdomine nigro.  
Habitat in America. *Mus. Banks.*

Statura praecedentis. Lingua brevis, inflexa, fusca.  
Antennae fuscae. Caput et thorax viridi-aenea,  
nitida. Abdomen ovatum, nigrum, nitidum, subitus  
fusco-pubescentes. Alae fuscae. Pedes fusci.

*cingulata.* 13. A. thorace rufo, abdomine atro: fasciis quatuor  
coerulecentibus.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*  
Similis A. bidentatae, at thorax tibiaeque rufae.  
Caput nigrum, labio lineaque frontali flavis.  
Abdomen atrum, segmentorum marginibus coerule-  
centibus.

*succincta.* 14. A. thorace hirsuto, fulvo, abdomine nigro: cingulis  
quatuor albis.

*Apis succincta.* Linn. Syst. Nat. II. 955. 18. Fn. Sv. 1694.  
Schaeff. Icon. tab. 32. fig. 5.

*Apis nigra,* thorace hirsuto, fulvo, abdomine glabro,  
incisuris albis. Geoff. Inf. 2. 411. 7.

Habitat in Europae floribus.

119. A P I S. *Os* lingua inflexa, quinquefida.

*Palpi* brevissimi.

*Antennae* filiformes.

*latipes.* 1. A. hirsuta, atra, tarsis anticis explanatis, flavis, in-  
tus ciliatis.

*Apis latipes.* Drury Inf. 2. tab. 48. fig. 2.

Habitat in China.

Statura omnino A. violaceae, at paulo major. Caput  
nigrum, antennarum primo articulo elongato,  
clavato, compresso. Thorax ater, nitens, antice  
holosericeus. Abdomen atrum, glabrum, mar-  
ginibus hirsutis. Alae violaceae, nitentes. Pedes  
antici femoribus glabris, atris, tibiis atris, pun-  
ctis duobus ferrugineis. Tarsi magni, expla-  
nati, cornei, flavi, latere interiori pilis elongatis  
albis, basi nigris, ciliati. Pedes postici nigri.

2. A. hirsuta, atra, alis violaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. *violacea*.  
959. 38. *Mus. Lud. Uhr.* 415. *Geoff. Inf.* 2. 416. 19.

*Bombylius lusitanicus e nigro coerulescens. Petiv.*

*Gazoph.* tab. 12. fig. 5.

*Reaum. Inf.* 6. tab. 5. fig. 1. 2.

*Scop. carn.* 812.

Habitat in truncis exsiccatis Europae australis, quos perforat, longitudinaliter excavat, ibique plures nidos a fundo incipiens polline herbarum melle mixto replet et unicuique ovum concredit. Nidi distinguntur 4. 5. annulis ligneis. Nymphae caput deorsum spectat, ut in fundo exitum quaerat. Apis perfecta. *Linn.*

3. A. hirsuta, atra, fronte abdominisque lateribus cinereis. *nigrita*.

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Banks.*

Magna, statura praecedentis. Caput atrum, fronte hirta, cinerea. Thorax niger, pectore cinereo. Abdomen nigrum, lateribus cinereis. Alae nigrae.

4. A. hirsuta, atra, abdomine supra flavescente. *Linn. carolina*.

*Syst. Nat.* II. 959. 40.

Habitat in America.

5. A. hirsuta, nigra, thorace cingulo flavo, ano albo. *terrestris*.

*Linn. Syst. Nat.* II. 960. 41. *Fn. Sv.* 2709.

*Bombylius major niger*, linea duplice transversim ducta, lutea, alia supra scapulas, alia per medium abdominis, imo abdomine albo. *Raj. Inf.* 247. 5.

*Goed. Inf.* 2. tab. 46.

*Bradl. nat.* tab. 26. fig. 1. D.

*Reaum. Inf.* 6. tab. 3. fig. 1.

*Frisch. Inf.* 9. tab. 13. fig. 1.

*Sultz. Inf.* tab. 19. fig. 124.

*Schaeff. Elem.* tab. 20. fig. 6.

— — *Icon.* tab. 69. fig. 7.

Habitat in Europæ terra, profunde nidificans, strenue mellificans.

6. A. hirsuta, nigra, abdominis fascia flava, ano albo. *cryptarum*.

Habitat Hafniae. *Mohr.*

Statura et magnitudo A. terrestris. Caput et thorax nigra, immaculata. Abdomen fascia flava anque albo. Pedes nigri, apice fusi.

7. A.

- rudevata.* 7. A. hirsuta, atra, thorace flavo: fascia atra, abdomine antice flavo, ano albo.  
 Habitat Hafniae. *Mohr.* In Madera. *Mus. Banks.*  
 Statura omnino praecedentis. Caput atrum. Thorax flavus, fascia media atra. Abdomen antice flavum, in medio nigrum, ano albo. Pedes nigri.
- nemorum.* 8. A. hirsuta, atra, thorace fascia interrupta, flava, ano pallido.  
 Habitat Hafniae. *Mohr.*  
 Statura A. terrestris, atra. Thorax fascia antica, in medio interrupta, flava. Abdomen nigrum, ano pallidiore.
- surina-  
mensis.* 9. A. hirsuta, nigra, abdomine excepto, primo segmento flavo. *Linn. Syst. Nat.* II. 961. 52.  
*Drury Ins.* I. tab. 43. fig. 4.  
 Habitat Surinami.
- virginica.* 10. A. hirsuta, pallida, abdomine excepto, primo segmen-  
to atro. *Linn. Mant.* 1540.  
*Drury Ins.* I. tab. 43. fig. 1.  
 Habitat in Virginia.
- antiguensis.* 11. A. hirsuta, atra, thorace abdomineque antice flavis.  
 Habitat in Antigua. *Drury.*  
 Differt manifeste ab A. Americanorum. Statura A. violaceae. Caput atrum, iminaculatum. Thorax hirtus, niger. Abdomen atrum, antice flavum. Alae fuscae. Pedes nigri.
- america-  
norum.* 12. A. hirsuta, nigra, thorace antice flavo, abdomine  
flavo, ano nigro.  
 Habitat in America. *Lewin.*  
 Summa affinitas A. terrestris. Caput nigrum. Thorax antice flatus, postice niger. Abdomen flavum, ano nigro. Alae et pedes nigrae.
- hortorum.* 13. A. hirsuta, nigra, thorace abdomineque antice flavo,  
ano albo. *Linn. Syst. Nat.* II. 960. 42. *Fn. Sv.* 1710.  
 Habitat in Europae hortis.  
 Duplo minor praecedenti.

14. A. hirsuta, atra, ano fulvo. *Linn. Syst. Nat.* II. 960. *lapidaria.*  
*Fn. Sv.* 1701. *Geoff. Inf.* 2. 417.  
 Bombylius maximus, totus niger, exceptis duobus extremitatibus abdominis annulis rufis. *Raj. Inf.* 246. 1.  
*Scop. carn.* 813.  
*Frisch. Inf.* 9. 25. 2.  
*Reaum. Inf.* 6. tab. 1. fig. 1 — 4.  
*Schaeff. Icon.* tab. 69. fig. 9.  
 Habitat in lapidum acervis, mellificans.  
 Minor varietas, vix distincta.
15. A. hirsuta, pallida, thoracis fascia abdomineque *sylvarum.*  
 postice nigris, ano rufo.  
 Apis sylvarum hirsuta, pallida, thoracis fascia nigra,  
 ano rubro. *Linn. Syst. Nat.* II. 960. 45. *Fn. Sv.* 1713.  
*Scop. carn.* 822.  
 Habitat in Europae nemoribus.  
 Caput et antennae nigrae, fronte flava. Thorax fascia nigra inter alas. Abdomen basi flavum, postice nigrum, ano rufo. Pedes nigri.
16. A. hirsuta, flava, abdomine virescente. *bryorum.*  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
 Magna, hirta, flava. Abdomen virescens. Pedes flavi,  
 femoribus nigris.
17. A. hirsuta, fulva, abdomine flavo. *Linn. Syst. Nat.* II. *muscorum.*  
 960. 46. *Fn. Sv.* 1714.  
 Bombylius medius, dorso longis pilis rufis vestito,  
 mellificus, vulgatissimus, in gramine nidum constructus. *Raj. Inf.* 246. 3.  
*Frisch. Inf.* 9. 26. 8.  
*Schaeff. Icon.* tab. 69. fig. 8.  
*Reaum. Inf.* 6. tab. 2. fig. 3. 4.  
 Habitat sub inuscis Europae mellificans.
18. A. hirsuta, fulva, abdominis fascia nigra, ano albo. *hypnorum.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 960. 47. *Fn. Sv.* 1715.  
 Apis nigra, thoracis basi et apice abdominalisque basi flavis, ano albo. *Geoff. Inf.* 2. 418. ?  
*Scop. carn.* 820.  
*Reaum. Inf.* 6. tab. 4. fig. 1.  
 Habitat sub Europae inuscis.

- nemorum.* 19. A. hirsuta, flava, fascia thoracis nigra.  
Habitat in Daniae nemoribus.  
Color totus flavus, excepta fascia nigra inter alas.  
Pedes nigri.
- lucorum.* 20. A. hirsuta, flava, ano albido. *Linn. Syst. Nat.* II. 961. 48. *Fn. Sv.* 1716.  
Habitat in Europa.
- acervo-* 21. A. hirsuta, atra, tibiis posticis ferrugineis.  
*rum.* Apis acervorum hirsuta, atra. *Linn. Syst. Nat.* II. 961.  
50. *Fn. Sv.* 1727.  
*Schaeff. Icon. tab.* 78. fig. 5.  
Habitat sub terra.  
Similis A. lapidariae, at minor totaque atra, exceptis  
solis tibiis posticis lana densa ferruginea tectis.
- subterra-* 22. A. hirsuta, atra, ano fusco. *Linn. Syst. Nat.* II. 961.  
*nea.* 51. *Fn. Sv.* 1718.  
*Geoff. Inf.* 2. 416. 20.  
Bombylius minor praecedenti, concolor, abdomine  
imo pallidius nitente seu fulvo. *Raj. Inf.* 246. 2.  
Habitat sub terra.
- brasiliiano-* 23. A. hirsuta, heluola, femoribus basi nigris. *Linn.*  
*rum.* *Syst. Nat.* II. 961. 49.  
Habitat in America.  
Antennae supra fuscae, subtus testaceae. Abdomen  
supra fasciis obscurioribus, subtus flavis, interruptis.
- aestuans.* 24. A. hirsuta, coerulescente - atra, thorace supra flavo.  
Apis aestuans hirsuta, nigra, thorace flavo. *Linn. Syst.*  
*Nat.* II. 961. 53. *Mus. Lud. Ulv.* 416.  
Habitat in America, nova Hollandia, Cap. B. S.  
Lingua brevis, nigra. Antennae filiformes, nigrae.  
Thorax subtus niger, supra hirsutus flava tectus.  
Abdomen atrum, violaceo - nitens. Alae fuscae.
- tropica.* 25. A. hirsuta, nigra, abdomine postice flavo. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 961. 54. *Mus. Lud. Ulv.* 416.  
Habitat in regionibus australioribus.
- senilis.* 26. A. hirsuta, cinerea.  
Habitat in Daniae nemoribus.  
Minor, tota pilis cinereis tecta.

27. A. grisea, pedibus anticis dilatato - ciliatis, tibiis posticis clavatis, ano emarginato. *Linn. Syst. Nat.* II. 957. 27. *Fn. Sv.* 1702.  
Habitat in Europa.
28. A. grisea, pedibus intermediis fasciculato - pilosis. *pilipes.*  
Habitat in Anglia. *Lewin.*  
Corpus totum hirsutie cinerea testum. Pedes nigri, postici quatuor, in primis intermedii, pilis longioribus fasciculatis hirti.
29. A. pubescens, thorace ferrugineo, abdomine fusco, *cunicularia.* pedibus undique villosis. *Linn. Syst. Nat.* II. 957. 23. *vila.*  
*Fn. Sv.* 1698.  
Habitat in terra fabulosa Europae.
30. A. pubescens, thorace subgriseo, abdomine fusco, *mellifica.* tibiis posticis ciliatis, intus transverse striatis.  
*Linn. Syst. Nat.* II. 955. 22. *Fn. Sv.* 1697.  
Apis gregaria. *Geoff. Inf.* 2. 407. I.  
Apis domestica s. vulgaris. *Raj. Inf.* 240.  
*Swamm. Bibl. Nat.* tab. 17. fig. 1. operaria.  
— — — — — fig. 3. foemina.  
— — — — — fig. 4. mas.  
*Reaum. Inf.* 5. tab. 21, 23. tab. 22. fig. 1. operaria.  
— — — — — fig. 2. mas.  
— — — — — fig. 3. foemina.  
*Sultz. Inf.* tab. 19. fig. 123.  
Habitat in Europae arboribus cavis, frequentius culta.
31. A. atra, thorace rufo, alis apice fuscis. *thoracica.*  
Habitat in Daniae nemoribus.  
Magnitudo A. cuniculariae.
32. A. thorace hirsuto, albidente: fascia nigra, abdomine *flavifrons.* coerulecente, ano cinereo.  
Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*  
Antennae nigrae, articulo primo subtus flavo. Caput nigrum, fronte flava, linguaque ferruginea. Thorax hirsutissimus, albidus, fascia lata inter alas nigra. Abdomen coerulescens, primo segmento striga ferruginea, ultimo cinereo. Alae obscurae. Pedes nigri, tibiis anticis linea, reliquis puncto baseos flavis.

- eineraria.* 33. A. nigra, thorace hirsuto, albicante: fascia nigra, abdomine coerulecente. *Linn. Syst. Nat.* II. 953. 5. *Fn. Sv.* 1688.  
*Schaeff. Icon.* tab. 22. fig. 5. 6.  
 Habitat in Europa.  
 Alae fuscae. Pedes nigri.
- analis.* 34. A. thorace villoso, cinereo, abdomine coerulecente, ano nigro.  
 Habitat in America. *Drury.*  
 A. mellificae duplo fere major. *Antennae nigrae.*  
 Caput nigrum, fronte flava. Thorax tomento denso cinereo tectus. Abdomen cyaneum, primo segmento tomentoso, cinereo, et ano villoso, nigro. Pedes coerulecentes.
- manicata.* 35. A. cinerea, abdomine nigro: maculis lateralibus flavis, ano quinquedentato. *Linn. Syst. Nat.* II. 958. 28. *Fn. Sv.* 1701.  
 Apis abdomine fasciis flavis interruptis, apice spina quinduplici recurva armato. *Geoff. Ins.* 2. 408. 3.  
*Swamm. Bibl.* tab. 26. fig. 4.  
*Schaeff. Icon.* tab. 32. fig. 11. 12.  
 Habitat in Europae arboribus cavis.
- florentina.* 36. A. abdomine maeulis flavis lateralibus, subtus hirsutissimo; segmentis tribus ultimis utrinque dentatis.  
 Habitat in Europa australi. *Mus. Tottianum.*  
 Summa affinitas A. manicatae. Labium flavum. Thorax hirtus, cinereus. Abdomen supra glabrum, atrum, maculis lateralibus flavis. Segmenta tria ultima utrinque dente valido, acuto et anus praeterea tridentatus. Pedes flavi, femoribus nigris.
- fasciata.* 37. A. supra lutea, fascia baseos alarum atra. *Linn. Syst. Nat.* II. 958. 30.  
 Habitat in Africa.  
 Abdominis prima duo segmenta atra, lateribus albis.
- bicornis.* 38. A. fronte bicorni, capite nigro, abdomine hirsuto, rufo. *Linn. Syst. Nat.* II. 954. 10. *Fn. Sv.* 1691.  
 Habitat in Europa.

39. A. fusca, abdomine rufescente, fronte alba. *Linn. rufa.*  
*Syst. Nat. II. 954. 9. Fn. Sv. 1690.*

Apis sylvestris parva, abdomine breviore, tota supina parte lanugine rufa vestita, thorace lanugine albicans, *Raj. Ins. 242. 7.*

Habitat in Europa, frequens in floribus.

Antennae nigrae, corpore breviores.

40. A. thorace ferrugineo, abdomine nigro, albo fasciato, ventre lana nivea. *lanata.*

Habitat in America.

Statura A. centuncularis, at major. Caput et thorax hirsutie ferruginea. Abdominis primum et secundum segmentum itidem ferruginea, reliqua glabra, atra, marginibus albis; subtus lana densa nivea testum.

41. A. nigra, abdomine toto ferrugineo. *myristacea.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Caput, thorax et pedes villosa, nigra, immaculata. Abdomen ferrugineum, primo segmento basi parum nigricante. Alae fuscae.

42. A. nigra, ventre lana fulva. *Linn. Syst. Nat. II. 953. 4. Fn. Sv. 1687.* *centuncularis.*

Apis nigra, abdomine supra lineis albis, subtus lana fulva. *Geoff. Ins. 2. 410. 5.*

Apis parva, nigra, abdomine supino, nigro, glabro, splendente, prono lanugine rufa densa vestito. *Raj. Ins. 242. 6.*

*Scop. carn. 799.*

*Reaum. Ins. 6. tab. 10. fig. 3. 4.*

Habitat in Europa intra terram, plures nidos cylindricos ex foliis rosae formans tanquam centunculos.

43. A. villosa, cinerea, abdomine atro: segmentis utrinque puncto albo. *punctata.*

Habitat in Anglia.

Antennae nigrae, breves. Caput et thorax tomento cinerascente. Abdomen atrum, laeve, nitidum, acutum; primo secundoque segmento utrinque fasciculo pilorum albicantium, tertio, quarto quintoque utrinque puncto albo, ultimo immaculato. Pedes nigri, tibiis basi cinereo annulatis,

*bombylans*. 44. A. cyanea, nitida, abdomine aeneo.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Sequenti valde affinis. Antennae nigrae. Caput et thorax cyanea, nitida, tomento paucō cinereo. Abdomen aeneum, ano pilis paucis albis. Alae et pedes cyaneae.

*muscaria*. 45. A. coerulescens, ano albido.

Statura muscae. Antennae nigrae, apice subtus fuscae.

Caput nigrum, fronte flava. Thorax coerulescens, tomento cinereo hirtus. Abdomen coeruleum, glabrum, ano hirto, albido. Alae aqueae.

*haemorrhoidalis*. 46. A. atra, abdomine aeneo, ano rufo.

Habitat in America.

Antennae nigrae, primo segmento subtus flavo. Labium flavum. Frons nigra, punctis flavis. Thorax ater. Abdomen obscure aeneum, ano sanguineo.

*dentata*. 47. A. viridis, nitida, alis nigris, femoribus posticis dentatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 954. 14. *Mus. L. U.* 413.

Habitat in America.

Aenea, nitida, oculis brunneis. Lingua longissima.

*vericolor*. 48. A. thorace hirto, cinerascente, abdomine cyaneo, ano rufescente.

Habitat in America. *v. Rohr.*

Major A. quadridentata. Antennae breves, nigrae.

Caput nigrum, labio flavescente. Thorax lana cinerea densa tectus. Abdomen glabrum, cyaneum, nitidum, ano ferrugineo. Tibiae posticiae lanatae.

*quadridentata*. 49. A. fusca, abdomine cingulis quinis albidis, ano quadridentato: intermediis bifidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 958. 29. *Fn. Sv.* 1703.

*Swamm. Bibl.* tab. 26. fig. 4.

Habitat in Europa.

*lanipes*. 50. A. thorace cinereo, abdomine rufo, tibiis posticis hirsutissimis.

Habitat in America. *v. Rohr.*

Parva. Antennae breves, nigrae. Labium flavum, macula cyathiformi, nigra.

51. A. fusca, abdomine glabro, ferrugineo, utrinque *coccinens*, nigro maculato.  
 Habitat in Lipsiae hortis.  
 Antennae breves, nigrae. Oculi vivacissimi, albi, nigro punctati, qui vero colores cum vita pereunt. Abdomen subrotundum, rufum, utrinque punctis tribus s. quatuor nigris.
52. A. scutello tridentato, abdomine conico, acutissimo: *tridentata*.  
 segmentorum marginibus albis.  
 Habitat in America. v. Robr.  
 Nimis affinis A. conicae videtur, at scutellum dentibus tribus validis acutis armatum.
53. A. fusca, abdomine conico, acutissimo: segmentorum marginibus albis, scutello inermi. *Linn. Syst. Nat. II. 958. 32. Fn. Sv. 1705.*  
*Vespa sylvestris*, caudacuta, abdomine nigro, annulis flavis distincto. *Raj. Inf. 252. 4.*  
*Reaum. Inf. 6. tab. II. fig. 2. 3. 4.*  
 Habitat in Europa, in nova Hollandia, alis cyaneis.  
*Mus. Banks.*
54. A. cinerea, abdomine cylindrico, nigro: fasciis sex *sexcincta*.  
 albis, pedibus flavis.  
 Habitat in America.  
 Major A. florisomni. Caput et thorax cinerea. Abdomen cylindricum, nigrum, marginibus segmentorum albis. Pedes omnes flavi.
55. A. nigra, abdomine cylindrico, incurvo, ano bidentato. *florisomnis.*  
*Apis florisomnis nigra*, abdomine subcylindrico, incurvo, ano bidentato, tibiis posticis apice spinosis. *Linn. Syst. Nat. II. 954. 13. Fn. Sv. 1704.*  
*Scop. carn. 796.*  
 Habitat in Europa, pernoctans in floribus.
56. A. nigra, fronte annulisque pedum albis. *Linn. Syst. annulata.*  
*Nat. II. 958. 33. Fn. Sv. 1706.*  
 Habitat in Europae floribus.  
 Parva, moschum spirat.

- tumulo-* 57. A. antennis filiformibus, longitudine corporis nigri, maxillis flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 953. 2. *Fn. Sv.* 1685. *It. Gotl.* 336.  
Habitat in Europa.
- longicor-* 58. A. antennis longitudine corporis, hirsuti fulvique. *Linn. Syst. Nat.* II. 953. 1. *Fn. Sv.* 1684.  
Apis hirsutie flavescens, fronte flava, antennis articulatim compressis, corpori aequantibus. *Geoff. Ins.* 2. 413. 10.  
Apis sylvestris domesticae similis, antennis nigris, longissimis. *Raj. Ins.* 243. 1.  
*Scop. carn.* 794.  
*Swamm. Bibl. tab.* 26. fig. 6.  
Habitat in Europa.  
Lingua septemfida.
- glauea.* 59. A. antennis ferrugineis, longitudine corporis, hirsuti glauque.  
Habitat in Oriente. *Forstkühl.*  
Antennae cylindricae, obscure ferrugineae. Caput et thorax villo glauco testa. Abdomen glaucum, primo et secundo segmento fascia nigra.
- linguaria.* 60. A. antennis nigris, longitudine corporis, thorace cinereo, abdome nigro.  
Habitat in Saxoniae floribus.  
Statura A. longicornis. Caput nigrum, labio flavo.  
Lingua septemfida.
120. NOMADA. *Os* lingua inflexa, trifida.  
• *Palpi* postici linguaeformes, articulo secundo longissimo.  
*Antennae* filiformes.
- biflorio.* 1. N. thorace, abdome pedibusque albo nigroque variis, scutello emarginato.  
Habitat in India orientali. *Koenig.* In nova Hollanda. *Mus. Bankianum.*  
Statura sequentis, at paulo major. Antennae nigrae. Caput nigrum, fronte villosa, alba. Thorax gibbus, ater,

ater, dorso punctis undecim albis et duobus utrinque sub alis. Scutellum magnum, apice emarginatum, puncto albo. Abdomen atrum, singulo segmento utrinque puncto magno albo. Pedes atri, maculis albis.

2. N. thorace abdomineque albo variegatis, pedibus *variegata*. ferrugineis.

*Apis variegata.* Linn. Syst. Nat. II. 957. 24. Fn. Sv. 1699.

Habitat in Europa. Pernoctat in Geranii Phaei rostris mordicus apprehensis.

Variat scutello albo et ferrugineo.

3. N. antennis, pedibus punctisque quatuor scutelli ferrugineis, abdomine luteo variegato. *ruficornis.*

*Apis ruficornis* antennis, pedibus duobus punctisque thoracis ferrugineis, abdomine luteo variegato.

Linn. Syst. Nat. II. 958. 34. Fn. Sv. 1707.

Habitat in Europa.

Thorax ferrugineo lineatus.

4. N. nigra, abdomine glabro, ferrugineo: maculis *Fabriciana*. duabus flavis.

*Apis Fabriciana.* Linn. Syst. Nat. II. 955. 17.

Habitat Upsaliae.

Praecedenti nimis affinis.

5. N. nigra, abdomine rufo, apice nigro. *gibba.*

Habitat in Anglia. Mus. Banks.

Statura praecedentium.

6. N. nigra, abdominalis secundo segmento ferrugineo: *Hattorfiana*. maculis tribus nigris.

Habitat in Germania. v. *Hattorf*.

Caput et thorax immaculata, atra, nitida. Abdominis segmentum primum atrum, nitidum, margine ferrugineo, secundum ferrugineum, maculis tribus nigris, intermedia majori quadrata; segmentum tertium quartumque nigra, marginibus albis; quintum nigrum, ano rufescente. Pedes nigri, postici lanugine alba tecti.

*cingulata.* 7. N. cinereo - villosa, abdomine glabro, nigro : segmento secundo tertioque ferrugineis.

Habitat in Sueciae nemoribus.

Statura praecedentium. Alae albae.

121. TERMES. *Labium corneum, quadrifidum, laciniis linearibus acutis.*

*Antennae moniliformes.*

*fatale.* I. Termes.

Termes fatale luteum, alterius maxillis longitudine antennarum. *Linn. Syst. Nat. II. 1015. 1.*

Habitat in Indiae utriusque umbrosis, cuius calamitas summa, fornices cylindricos progrediendo inaedificans, nidos e fabulo sinibus daedaleis in tophum struens. Destruit utensilia, cibaria, vestimenta, relieta sola superficie integra; calce viva coercendum. *Mus. Bankianum.*

Mas formica rufa duplo major. Caput ferrugineum, ore flavescente maxillisque brevibus. Antennae longitudine thoracis. Punctum fulvum in medio frontis. Thorax marginatus et abdomen obscure ferruginea. Pectus pedesque pallidiora. Alae corpore quadruplo longiores, obscurae, margine exteriori nigro.

Foemina aptera, capite magno, globoso, ferrugineo, maxillis brevibus, nigris. Thorax segmentis tribus distinctis, marginatis, segmento primo antice emarginato. Abdomen ovatum, album, strigis ferrugineis. Ovis grava abdome intumescit ad magnitudinem digitii, tumidum, vesiculosum, album, maculis transversis ferrugineis. Ova parva per lineas parallelas disposita, innumera.

Neutra aptera, capite ovato, ferrugineo, maxillisque exsertis longitudine antennarum, atris, edentulis, acutissimis, subrecurvis.

**122. FORMICA.** *Palpi* inaequales, articulatis cylindricis.

*Labium* submembranaceum, cylindricum, truncatum, apice palpigerum.

*Antennæ* filiformes.

1. *F. nigra*, abdómine ovato, pedibus ferrugineis. *Linn.* *herculeana*.  
*Syst. Nat.* II. 962. 1. *Fn. Sv.* 1720.

*Formica magna*. *Hippomyrmex*. *Linn.* *It. Gotl.* 232.

*Formica maxima*. *Raj.* *Ins.* 69.  
*Scop. carn.* 832.

Habitat in Europæ, Americae truncis putrescentibus, vagabunda.

2. *F. hirta*, atra, pedibus rufis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

*Magna*. Caput magnum, ovatum, postice subdidymum, atrum, pilis ferrugineis hirtum. Antennæ apice fuscae. Thorax hirtus, niger, postice compressus. Abdomen ovatum, hirtum, nigrum. Squama ovata, obtusa. Pedes rufi.

3. *F. atra*, capite rufo, squama petiolari, didyma.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Caput magnum, oblongum, rufum. Antennæ rufæ.  
Thorax filiformis, tenuissimus, ater, immaculatus.  
Squama petiolaris, brevis, erecta, didyma. Abdomen oblongum, atrum. Pedes atri, plantis rufis.

4. *F. nigra*, thorace compresso pedibusque ferrugineis.

*Formica rufa* thorace compresso, toto ferrugineo, capite abdomineque nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 962. 3. *Fn. Sv.* 1721.

*Formica fusca*, thorace fulvo. *Geoff. Ins.* 2. 428.

*Formica media rubra*. *Raj. Ins.* 69.

*rufipes*.

*erythrocephala*.

*rufa*.

Habitat in Europæ, Americae acervis aceriosis, sylvaticis, pungens aculeo obsoleto.

*Formicarum respublica* consistit maribus foeminisque alatis, incurviis, gulae deditis spadonibusque

numerosis, indefessis. Hae corradunt quisquilias in acervum, sustentant mares foeminasque sub nuptiis et peractis puerperiis parentes expellunt, retentis liberis pro conservatione familiæ.

- pubescens.* 5. F. atra, abdomine pubescente.  
Habitat in Hungaria. *Mus. Tottianum.*  
Statura F. rufae. Totum corpus atrum, immaculatum.  
Abdomen pilis cinerascentibus pubescit.
- nigra.* 6. F. nigra, nitida, ano piceo.  
Formica nigra tota nigra, nitida, tibiis cinerascentibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 963. 5. *Fn. Sv.* 1723.  
Formica atra. *Geoff. Inf.* 2. 429.  
Formica minor e fusco nigricans. *Raj. Inf.* 69.  
*Scap. carn.* 834.  
Habitat in Europæ terra.
- obsoleta.* 7. F. supra nigra, subtus testaceo-rufa, abdomine subgloboso. *Linn. Syst. Nat.* II. 963. 6. *Fn. Sv.* 1724.  
Habitat in Europæ terra.
- 4 punctata.* 8. F. thorace compresso, ferrugineo, abdomine atro-punctis quatuor niveis.  
Formica 4 punctata rubra, abdomine nigro: punctis quatuor albis. *Linn. Mant.* I. 541.  
Habitat in Alsatia, capta d. XV. Maj.  
Caput globosum, atrum, antennis ferrugineis. Squama petiolaris, brevis, obtusa. Abdomen atrum, nitidum, primo secundoque segmento utrinque puncto albo. Pedes ferruginei, femoribus nigris.
- virescens.* 9. F. pallida, capite abdomineque virescentibus.  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
Angusta. Caput virescens, maxillis antennisque pallidis. Thorax tenuissimus, inermis, pallidus. Petiolus abdominis elongatus, pallidus, tuberculo parvo, elevato. Abdomen subrotundum, virescens. Pedes pallidi.
- sacchari-vora.* 10. F. nigra, pedibus, antennis maxillisque rufis. *Linn. Syst. Nat.* II. 963. 10.  
Formica minima saccharivora. *Brown. Jam.* 440.  
Habitat in America intra culmos sacchari nidificans, quos destruit.

11. *F. atra*, capite, antennis plantisque ferrugineis, *barbara*, petiolo binodi. *Linn. Syst. Nat.* II. 962. 2.  
Habitat in Africa.
12. *F. nigra*, thorace rufo, postice bidentato, petiolo binodi. *Habitat in Aegypto. Forstkähl.* *aegyptiacus.*  
Parva. Caput magnum, fuscum, antennis ferrugineis.  
Thorax compressus, fuscus, postice bidentatus.  
Abdomen fuscum. Pedes ferruginei, femoribus subclavatis.
13. *F. nigra*, capite maximo, rufo, petiolo binodi. *binodis.*  
Habitat in Aegypto. *Forstkähl.*  
Media. Caput abdomine majus, rufum, immaculatum. Thorax compressus, angustissimus, niger.  
Petiolus nodis duobus, antico majori. Abdomen parvum, subrotundum, nigrum. Pedes rufi, femoribus ferrugineis.
14. *F. nigra*, abdominis petiolo binodi, scutello bidentato. *caespitum.*  
*Formica caespitum* abdominis petiolo binodi: priore subtus thoraceque supra bidentato. *Linn. Syst. Nat.* II. 963. II. *Fn. Sv.* 1726.  
*Formica binodis.* *Linn. Amoen. Acad.* 6. 413. 94.  
*Scop. carn.* 837.  
*Aet. Berol.* vol. 5.  
*Hamb. Mag.* 5. p. 393.  
Habitat in Europae pratis siccioribus sub muscis. Mares foeminaeque examinant medio Augusti, meridie calido, more Phryganeorum in aere choreas agentes, turma volatili, depluentes per paria iuncta. *Linn.*
15. *F. rufa*, capite abdominisque fascia nigris, petiolo *tuberum.* binodi.  
Habitat in Suecia.  
Præcedente minor. Antennæ rufae, apice nigrae.  
Thorax ferrugineus, postice bidentatus.
16. *F. nigra*, thorace inermi, squama petiolaris, bispinosa. *australis.*  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
Corpus medium, totum nigrum, tomento cinereo, subnitente. Squama petiolaris, crassa, obtusa, spinis duabus incurvis, validis.

- biscutata*. 17. F. thorace bidentato, squama petiolari duplicata.  
 Habitat Cajennae. *Mallet*.  
 Caput piceum, postice utrinque acuminatum. Thorax elevatus, gibbus, postice bidentatus. Petiolus squamis duabus ovatis, brevibus. Abdomen globosum, piceum, linea dorsali nigra. Alae subferrugineae.
- clavata*. 18. F. nigra, thorace bidentato, abdominis petiolo subtus unidentato.  
 Habitat in India.  
 Corpus magnum, nigrum, oculis testaceis. Caput thorace latius, maxillis concavis, validis. Thorax gibbus, medio bidentatus. Petiolus nodo elevato, gibbo et sub hoc nodo dens acutus, validus. Abdomen ovatum, primo segmento globoso.
- Attelaboi-des*. 19. F. thorace bispinoso, nigra, pedibus ferrugineis, capite postice attenuato.  
 Habitat in Brasilia. *Mus. Banks*.  
 Magna. Caput scabrum, nigrum, immaculatum, postice attenuatum. Thorax tenuis, niger, postice ferrugineus, spinis duabus approximatis, validis, incurvis. Squama petiolaris ovata, crassa, obtusa. Abdomen fuscum, pubescens. Pedes ferruginei.
- Ammon*. 20. F. thorace bispinoso, squama petiolari, spinis duabus incurvis.  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks*.  
 Caput parvum, ovatum, inerme, nigrum. Thorax compressus, submarginatus, niger, dorso tomento aureo, nitente; postice spinis duabus, rectis validis. Squama petiolaris ovata, truncata, spinis duabus valde incurvis. Abdomen subrotundum, nigrum, tomento aureo. Pedes nigri.
- bihamata*. 21. F. thorace quadrispinoso, squama petiolari spinis duabus arcuatis.  
*Formica bihamata*. *Drury Inf. 2. tab. 38. fig. 7. 8.*  
 Habitat in insula St. Iohannis Indiae.  
 Caput parvum, subrotundum, inerme, antennis fere longitudine corporis. Thorax compressus, ferrugineus, antice utrinque spina porrecta, elongata, arcuata; in medio spinae duae recurvae, acutissimae; postice tubercula duo fere obsoleta.  
 Squa-

Squama petiolaris porrecta, basi cylindrica, ferruginea; ultra medium fissa in spinas duas arcuatas, nigras. Abdomen subglobosum, nigrum, basi ferrugineum. Pedes elongati, nigri, femoribus ferrugineis.

22. F. thorace quadrispinoso, capite didymo, magno, *cephalotes*. utrinque postice mucronato. *Linn. Syst. Nat.* II. 964. 15.

*Formica magna*. *Marcgr. bras.* 252.

*Merian. Sur.* tab. 18. fig. majores.

*Seb. Mus.* 4. tab. 99. fig. 6.

Habitat in America meridionali.

23. F. thorace sexspinoso, capite didymo, maximo. *6 dens.* *Linn. Syst. Nat.* II. 964. 14.

Habitat in America meridionali.

24. F. thorace quadrispinoso, capite depresso, marginato, utrinque bispinoso. *Linn. Syst. Nat.* II. 965. 16.

*Tapiiai*. *Marcgr. bras.* 252.

*Seb. Mus.* 4. tab. 99. fig. 7.

Habitat in America meridionali.

25. F. rufa, abdomine apice nigro, primo segmento *gulosa*. contracto, maxillis porrectis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Magna. Caput ovatum, rufum, maxillis porrectis, longitudine capitidis, dentatis, pallidis. Thorax inermis, medio compressus, rufus. Petiolus abdominis elongatus, tuberculo magno, subrotundo. Abdomen rufum, nitidum, apice atrum; primum segmentum breve, contractum, campaniforme. Pedes rufi.

26. F. squama petiolaris conica, acutissima, capite sub-didymo, maxillis porrectis. *haemato-* *Linn. Syst. Nat.* II. da. 965. 17.

Habitat in America meridionali.

Oblonga. Maxillae porrectae, edentulae, obscure rufae. Caput rufescens, oculis orbiculatis, atris. Thorax inermis, niger. Alae hyalinæ.

*maxillofa.* 27. F. thorace sexdentato, capite flavescente: maxillis longitudine capitis.

Habitat in India. *Mus. Hagense.*

Caput maximum, flavescens, oculis nigris maxillisque porrectis parallelis, longitudine capitis. Thorax spinis sex, anticis duabus validis, intermediis tenuioribus, recurvis, posticis brevissimis. Abdomen subrotundum, fuscum.

123. MVTILLA. *Palpi inaequales, articulis obconicis.*

*Labium porrectum, cornuum, obconicum, gibbum, apice palpigerum.*

*Antennae filiformes.*

*occidentalis.* 1. M. coccinea, abdomine cingulo nigro. *Linn. Syst. Nat. II. 966. 1.*

*Petiv. Mus. 404.*

— *Gazoph. tab. 13. fig. 10.*

— *Filic. 404. tab. 11. fig. 4.*

*Catesb. Carol. 3. p. 15. tab. 15.*

*Sultz. Ins. tab. 19. fig. 9.*

Habitat in America septentrionali.

Aculeus reconditus, punctarius.

*antiquensis.* 2. M. coccinea, abdominis apice nigro: strigis albis.

Habitat in insula Antigua. *Drury.*

Praecedenti dimidio minor. Caput coccineum, oculis nigris. Thorax coccineus, immaculatus. Abdomen ovatum, coccineum, macula parva baseos nigra. Apex niger, strigis tribus albis subobsoletis. Pedes nigri.

*americanus.* 3. M. atra, abdomine maculis quatuor flavescientibus lineisque tribus albis. *Linn. Syst. Nat. II. 966. 2.*

Habitat in America australi.

4. M. nigra, abdomine linea dorsali punctorum albiorum. *formicaria.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Magna. Caput cinerascens. Thorax scaber, hirtus, niger, immaculatus. Abdomen nigrum, linea dorsali e punctis albis. Latera abdominis albitantia.

5. M. atra, abdomine punctis duobus baseos, striga interrupta lineolaque postica flavis. *exulans.*

Habitat in America. *Drury.*

Statura praecedentis. Caput et thorax atra, immaculata. Punctum utrinque flavum ad basin abdominis, striga interrupta in medio et postice linea dorsalis fere obsoleta e puncto parvo in singulo segmento.

6. M. coerulescens, abdomine macula magna aurea. *aurata.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Statura praecedentium, coerulescens, hirta. Antennae fuscae. Abdomen coerulescens, primo segmento maximo, macula magna dorsali, aurea, nitente. Reliqua segmenta basi atra. Alae in nostris nullae.

7. M. nigra, thorace rufo, abdominalis segmentis margine albis. *europaea.*

Mutilla europaea nigra, abdomine fasciis duabus albis, thorace antice rufo. *Linn. Syst. Nat. 11. 966. 4. Fn. Sv. 1727?*

Apis aptera. *Uddm. Diff. 98. tab. 17?*

Habitat in Oriente. *Forstkähl.*

Caput nigrum. Thorax rufus antice parum nigricat. Abdomen atrum, basi segmentorumque marginibus albo-aureis.

8. M. nigra, antennis rufis, ano albido. *ruficornis.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Corpus medium, nigrum, abdomine apice pilis albis tecto. Antennae rufae. Alae atrae.

*atrata.* 9. M. nigra, thorace supra rufo, abdomine coeruleo: fasciis duabus albis.

Mutilla atrata atra, abdomine fascia alba, thorace immaculato. *Linn. Syst. Nat.* II. 966. 5.

Habitat in Africa.

Alae fuscescentes.

*maura.* 10. M. nigra, abdomine maculis quatuor albis, thorace rufo. *Linn. Syst. Nat.* II. 967. 6.

Habitat in Europa.

*versicolor.* 11. M. abdomine basi apiceque nigro, medio rufo: fascia alba; puncto nigro.


Habitat in America. *Drury.*

Caput cum antennis rufum. Thorax rufus, immaculatus. Abdomen basi nigrum, in medio rufum, fascia alba, puncto nigro. Apex iterum niger. Pedes fuscii.

*glabrata.* 12. M. glabra, nigra, ore thorace abdomineque subtus rufis.

Habitat in Oriente. *Forskahl.*

Praecedentibus minor. Caput nigrum, ore, antennarum primo articulo rufis. Thorax subcompressus, rufus. Abdomen atrum, segmentorum marginibus albicantibus, subtus rufescens.



## IV. AGONATA.

*Os palpis quatuor, aut sex.**Maxilla inferior nulla.*124. SCORPIO. *Palpi anteriores cheliferi.*  
*Labium bifidum.*

- 1.
- S. pectinibus 6 dentatis, manibus laevibus.*

Habitat in insulis Oceani pacifici. *Mus. Banks.*Australia-  
stiae.

Parvus, depresso, supra fuscus, caudae ultimo articulo pallido. Subitus et pedes pallidiores.

- 2.
- S. pectinibus 8 dentatis, manibus subcordatis, punctatis.*
- maurus.*
- 
- Linn. Syst. Nat. II. 1037. 1.*

Habitat in Africa.

- 3.
- S. pectinibus 13 dentatis, manibus subcordatis, pilosis.*
- afer.*

*Linn. Syst. Nat. II. 1038. 3. Mus. Lud. Ulr. 429.**Swamm. Bibl. nat. tab. 3. fig. 3.**— — quart. tab. 6.**Seb. Mus. I. tab. 70. fig. 4.**Petiv. Gazoph. tab. 13. fig. 2.**Roeß. Inf. 3. tab. 65.*

Habitat in India.

- 4.
- S. pectinibus 14 dentatis, manibus subciliatis: digitis americanus.*
- 
- filiformibus.*
- Linn. Syst. Nat. II. 1038. 4.*

*Roeß. Inf. 3. 382. tab. 66. fig. 5.*

Habitat in America.

- 5.
- S. pectinibus 18 dentatis, manibus angulatis.*
- Linn. europaeus.*

*Syst. Nat. II. 1038. 5. Mus. Lud. Ulr. 429.**Monff. Inf. 204.**Aladr. Inf. 577.**Raj. Inf. 9.**Roeß. Inf. 3. tab. 66. fig. 1, 2.*

Schaeff.

*Schaeff. Elem. tab. 113.*

*Sulz. Inf. tab. 23. fig. 150.*

Habitat in Europa australi.

*australis.* 6. S. pectinibus 32 dentatis, manibus laevibus. *Linn. Syst. Nat. II. 1038. 6.*

Habitat in Africa.

*cancroides.* 7. S. abdomine ecaudato.

*Phalangium cancroides* abdōmine obovato, depresso, chelis laevibus: digitis pilosis. *Linn. Syst. Nat. II. 1028. 4. Fn. Sv. 1968.*

*Chelifer* abdomine lineis transversis. *Geoff. Inf. 2. 618. 1. Seb. Mus. 1. tab. 70. fig. 11.*

*Frisch. Inf. 8. tab. 1.*

*Roel. Inf. 3. tab. 64.*

*Schaeff. Elem. tab. 38.*

*Clerk. aran. tab. 6. fig. 10. 1. 2.*

Habitat in umbrosis suffocatis. *Retrogradus* vicitat T. *Hemerobio pulsatorio*, *Acaris*.

## 125. CANCER. *Palpi* quatuor os obtengentes.

*Antennae* quatuor filiformes: posticis articulo ultimo bifido.

\* *Thorace laevi lateribus integerrimo.*

*raninus.* 1. C. thorace laevi, integerrimo, oblongo, obovato, antice truncato, dentato. *Linn. Syst. Nat. II. 1039. 2. Mus. Lud. Ulr. 430.*

*Rumph. Mus. tab. 7. fig. T. V.*

Habitat in mari Indico.

*mutus.* 2. C. thorace laevi, integerrimo: margine antice transverso, brunneo. *Linn. Syst. Nat. II. 1039. 3.*

Habitat in mari mediterraneo.

Chelae laeves.

*cordatus.* 3. C. thorace laevi, undato, integerrimo, chelis subtus cordatis. *Linn. Syst. Nat. II. 1039. 4. Am. acad. 6. 414. 97.*

Habitat Surinami.

4. C. thorace laevi, integro, pedum primo articulo *ruricola*.  
spinoso, secundo tertioque fasciculato-pilosus.

*Cancer ruricola* brachyurus, thorace laevi, integerrimo, antice retuso, pedum articulis ultimis penultimisque undique spinosis. *Linn. Syst. Nat.* II. 2040. II.

*Sloan. Iam.* I. tab. 2.

*Fewill. peruv.* 3. p. 237.

*Seb. Mus.* 3. tab. 30, fig. 4. 5.

*Catesb. Carol.* 2. tab. 32.

*Brown. Iam.* 423.

Habitat in America.

Iuniores articulis pedum tribus ultimis quadrifariam spinosis, at in adultioribus spinae in fasciculos pilorum nigrorum transeunt.

Degit in sylvis, quotannis vastissimis agminibus ad littora maris migrans, ova deponendo. Cuniculos fodit. Delectatur fructibus Mancinellae, et inde saepe venenatus fertur.

5. C. thorace orbiculato, laevi, integerrimo, obtuso, cauda corporis amplitudine. *Linn. Syst. Nat.* II. 1039. 6. *pifum.*

Habitat in mari mediterraneo.

Corpus parvum et fere orbiculatum.

6. C. thorace laevi, subcrenato, cauda basi binodi, brachiis scabris. *globus.*

Habitat ad littora malabarica. *Koenig.*

Parvus, subglobosus, thorace undique crenato. Brachia scabra, manus filiformes.

7. C. thorace, inermi quadrato: lateribus antice prominulis, chela altera magna. *Linn. Syst. Nat.* II. 1041. 14. *Amoen. acad.* 6. 414. 96. *vocans.*

Marocoani. *Marg. bras.* 184.

*Pif. bras.* 77. tab. 78.

*Rumph.* tab. 10. E.

*Seb. Mus.* 3. tab. 18. fig. 8.

*Gronov. Zooph.* 965.

*Petiv. Gazoph.* tab. 78. fig. 5.

*Catesb. Car.* 2. tab. 25.

Habitat in Indiis sub faxis latitans.

- craniola-* 8. C. thorace laevi, integerrimo, ovato, glaberrimo,  
*ris.* manibus ancipitibus, laevibus. *Linn. Syst. Nat.* II.  
 1041. 15. *Mus. Lud. Ulv.* 431.  
*Petiv. Gazoph.* tab. 9. fig. 3.  
*Seb. Mus.* 3. tab. 19. fig. 4. 10.  
*Rumph. Mus.* tab. 10. fig. A. B.  
 Habitat in Asia.
- minutus.* 9. C. thorace laevi, integerrimo, subquadrato: margine  
 acutiusculo, pedibus compressis. *Linn. Syst. Nat.* II.  
 2040. 8. *Mus. Ad. Fr.* 1. 8. *It. Westg.* 137. tab. 3. fig. 1.  
*Sloan. Iam.* 2. tab. 245. fig. 1.  
*Gronov. Zooph.* 962.  
*Kalm. Iter.* 143.  
*Baster. subf.* 2. 26. tab. 4. fig. 12.  
 Habitat in Pelago.
- pufallus.* 10. C. thorace laevi, integerrimo, subquadrato, tarsis  
 unidentatis.  
 Habitat in Oceano boreali.  
 Statura omnino praecedentis, at quadruplo minor, to-  
 tus pallidus, depresso.
- Pinnotheres.* 11. C. glaberrimus, thorace laevi, lateribus antice pla-  
 nato, caudae medio noduloso-carinato. *Linn. Syst.*  
*Nat.* II. 1040. 9.  
*Ionst. exsangu.* tab. 20. fig. 3.  
*Hasselqu. Iter.* 450.  
 Habitat in mari asiatico intra testas Pinnae. *Forskäbl.*  
 Neque enim vita conchae fortasse servari posset, nisi  
 opera Canceris. *Bellon. aquat.* 401.
- Pinnophy- lax.* 12. C. thorace orbiculato, inaequali, ciliato, pedibus  
 dorsalibus quatuor. *Linn. Syst. Nat.* II. 1039. 5.  
*Ancen. acad.* 6. 415. 92.  
*Pinnotheres. Rumph. Mus.* 25.  
 Habitat in America intra Chamam Lazarum, cuius  
 Pinnotheres et custos est.
- Orbiculus.* 13. C. thorace orbiculato, laevi, plano, rostro tri-  
 cuspidato.  
 Habitat in nova Zelandia. *Mus. Banks.*  
 Minor C. longicorni. Rostrum exsertum, breve, tri-  
 cuspidatum. Thorax suborbicularis, planus, de-  
 pressus

pressus margine integerrimo. Cauda conica, inflexa. Pedes laeves.

14. C. thorace orbiculato, laevi, chelis minore, antennis longissimis. *Linn. Syst. Nat.* II. 2040. 10. *longicornis.*  
*Gronov. Zooph.* 968.

*Aet. belv.* 5. 363. tab. 5. fig. 447.

*Bast. Suhf.* 2. 26. tab. 4. fig. 3.

*Seb. Mus.* 3. 42. tab. 17. fig. 1—4.

Habitat in Oceano europaeo, australi.

15. C. thorace orbiculato, laevi, integro, pedibus senis, *bexapus.* antennis corpore longioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 1039. 7.

Cancer thorace laevi, orbiculato, subdepresso, chelis validioribus, antennis longissimis, pedibus posticis minutioribus. *Baster. Suhf.* 2. 26. tab. 4. fig. 3.

Habitat in Oceano europaeo.

16. C. thorace laevi, cordato, litera H impresso, pedibus subtus barbatis, brachiis muricatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1041. 13. *Uca.*

*Uca una. Margr. bras.* 184.

Habitat in Americae paludibus.

\* \* *Thorace laevi, lateribus inciso.*

17. C. thorace laevi, unidentato, maculato, fronte triloba. *floridus.*  
 Cancer floridus brachyurus, thorace laevi, mutico, maculato, margine crenulato, manibus cristatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1041. 12. *Amoen. acad.* 6. 414. 98? *Rumph. Mus.* tab. 8. fig. 5.

Habitat in India.

Figura *Rumphii* accuratissima, at de Synonymo *Linnae* dubito, quum margo haud crenulatus, nec manus cristatae.

18. C. thorace orbiculato, laevi: lateribus unidentatis, *planatus.* fronte tridentata.

Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Banks.*

Minutus. Frons absque rostro, denticulis tribus parvis, acutis. Thorax orbiculatus, planus, laevis, margine subelevato. Latera in medio dente valido acuto notata. Cauda magna, inflexa, orbiculata. Pedes laeves, unguiculati.

- rhomboides.* 19. C. thorace laevi: lateribus antice unispinosis, fronte truncata. *Linn. Syst. Nat.* II. 1042. 17.  
*Barrel. Icon. rar.* tab. 1287. fig. 1.  
 — — — tab. 1286. fig. 1. 2.  
 Habitat in mari mediterraneo.
- maculatus.* 20. C. thorace laevi: maculis sanguineis, rotundis, lateribus unidentatis, fronte triloba. *Linn. Syst. Nat.* II., 1042. 18. *Mus. Lud. Ulr.* 433.  
*Petiv. amb.* tab. 1. fig. 8.  
*Seb. Mus.* 3. tab. 19. fig. 12.  
*Rumph. Mus.* tab. 10. fig. 1.  
*Gronov. Zooph.* 971.  
 Habitat in Asia.
- pelagicus.* 21. C. thorace laevi, utrinque unispinoso, antice octodentato, fronte sexdentata, manibus multangulo-prismaticis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1042. 19. *Mus. Lud. Ulr.* 434.  
 Cancer manuum articulis omnibus dentatis: extimo heptagono. *Osb. It.* 307.  
*Rumph. Mus.* tab. 7. fig. R.  
*Gronov. Zooph.* 956.  
*Brown. Iamaic.* 421. tab. 41. fig. 2.  
*Seb. Mus.* 3. tab. 20. fig. 9.  
 Habitat in Pelagi fuso natante.
- haastatus.* 22. C. thorace laevi: lateribus octodentatis; postico maximo, manibus angulatis.  
 Cancer haastatus brachyurus, thorace rugoso, nudo, margine utrinque octodentato: postico maximo, palmis posticis ovatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1046. 39?  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
 Minutus. Palmae anticae bidentatae, chelae angulatae.  
 Palmae posticae ovatae.
- nucleus.* 23. C. thorace laevi, globoso, antice utrinque unidentato, postice rostroque bidentato. *Linn. Syst. Nat.* II. 1042. 20.  
 Habitat in mari mediterraneo.

24. C. thorace laeviusculo, utrinque quinquedentato, *maenas.*  
 carpis unidentatis. *Linn. Syst. Nat. II. 1043. 22.*  
*Mus. Lud. Ulr. 436. Fn. Sv. 2026.*  
*Petiv. amb. tab. I. fig. 5.*  
*Baster. subs. 2. 19. tab. 2.*  
*Rumph. Mus. tab. 6. fig. O.*  
*Gronov. Zooph. 955.*  
 Habitat in Oceano europaeo, asiatico.
25. C. thorace laevi, utrinque quinquedentato, manibus apice compressis, pedibus posticis ovatis. *Linn. depurator.*  
*Syst. Nat. II. 1043. 23.*  
*Cancer caninus. Mus. Ad. Fr. I. 85.*  
*Scop. carn. 1124.*  
*Cancer latipes. Rond. pisc. 565.*  
*Cancer raimipes. Barrel. Icon. 1287. 2. fig. mal.*  
*Planck. conch. 34. tab. 3. fig. 7. mal.*  
*Seb. Mus. 3. tab. 18. fig. 9. bon.*  
 Habitat in Oceano europaeo.
26. C. hirsutus, thorace utrinque dentato, pedibus posticis, unguibus geminis. *Linn. Syst. Nat. II. 1043. dormia.*  
*24. Amoen. acad. 6. 413. 96.*  
*Cancer lanosus. Rumph. Mus. tab. II. fig. I.*  
*Seb. Mus. 3. tab. 18. fig. 1. 3.*  
 Habitat in Indiae orientalis profundo, venenatus.
27. C. thorace laevi, utrinque quinquedentato, manibus multangulis, ovatis, carpis unidentatis. *Linn. feriatus.*  
*Syst. Nat. II. 1043. 25. Mus. Lud. Ulr. 437.*  
*Rumph. Mus. tab. 6. P.*  
*Petiv. Amb. tab. I. fig. 6.*  
 Habitat in mari indicō.
28. C. thorace laevi, utrinque quadridentato, fronte fissa, *Pagurus.*  
 manibus apice atris.  
*Cancer Pagurus brachiyurus, thorace utrinque obtuse novem-plicato, manibus apice atris. Linn. Syst. Nat. II. 1044. 27. Fn. Sv. 2028. Mus. Ad. Fr. I. 85.*  
*Gronov. Zooph. 967.*  
*Bradl. nat. tab. 3. fig. 4.*  
*Rumph. Mus. tab. II. fig. 4.*  
 Habitat in Oceano europaeo, indicō.

- granulatus.* 29. *C. thorace subnodoso, crenato: angulis posticis dilatato-quinquedentatis, manibus cristatis.* *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 1043. 26.  
*Cancer chelis crassissimus.* *Catesb.* 2. tab. 36.  
*Seb. Mus.* 3. tab. 19. fig. 13.  
*Habitat in mari mediterraneo.*
- Calappa.* 30. *C. thorace laevi, crenulato: angulis posticis dilatato-integerrimis, manibus cristatis.*  
*Cancer Calappa brachyurus thorace strigis subimbri-cato, gibbo antice trilobo.* *Linn. Syst. Nat.* II. 1048.  
 52. *Mus. Lud. Ulr.* 449.  
*Petiv. Gazoph.* tab. 75. fig. 11.  
*Seb. Mus.* 3. tab. 20. fig. 7. 8.  
*Rumph. Mus.* tab. 11. fig. 2. 3.  
*Habitat in America.*  
*Affinis praecedenti, at duplo major et anguli dilatati, integerrimi.*
- aeneus.* 31. *C. thorace rugosissimo, obtuso, utrinque quadrilobo.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 1048. 54. *Mus. Lud. Ulr.* 451.  
*Habitat in India.*
- depressus.* 32. *C. thorace sublaevi, utrinque quadridentato, femo-ribus unidentatis, unguibus subtus serratis.*  
*Habitat in mari mediterraneo.*  
*Parvus, depressus, griseo rufoque varius. Frons quadridida. Thorax dentibus utrinque quatuor acutis. Femora apice unidentata, medio dorsali macula nigra. Ungues omnes valde ferrati. Chelae parvae.*
- Grapsus.* 33. *C. thorace laevi, utrinque tridentato, subrugoso, corpore variegato.*  
*Cancer Grapsus brachyurus, thorace strigis lateralibus, fronte retusa.* *Linn. Syst. Nat.* II. 1048. 53. *Amoen. acad.* 4. tab. 3. fig. 10.  
*Pagurus maculatus.* *Catesb. Carol.* 2. tab. 36. fig. 1.  
*Seb. Mus.* 3. tab. 18. fig. 5.  
*Gronov. Zooph.* 966.  
*Habitat in mari mediterraneo.*  
*Statura praecedentis. Frons integra. Thorax late-ribus et antice subrugosus, utrinque dentibus tribus acutis. Color supra fusco flavescentique varius, subtus flavescens.*

\*\*\* *Tho-*

\*\*\* *Thorace supra hirto aut spinoso.*

34. C. thorace hirto, suborbiculato, mutico, manibus ovatis, muricatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1044. 28. *Mus. Lud. Ulr.* 438.  
 Habitat in Oceano indico.
35. C. thorace hirto, rugoso, utrinque dentato, rostro bidentato. *Linn. Syst. Nat.* II. 1044. 24.  
*Planct. conch.* 36. tab. 5. fig. 1.  
 Habitat in mari mediterraneo.
36. C. thorace hirto, ovato, tuberculato, rostro bifido, *araneus.* manibus ovatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1044. 30. *Fn. Sv.* 2030. *Mus. Lud. Ulr.* 439.  
*Ionst. exsangu.* tab. 5: fig. 13.  
 Habitat in Oceano europaeo.
37. C. thorace pubescente, obcordato: dorso spinis duabus erectis, manibus oblongis, compressis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1045. 31. *Fn. Sv.* 2027.  
 Habitat in Oceano europaeo.
38. C. thorace spinis octo, pedibus filiformibus, rostro bifido. *Linn. Syst. Nat.* II. 1045. 35.  
 Habitat in mari mediterraneo.
39. C. thorace aculeato, rostro porrecto, bifido, cristato, pedibus aculeatis. *cristatus.*  
 Cancer cristatus brachyurus, thorace aculeato, rostro bifido, cristato, manibus teretibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 1047. 44. *Mus. Lud. Ulr.* 443.  
 Habitat in Oceano.  
 Synonyma a Linnaeo citata vix hoc pertinent.
40. C. thorace ovato, crenato: postice tridentato. *Linn. punctatus.*  
*Syst. Nat.* II. 1045. 36.  
*Brown. Iam.* tab. 42. fig. 3.  
 Habitat in Asia, America.
41. C. thorace aculeato, rostro spinis corniformibus, *cornutus.* barbatis, manibus rotundatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1047. 46. *Mus. Lud. Ulr.* 445.  
 Habitat in mari mediterraneo.

Statura C. aranei. Testa scabra, inaequalis, linea dorsali aculeata. Aculei duo paulo maiores supra caudam. Margo spinis octo validissimis armatus, quarum secunda brevior. Rostrum abbreviatum, spinis duabus barbatis, apice nudis. Manus teretes, laeves. Pedes hirti.

- longirostris.* 42. C. thorace aculeato, porrecto, adscendente, rostro acuto, bifido, pedibus longissimis.

Cancer dodecos brachyurus, thorace pubescente, spinis duodecim, rostro bifido. *Linn. Syst. Nat. II. 1046. 38?*

Habitat in mari mediterraneo.

Manus spinosae. Rostrum fissum, connivens. Variat rostro fere longitudine thoracis.

- Phalangium.* 43. C. thorace pubescente, antice spinis tribus erectis, acutis, postice tuberculis obtusis, rostro bifido.

Habitat - - -

Statura praecedentis. Rostrum exsertum, breve, bifidum. Spina pone oculos. Testa adscendens, antice spinis tribus, intermedia majori, postice tuberculis tribus majoribus obtusis. Margo dentatus. Pedes elongati, nudi, chelis scabris.

- puber.* 44. C. thorace hirto, cordato, utrinque quinquedentato, manibus unidentatis, apice nigris.

Cancer puber brachyurus, thorace rugoso, villoso, utrinque quinquedentato, palmis posticis ovatis. *Linn. Syst. Nat. II. 1046. 40.*

Habitat in mari mediterraneo.

Statura C. Grapsus, at paulo major. Frons dentibus tribus obtusis, crenatis. Testa rugosa, fusca, pilis rufis hirta. Carpi manusque unidentati. Pedes postici compressi, ovati.

- Maja.* 45. C. thorace aculeato, manibus ventricosis, spinosis: digitis penicillato-hirsutis. *Linn. Syst. Nat. II. 1046. 41. Fn. Sv. 2031.*

*Jenst. ex sangu. tab. 5. fig. 5.*

*Gronov. Zooph. 973.*

Habitat in Oceano norwegico.

46. C. thorace aculeato-nodoso, pedibus senis, cauda *horridus*, cariosa.

*Cancer horridus brachyurus*, thorace obtuse aculeato, manibus ovatis, cauda cariosa. *Linn. Syst. Nat.* II. 1047. 43. *Mus. Lud. Ulr.* 442.

*Gronov. Zool.* 976.

*Petiv. amb.* tab. I. fig. 7.

*Seb. Mus.* 3. tab. 18. fig. 10.

— — tab. 22. fig. 1. 2. 3.

*Rumph. Mus.* tab. 9. fig. 1.

Habitat in Oceano asiatico.

47. C. thorace nodoso, inaequali, rostro piano, retuso, *Chiragra*. pedibus octo nodulosis.

Habitat in mari mediterraneo.

Statura praecedentis, at triplo minor. Rostrum exsertum, planum, apice valde retusum. Ante oculos tuberculum obtusum. Thorax nodis plurimis, in primis quatuor dorsalibus majoribus et tribus utrinque ad marginem posticum. Pedes omnes curvati, nodulosi.

48. C. thorace aculeato, manibus corpore longioribus: *longimanus*. digito patulo, pollice curvato. *Linn. Syst. Nat.* II. 1046. 42.

*Rumph. Mus.* tab. 8. fig. 2.

*Petiv. amb.* tab. 2. fig. 15.

*Seb. Mus.* 3. tab. 20. fig. 12.

Habitat in Oceano asiatico.

49. C. thorace aculeato, manibus ovatis, scabris, pedibus posterioribus longissimis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1047. *longipes*.

47. *Mus. Lud. Ulr.* 446.

*Rumph. Mus.* tab. 8. fig. 4.

Habitat in Oceano indico.

50. C. thorace postice uniaculeato, inaequali, pedibus *spinifer*. secundi paris longissimis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1047.

48. *Mus. Lud. Ulr.* 447.

Habitat in Asia.

51. C. thorace inaequali, spina altera frontis, altera *germanus*. supra caudam. *Linn. Syst. Nat.* II. 1047. 49.

Habitat in mari germanico.

Chelae laeves.

*suritus.* 52. C. thorace antice utrinque unispinofo: dorso canaliculato, molliusculo.

Habitat in Islandia. *Koenig.*

*Parvus.* Antennae brevissimae. Testa antice pone oculos spina parva, erecta, acutâ. Dorsum impressum, molliusculum. Brachia basi apiceque unispinosa.

126. PAGVRVS. *Antennae quatuor pedunculatae, inaequales: anteriores setaceae, posteriores filiformes, articulo ultimo bifido.*

*latro.* 1. P. thorace futuris quadrifido, cauda simplici, subtus ventricosa.

Cancer latro. *Linn. Syst. Nat. II. 1049. 56.*

Cancer crumenatus. *Rumph. Mus. tab. 7. fig. 4.*

Bourfires. *Rochef. ant. I. c. 21.*

*Seb. Mus. 3. tab. 21. fig. 1. 2.*

Habitat in Indiae orientalis cryptis rupium: terrestris, nocturnus, victitans nucibus cocos, quas adscendens dejicit, dein manibus aperit violenter; esculentus demitis intestinis.

*Bernhard-* 2. P. parasiticus, chelis muricatis: dextra majore.

*dus.* Cancer Bernhardus. *Linn. Syst. Nat. II. 1049. 57.*  
*Mus. Lud. Ulr. 454. Fn. Sv. 2032.*

*Ionst. exsangu. tab. 7. fig. 6. 12.*

*Swamm. Bibl. tab. II. fig. 1. 2.*

*Bastler. subs. I. 74. tab. 10. fig. 3. 4.*

*Gronov. Zooph. 982.*

Habitat in Oceano europaeo intra testas Cochlearum, quas vacuas intrat trahitque, mutatas prout adolescit.

*Diogenes.* 3. P. parasiticus, chelis laevibus, pubescentibus: sinistra majore.

Cancer Diogenes. *Linn. Syst. Nat. II. 1049. 58.*

*Gronov. Zooph. 983.*

*Rumph. Mus. tab. 5. fig. K. [L.*

*Catesb.*

*Catesb. Carol.* 2. tab. 33, fig. 1. 2.

*Kaempf. Iap.* tab. 13, fig. 7.

Habitat in Oceano americano, asiatico intra testas cochlearum.

4. P. parasiticus, chelis scabris, subaequalibus, pedibus *Eremita*, sex anterioribus pollicatis.

*Cancer Eremita. Linn. Syst. Nat.* II. 1049. 59.

Habitat in mari italicō intra tophum suberosum, subrotundum, apertura transversali.

Pedes sex antici porrecti, extra tophum.

5. P. parasiticus, chelis muricatis, aequalibus, oculorum *oculatur*. pedunculis longitudine thoracis.

Habitat in Murice Brandaris.

Statura P. Bernhardi. Corpus totum ferrugineum.

Oculorum pedunculi porrecti, cylindrici, basi dente armati. Brachia utrinque macula sanguinea. Chelae scabrae.

6. P. parasiticus, manibus laevibus, trialatis: dextra *alatus*. majore.

Habitat in Islandiae bullis. *Koenig.*

Statura omnino praecedentium, paulo tamen minor.

Chelae articulo penultimo scabro, ultimo five manu laevi, alis tribus prominentibus, acutis.

7. P. parasiticus, chelis scabris, cauda apice callosa, *araneifor-* unguiculata. *moris.*

Habitat in fissuris rupium maris Edimburgici, intrans helices et turbines.

Parvus, obscure cinerascens. Margo supra oculos spinis duabus parvis. Chelae ovatae, scabrae. Pedes quatuor postici breves, obtusi, reflexi, unguiculo brevissimo. Cauda cylindrica, mollis terminatur callo globose, unguiculato.

8. P. parasiticus, subcylindricus, testa punctis excavatis. *tubularis.*

*Cancer tubularis. Linn. Syst. Nat.* II. 1050. 60.

Habitat intra testas Serpulae maris mediterranei.

9. P. tomentosus, obtectus pileo hemisphaerico suberofo. *Caput*

*Caput mortuum. Linn. Syst. Nat.* II. 1050. 61. *mortuum.*

Habitat in mari mediterraneo.

- strigosus.* 10. P. thorace antrorsum rugoso, spinis ciliato, rostro acuto, septemdentato.  
*Cancer strigosus.* Linn. *Syst. Nat.* II. 1052. 69.  
*Cancer macrourus*, thorace chelisque angulatis, hispidis. *Mus. Ad. Fr.* '87.  
*Astacus marinus.* *Column. aquat.* 8. tab. 6.  
*Astacus similis pediculo marino.* *Ionst. exsangu.* t. 2. f. 7.  
*Barr. var.* tab. 1288. fig. 1.  
*Seb. Mus.* 3. tab. 19. fig. 19. 20.  
*Gron. Zoolph.* 980.  
— *Aet. Helvet.* 4. 23. tab. 2. fig. 1. 2.  
Habitat in Oceano.  
Habitus ab hoc genere omnino differt, at charactere junguntur.
- rugosus.* 11. P. thorace rugoso, antice ciliato, spinoso, rostro tridente, manibus filiformibus.  
Habitat in mari mediterraneo.  
Affinitas summa praecedentis, cuius forte varietas.  
Loco rostri dentes tres acutissimi, intermedio majori. Ad basin dentes duo elevati, acuti. Margo thoracis anticus spinosus.
- gregarius.* 12. P. thorace rugoso, ciliato, rostro tridentato, palpis anticis elongatis.  
Habitat in Oceano americano Patagoniam alluente, gregarius, unde saepe mare cruentum videtur.  
*Mus. Bankianum.*  
Statura praecedentium, at minor. Palpi antice longitudine antennarum, articulis cordato - obconicis. Rostrum breve, tridentatum. Thorax dentato - ciliatus, rugosus: rugis margine ciliatis. Chelae scabrae, subclavatae. Color sanguineus, macula magna dorsali fusca.
- amplex-*  
*Etens.* 13. P. thorace laevi, rostro brevissimo, emarginato, pedibus intermediis longissimis.  
Habitat in Oceano atlantico, Brasiliam alluente, noctu fulgens.  
Corpus parvum, albidum, subdiaphanum, punctis parvis rubris adspersum. Thorax laevis, inermis, postice rotundatus, latior, antice angustatus, terminatur rostro brevissimo, vix exerto, emarginato.  
Anten-

Antennae anticae setaceae, corpore longiores, posticae breves, triarticulatae, filiformes. Abdomen segmentis quinque. Cauda foliolis quinque intermedio linguiformi. Pedes decem, antici chelati, breves, 2. 3. reliquis duplo longiores.

127. SCYLLARVS. *Antennae* duae filiformes: articulo ultimo bifido. Squamae duae aculeatae, biarticulatae, loco antennarum posticarum.

## 1. Scyllarus.

*arethus.*

Cancer Arctus macrourus, thorace antrorsum aculeato: fronte diphylla, manibus subadactylis. *Linn. Syst. Nat. II. 1053. 75. Fn. Sv. 2040.*

*Ionst. ex sangu. tab. 4. fig. 4. 8. 12.*

*Barrel. Icon. 1288. fig. 2.*

*Rumph. Mus. tab. 2. fig. 6. D.*

*Brown. Iam. tab. 41. fig. 1.*

*Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 1.*

Habitat in Oceano Europae, Asiae, Africæ, Americae.

128. ASTACVS. *Antennae* quatuor pedunculatae; anticae elongatae, setaceae, posticae fissae.

## 1. A. antennis posticis bifidis, thorace laevi, rostro lateribus dentato: basi supra dente duplice.

Cancer Gammarus. *Linn. Syst. Nat. II. 1051. 62. Fn. Sv. 2032. Linn. It. Wgoth. 174.*

*Mus. Adolph. Fr. 87.*

*Bast. subf. 2. 6. tab. 1.*

Habitat in Oceano norwegico, frequens.

## 2. Antennis posticis bisidis; thorace laevi, rostro lateribus dentato: basi dente utrinque unico.

Cancer Astacus. *Linn. Syst. Nat. II. 1051. 63. Fn. Sv. 2034. Cancer*

*Cancer macrourus*, rostro supra ferrato, basi utrinque dente simplici, thorace integro. *Geoff. Inf.* 2.  
666. 1. *Mus. Ad. Fr.* 1. 87.

*Gronov. Zooph.* 977.

*Roeſ. Inf.* 3. tab. 54. 55.

*Ionſt. exſangu.* tab. 4. fig. 1.

*Sultz. Inf.* tab. 23. fig. 151.

Habitat in Europae lacubus, fluviis.

*Homarus.* 3. A. antennis posticis bifidis, thorace antrorsum aculeato, fronte bicorni, manibus adactylis.

*Cancer Homarus.* *Linn. Syſt. Nat.* II. 1053. 74. *Mus.*  
*Lud. Ulv.* 457.

*Rumph. Mus.* tab. I. fig. A.

*Gronov. Zooph.* 981.

*Marcgr. bras.* 245. tab. 246.

*Petiv. Amb.* tab. 6. fig. 1.

*Seb. Mus.* 3. tab. 21. fig. 5.

Habitat in mari asiatico, americano.

*carcinus.* 4. A. antennis posticis bifidis, thorace laevi, manibus teretiusculis: brachiis hispido-aculeatis.

*Cancer Carcinus.* *Linn. Syſt. Nat.* II. 1051. 64.

*Locusta marina.* *Rumph. Mus.* tab. I. fig. B.

*Astacus fluviatilis major*, chelis aculeatis. *Sloan. Iam.*  
2. 271. tab. 245. fig. 2.

*Seb. Mus.* 3. tab. 21. fig. 4.

Habitat in Americae fluviis.

*coeruleo-*  
*scens.* 5. A. antennis posticis bifidis, coeruleoscens, thorace laevi, rostro porrecto, subulato, bidentato.

Habitat in Pelago inter Tropicos frequens. *Mus. Banks.*

*Corpus parvum*, amoene coeruleum. Thorax oblongus, subcylindricus, laevis, antice ad basin rostri denticulis duobus parvis. Rostrum elongatum, thorace paulo brevius, subulatum, denticulis duabus minutissimis notatum. Antennae anticae longitudine corporis, posticae vix rostro longiores, bifidae, lacinia interiore ovata, compressa, ciliata. Abdominis primum segmentum maximum. Cauda foliolis quinque, intermedio emarginato. Brachia brevissima, teretia, chelis minutis. Pedes octo filiformes, teretes.

6. A. antennis posticis bifidis, rostro brevissimo, subulato, pedibus simplicibus. *fulgens.*

Habitat in Oceano Brasiliam alluente, noctu fulgens.

*Mus. Banks.*

Corpus parvum, albidum, subdiaphanum. Thorax oblongus, subcylindricus, postice truncatus, antice terminatus in rostrum breve, subulatum, integrum. Pedes omnes simplices, octo parium. Cauda foliolis quinque.

7. A. antennis posticis bifidis, thorace articulato, pedibus sexti paris longissimis. *crassicornis.*

Habitat in Oceano americano. *Mus. Banks.*

Corpus parvum, rubescens. Thorax oblongus, subcylindricus, dorso carinatus, antice retusus absque rostro, articulatus: articulis octo subaequalibus. Antennae anticae corpore longiores, setaceae, crassifusculae. Abdomen angustatum, quinque-articulatum. Pedes utrinque octo, omnes simplices: sexto duplo longiori, femoreque ferrato. Cauda stylis sex exsertis, filiformibus.

8. A. antennis posticis bifidis, thoracis margine bidentato, rostro lanceolato, ferrato, corpore variegato. *biflorio.*

Cancer pennaceus macrourus, thorace laevi, cylindrico, rostro ensiformi; margine superiori ferrato.

*Linn. Syst. Nat. II. 1051. 65?*

Habitat in Groenlandia.

Statura et magnitudo A. Crangonis. Palpi apice spinosi. Rostrum porrectum, subtus in medio dilatatum, unidentatum, supra serratum. Thorax cylindricus, margine antico tridentato. Corpus rufo cinereoque variegatum. Cauda foliolis quinque, intermedio lineis duabus spinosis.

9. A. antennis posticis bifidis, thorace laevi, inermi, chela dextra majori, pedibus filiformibus. *Malabaricus.*

Habitat ad littora Malabarica. *Koenig.*

Statura A. Crangonis, at paulo minor. Thorax cylindricus, laevis, rostro abbreviato, acuminato inter oculos. Chela dextra incrassata, digito incurvo; sinistra longior, filiformis. Pedes octo filiformes.

*Groenlans-* 10. A. antennis posticis bifidis, thorace margine antico rostroque dentatis, palpis apice spinosis, corpore fusco.

Habitat in mari groenlandico.

Rostrum porrectum, supra tri-subtus bidentatum. Palpi antici spinis apice ciliati. Antennae anticae longissimae, albo rubroque variegatae. Thoracis margo anticus tridentatus et dorsum carinatum dentibus quatuor. Abdominis segmenta inaequalia utrinque spina terminantur. Cauda quinquephylla, foliolo intermedio lineis duabus dentatis.

*emeritus.* 11. A. antennis - - - -, manibus nullis, pedibus utrinque quinque natatoriis.

Cancer emeritus. *Linn. Syst. Nat.* II. 1055. 79.

Emerita. *Gron. Zooph.* 1000. tab. 17. fig. 8. 9.

*Pet. pterigr.* tab. 20. fig. 9.

Habitat in mari indicō.

Specimina mea imperfecta, ideoque de genere dubius haereo. Forte potius Pagurus.

*Norwegi-* 12. A. antennis posticis trifidis, thorace antrorsum aculeato, manibus prismaticis: angulis spinosis.

Cancer norwegicus. *Linn. Syst. Nat.* II. 1053. 73. *Fn.*

*Sv.* 2039. *Mus. Lard. Ulv.* 456. *Mus. Ad. Fr.* I. 88.

*Gronov. Zooph.* 979.

*Seb. Mus.* 3. tab. 21. fig. 3.

Habitat in mari Norwegico.

Varietatem duplo minorem e mari mediterraneo vidimus.

*Squilla.* 13. A. antennis posticis trifidis, thorace laevi, rostro supra ferrato, subtus tridentato, thoracis margine quinquedentato.

Cancer Squilla macrourus, thorace laevi, rostro supra ferrato, subtus tridentato, manuum digitis aequalibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 1051. 66. *Fn. Sv.* 2037.

*Klein. dub.* 35. fig. A.

*Seb. Mus.* 3. tab. 21. fig. 9. 10.

*Büßler. Sühf.* 2. 30. fig. 5.

*Gronov. Zooph.* 986.

Habitat in Oceano europeo, mari balthico.

Variat rostro recto et incurvo.

14. A. antennis posticis trifidis, thorace laevi, rostro brevi, integerrimo, manuum pollice longiori. *crangon.*  
*Cancer Crangon.* *Linn. Syst. Nat.* II. 1052. 67.  
*Fn. Sv.* 2038.  
*Squilla marina batava.* *Bast. subf. 2.* 27. tab. 3. fig. 1 - 4.  
*Seb. Mus.* 3. tab. 21. fig. 8.  
*Roef. Ins.* 3. tab. 63. fig. 1. 2.  
*Habitat in mari Balthico.*
15. A. antennis posticis trifidis, thorace spinoso, pedibus quatuor anticis silifermibus. *tettigonus.*  
*Habitat in Islandia.* *Koenig.*  
*Rostrum breve, inflexum, bidentatum. Thorax carinatus, carina bidentata. Margo unidentatus. Manus adactylae, subcylindricae, spina unica, rigida, acuta et ungue falcato, mobili.*  
*Varietas minor, carina thoracis tridentata, vix distincta.*
16. A. antennis posticis trifidis, manibus adactylis compressis, falcatis, ferrato-dentatis. *Mantis.*  
*Cancer Mantis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 1054. 76. *Fn. Sv.* 2035. *Mus. Adol. Frid.* I. 86.  
*Cancer arenarius.* *Rumph. Mus.* tab. 3. fig. E.  
*Tamaru guacu.* *Marg. bras.* 186. tab. 187.  
*Seb. Mus.* 3. tab. 20. fig. 2. 3.  
*Gronov. Zooph.* 984.  
*Habitat in mari asiatico, indico, mediterraneo.*  
*Habitus ab hoc genere differt, forte proprii generis.*
17. A. antennis posticis trifidis, manibus adactylis, ventricosis, rectis, angulatis, introrsum tridentatis. *Scyllarus.*  
*Cancer Scyllarus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 1054. 77.  
*Cancer mirabilis.* *Linn. Mus. Adolph. Fr.* I. 86.  
*Rumph. Mus.* tab. 3. fig. F.  
*Seb. Mus.* 3. tab. 20. fig. 6.  
*Habitat in mari asiatico.*  
*Praecedenti valde affinis.*
18. A. antennis posticis trifidis, thorace laevi, carinato: angulis subulatis, manibus falcato-subulatis, integris. *vitreus.*  
*Habitat in Oceano atlantico.* *Mus. Banks.*  
*Dd* *Cor-*

Corpus parvum, pellucidum, limpidissimum, membranaceum. Thorax oblongo-quadratus, angulis subulato-spinosis. Rostrum elongatum, subulatum, acutum. Abdomen elongatum, subclavatum, canda magna, ovata, sexdentata, utrinque foliolis tribus parvis, oblongis, intermedio truncato, bifeto, suffulta. Pedes quinque parium, 1. capillare simplex, longitudine thoracis: 2. crassius, thorace longius, articulo penultimo compresso, intus carinato pro receptione digiti subulato-falcati apice inflexi, simplicis. Reliqua similia, at multo breviora.

**129. GAMMARVS.** *Antennae quatuor simplicissimae, sessiles: anticae breviores, subulatae, posticae fetaceae.*

*locusta.* 1. *G. manibus quatuor adactylis, pedibus quatuor-decem.*

Cancer Locusta. *Linn. Syst. Nat.* II. 1055. 82. *Fn. Sv.* 2042.

*Roeſ. Inf.* 3. tab. 62.

*Klein. miss.* 5. tab. 6. fig. A. B. 6.

*Sultz. Inf.* tab. 23. fig. 152.

Habitat in Europae maritimis.

*pulex.* 2. *G. manibus quatuor adactylis, pedibus decem.*

Cancer Pulex. *Linn. Syst. Nat.* II. 1055. 81. *Fn. Sv.* 2041.

Pulex fluviatilis. *Raj. Inf.* 44.

Pulex marinus. *Bast. subf.* 2. 31. tab. 3. fig. 7.

*Roeſ. Inf.* 3. tab. 62.

*Frisch. Inf.* 7. tab. 18.

*Gronov. Zoolph.* 990.

*Geoff. Inf.* 2. 667. tab. 21. fig. 6.


Habitat ad maris littora, etiam in fontibus et fossis, dorso innatans.

3. *G. manibus quatuor monodactylis, pedibus decem.* *linearis.*  
*Cancer linearis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 1056. 83.  
*Mart. spitzb.* 56. tab. P. fig. I.  
*Habitat in Oceano islandico,* *Koenig.* *In Terra*  
*nova.* *Muf. Banks.*
4. *G. manibus adactylis, pedibus viginti patentibus,* *salinus.*  
*cauda subulata.*  
*Cancer salinus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 1056. 86.  
*Maty diar. britt.* 1756.  
*Habitat in Angliae salinis Limingtonianis.*
5. *G. manibus adactylis, pedibus patentibus, cauda cy-* *stagnalis.*  
*lindrica, bifida.*  
*Cancer stagnalis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 1056. 87. *Fil.*  
*Sv. 2043.*  
*Habitat in Europae aquis stagnantibus.*





## V. VNOGATA.

*Os palpis duobus.**Maxilla inferior saepius unguiculata.*130. LIBELLVLA. *Labium trifidum, lacinia dorsali minutissima.*

*4 macula-* 1. L. alis posticis basi omnibusque medio antico macula nigricante, abdomine depresso, tomentoso.

*ta.* Libellula *4 maculata* alis posticis basi omnibusque medio antico macula nigricante. *Linn. Syst. Nat. II. 901. 1. Fn. Sv. 1459.*

Libellula alis macula dupli marginali. *Geoff. Inf. 2. 224. 6.*

Libellula *maxima*, abdomine breviore latioreque flavo. *Raj. Inf. 49. 4.*

*Reaum. Inf. 6. tab. 35. fig. 1. 2.*

Habitat in Europa.

*depressa.* 2. L. alis omnibus basi nigricantibus, abdomine depresso, lateribus flavescente.

Libellula *depressa* alis omnibus basi nigricantibus, thorace lineis duabus flavis, abdomine lanceolato, lateribus flavescente. *Linn. Syst. Nat. II. 902. 5. Fn. Sv. 1413.*

Libellula thorace viridi, nitido, lineis flavis, alis albis, abdomine nigro-coerulecente. *Geoff. Inf. 2. 226. 9.*

Libellula *maxima*; abdomine breviore latioreque coeruleo. *Raj. Inf. 49. 5.*

*Reaum. Inf. 6. tab. 35. fig. 1.*

*Roef. Inf. 2. aqu. tab. 6. fig. 4.*

— — — tab. 7. fig. 3.

*Edw. Av. tab. 333.*

Habitat ad Europae aquas.

3. L. alis hyalinis: macula baseos fasciisque duabus fuscis. *bifasciata*.

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo praecedentis. Thorax villosus, fuscus, lineolis duabus flavis sub alis. Abdomen depresso, fuscum, lateribus flavescens. Alae hyalinae, basi macula oblonga, nigrá, in qua lineola albicans: fascia in medio abbreviata, et alia apicis, fuscis.

4. L. alis basi luteis. *Linn. Syst. Nat. II. 901. 2. Fn. flaveola.*

*Sv. 1460.*

Libellula alis albis, basi luteis, abdomine lutescente.

*Geoff. Ins. 2. 225. 7.*

*Schaeff. Ins. tab. 4. fig. 1.*

Habitat in Europa.

Variat rarius alis absque macula lutea.

5. L. flavescentes, alis macula apiceque fuscis: stigmate *stigmatisans*.  
niveo.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Statura omnino praecedentis. Corpus totum flavescentes, abdomine nigro, lineato. Alae aqueae, in macula fusca in medio marginis exterioris. Pone maculam stigma marginis crassioris niveum. Apex alae fuscus. Pedes flavescentes, apice nigri.

6. L. flavescentes, alis anticis apice, posticis margine *oculata*.  
aqueis: stigmate niveo.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Praecedenti nimis affinis, cuius forte mera varietas.

Alae anticae flavescentes usque ad stigma marginis crassioris niveum, tunc aqueae: posticae flavescentes, margine postico aqueo.

7. L. alis albis, fronte elevata, vesiculoso, thoraceque *vesiculoso*.  
flavis, immaculatis.

Habitat in America.

Major. Frons elevata, vesiculoso, subpellucida. Oculi testacei. Thorax flavius, immaculatus. Abdomen cylindricum, segmentis basi obscure pallidis, apice nigris. Cauda foliolis cylindricis.

- rubicunda.* 8. L. alis tantum posticis basi nigricantibus, corpore testaceo. *Linn. Syst. Nat.* II. 902. 4. *Fn. Sv.* 1462.  
*Roef. Inf.* 2. *aqu.* 2. tab. 7. fig. 4.  
*Raj. Inf.* 50. 8.  
 Habitat in Europa.
- vulgarissima.* 9. L. thorace flavo, striis octo nigris. *Linn. Syst. Nat.* II.  
 502. 6. *Fn. Sv.* 1464.  
 Libellula lateribus flavis, alis albis. *Geoff. Inf.* 2. 227. II.  
*Roef. Inf.* 2. *aqu.* 2. tab. 5. fig. 3.  
 Habitat in Europa.
- obscura.* 10. L. alis totis ferrugineis, corpore obscuro.  
 Habitat in America. *D. Lewin.*  
 Statura et magnitudo L. flaveolae. Corpus totum ferrugineo-fuscum. Abdomen cylindricum. Alae ferrugineae, puncto marginali oblongo, fuso.
- vulgata.* 11. L. alis hyalinis, immaculatis, abdomine cylindrico, rufo.  
 Libellula vulgata alis hyalinis, corpore griseo, cauda simplici. *Linn. Syst. Nat.* II. 901. 3. *Fn. Sv.* 1461.  
*Roef. Inf.* 2. *aqu.* 2. tab. 8.  
 Habitat in Europa.
- cancellata.* 12. L. alis basi immaculatis, abdomine, dorso lateribusque interrupte luteis. *Linn. Syst. Nat.* II. 902. 7.  
*Fn. Sv.* 1465.  
 Habitat in Europa.
- fasciata.* 13. L. alis planis, fuscis: striga alba.  
 Libellula fasciata alis planis, fuscis: fascia linearis alba.  
*Linn. Syst. Nat.* II. 903. 12.  
*Edw. Av.* 174. tab. 174.  
 Habitat in India.
- umbrata.* 14. L. alis planis, albis: fascia atra. *Linn. Syst. Nat.* II.  
 903. 13.  
 Habitat in America meridionali.
- dimidia-*  
*ta.* 15. L. alis planis, a basi ad medium nigris. *Linn. Syst.*  
*Nat.* II. 903. 14.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 78. fig. 7. 8.  
 — — tab. 86. fig. 19.  
 Habitat in America.

16. L. alis anticis testaceo-obsoletis; posticis viridibus, *chinensis*.  
apice fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 904. 15.

*Edw. Av.* 112. tab. 112.

Habitat in China.

17. L. alis planis, albis: maculis tribus atris tribus- *versicolor*.  
que cinereis.

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Magna. Caput fuscum, flavo maculatum. Thorax  
fuscus, lineis utrinque duabus sub alis flavis. Ab-  
domen fuscum. Alae albae, macula magna oblonga  
baseos atra et alia cinerea ad marginem tenuiorem.  
Maculae duae reliquae atrae et cinereae alternae,  
macula atra alam terminante.

18. L. alis purpurascensibus: fascia alba, anticis apice *america-*  
albis; posticis linea baseos alba. *Linn. Syst. Nat.* II. *na.*  
904. 16.

Habitat in India.

Corpus viride.

19. L. alis albis, corpore ferrugineo, ore punto utrin- *ferrugi-*  
que flavo. *nea.*

Habitat in America.

Statura L. umbratae. Corpus totum ferrugineum,  
puncto flavo utrinque ad os.

20. L. alis albis, corpore tomentoso, fusco viridiique *tomentosa*.  
variegato.

Habitat in America.

Parva. Frons cyanea. Thorax tomentosus, fuscus,  
viridi maculatus. Abdomen nigrum, cylindricum,  
segmentis apice utrinque puncto virescente.

21. L. alis hyalinis, thorace viridi-aeneo. *Linn. Syst. aenea.*  
*Nat.* II. 902. 8. *Fu. Sv.* 1466.

Libellula viridi-inaurata, alis pallidis, pedibus nigris.

*Geoff. Inf.* 2. 226. 10.

*Raj. Inf.* 49. 5.

*Roeß. Inf.* 2. *aqu.* 2. tab. 5. fig. 2.

Habitat in Europa.

*cyanea.* 22. L. alis albis: stigmate niveo, nigro terminato, corpore cyaneo.

Habitat in America. *Lewin.*

Corpus totum cyaneum, abdomine cylindrico. Alae omnes albae, macula parva nigra ad basin et majori marginali nivea versus apicem, quae puncto fusco terminatur.

*carolina.* 23. L. alis albis: posticis basi dentata, ferruginea, corpore fusco.

Libellula carolina alis patentibus, hyalinis: posticis basi tota late ferruginea. *Linn. Syst. Nat.* II. 504. 17? *Am. Acad.* 6. 411. 85?

Libellula carolina. *Drury Ins.* I. tab. 48. fig. 1.  
Habitat in America.

*capensis.* 24. L. alis patentibus, albidis, fusco undique maculatis: punctatisque. *Linn. Syst. Nat.* II. 904. 19.

*Scb. Mus.* 4. tab. 86. fig. 17.

Habitat ad Cap. B. Spei.

### 131. AESHNA. *Labium* trifidum: laciniis acqualibus; lateralibus apice fissis.

*forcipata.* 1. A. thorace nigro, characteribus variis flavescentibus, cauda unguiculata.

Libellula forcipata. *Linn. Syst. Nat.* II. 903. II. *Fn. Sv.* 1469.

Libellula thorace luteo, virescente, lineis nigris, abdomine nigricante, characteribus flavis. *Geoff. Ins.* 2. 228. 13.

*Petiv. Mus.* 84. n. 819.

*Reaum. Ins.* 4. tab. 10. fig. 4.

— — 6. tab. 35. fig. 5.

Habitat in Europa.

*grandis.* 2. A. thorace lineis quatuor flavis, corpore variegato.

Libellula grandis alis glaucescentibus, thoracis lineis quatuor flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 903. 9. *Fn. Sv.* 1467.

*Libellula fulva*, alis flavescentibus, thoracis lateribus lineis duabus flavis, fronte flavescente, cauda diphylla. *Geoff. Inf.* 2. 227. 12.

*Libella maxima*, vulgatissima, alis argenteis. *Raj. Inf.* 48. 1.

*Aet. Nidr.* 3. p. 412. tab. 6. fig. 9.

*Reaum. Inf.* 6. tab. 35. fig. 3.

*Roef. Inf.* 2. aqu. 2. tab. 4. fig. 14.

*Schaeff. Icon.* tab. 2. fig. 4.

Habitat in Europa.

Colores corporis pulcre variegati vita pereunt.

3. A. thorace lineis utrinque duabus flavis, alis basi **variegata**.  
macula alba.

Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Bankianum*.

Statura A. grandis. Caput fuscum, ore flavescente, puncto baseos nigro. Thorax flavesiens, lateribus sub alis fuscis, lineis duabus flavis. Abdomen cylindricum, ferrugineum, segmentorum marginibus nigris. Macula alba, linea nigra divisa, utrinque in singulo segmento. Alae albidae, macula parva alba ad marginem tenuiorem baseos. Macula ordinaria, fusca versus apicem.

4. A. abdomine clavato: basi gibbo, corpore fusco viride variegato. **clavata**.

Habitat in China. *Drury*.

Caput vesiculosum, viride. Thorax viridis, nigrolineatus. Abdomen elongatum basi, in primis subtus gibbum, viride, strigis nigris, medio attenuatum, nigrum, maculis lateralibus flavis, apice incrassatum, atrum, ano albo. Alae albae, puncto marginali fusco. Pedes nigri.

## 132. AGRION. *Labium quadrifidum*.

1. A. alis erectis, coloratis.

*virgo*.

*Libellula Virgo*. *Linn. Syst. N.* II. 904. 20. *Fn. Sv.* 1470.

2. Libellula corpore viridi-coeruleo, nitido, alis medio coerulecentibus: basi et apice albis, margine immaculato. *Geoff. Inf.* 2. 221. 1.

*Roef. Inf.* 2. aqu. 2. tab. 9. fig. 7.

*Raj. Inf.* 50. n. II.

*Schaeff. Elem.* tab. 78. fig. 1.

**β.** Libellula corpore sericeo, nitido, alis viridi-coerulecentibus, apice fuscis, margine immaculatis.  
*Linn. Fn. Sv. 1. 757.*

*Raj. Inf. 50. n. 10.*

*Reaum. Inf. 6. tab. 35. fig. 7.*

*Leuwenh. arc. 19. tab. 19.*

**γ.** Libellula viridi-sericea, alis subfuscis, puncto marginali albo. *Geoff. Inf. 2. 122. 2. Fn. Sv. 1. 758.*

*Roeß. Inf. 2. aqu. 2. tab. 9. fig. 6.*

*Raj. Inf. 51. n. 12.*

**δ.** Libellula corpore sericeo, nitido, alis inaurato-fuscis: macula nigra. *Linn. Fn. Sv. 1. 759.*

*Mouff. Inf. 68. fig. 1. 3.*

*Roeß. Inf. 2. aqu. 2. tab. 9. fig. 5.*

*Raj. Inf. 50. n. 9.*

Habitat in Europae fluviis frequens.

*puella.* **2.** A. alis erectis, hyalinis.

Libellula Puella. *Linn. Syst. Nat. II. 905. 21. Fn. Sv. 1471.*

**ε.** Libellula corpore coeruleo cinereoque alterno, alis puncto marginali nigro. *Geoff. Inf. 2. 222. 3.*

*Raj. Inf. 51. n. 15.*

*Reaum. Inf. 6. tab. 40.*

*Roeß. Inf. 2. aquat. 2. tab. 10. fig. 3. 4.*

*Sultz. Inf. tab. 17. fig. 102.*

**Ϛ.** Libellula corpore infra coeruleo-viridi, supra fusco, thorace fasciis fuscis coerulecentibusque alternis, puncto alarum marginali nigro. *Geoff. Inf. 2. 223. 4.*  
*Roeß. Inf. 2. aqu. 2. tab. 11. fig. 7.*

**ϛ.** Libellula corpore viridi, pallide incarnato, thorace fasciis tribus longitudinalibus nigris, alis puncto marginali fusco. *Geoff. Inf. 2. 224. 5.*

Habitat in pratis Europae paludosis, vicitans rapina muscarum.

Varietates harum specierum fere innumerae, at copula junguntur, ideoque haud distinctae.

133. IVLVS. *Labium crenatum, emarginatum.*

*Antennae clavato - monili-formes.*

1. I. pedibus utrinque 20. *Linn. Syst. Nat. II. 1064. 1. ovatus.*  
*Am. acad. 4. 253. 36. tab. 3. fig. 4.*

*Oniscus. Gronov. Zool. 995. tab. 17. fig. 4. 5.*  
 Habitat in Oceano europaeo.

2. I. pedibus utrinque 80. *Linn. Syst. Nat. II. 1065. 2. crassus.*  
*Amoen. acad. 4. 253. 35.*

Habitat in Asia.

Corpus pallescens, utrinque linea e punctis minutissimi nigris. Cauda acuta.

3. I. pedibus utrinque 100. *Linn. Syst. Nat. II. 1065. 3. terrestris.*  
*Fn. Sv. 2066. Geoff. Inf. 2. 679. 1.*

Iulus quartus glaber. *Raj. Inf. 46. 4.*

*Aldr. Inf. 636. fig. 4.*

*Frisch. Inf. 2. tab. 8. fig. 3.*

*Ionst. Inf. tab. 23.*

*Sultz. Inf. tab. 24. fig. 156.*

Habitat in Europa.

Pedes 176 s. 88 paria numerat Rajus.

4. I. pedibus utrinque 30, corpore planiusculo.

Iulus complanatus pedibus utrinque 30, corpore planiusculo, antennis clavatis. *Linn. Syst. Nat. II. 1065. 4. Fn. Sv. 2068.*

*Scolopendra fusca, pedibus utrinque triginta. Geoff.*

*Inf. 2. 675. 3.*

*Scolopendra julacea. Scop. carn. 1150.*

Iulus scolopendricus. *Pod. Inf. 127.*

Habitat in Europa, Anglia.

5. I. pedibus utrinque 36, ano tridentato.

Habitat in America. *Drury.*

I. fabuloso multo crassior. Segmenta corporis 18 grisea, puncto dorsali ferrugineo. Anus tridentatus, dente intermedio majori, acutiori. Pedes basi denticulis duobus.

*complanatus.*

*tridentatus.*

- sabulosus.* 6. I. pedibus utrinque 120. *Linn. Syst. Nat.* II. 1065. 5.  
*Fn. Sv.* 2067. *Geoff. Inf.* 2. 679. 2.  
 Iulo glabro affinis, lividis albisque circulis. *Raj. Inf.* 47.  
*Schaeff. Elem.* tab. 73.  
 Habitat in Europae corylo.  
 I. terrestri duplo major.
- stigma.* 7. I. pedibus utrinque 30, corpore atro: segmentis alternis utrinque puncto calloso, albo.  
 Habitat Tranquebariae. *Koenig.*  
 Duplo major I. complanato. Corpus antennis pedibusque atrum. Segmenta alterna utrinque stigmate calloso, elevato, albo. Cauda acuta, alba.
- carnifex.* 8. I. pedibus utrinque 94, capite, cauda, linea dorsali pedibusque sanguineis.  
 Habitat Tranquebariae. *Koenig.*  
 Statura I. fabulosi, at paulo major. Cauda acuminata.
- Indus.* 9. I. pedibus utrinque 115. *Linn. Syst. Nat.* II. 1065. 6.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. 90. *Mus. Lud. Ulr.* 462.  
*Gronov. Zooph.* 1008.  
*Seb. Mus.* 1. tab. 81. fig. 5.  
*Petiv. Gazoph.* tab. 74. fig. 3.  
 Habitat in Indiis.  
 Corpus ferrugineum, pedibus luteis.
- fuscus.* 10. I. pedibus utrinque 124. *Linn. Syst. Nat.* II. 1065. 7.  
*Amoen. acad.* 4. 253. 34.  
*Seb. Mus.* 2. tab. 24. fig. 4. 5.  
 Habitat in Indiis.
- maximus.* 11. I. pedibus utrinque 134. *Linn. Syst. Nat.* II. 1066. 8.  
 Vermis terrestris. *Marg. bras.* 255.  
*Lift. It.* 1699. tab. 5.  
 Habitat in America.  
 Praecedenti affinis.

134. SCOLOPENDRA.

*Palpi filiformes, inter maxillas connati.*

*Labium dentatum, fissum.*

*Antennae setaceae.*

1. S. pedibus utrinque 12, corpore ovali, cauda penicillo albo. *Linn. Syst. Nat. II. 1062. 1. Fn. Sv. 2063.*

*Geoff. Inf. 2. 677. 6. tab. 22. fig. 4.*

Iulus Lagurus. *Scop. carn. 1152.*

*Aet. par. miss. 1. p. 532. tab. 17. fig. 4 — 10.*

Habitat in Europa sub muscis.

2. S. pedibus utrinque 14 elongatis, thorace scutellato. *coleoptrata.*  
Scolopendra coleoptrata pedibus utrinque 14, thorace *coleoptrata.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 1062. 2.*

Habitat in Europa australi.

3. S. pedibus utrinque 15. *Linn. Syst. Nat. II. 1062. 3. forficata.*  
*Fn. Sv. 2064. Geoff. Inf. 2. 674. 1.*  
*Sulz. Inf. tab. 24. fig. 155.*  
*Schaeff. Elem. tab. 3. fig. 1.*

Habitat in Europa, America.

4. S. pedibus utrinque 17. *Linn. Syst. Nat. II. 1063. 4. gigantea.*  
Scolopendra maxima pedibus 36. *Brown. Iam. 426.*  
*tab. 42. fig. 4.*

Habitat in America.

Affinis sequenti, at multo major.

5. S. pedibus utrinque 20, oculis octo. *Linn. Syst. Nat. II. 1068. 5. morsitans.*  
*Amoen. acad. 1. 325. 506.*

*Olear. Mus. tab. 12. fig. 5.*

*Petiv. Gazoph. tab. 13. fig. 3.*

*Bradl. nat. tab. 25. fig. 4.*

*Seb. Mus. 1. tab. 81. fig. 3. 4.*

— — 2. tab. 25. fig. 3. 4.

*Frisch. Inf. 2. tab. 2. fig. 7.*

*Catesb. Carol. 3. p. 2. tab. 2.*

Habitat in Indiis.

- ferrugi-* 6. S. pedibus utrinque 22. *Linn. Syst. Nat.* II. 1068. 6.  
*nea.* Habitat in Africa.  
 Corpus ferrugineum, pedibus luteis.
- Gabrielis.* 7. S. pedibus utrinque 148. *Linn. Syst. Nat.* II. 1063. 7.  
 Habitat in Italia.  
 Statura S. electricae, at quadruplo major, tota de-  
 pressa, flavescens.
- electrica.* 8. S. pedibus utrinque 70, corpore linear. *Linn. Syst.*  
*Nat.* II. 1068. 8. *Fn. Sv.* 2065. *Geoff. Inf.* 2. 676. 2.  
*Aldr. Inf.* 636. fig. 8.  
*Frisch. Inf.* 2. tab. 8. fig. 1.  
*Raj. Inf.* 45.  
 Habitat in Europa, in tenebris electrica s. lucens per se.
- phospho-* 9. S. pedibus utrinque 76. *Linn. Syst. Nat.* II. 1064. 9.  
*rea.* Habitat in Asia, noctu instar Lampyridis ignita, ex  
 alto coelo decidua in navem, in mari indico et  
 aethiopico 100 milliaribus a continente. *Linn.*
- Occiden-* 10. S. pedibus utrinque 123. *Linn. Syst. Nat.* II. 1064. 10.  
*talis.* *Lift. It.* 1699. tab. 6.  
 Habitat in America.  
 Corpus ferrugineum. Antennae articulis 14.
- marina.* 11. S. pedibus - - -, corpore pallido: linea dorsali  
 rufa. *Linn. Syst. Nat.* II. 1064. 11. *It. Wgotb.* 191.  
 Norweg. Roedaat. *Stroem. Sundm.* 1.  
 Habitat in Oceano atlantico.  
 Clupearum Harengarum esca, unde abdomen piscium  
 rufescit et corpus brevi pubescit. *Stroem.* I. c.

135. TROMBIDIVM. *Palpi* incurvi, apice acu-  
 tissimi, os tegentes.  
*Labium* concavum, ma-  
 xillas recipiens.

- tinctori-* 1. T. abdomine rubro, hirsuto, postice obtuso, tibiis  
*um.* anterioribus pallidioribus.  
*Acarus tinctorius.* *Linn. Syst. Nat.* II. 1025. 20.  
 Habitat in Guinea.  
 Corpus undique hirsutissimum, rubrum.

2. T.

2. T. abdomine sanguineo, depresso, tomentoso, postice retuso, terrestris.

Acarus holosericeus. *Linn. Syst. Nat.* II. 1025. 22.  
*Fn. Sv.* 1979.

Acarus terrestris ruber, abdomine depresso. *Geoff. Inf.*

2. 624. 7.

*List. Aran.* fig. 38.

*Roes. Inf.* 4. tab. 38.

*Blank. Inf.* tab. 14. fig. I.

Habitat in Europae, Americae siccis.

3. T. abdomine sanguineo, depresso, tomentoso, postice obtuso, aquaticus.

Acarus aquaticus. *Linn. Syst. N.* II. 1025. 21. *Fn. Sv.* 1978.

Acarus aquaticus ruber, abdomine depresso. *Geoff. Inf.* 2. 625. 8.

*Frisch. Inf.* 8. tab. 3.

*Roes. Inf.* 3. tab. 25.

*Sultz. Inf.* tab. 22. fig. 147.

Habitat in Europae aquis dulcibus, velociter natans,  
ova rubra in nepis ponens.

### 136. ARANEA. *Palpi* incurvi, maris clavati.

*Labium* breve, apice rotundatum.

\* *Oculis* ::::

1. A. abdomine longo, argenteo, virescente, pedibus longitudinaliter extensis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1033. 22. *extensa.*

*Fn. Sv.* 2011.

*Geoff. Inf.* 2. 642. 3.

*Raj. Inf.* 19. 3.

*List. aran.* fig. 3.

Habitat in uliginosis, sylvaticis.

Caput, thorax et pedes rufescens. Pedes semper extensi, anteriores longissimi, tertii parvis breves.

2. A. abdomine globoso, gibbo, ambitu sexdentato. *cancriformis.*

Aranea cancriformis abdomine semiorbiculato, ambitu sexdentato. *Linn. Syst. Nat.* II. 1037. 45.

Araneus cancriformis campestris, reticulum spirale nectens. *Sloan. Iam.* 2. 197. tab. 235. fig. 4.

Aranea

*Aranea nigra cancriformis. Brown. Iam. 419. tab. 44.  
fig. 5. Slabber. obs. microsc. tab. 1.*

Habitat in America.

Media, nigra, abdomine magno ferrugineo, punctis nigris impresso.

*latens.* 3. A. atra, abdomine cinerascente: linea dorsali atra, interrupta.

Habitat in Anglia, latitans sub parvo reticulo in foliolum pagina superiori.

Parva. Caput et thorax atra, pubescentia. Abdomen basi gibbum, ovatum, tomento cinereo vestitum, linea dorsali atra, postice latiori, interrupta. Pedes atri.

*maestans.* 4. A. abdomine ovato, atro: linea dorsali coccinea.

Habitat in America. *Lewin.*

Parva. Thorax et pedes obscure fusi. Abdomen ovatum, atrum, linea dorsali coccinea.

Aliam vidimus simillimam, at paulo majorem, abdome punctis duorum parium quoque coccineis.

*Nigrita.* 5. A. atra, abdomine subtus punctis duobus testaceis.

Habitat Dresdae.

Media. Corpus atrum, nitidum, glabrum. Puncta duo testacea, subtus ad basin abdominalis. Pedes apice pallidi.

\* \* \* *Oculis* . . . . .

*globosa.* 6. A. nigra, abdominalis lateribus sanguineis.

Habitat in pratis Lipsiensibus.

Corpus parvum, nigrum. Abdomen globosum, lateribus sanguineis, dorso nigro, in medio fascia interrupta, alba.

\* \* \* *Oculis* . . . . .

*borrida.* 7. A. abdomine subtriangulari, apice truncato, retuso, pedibus quatuor anticis longioribus.

Habitat in Lipsiae hortis.

Major: singularis structurae: Latera frontis parum elevata. Corpus fuscum. Thoracis dorsum argenteum cingitur linea alba. Abdomen triangulare, basi angustum, apice multo latius, truncatum et valde retusum.

retusum. Anus sub abdomine elevatus, albus. Latera abdominis rugosa. Pedes quatuor anteriores duplo longiores, fusci, tibiis albo annulatis, postici virescentes.

8. A. abdomine ovato, fusco: maculis nigris quinque *domestica*. subecontiguis, anterioribus majoribus. *Linn. Syst. Nat. II. 1031. 9. Fn. Sv. 2000.*

*Aranea Derhamii. Scop. carn. 1104.*

*Raj. Inf. 27. 17.*

*List. aran. 59. fig. 17.*

*Clerk. aran. 76. tab. 2. fig. 9.*

Habitat in Europae fenestris et domibus.

9. A. virescens, abdomine albo: ano rufescente.

Habitat Lipsiae.

Caput, thorax et pedes virescentes. Oculi inprimis laterales elevati. Abdomen ovatum, album, ano rugoso, rufescente. Linea longitudinalis abbreviata et duae obliquae laterales rufae, quae in medio abdominis fere coeunt.

*tricuspidata.*

\*\*\*\* *Oculis :*

10. A. abdomine albo, postice fusco: ambitu sex-dentato. *argentata.*

Habitat in Indiis.

Magna. Thorax argentatus, subpubescens. Abdomen subovatum, antice album, postice fuscum, punctis duobus albis. Margo utrinque dentibus tribus validis armatus. Pedes pallidi, fusco annulati.

\*\*\*\*\* *Oculis :*

11. A. argentea, abdomine fasciis flavescentibus, pedibus fusco annulatis. *fasciata.*

Habitat in insula Madera. *Mus. Bankianum.*

Magna. Caput et thorax argentea, immaculata. Abdomen argenteum, fasciis quinque flavescentibus, fusco terminatis. Pedes octo testacei, annulis plurimis fuscis.

- angulata.* 12. A. abdomine ovato, antice lateribus angulato, acuto, thoracis centro excavato. *Linn. Syst. Nat.* II. 1031. 8.  
*Fn. Sv.* 1999.  
*Clerk. aran. Suec.* tab. I. fig. I.  
 Habitat in arboribus, rete perpendiculari.  
 Variat colore.
- diadema.* 13. A. abdomine subgloboso, rubro-fusco: cruce albo-punctata. *Linn. Syst. Nat.* II. 1030. I. *Fn. Sv.* 1993.  
*Aranea Linnaei.* *Scop. carn.* 1077.  
*Mouff. Inf.* 233. fig. 1.  
*Aldr. Inf.* 608. fig. 9.  
*Ionst. Inf.* tab. 18. fig. 17. 19. 20.  
*Raj. Inf.* 18. 2.  
*Lift. aran.* fig. 2.  
*Frisch. Inf.* 7. tab. 4.  
*Clerk. aran.* tab. 21. fig. 2.  
*Schaeff. Elem.* tab. 21. fig. 2.  
 — — *Icon.* tab. 19. fig. 9.  
 Habitat in Europae arboribus.
- marmo-reia.* 14. A. fusca, abdomine ovato, fusco alboque variegato.  
*Clerk. aran.* tab. I. fig. 2.  
 Habitat in Europa, nidum in fruticibus et graminibus struens, attractis insectorum cadaveribus.  
 Praecedenti valde affinis. Corpus magnum, fuscum. Abdomen glabrum, variegatum. Pedes fusci, geniculis nigris.
- 4 punctata.* 15. A. abdominis dorso plano, nigro: punctis excavatis quatuor.  
*Aranea 4 punctata* abdomine oblongo, nigro: punctis excavatis quatuor. *Linn. Syst. Nat.* II. 1034. 28.  
*Fn. Sv.* 2014. *It. oel.* 34.  
 Habitat in Europae domibus.
- militaris.* 16. A. spinis dorsalibus quatuor, posticis longioribus patentibus.  
 Habitat in America. *v. Rohr.*  
 Statura omnino A. spinosae. Spinae duae anticae abdominis erectae, nigrae. Anus sub abdomine conicus.

17. A. spinis dorsalibus octonis: posticis duabus patentibus, abdomine subtus conico. *Linn. Syst. Nat. II.* 1037. 47. *spinosa.*  
 Habitat in America.  
 Media, obscure fusca.
18. A. spinis dorsalibus sex, posticis patentibus. *aculeata.*  
 Habitat in America. *Mus. Bankianum.*  
 Caput et thorax brunnea s. obscure ferruginea, immaculata, laevia. Abdomen antice fuscum, spinis duabus dorsalibus elongatis, erectis; postice impressum, flavescens, spinis quatuor anterioribus lateralibus brevissimis, posticis porrectis, divergentibus, conicis, brunneis, apice atris. Abdomen subtus fuscum, rugosum, ano conico, prominulo, truncato, annulato. Pedes ferruginei.
19. A. abdome globose, ambitu quadridentato. *Linn. tetractatha.* *Syst. Nat. II.* 1037. 45.  
 Habitat in Americae insulis.  
 Caput et thorax ferruginea. Abdomen basi punctis nigris impressum.
20. A. abdome utrinque fornicato, bispinoso: posterioribus longioribus. *fornicata.*  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*  
 Media. Caput et thorax nigra, immaculata. Pectus flavescens. Abdomen lateribus valde dilatatis, fornicatis, spinis duabus ferrugineis, anteriore ad basin acuta, brevi, posteriore validissima, porrecta, acuta. Margo posticus itidem spinis duabus aequalibus, subulatis, ferrugineis. Color abdominis testaceus, basi apiceque obscurioribus maculis annularibus elevatis, fuscis. Pedes fusi.
21. A. abdome ovato, fuso: linea exalbida, pinnata. *labyrinthica.* *Linn. Syst. Nat. II.* 1031. 12. *Fn. Sv. 2003.*  
*Clerk. aran. 79. tab. 2. fig. 8.*  
*Raj. Inf. 27. 18.*  
*Lift. aran. 60. fig. 18.*  
*Schaeff. Icon. tab. 19. fig. 8.*  
 Habitat in terra, tela horizontali cum puteo cylindrico. *Linn.*

- aquatica.* 22. A. fusca, abdomine ovato, cinereo: dorso fuso, punctis duobus impressis.  
*Aranea aquatica* livida, abdomine ovato: linea transversa punctisque duobus excavatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1036. 39. *Fn. Sv.* 2020.  
*Aranea aquatica*, tota fusca. *Geoff. Inf.* 2. 644. 7?  
*Clerk. aran.* 143. tab. 6. fig. 8.  
*Habitat* in Europae aquis dulcibus, urinatoria. *Hibernat* in cochleis, quas rete artificioso claudit.  
*Major.* Maxillae prominentes, validae, atrae, unguibus sanguineis.
- trigutta-ta.* 23. A. flavescens, abdomine nigro: maculis tribus albis. Capta tempore autumnali in foliis Viburni Alsatiae.  
*Prof. Hermann.*  
*Parva.* Caput et thorax flavescens, immaculata. Abdomen ovatum, postice acutiusculum, subholofericum, nigrum, in medio punctis tribus albis, quae fere fasciam constituunt. Pedes flavi, tertii parisi brevissimi.
- scorpifor-mis.* 24. A. nigra, abdomine albicante: lineis duabus nigris, pedibus quatuor anticis longissimis.  
*Habitat* in Lipsiae hortis, laterigrada.  
*Parva, nigra.* Frons parum rufescit. Abdomen ovatum, glabrum, albicans lineolis duabus, sinuatis, abbreviatis, nigris. Pedes quatuor antici reliquis duplo longiores, nigri, albo annulati. Postici brevissimi, virides.
- sex pun-ctata.* 25. A. abdomine oblongo: punctorum excavatorum paribus tribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 1033. 24. *Fn. Sv.* 2013.  
*Habitat* in Europae sylvis.
- carnifex.* 26. A. ferruginea, abdomine cinereo: linea dorsali fusca.  
*Habitat* in Anglia.  
*Media.* Caput ferrugineum, maxillis atris. Thorax ferrugineus, laevis, glaber, margine parum flavescente. Abdomen subrotundum, cinereum, linea dorsali lata, fusca. Subtus utrinque macula baseos flava. Pedes pallidi.

\*\*\*\*\* *Ocu-*

\*\*\*\*\* *Oculis* ::.

27. A. abdomine oblongo, tibiis, excepto tertio pari, *clavipes*.  
clavatis, villosis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1034. 24.

*Aranea oblonga*, luteo-variegata, pedibus longissi-  
mis, articulis inferioribus tumidis, hirsutis. *Brown.*  
*Iam.* 419. tab. 44. fig. 4.

Habitat in America.

Abdomen flavum, albo punctatum.

28. A. abdomine ovato, ferrugineo-fusco. *Linn. Syst. saccata.*  
*Nat.* II. 1036. 40. *Fn. Sv.* 2021.

*Lifl. aran.* 82. fig. 28.

*Frisch. Inf.* 8. tab. 2.

*Clerk. aran.* tab. 4. fig. 5.

Habitat in Europae hortis, ovorum saccum circum-  
ferens.

Pedes lividi, annulis fuscis confertis, inaequalibus.

29. A. abdomine ovato, fusco: basi punctis duobus albis. *fumigata.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 1032. 16. *Fn. Sv.* 2006.

*Clerk. aran.* tab. 5. fig. 6.

Habitat in campis ante larvarum nidum incubans,  
quas unam post alteram prehendit et exfugit.

\*\*\*\*\* *Oculis* :::

30. A. nigra, linea laterali alba.

*fimbriata.*

*Aranea fimbriata* abdomine oblongo, nigro: linea  
utrinque laterali alba. *Linn. Syst. Nat.* II. 1033. 23.  
*Fn. Sv.* 2012.

*Aranea tota* cinereo-villosa, thoracis linea triplici  
alba. *Geoff. Inf.* 2. 650. 15.

*Clerk. aran.* tab. 5. fig. 9.

Habitat in Europae paludibus caespitosis.

31. A. atra, thorace linea dorsali alba.

*dorsalis.*

Habitat in Anglia.

*Parva, atra.* Thorax compressus, linea dorsali alba.

Abdomen ovatum, atrum, basi parum albicans.

Pedes lividi.

- seenica.* 32. A. saliens, nigra: striis tribus semicircularibus, albis.  
*Linn. Syst. Nat.* II. 1035. *Fn. Sv.* 2017.  
 Aranea saliens, nigra, abdomine utrinque lineis tribus albis, ad angulum acutum coeuntibus. *Geoff. Inf.* 2. 650. 16.  
*List. aran.* fig. 31.  
*Raj. Inf.* 37. 31.  
*Bradl. nat.* tab. 24. fig. 5.  
*Clerk. aran.* tab. 5. fig. 13.  
*Schaeff. Icon.* tab. 44. fig. 11.  
 Habitat in Europae parietibus.

- pubescens.* 33. A. abdomine ovato, fuscō: maculis quatuor cinereis, posticis majoribus.  
 Habitat Lipsiae.  
 Media. Corpus pubescens, fuscum, cinereo variegatum. Abdomen ovatum, dorso fuscō, maculis quatuor cinereis distinctis, posticis majoribus. Palpi pilosi. Oculi secundi paris minutissimi.

- Taran-tula.* 34. A. abdominis dorso maculis trigonis nigris, pedibus nigro maculatis.  
 Aranea Tarantula subtus atra, pedibus subtus atro fasciatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1035. 35.  
 Tarantola. *Bocc. Mus.* I. 101. tab. 2.  
*Albin. aran.* 64. tab. 38.  
*Bradl. nat.* tab. 24. fig. 10.  
*Olear. Mus.* 21. tab. 12. fig. 4.  
 Habitat in Europa australi.

\*\*\*\*\* \* Oculis : :

- avicula-ria.* 35. A. thorace orbiculato, convexo: centro transverse excavato. *Linn. Syst. Nat.* II. 1034. 31. *Mus. Lud. Ulr.* 428.  
*Linn. Amoen. acad.* I. 323.  
*Laet. amer.* tab. 570  
*Worm Mus.* tab. 244.  
*Seb. Mus.* I. tab. 69. fig. 2. 3.  
*Olear. Mus.* tab. 17. fig. 3.  
*Merian. sur.* tab. 18.  
*Roef. Inf.* 3. tab. 11.  
 Habitat in America, insidiatur aviculis, insectis.

\*\*\*\*\*

\*\*\* \*\*\* \*\*\* *Oculis tantum senis* . . . . .

36. A. abdomine virescente: lateribus flavis. *senocula-*

*Aranea senoculata oculis tantum senis. Linn. Syst. Nat. ta.*

II. 1034. 30. *Fn. Sv. 2036.*

*Lifler. aran. 74. fig. 24.*

*Raj. Ins. 32. 24.*

Habitat in Germaniae hortis.

Caput, thorax et pedes pallide ferruginea. Pedes tertii paris breviores, reliqui aequales. Abdomen virescens, linea laterali flavicante, punctis quinque nigris. Puncta quatuor nigra, dorso impressa et infra haec maculae quatuor pallidae, obsoletae. Anus sanguineus.

37. A. pallida, abdomine argenteo: lineis ramosis, nigris. *lufca.*

Habitat Tranquebariae. *Koenig.*

Caput et thorax pallide testacea. Abdomen oblongum, argenteum, linea dorsali ramosa, et laterali majori trifurca, nigris. Anus prominens, conicus, niger. Pedes longiusculi, pallide testacei.

† *Oculis - - - -*

38. A. atra, abdomine fascia baseos flava, pectore *cruentata.* fanguineo.

Habitat ad Rio Ianeiro Brasiliae. *Mus. Dom. Banks.*

Magna, atra. Thorax immaculatus. Abdomen ovatum, supra fascia baseos flava, subtus maculis decem flavescentibus. Pectus sanguineum. Pedes nigri.

39. A. thorace orbiculato, glabro, atro, abdomine ova- *venatoria.* to, fusco, pubescente.

*Aranea venatoria* subhirsuta, thorace orbiculato, convexo, abdomine ovato, magnitudine thoracis.

*Linn. Syst. Nat. II. 1035. 33.*

*Gronov. Zooph. 2. 217.*

*Merian. Sur. tab. 18.*

*Sloan. Iam. 2. 181. tab. 235. fig. 1. 2.*

*Brown. Iam. 420. tab. 44. fig. 2.*

Habitat in America. Nidum struit cylindricum, tenacem, longitudine pedis, superne operculo claudendum.

137. PHALANGIVM. *Palpi porrecti, incurvi.*

*Maxilla superior, chelifera.*

*grossipes.* 1. P. corpore minuto, cylindrico, humeris tuberculatis, pedibus longissimis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1027. 1.

*Phalangium marinum.* *Servom. Sondm.* 208. tab. I. fig. 16.

Habitat in mari Norwegico: tardissimum, Mytilorum testas penetrat et exhaustit.

*opilio.* 2. P. abdomine ovato, subtus albo. *Linn. Syst. Nat.* II. 1027. 2. *Fn. Sv.* 1992.

*Araneus rufus, non cristatus.* *Raj. Inf.* 40. 35.

*Goed. Inf.* 2. tab. 49.

*Mouff. Inf.* 234. fig. 4.

*Hoeffn. Inf.* 2. tab. 9.

*Bradl. nat.* tab. 24. fig. 2.

*Clerk. aran.* tab. 6. fig. 10. 3.

*Sultz. Inf.* tab. 22. fig. 140.

Habitat in Europa, America, nocte vagatur.

*cornutum,* 3. P. abdomine depresso, maxilla conica ascendentē, palpis pediformibus.

*Phalangium cornutum* abdomine depresso, rostro bicorni, palpis pediformibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 1028. 3.

*Phalangium.* *Geoff. Inf.* 2. 629. 1. tab. 20. fig. 6.

*Araneus cinereus, cristatus.* *Raj. Inf.* 39. 35.

*Schaeff. Elem.* 13. fig. 9.

— — *Icon.* tab. 39. fig. 13.

Habitat in Europa, Anglia.


*bimaculatum.* 4. P. abdomine atro: maculis duabus albis.

Habitat in Anglia. Capt. die VI. Maj.

Triplo minus praecedentibus. Corpus ovatum, atrum, maculis duabus oblongis, albis ad basin abdominalis. Linea submarginalis tenuissima, alba, abdomen cingit. Pedes elongati, atri.

5. *P. chelis ramosis*, ano setifero. *Linn. Syst. Nat. II. caudatum.*  
1029. 8. *Mus. Lud. Ulr.* 426.  
*Scorpio. Gronov. Zooph.* 952.  
*Seb. Mus.* I. tab. 70. fig. 7. 8.  
 Habitat in India orientali.
6. *P. brachiis dentatis*, pedibus primis longissimis filiformibus, thorace reniformi. *Linn. Syst. Nat. II.*  
1029. 9. *Mus. Lud. Ulr.* 427.  
*Phalangium palpis longissimis, crassis. Gronov.*  
*Zooph.* 935.  
*Tarantula fusca major*, pedibus anterioribus crassioribus, aculeatis et unguiculatis, fere cheliformibus, proximiis longissimis et tenuissimis. *Brown. Iam.*  
409. tab. II. fig. 3.  
*Cancellus araneoides. Pet. pteriog.* tab. 20. fig. 12.  
 Habitat in Carolina, Iamaica.  
 Ultimae duae species habitu ab hoc genere differunt. An proprii generis?





## VI. GLOSSATA.

*Os palpis linguaque spirali.*

- 
138. PAPILIO. *Palpi duo reflexi.  
Lingua spiralis, exserta.  
Antennae clavatae.*

*\* Equites Troes.*

- Paris.* 1. P. E. T. alis caudatis, nigris, posticis macula cyanea ocelloque purpureo; subtus ocellis septem. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 745. 3. *Mus. Lud. Ulr.* 184.  
Papilio Paris. *Clerk. Icon.* tab. 13. fig. 1.  
*Knorr. Delic.* tab. C. 3. fig. 1.  
*Drury Ins.* I. tab. 12. fig. 1.  
Habitat in Asia.
- 

Papiliones dividuntur in VI Phalanges.

- a. *Equites* alis anticis ab angulo postico ad apicem longioribus, quam ad basin.  
— *Troes* ad pectus maculis sanguineis aut nigris.  
— *Achivi* pectore incruento, ocello ad angulum ani.
- b. *Heliconii* alis angustis, integerrimis, anticis oblongis.
- c. *Parnassii* alis rotundatis, denudatis.
- d. *Danai* alis integerrimis.  
— *Candidi* alis albidis.  
— *Festivi* alis variegatis.
- e. *Nymphales* alis denticulatis.  
— — *Gemmari* alis ocellatis.  
— — *Phalerati* alis coecis absque ocellis.
- f. *Plebeji* parvi; larva saepius contracta.  
— *Rurales* alis maculis obscurioribus.  
— *Urbicolae* alis saepius maculis pellucidis.

2. P. E. T. alis caudatis, nigris, concoloribus, posticis macula quinduplici alba lunulisque rubris, corpore nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 746. 5. *Mus. L. U.* 186. *Polytes.*  
 Papilio Polytes. *Clerk. Icon.* tab. 14. fig. 1.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 27. fig. 23. 24.  
 — — — tab. 46. fig. 17. 18.  
 Habitat in Asiae Chalcas. *Koenig.*
3. P. E. T. alis caudatis, nigris, concoloribus: posticis fascia maculari alba lunulisque rubris, capite caudaque sanguineis. *Aristolochiae.*  
 Habitat in Aristolochiis Indiae orientalis. *Mus. Tot-tianum.*  
 Statura et nimia affinitas praecedentis, at caput, latera corporis et apex abdominis sanguinea.
4. P. E. T. alis caudatis, nigris, concoloribus: anticus fascia alba; posticis maculis rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 745. 2. *Mus. Lud. Ulr.* 181. *Hector.*  
 Papilio Hector. *Clerk. Icon.* tab. 33. fig. 1.  
 Papilio Indica maxima, nigra. *Raj. Ins.* 134. 137.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 28. fig. 23. 24.  
 Habitat in Indiis.
5. P. E. T. alis caudatis, nigris: posticis macula alba lunulaque duplice purpurea. *Helenus.*  
 Papilio Helenus E. T. alis caudatis, nigris: posticis macula alba: subtus tribus albidis lunulisque septem ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 745. 4. *Mus. Lud. Ulr.* 185.  
 Papilio Helenus. *Clerk. Icon.* tab. 13. fig. 2.  
*Ehret. piēt.* tab. 10.  
*Edw. Av.* tab. 342.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 46. fig. 17. 18.  
 Habitat in Asia.  
 Ocellus purpureus ad angulum ani et sub' ocello luna rubra.
6. P. E. T. alis caudatis, concoloribus, atris, albo-maculatis: posticis lunulis marginalibus rubris. *Antenor.*  
 Papilio Antenor. *Drury Ins.* 2. tab. 3. fig. 1.  
 Habitat in India. *Magnus.*

Magnus. Caput sanguineum, antennis obtusis, nigris.  
 Thorax niger. Abdomen albidum, fasciis sanguineis. Alae concolores, atrae, maculis sparsis albis, numerosis. Posticae basi albo-maculatae et ad marginem lunulis quatuor rufis. Angulus ani albidus, lunula rufa.

*Troilus.* 7. P. E. T. alis caudatis, nigris: anticis punctis marginalibus pallidis: posticis supra pallido-subtus fulvo-maculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 746. 6. *Mus. L. U.* 187.

*Drury Ins.* I. tab. II. fig. 2. 3. 5.

*Petiv. Mus.* 51. n. 523.

Habitat in Indiis.

Macula ferruginea ad marginem tenuiorem alae posticae et altera ad angulum ani.

*Deiphobus.* 8. P. E. T. alis caudatis, nigris, subtus basi rubra maculatis, posticis maculis septem rubris, subannularibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 746. 7. *Mus. L. U.* 188.

Papilio Deiphobus. *Clerk. Icon.* tab. 25.

Papilio Luzonicus maximus nigrescens, maculis coccineis. *Petiv. Gazoph.* tab. II. fig. 8.

*Seb. Mus.* 4. tab. 47. fig. 5. 6.

*Edw. Av.* tab. 346.

Habitat in Asia.

*Pelaus.* 9. P. E. T. alis caudatis, atris: anticis fascia, posticis lunulis marginalibus albis punctisque duobus rubris.

Habitat in India. *Drury.*

Parvus. Antennae nigrae, obtusae. Pectus nigrum, utrinque macula sanguinea. Alae anticae dentatae, concolores, fuscae, fascia media submaculari lunulisque tenuissimis marginalibus, albis. Posticae supra lunulis majoribus marginalibus, albis punctisque duobus rubris; subtus punctis sex rubris ante marginem lunulisque marginalibus albis.

*Polyxenes.* 10. P. E. T. alis caudatis, atris: fasciis duabus macularibus flavis, angulo ani fulvo, puncto nigro.

Habitat in America.

Affinis P. Troilo. Alae anticae nigrae, fasciis duabus parallelis macularibus flavis et margine flavo variegato. Posticae atrae, fasciis flavis anguloque ani

ani fulvo, puncto nigro. Subtus concolores, at maculae majores magis fulvae.

11. P. E. T. alis caudatis, nigris, coeruleo maculatis: *Phorban-*  
posticarum fascia interrupta, subtus alba. *Linn. ta.*  
*Mant. I. 535.*

*Aub. miscell. tab. 43. fig. I. 2.*

Habitat in Cajenna.

12. P. E. T. alis caudatis, nigris: posticis virescenti-  
nitidis; subtus maculis septem rubris, subocel-  
laribus. *Philenor.*

*Papilio Philenor. E. T. alis caudatis, nigris: posticis  
subtus nitenti-cyaneis: ocellis septem concatenatis.  
Linn. Mant. 535.*

*Papilio Astenous. Drury Inf. I. tab. II. fig. I. 4.*

Habitat in America.

Corpus nigrum, magnitudine P. Troili. Abdomen  
albo punctatum. Alae anticae nigrae, margine  
albo nigroque vario, posticae virescentes, nitidae,  
punctis aliquot albis, obsoletis, margineque albo  
variegato: subtus basi nigrae, puncto albo, postice  
virescentes, maculis septem orbiculatis, fulvis,  
annulo nigro cinctis et puncto parvo lateraliter  
albo notatis.

13. P. E. T. alis caudatis, concoloribus, nigris, mar-  
gine maculatis: posticis fascia maculis septem albis. *Pammon.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 746. 8. Mus. Lud. Ulr. 189.*

*Papilio Pammon. Clerk. Icon. tab. 14. fig. 2.*

*Klemann. Inf. I. tab. 2. fig. 2. 3.*

*Seb. Mus. 4. tab. 27. fig. 21. 22.*

— — 41. fig. II. 12.

*Aubent. miscell. I. tab. 43. fig. I.*

Habitat in Chalcas Asiae. *Koenig.*

Invenitur interdum ecaudatus.

14. P. E. T. alis subcaudatis, nebulosis, concoloribus: *glaucus.*  
anticis macula flava; posticis macula ani fulva.

*Linn. Syst. Nat. II. 746. 9. Mus. Lud. Ulr. 190.*

*Papilio Glaucus. Clerk. Icon. tab. 24. fig. I.*

*Klemann. Inf. I. tab. 8. fig. I. 2.*

Habitat in America.

Alae posticae subtus lunulis rufis flavisque.

*Polydorus.* 15. P. E. T. alis subcaudatis, nigris, concoloribus: posticis macula alba futuris sexfida lunulisque septem rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 746. 10. *Amoen. acad.* 6. 401. 40.

*Papilio Polydorus.* *Clerk. Icon.* tab. 23. fig. 2.

*Seb. Mus.* tab. 28. fig. 21. 22.

Habitat in India.

*Priamus.* 16. P. E. T. alis denticulatis, holosericeis: anticis supra viridibus, macula atra; posticis maculis sex nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 744. 1. *Mus. Lud. Ulr.* 182. *Amoen. Acad.* 5. tab. 3.

*Papilio Priamus.* *Clerk. Icon.* tab. 17.

*Papilio amboinensis* viridi et nigro holosericeus, insignis. *Vincent. Mus.* 10.

*Papilio* f. *Atlas amboinensis*, alis superioribus holoserice-nigris: institis viridibus. *Mus. Petrop.* 664. *Aubent. miscell.* 1. tab. 45.

Habitat in Amboina.

*Memnon.* 17. P. E. T. alis dentatis, nigris: posticis subtus macula difformi rubra anguli ani.

*Papilio Memnon* E. T. alis dentatis, nigris: omnibus basi subtus rubro notatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 747. 13. *Mus. Lud. Ulr.* 193.

*Petiv. Gazoph.* tab. II. fig. 8.

*Raj. Inf.* 135.

*Seb. Mus.* 4. tab. 5. fig. 6.

— — tab. 16. fig. 10. 11.

Habitat in China.

Variat alis basi subtus maculatis et immaculatis.

*Agenor.* 18. P. E. T. alis dentatis, nigris, basi sanguineis: posticis disco albo, maculis nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 747. 14. *Mus. Lud. Ulr.* 194.

*Papilio Agenor.* *Clerk. Icon.* tab. 15.

*Seb. Mus.* 4. tab. 46. fig. 11. 12. 19. 20.

Habitat in China.

*Achilles.* 19. P. E. T. alis dentatis, nigris, concoloribus: posticis maculis septem coccineo-ovatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 746. 11. *Mus. Lud. Ulr.* 191.

Papi-

**Papilio Anchises.** *Clerk. Icon.* tab. 29. fig. 1.

*Merian. Sur.* tab. 17.

*Sloan. Iam.* 2. 216. tab. 239. fig. 19. 20.

*Edw. Av.* tab. 207.

*Ehret. Piſt.* tab. 9.

*Seb. Muſ.* 4. tab. 7. fig. 27. 28.

— — tab. 11. fig. 11. 12.

Habitat in citro Americes.

Larva gregaria, flavo tentaculata, spinosa, fusca, albo-annulata.

Puppa brunnea, antice quatridentata.

20. P. E. T. alis dentatis, nigris: posticis limbo coerulecente, fascia nigra, subtus fulvo-maculatis. *Aſlyanax.*

Habitat in America. *Muſ. D. Hunter.*

Parvus. Alae anticae nigrae, margine stria punctorum ferrugineorum alborumque, subtus concolores, inaculis duabus fulvis, annulo atro cinctis ad marginem crassiorem. Posticae supra fuscae, apice coerulecentes, fascia strigaque marginali nigris: subtus fuscae, maculis quatuor fulvis, annulo atro cinctis ad basin, et stria e punctis septem fulvis versus apicem. Margo alae albo maculatus.

21. P. E. T. alis dentatis, fuscis, fascia viridi: posticis subtus linea baseos maculisque quinque viridibus. *Sarpedon.*

*Linn. Syst. Nat.* II. 747. 15. *Muſ. L. U.* 196.

*Seb. Muſ.* 4. tab. 37. fig. 3. 4. 15. 16.

Habitat in Asia.

22. P. E. T. alis dentatis, nigro-aeneis, fascia maculari flava: posticis subtus lunulis flexuosis, rubris. *Polydamas.*

*Linn. Syst. Nat.* II. 747. 12. *Muſ. L. U.* 192.

*Drury Inf.* 1. tab. 17. fig. 1. 2.

*Merian. Inf. Sur.* tab. 31.

*Seb. Muſ.* 4. tab. 39. fig. 2. 3.

Habitat in hibisco mutabili, citro Americes.

Larva albida, fusco maculata.

Puppa cinerea, nigro maculata.

**Aeneas.** 23. P. E. T. alis dentatis, nigris: anticis supra macula viridi: posticis macula palmata, sanguinea. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 747. 16. *Mus. L. U.* 197.

*Roef. Ins.* 4. tab. 2. fig. 2.

*Seb. Mus.* 4. tab. 7. fig. 25. 26.

— — tab. 20. fig. 17. 18.

Habitat in India.

**Cressida.** 24. P. E. T. alis dentatis: anticis hyalinis; maculis duabus nigris: posticis nigris, macula alba.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

**Parvus.** Antennae clavatae, nigrae. Caput nigrum, fronte alba. Thorax niger, pectoris lateribus sanguineis. Abdomen atrum, ano sanguineo. Alae anticae oblongae, hyalinae, basi, margine maculisque duabus nigris; posticae rotundatae, dentatae, nigrae; in medio macula magna nervis divisa, alba, puncto medio nigro. Macula rufa ad angulum anisubtus concoloris; posticis maculis quinque marginibus sanguineis.

**Panthous.** 25. P. E. T. alis dentatis, concoloribus, nigris: anticis albo maculatis; posticis maculis albis, nigra foetis. *Linn. Syst. Nat.* II. 748. 17. *Mus. L. U.* 195.

Papilio Panthous. *Clerk. Icon.* tab. 18. 19.

*Seb. Mus.* 4. tab. 45. fig. 17—20.

Habitat in Indiis.

**Pandarus.** 26. P. E. T. alis subdentatis, nigricantibus, albo maculatis, concoloribus: posticis flavis: ocellis septem nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 748. 18. *Mus. L. U.* 198.

Habitat in India.

Ocelli septem nigri, pupilla coerulea, ultima duplice ad angulum ani.

**Astenous.** 27. P. E. T. alis dentatis, concoloribus, nigris: anticis macula radiata, alba, posticis disco flavo.

Habitat in Capite Bonae Spei. *Mus. Banks.*

**Magnus.** Thorax niger. Abdomen subtus flavum. Alae anticae dentatae, in disco macula magna postice striata, albida. Sinus dentium albidi. Alae posticae disco flavissimo, nervis nigris. Limbus niger et ante marginem posticum fascia e maculis quatuor nigris.

28. P. E. T. alis dentatis, atris, concoloribus: posticis disco communi aurato. *Linn. Syst. Nat.* II. 748. 19. *Mus. Lud. Ulv.* 199.  
*Papilio Helena.* *Clerk. Icon.* tab. 22. fig. 1.  
*Merian. sur.* in tabula titulo praefixa.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 45. fig. 5—12.  
*Habitat* in floribus Arecae Americes.
- \* *Eques Achivi.*
29. P. E. A. alis bicaudatis, fuscis, postice lutescentibus, subtus fascia characteribusque albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 749. 26.  
*Papilio Iasius.* *Drury Ins.* 1. tab. 1. fig. 1.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 46. fig. 21. 22?  
*Habitat* in Barbaria, Africa.  
*Fascia* in alis posticis magis distincta.
30. P. E. A. alis bicaudatis, fuscis: fascia communi alba: primorum dimidiata. *Linn. Syst. Nat.* II. 749. 25.  
*Mus. Lud. Ulv.* 205.  
*Papilio Pyrrhus.* *Clerk. Icon.* tab. 25. fig. 2.  
*Papilio Athamas.* *Drury Ins.* 1. tab. 2. fig. 3. 4.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 47. fig. 2. 3.  
*Habitat* in Indiis.
31. P. E. A. alis caudatis, concoloribus, nigris: fascia strigisque viridibus, nitentibus, numerosis. *Linn. Syst. Nat.* II. 750. 31. *Mus. Lud. Ulv.* 206.  
*Papilio Leilus.* *Clerk. Icon.* tab. 27. fig. 1.  
*Gronov. Zooph.* 724.  
*Klem. Ins.* 1. tab. 2. fig. 1.  
*Merian. sur.* tab. 29.  
*Sloan. Iam.* 2. p. 215. tab. 239. fig. II. 12.  
*Knorr. Delic.* tab. 6. fig. 1.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 36. fig. 1. 2.  
*Aub. miscell.* 1. tab. 71. fig. 1?  
*Habitat* in citro Americes.  
*Antennae* obtusae, subfiliformes. *Thorax* niger, lineis lateralibus viridibus.  
*Variat* macula magna aurea in alis posticis.  
*Larva* pilosa, viridis, capite coeruleo.  
*Puppa* brunnea, maculata.

*Lavinia.* 32. P. E. A. alis caudatis, nigris, viridi-fasciatis, subtus argentatis, strigis fulvis.

Habitat in America. *v. Rohr.*

Corpus nigrum, palpis albis. Alae anticae dentatae, nigrae, fascia e maculis quinque oblongis, viridibus. Maculae tres virides minores intra fasciam et marginem crassiorem: subtus fulvo, albo argenteoque variegatae, litura atra ad marginem crassiorem, in qua lineola alba bifida coeruleaque flexuosa. Alae posticacae caudatae, nigrae, fascia bascos integra et posteriori e maculis septem viridibus. Angulus ani fulvus. Subtus argentatae strigis tribus fulvis. Fascia alba in medio alae. Margo posticus fulvus terminatur striga tenuissima alba.

*Ulysses.* 33. P. E. A. alis caudatis, nigris; disco coeruleo, radiante: posticis subtus ocellis septem. *Linn. Syst. Nat.* II. 748. 21. *Mus. Lud. Ulv.* 201.

Papilio Ulysses. *Clerk. Icon.* tab. 23. fig. 1.

*Seb. Mus.* 4. tab. 45. fig. 9. 10.

— — — tab. 47. fig. 9. 10.

Habitat in Asia.

*Patroclus.* 34. P. E. A. alis caudatis, concoloribus, fuscis: fascia linearis, obliqua, alba apicibusque albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 749. 24. *Mus. Lud. Ulv.* 204.

Papilio Patroclus. *Drury Ins.* I. tab. 7. fig. 1.

*Clerk. Icon.* tab. 37. fig. 1.

*Seb. Mus.* 4. tab. 47. fig. 13 — 16.

*Aub. miscell.* tab. 17. fig. 1. 2.

Habitat in Indiis.

*Diomedes.* 35. P. E. A. alis caudatis, nigris, supra introrsum viridibus: posticis lunulis cyaneis. *Linn. Syst. Nat.* II. 749. 23. *Mus. Lud. Ulv.* 203.

*Seb. Mus.* 4. tab. 47. fig. 11. 12.

Habitat in Indiis.

*Protefi-laus.* 36. P. E. A. alis caudatis, subconcoloribus, albis, fasciis fuscis; unica subtus sanguinea, angulo ani rubro. *Linn. Syst. Nat.* II. 752. 39. *Mus. L. U.* 209.

Papilio Protefilaus. *Clerk. Icon.* tab. 27. fig. 2.

Papilio

Papilio caudatus, fuscus, striis pallescentibus, linea et maculis sanguineis subtus notatus. *Petiv. Mus.*

50. n. 502.

*Sloan. Iam.* 2. p. 218. tab. 239. fig. 17. 18.

*Seb. Mus.* 1. tab. 11. fig. 2.

— — 4. tab. 36. fig. 11. 12.

*Catesb. Carol.* 2. tab. 100.

*Merian. Sur.* tab. 43.

*Aubent. miscell.* tab. 44. fig. 1. 2.

Habitat in America septentrionali.

Affinis *P. Podalirio*, at colores multo vivaciores.

Larva spinosa, nigra.

37. *P. E. A.* alis caudatis, concoloribus, flavis: fasciis marginaque nigris, caudis albis longitudine alae. *Antilo-*

*Linn. Syst. Nat.* II. 751. 35. *Mus. Lud. Utr.* 207.

Papilio caudatus, maximus, striis umbrisque nigris.

*Petiv. Mus.* 50. n. 505.

*Catesb. Carol.* 2. tab. 83.

*Seb. Mus.* 4. tab. 30. fig. 1. 2. 5. 6.

Habitat in America septentrionali.

38. *P. E. A.* alis caudatis, subconcoloribus, flavescens: fasciis fuscis, geminatis: posticis subtus linea sanguinea. *Linn. Syst. Nat.* II. 751. 36. *Mus. Lud. Podali-*

*Utr.* 208.

Papilio alis pallide flavis: rivulis transversis, nigris, secundariis, angulo subulato maculaque crocea.

*Geoff. Inf.* 2. 56. 24.

Papilio alis amplissimis, pallidius flavicantibus. *Raj.*

*Inf.* III. 3.

Papilio Sinon. *Pod. Inf.* 62. tab. 2. fig. 1.

*Merian. Eur.* 163. tab. 44.

*Reaum. Inf.* 1. tab. 11. fig. 3. 4.

*Roef. Inf.* 1. *pap.* 2. tab. 2.

*Schaeff. Elem.* tab. 94. fig. 4.

— — *Icon.* tab. 32. fig. 11. 12.

*Mouff. Pap. diurn.* 3. p. 99. fig. 3.

*Ionft. Inf.* tab. 5. fig. 5.

Habitat in Europae brassica.

Larva solitaria, flavescens, fusco-punctata, capite pallide virescente.

Puppa flavescens, fusco punctata, antice bidentata.

*Sinon.* 39. P. E. A. alis caudatis, nigris, viridi fasciatis maculatisque: posticis subtus linea sanguinea.

Papilio Protesilaus. *Drury Inf.* 1. tab. 22. fig. 3. 4.

*Aubent. miscell.* 1. tab. 18. fig. 1. 2.

Habitat in India.

Statura P. Podalirii, at duplo minor. Angulus ani rufus.

*Chiron.* 40. P. E. A. alis caudatis, nigris, fusco fasciatis: subtus antice albis, strigis ferrugineis.

*Aubent. miscell.* 1. tab. 71. fig. 2. 3?

Habitat in India. *Drury.*

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae clavatae, nigrae. Alae supra obscure-nigrae, fasciis quatuor ferrugineo-fuscis. Angulus ani ocello atro. Cauda elongata, acuta, fusca terminatur puncto albo. Subtus antice nivea, strigis tribus ferrugineis, postice grisea.

*Turnus.* 41. P. E. A. alis caudatis, concoloribus, flavis: margine fasciisque abbreviatis, nigris, angulo ani fulvo.

Papilio Turnus E. A. alis caudatis, concoloribus, flavis: prioribus fasciis quinque dimidiatis posticeque nigris. *Linn. Mant.* 1. 536.

Papilio diurna prima, omnium maxima. *Raj. Inf.* III. *Catesb. Carol.* tab. 97.

Habitat in America.

Statura P. Machaon, at triplo major.

*Machaon.* 42. P. E. A. alis caudatis, concoloribus, flavis: limbo fusco, lunulis flavis, angulo ani fulvo. *Linn. Syst. Nat.* 11. 750. 33. *Fn. Sv.* 1031. *Scop. carn.* 444. *Gronov. Zoolph.* 725.

Papilio alis flavo nigroque variegatis, secundariis angulo subulato maculaque fulva. *Geoff. Inf.* 2. 54. 23.

Papilio alis amplissimis, flavicante et nigro coloribus variegatis. *Raj. Inf.* 110. 1.

Papilio diurnus maximus, secundus. *Merr. pinn.* 198.

Papilio erucae rutaceae. *Column. ecph.* 2. tab. 86.

Eruca Anethi. *Frisch. Inf.* 2. tab. 10.

Papilio major caudatus, ex nigro et luteo variegatus.

*Petiv. Mus.* p. 35. n. 328.

*Monuff. Inf.* 99. tab. 968.

*Aldrov. Inf.* 96. n. 5. 6. fig. 1.

*Ionft.*

- Ionfl. Inf. tab. 5. 7.*  
*Hoeffn. Inf. 1. tab. 12.*  
*Merian. Eur. tab. 94.*  
*Reaum. Inf. 1. tab. 29. fig. 1.*  
*Edw. Av. tab. 343.*  
*Roef. Inf. 1. pap. 2. tab. 1.*  
*Wilk. pap. 47. tab. 1. a. 1.*  
*Schaeff. Icon. tab. 45. fig. 1. 2.*  
*Seb. Mus. 4. tab. 32. fig. 9. 10.*  
 — — tab. 59. fig. 12. 13.

Habitat in Europae umbellatis, ruta.

Larva solitaria, glabra, tentaculata, nigro viridique annulata, rubroque punctata.

Pupa flavescens.

43. P. E. A. alis caudatis, flavis: limbo nigro: posticis lunulis flavis. *Therites.*

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Statura P. Machaonis. Antennae nigrae, extrorsum crassiores. Thorax niger, antice punctis quatuor flavis. Pectus flavum. Abdomen flavum, dorso nigro. Alae anticae flavae, margine exteriori interrupto posticoque nigris; subtus flavae, margine nigro striga flava. Posticae flavae apice nigrae, lunulis sex flavis. Angulus ani lunula rufa. Cauda nigra, immaculata. Subtus flavae, striga e maculis nigris lunula coerulea foetis. Margo posticus tenuissime niger, sinibus flavis.

44. P. E. A. alis caudatis, nigris: fasciis duabus macularibus, flavis: posticis subtus vitta flava lunulisque rufis. *Chalcas.*

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Magnus. Corpus nigrum, orbita oculorum, lineis duabus thoracis, pectore abdominalisque lateribus flavis. Alae anticae nigrae, lunula in medio ad marginem crassiorem, fasciis duabus macularibus punctisque parvis marginalibus flavis. Subtus concolores. Posticae nigrae, fascia in medio flava fere integra et altera posterior e lunulis sex flavis. Angulus ani flavus, lunula coerulea duabusque rufis. Margo posticus lunulis parvis flavis. Cauda obtusa, nigra, linea longitudinali flava. Subtus fuscae, vitta

vitta longitudinali flava a basi usque ad fasciam ducta. Postice fascia e lunulis rufis antice albo-postice atro coeruleoque marginatis. Versus marginem lunulae septem rufae.

- Palamedes.* 45. P. E. A. alis caudatis, nigris, lunulis marginalibus flavis; anticis fascia flava, posticis maculari rufa.

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Corpus magnum, supra nigrum, punctis quatuor collaribus flavis, subtus flavum. Antennae extrorsum crassiores. Alae anticae falcatae, nigrae, fascia arcuata maculisque marginalibus flavis, subtus concolores, striis aliquot fere obsoletis flavis ad basin: posticae caudatae, fascia e lunulis rufis, pone hanc alia e lunulis coeruleis obsoletis, lunulisque flavis marginalibus. Cauda obtusa, nigra, immaculata. Angulus ani lunula rufa. Subtus concolores, at lunulae rufae et coeruleae magis distinctae.

- Menestheus.* 46. P. E. A. alis caudatis, nigris, subtus albido striato-maculatis; posticis lunulis rufis coerulescentibusque.

Papilio Menestheus. *Drury Inf. 2. tab. 9. fig. 1. 2.*

Habitat in India.

Major P. Xutho. Angulus ani lunula coerulescente rubraque.

- Xuthus.* 47. P. E. A. alis caudatis, nigris, albo striato-maculatis: posticis subtus ocellis coeruleis fulvisque subfasciatis. *Linn. Syst. Nat. 11. 751. 34.*

Habitat in India orientali.

Alae anticae basi albo striatae, apice maculatae. Cauda nigra, margine albo. Angulus ani supra albus, subtus fulvus, utrinque puncto nigro.

- Thoas.* 48. P. E. A. alis caudatis, nigris, flavo-fasciatis: posticis subtus flavis, fascia nigra, lunulis cyaneis.

Papilio Thoas alis caudatis, supra nigris, fasciis duabus flavis interruptis, subtus flavis: fascia coerulea. *Linn. Mant. 1. 536.*

Papilio Thoas. *Drury Inf. 1. tab. 22. fig. 1. 2.*  
*Aubent. miscell. 1. tab. 69.*

Habitat in America meridionali.

Statura P. Xuthi.

49. P. E. A. alis obtuse caudatis, concoloribus, fuscis: fasciis flavescentibus, angulo ani fulvo. *Linn. Syst. Nat.* II. 750. 32. *Ajax.*

*Nat.* II. 750. 32.

*Raj. Ins.* III. 2.

*Edw. Av.* 34. tab. 34.

Habitat in America boreali.

50. P. E. A. alis caudatis, nigris, fasciis duabus virescentibus; caudis albis, distantibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 750. 27. *Amoen. acad.* 6. 402. 51. *Orontes.*

Papilio Orontes. *Clerk. Icon.* tab. 26. fig. 1.

*Seb. Mus.* 4. tab. 16. fig. 1. 2.

— — — tab. 47. fig. 7. 8.

Habitat in India.

Antennae obtusae, subfiliformes.

51. P. E. A. alis caudatis, nigris, viridi-maculatis: posticis subtus lunulis tribus rufis. *Linn. Syst. Nat.* II. 748. 22. *Mus. Lud. Ulr.* 202. *Agamemnon.*

Habitat in Asia.

52. P. E. A. alis subcaudatis, fuscis, subtus fasciis albis, *Phidippus.* biocellatis, caudaeque ocellis geminis. *Linn. Syst. Nat.* II. 752. 37. *Amoen. acad.* 6. 402. 52.

Habitat in India.

Alae supra fuscae, immaculatae, subtus griseae, fasciis albidis. Posticae subtus ocellis duobus, altero ad angulum exteriorem, altero versus angulum posticum.

53. P. E. A. alis dentatis, nigris, flavo-maculatis: posticis ocello coeruleo rufoque. *Demoleus.*

Papilio Demoleus alis dentatis, fuscis: maculis fascia- que maculosa flavis; posticis ocellis binis. *Linn. Syst. Nat.* II. 753. 46. *Mus. Lud. Ulr.* 214.

*Klemann. Ins.* I. tab. I. fig. 2. 3.

*Ehret. pi&t. tab. 5.*

*Seb. Mus.* 4. tab. 37. fig. 17. 18.

— — — tab. 44. fig. 6—9.

Habitat in citro Indiae orientalis. *Koenig.*

*Achilles.* 54. P. E. A. alis dentatis: supra nigris, fascia coerulea, subtus fuscis: ocellis tribus quinque. *Linn. Syst. Nat.* 11. 752. 42. *Mus. Lud. Ulv.* 211.

*Papilio Achilles.* *Clerk. Icon.* tab. 24. fig. 2.

*Merian. Sur.* tab. 7.

*Seb. Mus.* 4. tab. 24. fig. 1. 2.

*Gronov. Zooph.* 719.

*Knorr. del.* tab. C. 2. fig. 1. 2.

Habitat in Psidio Americes.

Larva pilosa, flava.

Puppa obesa, viridis.

*Medon.* 55. P. E. A. alis supra nigris: anticis fascia lutea apice que albo; posticis disco coerulecentibus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 752. 43. *Amoen. acad.* 6. 402. 53.

*Clerk. Icon.* tab. 28. fig. 1.

*Drury Inf.* 2. tab. 15. fig. 1. 2.

Habitat in Indiis.

Alae omnes subtus cinerascentes, punctis baseos tribus nigris.

*Philoctetes.* 56. P. E. A. alis dentatis, fuscis: posticis ocellis duobus, pupilla nigra punctisque tribus albis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 750. 29. *Mus. Lud. Ulv.* 219.

*Drury Inf.* 2. tab. 1. fig. 1. 2.

*Clerk. Icon.* tab. 30. fig. 3.

*Seb. Mus.* 4. tab. 4. fig. 9. 10.

— — tab. 21. fig. 7. 8.

Habitat in Indiis.

Fascia linearis, alba et linea transversa atra subtus in alis anticis.

*Stelenes.* 57. P. E. A. alis dentatis, fuscis: fasciis duabus viridibus, altera posticarum integra.

*Papilio Stelenes* alis subcaudatis, supra fuscis: fascia virescente, obtusa, interrupta. *Linn. Syst. Nat.* 11. 750. 30. *Mus. Lud. Ulv.* 218.

*Papilio Stelenes.* *Clerk. Icon.* tab. 35. fig. 2.

*Papilio Iamaicensis* e fusco lutescens, subtus virescens, croceo mixtus. *Petiv. Gazoph.* 20. tab. 13. fig. 1.

*Sloan. Iam.* 2. p. 217. tab. 239. fig. 9. 10.

*Merian. Sur.* tab. 11.

Habitat in America meridionali.

Larva viridis, stria alba coccineaque, cauda spinis duabus.

58. P. E. A. alis dentatis, nigris, fascia inaurato - viridi: subtus nigricantibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 750. 28.  
*Mus. Lud. Ulr.* 207.

Papilio Nireus. *Clerk. Icon.* tab. 30. fig. 1.

*Seb. Mus.* 4. tab. 9. fig. 21. 22.

— — tab. 6. fig. 21. 22.

Habitat in India.

Alae posticae subtus striga maculari alba.

59. P. E. A. alis dentatis, atris, fascia coerulea, nitida: subtus antice albis, postice cinereis. *Amphimachus.*

Habitat in Indiis. *Mus. Lugdunense.*

Statura P. Machaonis. Corpus nigrum. Alae omnes supra nigrae, fascia cyanea, anticarum interrupta, subtus omnes a basi ad medium albae, signaturis variis fuscis, postice obscure cinereae; posticis puncto majori albicante et septem parvis brunneis, pupilla alba.

60. P. E. A. alis falcatis, subdentatis, fuscis: anticis *Odius.* disco flavo.

Habitat in Indiis. *Mus. Lugdunense.*

Alae anticae falcatae, nigrae, disco flavo et puncto parvo albo versus apicem: posticae rotundatae, subdentatae, supra nigrae, basi parum flavescentes, margineque postico albo. Subtus omnes fasciis cinereis et olivaceis variae, strigis aliquot nigris margineque postico albo.

61. P. E. A. alis dentatis, supra nigris, fascia viridi, subtus griseo - marmoratis. *Linn. Syst. Nat.* II. 753. 47. *Demonphon.*

*Mus. Lud. Ulr.* 215.

*Clerk. Icon.* tab. 29. fig. 2.

*Roef. Inf.* 4. tab. 6. fig. 1.

*Seb. Mus.* 4. tab. 18. fig. 2. 3.

— — tab. 26. fig. 11 - 15.

Habitat in Indiis.

62. P. E. A. alis dentatis, fascia supra viridi, subtus alba. *Doreus.*  
Habitat in Sierra Leon. *Mus. Banks.*

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae subfiliformes, nigrae. Caput et thorax nigra, albo maculata. Alae anticae subdentatae, sinubus inter dentes

dentes albis, nigrae, fascia lata viridi, apice interrupta. Subtus obscurae, fascia alba, apice interrupta et maculae aliquot albae ad marginem posticum. Posticae dentatae, sinubus inter dentes albis, fascia baseos viridi, margine, interiori tenuissime nigro. Subtus obscurae, fascia baseos punctisque aliquot ad marginem posticum albis.

- Nestor.* 63. P. E. A. alis dentatis, supra fuscis, albo maculatis discoque coeruleo, subtus ocellis tribus binisque. *Linn. Syst. Nat. II. 752. 40.*  
*Gronov. Zool. 718.*  
*Merian. Sur. 9. tab. 9.*  
 Habitat in Punica Americes.

- Telemachus.* 64. P. E. A. alis dentatis, fuscis: area communis coerulea, radiata; singulis subtus ocellis sex. *Linn. Syst. Nat. II. 752. 41.*  
*Merian. Inf. Sur. tab. 68.*  
 Habitat in America meridionali.

- Menelaus.* 65. P. E. A. alis dentatis, supra coeruleis, nitidissimis; subtus nebulosis: punctis fuscis. *Linn. Syst. Nat. II. 748. 20. Mus. Lud. Ulr. 200.*  
*Clerk. Icon. tab. 21. fig. 1.*  
*Merian. Sur. tab. 53.*  
*Knorr. Delic. tab. C. 4. fig. 2.*  
*Seb. Mus. 4. tab. 17. fig. 13. 14.*  
*— — tab. 18. fig. 15. 16.*  
*— — tab. 31. fig. 1. 2.*  
 Habitat in America meridionali.

Forte plures hujus species. Vidimus alium, supra margine alarum late fuscum albo maculatum, subtus alis anticis ocellis tribus, posticis quatuor.

Larva spinosa, flava, striis pedibusque roseis, capite brunneo.

Puppa pallida, cauda cylindrica, inflexa.

- Tenacer.* 66. P. E. A. alis subrepandis, lividiusculis, subtus nebulosis; posticis ocellis tribus: postremo maximo. *Linn. Syst. Nat. II. 753. 44. Mus. L. U. 212.*  
*Sloan. Iam. 2. p. 219. 24.*  
*Knorr. Del. tab. C. 1. fig. 1. 2?*

*Merian.*

*Merian. Sur. tab. 23.*

*Seb. Mus. 4. tab. 31. fig. 3. 4.*

Habitat in mysa Americes.

Larva brunnea, dorso quadrispinoso, capite spinoso,  
cauda bifida.

Puppa pallescens, maculis utrinque duabus argenteis.

67. P. E. A. alis dentatis, anticis rubris, posticis nigris: *Hecuba.*  
subtus utrinque ocellatis. *Linn. Mant. 1534.*

*Aub. miscell. tab. 19.*

Habitat in Cajania.

68. P. E. A. alis subcrenatis, fuscis, basi cyaneis, subtus  
nebulosis: posticis ocello magno slavecente. *Idome-*  
*neus.*

Papilio Idomeneus alis subcrenatis, coerulescenti-  
fusciscentibus, subtus nebulosis: ocellis duobus.

*Linn. Syst. Nat. II. 753. 45. Mus. L. U. 213.*

*Clerk. Icon. tab. 20. fig. 1.*

*Gronov. Zooph. 721.*

Papilio surinamensis maximus, subtus perbelle oculat-  
us et marmoratus. *Petiv. Gazoph. 43. tab. 28. fig. 1.*

*Merian. Sur. 60. tab. 60.*

*Aubent. miscell. I. tab. 96. fig. 1. 2.*

*Seb. Mus. 4. tab. 24. fig. 7. 8.*

Habitat in America meridionali.

Larva rufa, verrucis plumosis verticillata.

Puppa dentata, apice stylis duobus incurvis.

\* *Heliconii.*

69. P. H. alis oblongis, integerrimis, rubris, anticis  
apice hyalinis, posticis subtus albidis, nigro punctatis. *Horta.*

*Linn. Syst. Nat. II. 755. 54. Mus. L. U. 234.*

*Seb. Mus. 4. tab. 39. fig. 4—9.*

Habitat in Africa.

70. P. H. alis oblongis, integerrimis, luteis; anticis striis  
tribus; posticis fasciis tribus nigris. *Linn. Syst. Nat. II.* *Calliope.*

*755. 56. Mus. Lud. Ulr. 223.*

*Clerk. Icon. tab. 41. fig. 4.*

*Seb. Mus. tab. 7. fig. 5. 6.*

— — tab. 29. fig. 17. 18.

Habitat in Indiis.

Apex alae anticae niger, albo punctatus.

71. P. H.

*Melite.* 71. P. H. alis oblongis, integerrimis, flavis; anticis supra nigris: lineis duabus fasciaque flavis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 755. 57. *Amoen. acad.* 6. 403. 56.

*Clerk. Icon.* tab. 44. fig. 5.

*Seb. Mus.* 4. tab. 17. fig. 8. 9.

— — tab. 20. fig. 8. 9.

— — tab. 30. fig. 5. 6.

Habitat in Indiis.

Alae posticae flavae, margine postico nigro.

*Mopsa.* 72. P. H. alis oblongis, concoloribus, fulvis, apice nigris, albo punctatis.

Papilio Mopsa alis oblongis, concoloribus, luteis nigrisque: subtus punctis marginalibus octo albis.

*Linn. Syst. Nat.* 11. 756. 59. *B. Mus. L. U.* 235.

Habitat in India orientali.

*Lybia.* 73. P. H. alis oblongis, integerrimis, fulvis, anticis strigis tribus, posticis fascia marginali fuscis.

Habitat in India. *D. Solander.*

Statura P. Polymniae, at minor. Corpus nigrum, pectore albo, punctato. Alae valde oblongae, flavae; anticae strigis tribus nigris, quarum exterior alam terminat. Margo posticus et exterior fuscus. Alae posticae fascia marginali fusca, subtus subconcolores, at multo pallidiores, basi anteriorum lineola, posteriorum punctis duobus coccineis.

*Violae.* 74. P. H. alis oblongis, integerrimis, fulvis, nigro-punctatis: posticis margine nigro punctis albis.

Habitat in violis, boragine Indiae orientalis. *Koenig.*

Statura P. Terficore. Alae omnes fulvae, nigro maculatae. Margo posticus alarum posticarum punctis septem albis.

*Terficore.* 75. P. H. alis oblongis, integerrimis, fulvis, posticis nigro-punctatis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 755. 55. *Mus. Lud. Ulv.* 222.

Papilio maderaspatanus croceus, nigris maculis adspersus. *Petiv. Gazoph.* tab. 40. fig. 4.

Habitat in Asia.

Apex alae anticae albicat.

76. P. H. alis oblongis, integerrimis, fulvis, posticis subtus basi nigro punctatis. *Serena.*  
*Habitat in India. Mus. Tottianum.*  
 Parvus, affinis P. Terpsichori. Alae omnes fulvae, anticae apice, posticae margine fuscae, fulvo-maculatae. Subtus anticae concolores, posticae punctis numerosissimis nigris, sparsis ad basin.
77. P. H. alis oblongis, integerrimis, anticis fascia flava, posticis fasciis tribus nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 755.*  
*Mus. Lud. Ulv. 224.*
- Papilio surinamensis ex aurantio et nigro mixtus.  
*Periv. Gazoph. tab. 12. fig. 8.*  
*Roef. Ins. 4. tab. 5. fig. 2.*  
*Edw. Av. 175. tab. 175.*  
*Habitat in America meridionali.*  
 Larva flavescens, sub stigmatibus spinosa.
78. P. H. alis oblongis, integerrimis, anticis nigris, fasciis tribus hyalinis, posticis hyalinis. *Hippodamia.*  
*Habitat - - - Manduit.*  
 Parvus. Corpus nigrum, abdomine clavato. Alae anticae nigrae, fasciis tribus hyalinis, quae tamen margines haud attingunt: posticae hyalinae, margine postico fuso.
79. P. H. alis oblongis, integerrimis, fuscis, disco albis; posticis ocellis utrinque binis. *Urania.*  
*Habitat in Indiis.*  
 Ocelli duo magni, flavi, iride coerulecente, pupilla alba.
80. P. H. alis oblongis, integerrimis, atris: anticis flavo-maculatis, posticis supra basi coeruleis. *Linn. Mant. I. 536.*  
*Aub. miscell. tab. 72. fig. I. 2.*  
*Habitat Surinami.*  
 Nimis affinis P. Ricini.
81. P. H. alis oblongis, integerrimis, fuscis; anticis utrinque fasciis duabus flavis; posticis basi radiatis. *Linn. Syst. Nat. II. 756. 63. Mus. Lud. Ulv. 227.*  
*Gronov. Zooph. 740. 741.*  
*Ebret. pi&t. tab. I.*  
*Roef. Ins. 4. tab. 5. fig. I.*

*Merian.*

*Merian. Sur.* tab. 30.

*Seb. Mus.* 4. tab. 29. fig. 3. 4.

Habitat in Americae ricino.

Larva virescens, pilosa, pilis albis.

Mas alis posticis basi purpureo, foemina coeruleo radiatis.

**Myrti.** 82. P. H. alis oblongis, integerrimis, atris; anticis fasciis duabus flavis, posticis disco rufo.

Habitat Surinami. *Drury.*

Affinis P. Ricini, at triplo minor et basis alarum haud radiata.

**Psidii.** 83. P. H. alis oblongis, integerrimis, fuscis; anticis fasciis tribus, posticis duabus hyalinis. *Linn. Syst. Nat.* II. 756. 64. *Mus. Lud. Utr.* 228.

Phalaena Benghalensis fusco et diaphano mixta. *Petiv. Gazoph.* tab. 40. fig. 3.

*Roeſ. Inf.* 4. tab. 2. fig. 3.

*Merian. Sur.* tab. 19.

*Edw. Av.* tab. 80.

Habitat in Indiae psidio.

Larva nuda, viridis, capite nigro.

**Charito-** 84. P. H. alis oblongis, integerrimis, atris, concoloribus; anticis fasciis flavis tribus, posticis duabus.

*Linn. Syst. Nat.* II. 757. 65.

*Aubent. miscell.* tab. 70. fig. 4.

*Sloan. Iam.* 2. 217. tab. 239. fig. 15. 16.

*Edw. Av.* tab. 80.

Habitat in America.

**Melpome-** 85. P. H. alis oblongis, integerrimis, nigris; anticis fascia rubra, posticis basi subtus punctis sanguineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 758. 71. *Mus. L. U.* 232.

Papilio mexicanus nigrescens, linea lutescente, area miniacea notabili. *Petiv. Gazoph.* 7. tab. 4. fig. 2.

*Roeſ. Inf.* 4. tab. 3. fig. 6.

*Sloan. Iam.* 2. 219. tab. 239. fig. 25. 26.

*Edw. Av.* tab. 38.

*Seb. Mus.* 4. tab. 13. fig. 15. 16.

— — — tab. 29. fig. 13. 14.

Habitat in America.

86. P. H. alis oblongis, integerrimis, atris; anticis fascia rubra, posticis flava. *Phyllis.*  
*Habitat in Brasilia. Mus. Banks.*  
*Statura praecedentis, at minor. Corpus nigrum, flavo variegatum. Alae anticae concolores, atrae, fascia magna sanguinea, quae tamen marginem tenuiorem haud attingit: posticae atrae, fascia baseos laete flava subtusque punctis baseos aliquot rubris.*
87. P. H. alis oblongis, integerrimis, fuscis; anticis albo maculatis; posticis fascia alba. *Clio.* *Linn. Syst. Nat. II. 757. 66. Mus. Lud. Uhr. 229.*  
*Merian. fur. tab. 35. fig. inf.*  
*Habitat in Americes Sophora.*  
*Larva pilosa, brunnea.*
88. P. H. alis oblongis, integerrimis, fuscis; anticis flavo maculatis, posticis striatis. *Thalia.* *Linn. Syst. Nat. II. 757. 67. Mus. Lud. Uhr. 230.*  
*Clerk. Icon. tab. 43. fig. 2.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Striae alarum posticarum bifidae.*
89. P. H. alis oblongis, integerrimis, concoloribus, fuscis: fascia alba, posticis striatis: basi nigro punctatis. *Euryta.*  
*Papilio Euryta alis oblongis, integerrimis, fuscis, concoloribus, nigro striatis: fascia alba; posticis punctis decem atris. Linn. Syst. Nat. II. 757. 69. Mus. L. U. 221.*  
*Seb. Mus. 4. tab. 29. fig. 15. 16.*  
*Habitat in Indiis.*
90. P. H. alis oblongis, integerrimis, albo maculatis; anticis virescentibus, posticis fascia flava. *Aedea.* *Linn. Syst. Nat. II. 757. 68. Amoen. acad. 6. 403. 55.*  
*Clerk. Icon. tab. 4. fig. 2.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Alae anticae fasciis tribus e maculis inaequalibus albis.*
91. P. H. alis oblongis, integerrimis, nigris; anticis fasciis duabus posticisque unica flavis. *Thallo.* *Linn. Syst. Nat. II. 756. 62.*  
*Edw. Av. 36. tab. 226.*  
*Habitat in China.*  
*Corpus coeruleum, capite rubro.*

**Antiochus.** 92. P. H. alis oblongis, integerrimis, nigris; anticis fasciis duabus albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1068. 12.  
*Ebret. pi&t. tab. 1.*

Habitat in Indiis.

Alae anticae fasciis duabus, posteriore subinterrupta; posticae immaculatae, subitus concolores, anticis basi lineolis duabus flavis, posticis lineola punctis-que duobus coccineis.

**Camaena.** 93. P. H. alis subintegris, fuscis, nigro punctatis; posti-  
cis fascia rubra.

Papilio Camaena. *Drury Inf.* 2. tab. 7. fig. 2.

Habitat in Africa.

Affinis videtur P. Zetes. *Linn.* Palpi flavescentes.

Corpus nigrum, albo maculatum. Alae anticae concolores, integerrimae, fuscae, immaculatae; posticae basi fuscae, punctis plurimis nigris spar-  
sis. In medio fascia flavescens. Margo alarum niger, punctis septem albis.

**Lycia.** 94. P. H. alis integerrimis, concoloribus, fuscis, albo  
maculatis; posticis disco albo punctis nigris.

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Banks.*

Affinis praecedenti, at paulo minor. Thorax fusca, flavo maculatus. Alae anticae fuscae, macula albida nigro punctata ad marginem interiorem et fascia macularis ante apicem, posticae disco albo punctis plurimis nigris sparsis. Margo fusco striatus.

**Pyrrha.** 95. P. H. alis oblongis, integerrimis, concoloribus, fuscis,  
flavo maculatis: posticis disco ferrugineo nigro striato.

*Seh. Mus.* 4. tab. 29. fig. 1. 2.

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

Corpus nigrum, thorace utrinque puncto antico flavo. Alae anticae fuscae, maculis duabus baseos, anteriore longiore et fascia maculari ante apicem flavis: posticae fuscae disco omni ferrugineo, venis striis-que fuscis.

**Bonasia.** 96. P. H. alis oblongis, integerrimis, fuscis, fascia com-  
muni fulva: posticis basi nigro punctatis.

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Banks.*

Statura praecedentis. Corpus nigrum, abdomine punctis lateralibus flavescens. Alae anticae oblon-

oblongae, fuscae, fascia incurva fulva a basi alae ad medium et inde ad marginem tenuiorem ducta. Litura fulva ante apicem. Subtus concolores: posticae supra fuscae, fascia media lata, fulva. Striae aliquot brevissimae ad marginem posticum. Subtus basi albida punctis numerosis, sparsis, nigris, postice fuscae, maculis marginalibus acutis, albidis.

97. P. H. alis oblongis, integerrimis, nigris, albo punctatis: fascia fulva. *Linn. Syst. Nat.* II. 756. 61. *Mus. Lud. Ulv.* 226.

Habitat in America.

Alae omnes pone fasciam immaculatae.

98. P. H. alis oblongis, integerrimis, atris, anticus flavo maculatis, basi rubris; posticis rubro striatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 757. 70. *Mus. Lud. Ulv.* 231. *Clerk. Icon.* tab. 40. fig. 1.

Habitat in Indiis.

Alae anticae maculis decem flavis, posticae striis quinque albis, basi coeuntibus.

\* *Parnassii.*

99. P. P. alis rotundatis, integerrimis, albis, nigro maculatis, posticis supra ocellis quatuor, subtus sex. *Linn. Syst. Nat.* II. 754. 50. *Fn. Sv.* 1032. *Scop. carn.* 447.

*Papilio alpina major*, alis albicantibus, exterioribus maculis nigris notatis, interioribus maculis ophthalmoidibus, iride rubra. *Raj. Inf.* 139. 2.

*Mouff. Inf.* 94. fig. 2. 3.

*Petiv. Mus.* 49. n. 502.

— *Gazoph. tab.* 23. fig. 8.

*de Geer Inf.* I. tab. 18. fig. 12. 13.

*Roef. Inf.* 4. 29. tab. 4. fig. 1. 2.

*Sulz. Inf.* tab. 13. fig. 41.

*Papilio Rhea. Poda Inf.* 66. II.

*Schaeff. monogr.* 1754. tab. 2. fig. 2. 3.

— — *Elen.* tab. 9. fig. 6.

— — *Icon.* tab. 36. fig. 4. 5.

*Aubent. miscell.* tab. 68. fig. 1. 2.

Habitat in sedo telephio, saxifraga, cotyledone.

Gg

Larva

Larva solitaria, tentaculata, holofericea, atra, segmentis utrinque punctis rubris duobus.

Puppa coerulescens, antice utrinque rubro punctata.

- Mnemosyne*. 100. P. P. alis rotundatis, integerrimis, albis, nigro-nervosis: anticis maculis duabus nigris marginalibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 754. 51. *Fu. Sv.* 1033. *Scop. carn.* 449. *Uddm. Diff.* 55. *Pod. Inf.* 63. 3. β. *Schaeff. Icon. tab.* 34. fig. 6. 7. Habitat in Europa boreali.

- Cratægi*. 101. P. P. alis rotundatis, integerrimis, albis: venis nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 758. 72. *Fu. Sv.* 1034. *Scop. carn.* 448.

Papilio alis rotundatis, albis: venis nigris. *Geoff. Inf.* 2. 71. 43.

Papilio alba, nervis alarum nigris. *Raj. Inf.* 115. 5.

Papilio alba venis nigris. *Petiv. Mus.* 33. 301.

Eruca hyemalis luteo alboque striata. *Frisch. Inf.* 5. p. 16. tab. 5.

*Hoeffn. Inf.* tab. 10. fig. 14.

*Merian. Eur.* 2. p. 38. tab. 35.

*Albin. Inf.* tab. 2. fig. 2.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 2. fig. 9. 10.

*de Geer Inf.* 1. tab. 14. fig. 19. 20.

*Roef. Inf.* 1. *Phal.* 2. tab. 5.

*Wilh. pap.* 49. tab. 2. a. 1.

Habitat in Pomonae arboribus; hortorum pestis.

Larva gregaria, pilosa, flava, capite lineisque tribus nigris.

Puppa virescens, maculis punctisque nigris.

- Andromacha*. 102. P. P. alis rotundatis, integerrimis, concoloribus, nigro-punctatis: anticis denudatis, posticis flavescentibus.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Medius. Caput nigrum, palpis flavis. Thorax niger, utrinque puncto antico flavo. Pectus flavo maculatum. Alae anticae obscure denudatae, punctis aliquot nigris sparsis. Posticae subflavescentes, punctis

punctis nigris numerosis. Margo posticus niger, punctis septem flavescens. Pedes sex nigri, tibiis anticis flavi.

103. P. P. alis rotundatis, integerrimis, hyalino-dia-  
phanis: posticis ocellis binis marginalibus. *Linn.* *Pieræ.*  
*Syst. Nat.* II. 754. 52. *Mus. Lud. Ultr.* 220.

*Clerk. Icon.* tab. 36. fig. 4.

*Gronov. Zooph.* 734. 735.

*Merian. Sur.* tab. 16. fig. 1.

*Kleemann. Inf.* I. tab. 6. fig. 1.

*Seb. Mus.* 4. tab. 8. fig. 6. 7.

Habitat in Indiis.

104. P. P. alis rotundatis, nigris, albo subradiatis, puncto  
centrali albo: posticis subtus luteis; basi cruentatis. *Pasithoe.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 755. 53.

Habitat in India.

Alae posticae subtus sulphureae, margine venisque  
nigris, et basi sanguineae.

105. P. P. alis rotundatis, integerrimis, hyalino-vire-  
scentibus: posticis apice fuscis, ocellis duobus. *Anacar-*  
*dii.* *Linn. Syst. Nat.* II. 758. 74. *Mus. L. U.* 236.

*Clerk. Icon.* tab. 28. fig. 3.

*Merian. Inf. sur.* tab. 16.

*Seb. Mus.* 4. tab. 35. fig. 13. 14.

Habitat in anacardio Americes.

Affinis videtur P. Pieræ, cuius forte mera varietas.

Larva alba, pilosa, pilis longis, deflexis.

Puppa brunnea.

106. P. P. alis rotundatis, integerrimis; fusco-hyalinis:  
posticis punctis quinque albis. *Rhea.*

Habitat in Indiis. *Mus. Lugdunense.*

Statura omnino P. Pieræ. Alae anticae oblongae,  
strigis tribus obsoletis, obscurioribus. Posticae ro-  
tundatae, strigis tribus magis distinctis et versus  
marginem posticum punctis quinque albis.

107. P. P. alis rotundatis, integerrimis, hyalinis, albis:  
posticis ocello utrinque uno. *Androme-*  
*da.*

Habitat in India. *Mus. Gronovii.*

Statura praecedentis, at paulo minor. Alae posticae ad marginem posticum litura parva, coerulea, ocelloque unico, pupilla alba.

- diaphanous.* 108. P. P. alis rotundatis, integerrimis, albo-hyalinis: marginibus fuscis.

Papilio hyalinus. *Drury Inf.* 2. tab. 7. fig. 3.

Habitat in Iamaica.

Corpus fuscum.

- Idea.* 109. P. P. alis rotundatis, integerrimis, denudato-albis, venis maculisque nigris.

Papilio Idea alis rotundatis, integerrimis, albis: venis maculisque nigris: anticis nigro margine, albo punctato. *Linn. Syst. Nat.* II. 758. 73. *Amoen. acad.* 6. 405. 63.

Papilio lynceus. *Drury Inf.* 2. tab. 7. fig. 1.

*Clerk. Icon.* tab. 38. fig. 1.

*Aub. miscell.* tab. 20. fig. 1?

Habitat in Indiis.

Praecedentibus major.

\* *Danai Candidi.*

- Brassicae.* 110. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, albis: anticis maculis duabus apicibusque nigris, major. *Linn. Syst. Nat.* II. 759. 75. *Fn. Sv.* 1035.

Papilio brassicaria alba, major, vulgatissima. *Raj. Inf.* II. 1.

Papilio albus vulgaris, major. *Pet. Gaz.* 62. fig. 3.

Papilio alba major, apicibus nigris. *Petiv. Mus.* 85. 825.

*Geoff. Inf.* 2. 68. 40.

*Roeß. Inf.* 1. *pap.* 2. tab. 4.

*Goed. Inf.* 1. 59. tab. II.

*Mouff. Inf.* 189. fig. 1.

*List. Goed.* p. 16. fig. 7.

*Merian. Eur.* 1. p. 16. tab. 45.

*Alb. Inf.* 1. tab. 1.

*Swamm. Bibl.* tab. 37. 6.

*Reaum. Inf.* 1. tab. 29. fig. 1.

*Blank. Inf.* tab. 4. fig. A. D.

*Vallifn. Nat.* 1. tab. 1.

*Wilk. pap.* 49. tab. 2. a. 2.

*Schaeff.*

*Schaeff. Icon.* tab. 40. fig. 3. 4.

*Sepp. Inf.* 2. p. 7. tab. 2.

Habitat in brassica Europae, Chiae.

Larva solitaria, cinerea, nigro punctata lineisque tribus sulphureis, cauda nigra.

Puppa pallide virescens, lineis tribus flavis segmentisque tribus gibbosis.

III. P. D. C. alis integerrimis: anticis maculis duabus apicibusque nigris; minor. *Linn. Syst. Nat.* II. 759. 76. *Fn. Sv.* 1036. *Geoff. Inf.* 2. 69. 41.

Rapae.

Papilio alba, media, alis exterioribus albis, duabus maculis nigris notatis, inferioribus subtus flavacantibus. *Raj. Inf.* 114. 2.

Papilio corpore et antennis livescientibus, capite aliisque pallidis. *Merret. pin.* 198. 5.

Papilio vulgaris, albus, minor. *Petiv. Mus.* 15. 826.

Papilio alba, vulgaris, striata, maculis duplicitibus. *Petiv. Gazoph.* 10. tab. 64. fig. 4.

*Mouff. Inf.* 971. fig. 9. 10.

*Robert. Icon.* tab. 6.

*Alb. Inf.* tab. 51. fig. C. D. E. F.

*Reaum. Inf.* 1. tab. 29. fig. 7. 8.

*Blank. Inf.* tab. 5. fig. A — D.

*Goed. Inf.* 1. tab. 27.

*List. Goed.* 22. fig. 8.

*Merian. Eur.* 2. tab. 39.

*Ammir.* tab. 16.

*Sepp. Inf.* 2. p. 1. tab. 1.

Habitat in brassicis.

Larva viridis, linea dorsali aenea lateribusque aeneo-punctatis.

Puppa gibba, virescens, lineis tribus sulphureis

III. P. D. C. alis integerrimis, albis, subtus venis dilatatis, virescentibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 760. 77. *Fn. Sv.* 1037.

Napi.

Papilio alis rotundatis, albis, inferioribus subtus fasciis virescentibus. *Geoff. Inf.* 2. 70. 42.

Papilio braslicaria media, alis albis, secundum nervos lineis e viridi nigricantibus, subtus striatis. *Raj. Inf.* 114. 4.

*Wilk. pap.* 50. tab. 2. a. 4.

*Merian. Eur.* 2. tab. 39.

*Alb. Inf.* tab. 52. fig. F. G.

*Petiv. Gazoph.* tab. 62. fig. 4.

Habitat in oleraceis Europae, Asiae.

- Hellica.* 113. P. D. C. alis albis: anticis macula apiceque albo-punctato nigris; posticis subtus cinereo-venosis, *Linn. Syst. Nat.* 11. 760. 78. *Mus. L. U.* 243.

Habitat in India.

Alae posticae supra immaculatae.

- Sinapis.* 114. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, albis: apicibus fuscescenscentibus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 760. 79. *Fn. Sv.* 1038. *Scop. carn.* 452. *Schaeff. Icon.* tab. 97. fig. 8—11.

Habitat in brassica, sinapi, rapa.

- Sylvia.* 115. P. D. C. alis rotundatis, integerrimis, albis: anticis apice fuscis; subtus macula baseos fulva.

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Banks.*

Parvus. Alae anticae albae, apice nigrae; subtus albae, macula magna fulva. Posticae concolores, punctis quinque marginalibus fuscis.

- Argante.* 116. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, fulvis: subtus ferrugineo irroratis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

Statura P. Monutes. Antennæ ferrugineæ. Alae omnes supra fulvae, margine postico parum fusco maculato. Subtus omnes flavissimæ, atomis ferrugineis.

- Monuste.* 117. P. D. C. alis rotundatis, integerrimis, albis: margine fusco. *Linn. Syst. Nat.* 11. 760. 80. *Mus. L. U.* 237.

*Kleemann. Inf.* tab. 3. fig. 3.

Habitat in America.

Alae posticae subtus flavae.

- Argia.* 118. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, albis: anticis apice nigris.

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Banks.*

Nimis affinis P. Monutes. Alae anticae albae, apice nigrae; subtus albae, macula magna fusca versus apicem. Alae posticae albae, immaculatae.

119. P.

119. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, griseis: anticis supra albis, apice fuscis. *Philetas.*  
**Habitat** in America.  
**Affinis** P. Monastes. Antennae apice ferrugineae.  
 Alae griseae, at anteriores albidiiores, apice nigrae punctoque medio fuso.
120. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, albis: anticis costa baseos apiceque fuscis. *Libythea.*  
**Habitat** in India orientali. *Mus. Tottianum.*  
 Alae supra albissimae, anticis margine exteriori a basi ad medium apiceque fuscis. Posticae albae, punctis quatuor marginalibus fuscis.
121. P. D. C. alis rotundatis, integerrimis, albis: anticis puncto apiceque nigris; posticis subtus flavescentibus: margine nigro punctato. *Calypso.*  
**Papilio Calypso.** *Drury Inf.* 2. tab. 17. fig. 3. 4?  
**Habitat** in Sierra Leon Africæ.  
 Corpus griseum. Alae anticae albae, margine crassiori, punto medio apiceque albo striato nigris; subtus albae, arcu magno, ad marginem crassorem fuso. Apex niger, maculis sex flavescentibus. Alae posticae albae, maculis quinque marginalibus fuscis; subtus flavescentes, punctis marginalibus quinque, striga e punctis septem ante marginem et puncto solitario in medio nigris.
122. P. D. C. alis integris, rotundatis, albis, margine fuscis: subtus luteo-griseis, albo maculatis. *Daplidice.* *Linn.*  
*Syst. Nat.* 11. 760. 81.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 23. fig. 11. 12. 15. 16.  
*Petiv. Gazoph.* tab. 1. fig. 7.  
**Habitat** in Africa, *Egyptia*
123. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, albis: margine nigro; subtus nigro-venosis. *Nerissa.*  
**Habitat** in China.  
**Affinis** P. Napi, at paulo major et margo alarum niger.

*Demophila.* 124. P. D. C. alis rotundatis, albis: fasciis duabus marginaque fuscis; posticis subtus subincarnatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 761. 81. *Amoen. acad.* 6. 406. 66.

*Clerk. Icon.* tab. 28. fig. 4.

Habitat in India.

*Hecabe.* 125. P. D. C. alis integerimis, rotundatis, flavis, extimo nigris: subtus fuscis punctatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 763. 96. *Mus. Lud. Ulv.* 249.

*Gronov. Zooph.* 757.

*Edu. Av.* tab. 253. fig. 2.

*Peruv. Gazoph.* tab. 28. fig. 9.

Habitat in *aeschynomene pumila* Indiae orientalis.  
*Koenig.*

*Cardamines.* 126. P. D. C. alis rotundatis, integerimis, albis: posticis subtus viridi-marmoratis. *Linn. Syst. Nat.* II. 761. 85. *Fn. Sv.* 1039. *Geoff. Inf.* 2. 71. 44.

Papilio minor alis exterioribus albis, macula insigni crocea splendentibus; interioribus superne albis, subtus viridi colore variegatis. *Raj. Inf.* 115.

*Edu. Av.* tab. 125.

*Roel. Inf.* 1. pap. 2. tab. 8.

*Robert. Icon.* tab. 21.

*Schaeff. Icon.* tab. 79. fig. 23. et tab. 91. 1—3.

— — *Elem.* tab. 94. fig. 8.

*Wilk. pap.* 2. p. 50. tab. 2. a. 5.

Habitat in cardamine, brassica, thlaspi.

Mas macula magna fulva in alis anticis.

Larva solitaria, supra virescens, infra albicans.

Puppa viridis, linea utrinque lateralí alba, thorace conico, adscendente.

*Eucharis.* 127. P. D. C. alis rotundatis, integerimis, albis: anticis apice fulvis; margine nigro, posticis immaculatis.

Habitat in India orientali. *Mus. Tottianum.*

Magnitudo praecedentis. Antennae albo nigroque annulatae. Alae omnes albissimae; anticis apice late fulvis, margine nigro cinctis. Posticae immaculatae. Subtus omnes albae, macula apicis fuscæ.

128. P. D. C. alis rotundatis, integerrimis, albis: posticis subtus fuscis, puncto albo lunulisque sex flavis. *Nysa.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Medius. Alae anticae albae, apice nigrae, albo maculatae, subtus concolores, macula baseos fulva. Posticae supra albae, immaculatae, subtus fuscae, puncto medio albo et lunulis sex fulvis versus marginem posticum.

129. P. D. C. alis rotundatis, integerrimis, albis, apice nigris: posticis subtus fulvis; margine late nigro. *Chloris.*

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Banks.*

Antennæ albo nigroque variae. Alae anticae niveae, apice nigrae, subtus concolores, macula baseos fulva. Posticae supra albae, margine postico nigro, subtus fulvae, margine postico latius nigro.

130. P. D. C. alis rotundatis, integerrimis, extimo nigris: *Rhodope.* anticis flavis, posticis albis.

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Banks.*

Antennæ nigrae. Corpus cinereum. Alae anticae flavae, margine exteriori et postico flavo striato nigris, subtus flavae, inaculis septem apicis nigris. Posticae concolores, albae, punctis octo marginalibus nigris.

131. P. D. C. alis integerrimis, albis, margine nigro; posticis subtus flavis. *Phryne.*

Habitat in America. *Drury.*

Media. Caput et antennæ nigra. Alae supra albae, margine omni nigro, subtus nigro-venosæ; anticae albae, margine antico flavo, posticae flavae, margine omni nigro.

132. P. D. C. alis rotundatis, albis, puncto apiceque nigris: subtus cinereo-undatis, puncto fulvo. *Pyrantbe.* *Linn.*

*Syst. Nat. II. 763. 98. Mus. L. U. 245.*

Habitat in Indiae orientalis caffis. *Koenig.*

133. P. D. C. alis integris, albis: anticis apice, posticis *Callirhoe.* margine punctisque sex nigris.

*Aub. miscell. tab. 91. fig. 1. 2.*

Habitat in Asia.

Reliquis major. Alae albidae; anticae apice nigrae (medio fulvo), posticae margine et intra marginem punctis sex nigris, subtus albo nigroque marmoratae.

*Glaucippe.* 134. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, albis: anticis apice nigris; posticis subtus cinereis, fusco undatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 762. 89. *Mus. Lud. Ulr.* 240.

*Clerk. Icon.* tab. 35. 1.

*Drury Ins.* I. tab. 10. fig. 3. 4.

*Edw. Av.* 128. tab. 128.

*Seb. Mus.* 4. tab. 45. fig. 5. 6. 13. 14.

Habitat in Asia.

*Evippe.* 135. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, flavescentibus: anticis apice nigris; posticis subtus albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 762. 87. *Mus. Lud. Ulr.* 239.

*Seb. Mus.* 4. tab. 26. fig. 1. 2.

*Gronov. Zooph.* 758.

*Periv. Gazoph.* tab. 9. fig. 10.

Habitat in Asia.

*Hyparete.* 136. P. D. C. alis integerrimis, albis, nigro-venosis; posticis subtus flavis; margine rubro maculato.

Papilio Hyparete alis integerrimis, rotundatis, albis: posticis subtus venis nigris maculisque sanguineis.

*Linn. Syst. Nat.* II. 763. 92. *Mus. Lud. Ulr.* 247.

*Clerk. Icon.* tab. 38. fig. 2. 3.

*Aub. miscell.* tab. 93. fig. 3. 4.

Papilio Eucharis. *Drury Ins.* 2. tab. 10. fig. 5. 6.

Habitat in lorantho Indiae orientalis.

Alae anticae albae, venis nigris, posticae supra albae, maculis marginalibus nigris, subtus flavæ, nigro venosæ, margine postico nigro, maculis sex s. octo magnis rubris.

*Teutonia.* 137. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, albis: posticis subtus nigro-venosis, flavo maculatis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Praecedenti affinis. Alae anticae concolores, albae, puncto medio apiceque albo maculato nigris. Posticae supra albae, margine nigro, albo maculato; subtus albae, valde nigro-venosæ, maculis quatuor baseos et octo in margine nigro-flavis.

138. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, albis: posticis *Myfis*,  
subtus margine atro; fascia sanguinea.

Habitat in nova Hollandia. *Muf. Banks.*

Medius. Alae anticae concolores, albae, apice fusco,  
maculis quinque albis; posticae albae, margine po-  
stico nigro. Subtus albae, margine interiori late  
flavo, postico atro, fascia sanguinea.

139. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, albidis, apice *Nigrina*,  
nigris: subtus nigris; posticis striga flexuosa,  
sanguinea.

Habitat in nova Hollandia. *Muf. Banks.*

Medius. Alae anticae basi albidae, apice lato, nigro,  
maculis quinque albidis subfasciato; subtus totae  
nigrae, fascia apicis flava. Posticae supra albidae,  
margine nigro, subtus nigrae, macula baseos striga-  
que in medio valde flexuosa sanguineis.

140. P. D. C. alis rotundatis, integerrimis, albidis, apice *Melania*,  
nigris: posticis subtus obscure glaucis.

Habitat in nova Hollandia. *Muf. Banks.*

Statura praecedentis. Corpus fuscum, antennis atris.  
Alae anticae albae, basi obscurae, apice nigrae,  
maculis albis: subtus albae, macula baseos fulva:  
apice nigrae, albo maculatae. Posticae supra al-  
bae, subcoerulecentes, margine late fusco. Sub-  
tus glaucae.

141. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, luteis, con-  
coloribus: limbo nigro, punctis septem albis. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 763. 94. *Amoen. acad.* 6. 405. 62.  
*Seb. Muf.* 4. tab. 18. fig. 8. 9.  
— — — tab. 27. fig. 19. 20.

Habitat in Indiis.

142. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, flavis: anti-  
cis supra albis; limbo nigro, subtus omnibus nebu-  
losis. *Linn. Syst. Nat.* II. 763. 95. *Muf. L. Ulr.* 242.  
*Amoen. acad.* 6. 404. 57.  
*Seb. Muf.* 4. tab. 28. 19. 20.

Habitat in India.

*Amata.* 143. P. D. C. alis rotundatis, fulvis: limbo nigro, subtus virescentibus.

Habitat in India orientali. *Mus. Tottianum.*

Statura P. Palaeno, at paulo minor. Alae fulvae, margine exteriori et postico nigris, fulvo punctatis. Subtus omnes virescentes, anticis punctis duobus ad marginem interiorem, posticis puncto medio fuscis.

*Danae.* 144. P. D. C. alis rotundatis, albis: anticis apice croceis: margine fasciaque nigris, subtus striga moniliformi, abbreviata.

Habitat in India orientali. *Mus. Tottianum.*

Parva. Alae albae, anticae apice croceae, litura flavescente, fascia et margine omni nigris. In medio alae punctum nigrum. Posticae albae, margine postico nigro maculato. Subtus paulo obscuriores, anticae apice cinerascentes, striga abbreviata, e punctis quinque subocellaribus fuscis pupilla albicante. Punctum nigrum in medio alae. Alae posticae cinnereae, striga abbreviata, e punctis quinque subocellaribus et puncto medio ferrugineis.

*Rhexia.* 145. P. D. C. alis rotundatis, integerrimis, albis, apice (medio fulvo) nigris: singulis subtus puncto medio atro.

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Banks.*

Magnitudo P. Palaeno. Alae anticae albae, apice nigrae, macula magna fulva. Posticae albae, margine postico nigro. Subtus omnes albae. Anticis puncto medio nigro maculaque apicis fulva, posticis lineola media parva fulva, quae puncto atro terminatur.

*Trite.* 146. P. D. C. alis integerrimis, flavis: anticis supra margine nigris: singulis subtus striga ferruginea. *Linn. Syst. Nat. II. 763. 97. Mus. L. U. 248.*  
*Seb. Mus. 4. tab. 23. fig. 17. 18.*

Habitat in Africa, Europa australi.

*Palaeno.* 147. P. D. C. alis integerrimis, flavis, apice nigris margineque fulvis: posticis subtus puncto argenteo. *Linn. Syst. Nat. II. 764. 99. Fn. Sv. 1041.*

Papilio hexapus alis rotundatis, albis, ocello parvo, fusco, oblongo, apicibus fuscis. *Uddm. Diff. 56.*

Habitat in Europæ pteride aquilina.

Antennæ rubrae, alarum margo pilis rubris ciliatus.

148. P.

148. P. D. C. alis rotundatis, flavis: posticis macula fulva, subtus puncto sesquialtero argenteo. *Linn. Syst. Nat.* II. 764. 100. *Fn. Sv.* 1040. *Hyale.*

Papilio alis luteis, limbo nigro, primariis macula nigra, secundariis fulva. *Geoff. Ins.* 2. 75. 48.

Papilio mediae magnitudinis, alis exterioribus summa parte flavis, ad margines nigricantibus. *Raj. Ins.* 112. 6.

Papilio croceus apicibus nigricantibus. *Petiv. Gazoph. tab.* 14. *fig. II.*

*Schaeff. Elem. tab. 94. fig. 7.*

— — *Icon. tab. 61. N.*

*Roef. Ins. 3. tab. 46. fig. 5. 6.*

Habitat in Europa, Africa, America.

149. P. D. C. alis integerrimis, fulvis: anticis puncto fusco, subtus omnibus pallidis, puncto niveo. *Lesbia.*

Habitat in Patagoniae littoribus. *Mus. Banks.*

Corpus medium, griseum. Alae supra fulvae, margine punctoque anticarum fuscis. Subtus omnes albidae, puncto centrali niveo, annulo fusco cincto.

150. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, flavis: singulis subtus puncto gemino, ferrugineo. *Linn. Syst. Nat.* II. 764. 103. *Sennae.*

*Sloan. Iam. 2. tab. 236. fig. II. 12.*

*Merian. Sur. 58. tab. 58.*

*Raj. Ins. 112. 5.*

Habitat in Americae cassia.

Affinis P. Trite. Variat alis supra flavissimis, apicibus nigris et flavissimis, immaculatis.

151. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, flavis: margine punctis nigris: posticis subtus puncto gemino, ferrugineo, argenteo. *Linn. Syst. Nat.* II. 764. 102. *Eubule.*

*Edw. Av. tab. 304.*

*Seb. Mus. 4. tab. 38. fig. 19. 20.*

Habitat in Carolina.

Affinis praecedenti. Variat sexu. Alter alis anticis ocello medio ferrugineo et margine fusco maculato. Alter alis supra immaculatis.

**Proterpia.** 152. P. D. C. alis integerrimis, angulatis, fulvis: anticis  
marginē exteriori nigro.

Habitat in Iamaica. *Mus. D. Hunter.*

Medius. Artennae nigrae. Alae anticae fulvae, mar-  
gine exteriori late nigro, postico nigro striato;  
subtus fulvae, immaculatae. Posticae angulatae, ful-  
vae, margine postico nigro-striato; subtus flavescen-  
tes, atomis fuscis.

**Drya.** 153. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, flavis: subtus  
anticis puncto ferrugineo, posticis argenteo.

Habitat in America.

Statura et color omnino P. Rhamni, saturate flavus;  
subtus puncto alae anticae ferrugineo, posticae ar-  
genteo, vivacissimo, annulo ferrugineo cincto.  
Alae haud angulatae.

**Eclipsis.** 154. P. D. C. alis integerrimis, angulatis, flavis: anticis  
punctis duobus maculaque nigris; posticis ocello  
coeruleo. *Linn. Syst. Nat.* II. 765. 107. *Am. acad.* 6.  
406. 67.

*Peruv. Gazoph.* 6. tab. 10. fig. 6.

Habitat in America.

**Rhamni.** 155. P. D. C. alis integerrimis, angulatis, flavis: singulis  
puncto ferrugineo. *Linn. Syst. Nat.* II. 765. 106.  
*Fn. Sv.* 1042. *Geoff. Inf.* 2. 74. 47.

Papilio praecox sulphurea, sive flavo-viridis, singulis  
alis macula ferruginea notatis. *Roj. Inf.* 112. 4.

*de Geer Inf.* 1. tab. 15. fig. 8. 9.

*Robert. Icon.* tab. 13.

*Roef. Inf.* 3. tab. 46. fig. 1. 2. 3.

*Alb. Inf.* tab. 2. fig. 3.

*Sulz. Inf.* tab. 13. fig. 84.

*Wilk. pap.* 48. tab. 1. a. 2.

Habitat in Europae, Africæ rhamno.

**Philea.** 156. P. D. C. alis integerrimis, angulatis, flavis: anticis  
macula, posticis limbo luteis. *Linn. Syst. Nat.* II.  
764. 104. *Amoen. acad.* 6. 404. 59.

*Roef. Inf.* 4. tab. 3. fig. 5.

Habitat in Indiis.

157. P. D. C. alis integris, angulatis, flavis: anticis supra macula atra, reliquis ferruginea. *Matrula.*

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Magna; statura praecedentis. Antennae extrorsum crassiores, ferrugineae. Corpus flavum. Alae anticae angulatae, flavae, macula media quadrata, atra et punctis parvis ferrugineis marginalibus; subtus pallidiores, macula media ferruginea, puncto flavo. Posticae angulatae, flavae, puncto medio parvisque marginalibus ferrugineis; subtus pallidiores, macula didyma, ferruginea, puncto flavo.

158. P. D. C. alis subangulatis, albis: anticis puncto nigro, subtus flavis: posticis punctis duobus argenteis. *Pomona.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Nimis affinis sequenti, cuius forte varietas. Differt tamen apice alae anticae supra magis nigro maculato et punctis tantum duobus in pagina inferiori alae posticae.

159. P. D. C. alis subangulatis, albis: anticis puncto fusco; posticis subtus punctis tribus argenteis. *Florella.*

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Banks.*

Statura P. Rhamni. Alae anticae puncto medio magno, nigro. Apex alae maculis aliquot fuscis. Subtus flavescentes, atomis fuscis maculaque media fulva, annulo fusco cincta. Alae posticae subangulatae, albae, subtus flavescentes, atomis fuscis punctisque tribus argenteis, annulo ferrugineo cinctis in medio, quarum anterior multo major.

160. P. D. C. alis integerrimis, angulatis, flavis: anticis supra disco fulvo, reliquis puncto ferrugineo. *Cleopatra.*

*Linn. Syst. Nat. II. 765. 105.*

*Seb. Mus. 4. tab. 26. fig. 7. 8.*

Habitat in Africa.

\* *Danai Festivi.*

161. P. D. F. alis integerrimis, nigris, albo-punctatis: anticis supra coerulescentibus, posticis supra punctorum alborum striga. *Linn. Syst. Nat. II. 765. 108.*

*Mus. Lud. Utr. 251.*

*Act. Hol.*

*AEt. Holmens.* 1748. tab. 6. fig. 1. 2.

*Ehret. piEt.* tab. 3. et 11.

*Kleeman. Ins.* 1. tab. 9.

*Seb. Mus.* 4. tab. 19. fig. 13. 14.

Habitat in Pavetta Indiae orientalis. *Koenig.*

*Niavius.* 162. P. D. F. alis integerrimis, nigris: anticis fascia alba; posticis macula communi baseos alba. *Linn. Syst. Nat.* ii. 766. 109. *Mus. Lud. Uhr.* 253.  
*Clerk. Icon.* tab. 32. fig. 2.

Habitat in Sierra Leon Africæ.

*Zoilus.* 163. P. D. F. alis integerrimis, atris: anticis maculis tribus, posticis disco albis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Antennæ nigrae, extrorsum crassiores. Thorax et abdomen fusca, albo-maculata. Alae anticae atræ, maculis tribus puncto que parvo ad marginem exterio rem albis: subtus concolores, et lineola baseos punctisque quinque apicis albis. Posticae nigrae, disco albo: subtus concolores, at limbus niger, albo punctatus.

*Antiochus.* 164. P. D. F. alis integerrimis, rotundatis, nigris: supra fascia communi fulva. *Linn. Mant.* i. 537.

*Aubent. miscell.* tab. 68. fig. 3. 4.

Habitat in China.

*Syphax.* 165. P. D. F. alis integerrimis, atris: anticis fascia alba, posticis rubra marginali.

Habitat in Indiis. *Mus. Lugdunense.*

Magnitudo P. Midami. Alae omnes concolores, atrae, anticis fascia media alba et maculis quinque albis, transversim positis versus apicem. Posticae fascia marginali rubra, margine tamen ipso nigro. Antennæ uncinatae.

*Evalthe.* 166. P. D. F. alis integerrimis, fuscis: anticis fasciis duabus flavis, posticis fascia flava rubra que.

Habitat in Indiis. *Mus. Lugdunense.*

Statura praecedentis, at minor. Alae fuscae. Anticae fasciis duabus flavis, quarum altera in medio, altera versus apicem, marginem haud attingens. Posticae fascia flava in medio et rubra maculari in margine. Subtus anticae concolores, posticae rufo pulverulentæ, fascia flava.

167. P. D. F. alis integerrimis, nigris, albo rufoque *Phaeton*.  
maculatis.  
Papilio Phaeton. *Drury Inf.* 1. tab. 21. fig. 2. 3.  
Habitat in America.
168. P. D. F. alis integerrimis, subfuscis: posticis subtus *Caeneus*.  
orbe macularum novem rubro. *Linn. Syst. Nat.* 11.  
766. III. *Mus. Lud. Ulv.* 271.  
Habitat in Indiis.  
Alae supra fuscae, flavo-maculatae, basi pallidae.
169. P. D. F. alis integerrimis, fuscis, concoloribus: an-  
ticeis maculis tribus flavis, posticis dimidiato albis. *Pintbaeus*.  
*Linn. Syst. Nat.* 11. 766. 114. *Mus. Lud. Ulv.* 258.  
Habitat in Indiis.  
Pars antica alarum posticarum alba, postica fusca.
170. P. D. F. alis integerrimis, fulvis: venis nigris dilata-  
tis; margine nigro punctis albis. *Plexippus*.  
767. 117. *Mus. Lud. Ulv.* 262.  
Papilio Iamaicensis major, alis amplissimis, media parte  
fulvis cum nervis nigris, maculis et punctis albis  
crebris sparsis. *Raj. Inf.* 138. 3.  
Papilio carolinianus rufescens, limbis nigris, albis  
guttulis adspersis. *Petiv. Mus.* 527.  
*Sloan. Linn.* 2. 214. tab. 239. fig. 5. 6.  
*Catesb. Carol.* 2. tab. 88.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 6. fig. 15. 16.  
— — — tab. 41. fig. 9. 10. 13. 14.  
Habitat in America septentrionali.  
Larva albo nigroque annulata, tentaculis ditibus collis  
caudaeque.  
Puppa incrassata, viridis, striga punctisque aureis.
171. P. D. F. alis subintegris, fulvis, margine nigro,  
albo punctato: posticis arcu nigro.  
Papilio Misippus alis subintegerrimis, fulvis, margine  
nigro alboque lineatis; posticis macula nigra. *Linn.*  
*Syst. Nat.* 11. 767. 118. *Mus. Lud. Ulv.* 263.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 6. fig. 17. 18.  
Habitat in America.  
Simillimus P. Plexippo, at paulo minor.

*Chrysip-*  
*pus.*

172. P. D. F. alis integerrimis, fulvis, margine nigro punctis albis: posticis disco punctis nigris. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 767. 119. *Mus. Lud. Ulr.* 263.

*Papilio Iamaicensis minor fulvescens*, imis alis limbo nigro, guttulis albis asperso cinctis. *Raj. Ins.* 139. I.  
*Papilio aegyptius*. *Schreb. Ins.* 9. fig. 11. 12.

*Edw. Av.* 189. tab. 189.

*Seb. Mus.* 4. tab. 6. fig. 9 — 12.

— — — tab. 13. fig. 13. 14.

*Kleemann. Ins.* 1. tab. 1. fig. 1.

Habitat in *Asclepia fruticosa* Indiae orientalis.

*Darius.*

173. P. D. F. alis integerrimis, fuscis: anticis albo maculatis; posticis subtus arcu nigro.

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

*Magnus*. Antennae extrorsum crassiores, fuscæ. Alæ anticae fuscæ, in medio ad marginem crassiorem macula oblonga alba, et tres aliae minores ad angulum ani. Litura alba ante apicem. Subtus concolores, at pallidiores. Posticae supra fuscæ, subtus griseac, arcu medio nigro, lunula parva albida.

*Daedalus.*

174. P. D. F. alis integerrimis, fuscis, albo maculatis: subtus brunneis.

Habitat in Guinea. *Mus. Banks.*

*Statura P. Mineus*. Corpus totum fuscum, immaculatum. Alæ fuscæ, lunulis quatuor majoribus baseos strigisque tribus punctorum albidorum. Posticae strigis tribus e punctis coerulecenti-albidis, puncto nigro foetis: subtus pallide-brunneae, immaculatae.

*Nicetus.*

175. P. D. F. alis integerrimis, fuscis: posticis supra fascia rubra marginali, punctis quinque nigris.

Habitat in India.

*Statura P. Hyperanthi*. Alæ fuscæ, anticis ocello magno atro versus medium marginis crassioris. Posticae fascia marginali rufa, in qua puncta quinque atra: subtus cinerascentes, strigis duabus macularibus albis, quarum posterioris maculae puncto nigro foetae.

Variat sexu, absque ocello alae anticae.

176. P. D. F. alis integerrimis, fuscis: fascia ferruginea, posticis subtus brunneis, ocellis tribus. *Linn. Syst. Nat. II. 767. 121. Mus. Lud. Ulr. 266.*  
*Clerk. Icon. tab. 35. fig. 3.*  
*Merian. Sur. tab. 35.*  
*Roes. Ins. 4. tab. 4. fig. 1. 2.*  
*Seb. Mus. 4. tab. II. fig. 8. 9.*  
*— — tab. 15. fig. 10. 11.*  
Habitat in Sophora Americes.  
Larva gregaria, nuda, lineata.
177. P. D. F. alis integerrimis, fuscis: fascia ferruginea, posticis subtus griseo-marmoratis, ocellis duobus. *Xanthus.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 767. 122. Mus. L. U. 267.*  
*Clerk. Icon. tab. 34. fig. 1. 2.*  
*Seb. Mus. 4. tab. II. fig. 1. 2.*  
*— — tab. 15. fig. 5. 6.*  
*— — tab. 20. fig. 15. 16.*  
Habitat in Asia.  
Ocellus alter lunula alba notatus.
178. P. D. F. alis integerrimis, fuscis: fascia ferruginea apice bifida, posticis subtus cinereis, ocellis duobus. *Cassiae.*  
Papilio Cassiae alis integerrimis, fuscis: primoribus posticarumque margine fascia ferruginea, omnibus subtus ocellatis. *Linn. Syst. Nat. II. 767. 120. Mus. Lud. Ulr. 265.*  
*Clerk. Icon. tab. 29. fig. 3.*  
*Merian. Sur. tab. 32.*  
Habitat in Cassia Americes.  
Simillimus praecedentibus. Larva tamen differt.  
Larva viridis, rubro-striata, capite bispinofo, cauda bifida.  
Puppa rufescens, maculis argenteis.
179. P. D. F. alis integerrimis, supra fuscis; anticis fascia, *Pirithous.*  
posticis disco omnibusque subtus albis.  
Habitat in America boreali. *Mus. Banks.*  
Affinis videtur P. Niavio. *Linn.* Alae anticae supra fuscae, fascia media obliqua albicante maculaque alba ad marginem tenuiorem, quae a disco albo alarum posticarum excipiuntur. Posticae disco albo, limbo fusco: subtus omnes albidae, atomis parvis fuscis irroratae.

*Polixenes.* 180. P. D. F. alis integris, fuscis: posticis subtus griseo fuscoque nebulosis.

Habitat in America boreali. *Mus. Banks.*

- Statura praecedentis. Corpus hirtum, nigrum. Alae omnes supra fuscae, immaculatae, uti et anticae subtus. Posticae subtus griseo fuscoque nebulosae, fascia media obscuriore.

*Polycar-* 181. *P. D. F.* alis integerrimis, supra nigris, subtus brunneis, immaculatis.

Habitat in Indiis. *Mus. Lugdunense.*

Alae omnes supra nigrae, obscurae, immaculatae, subtus brunneae, minime nitidae.

*Chori-* 182. *P. D. F.* alis integerrimis, fuscis: anticis falcatis, naeus. fascia fulva, posticis caudatis.

Habitat Surinami. *Drury.*

Statura praecedentium. Alae anticae falcatae, integræ, obscure fuscae, fascia lata fulva puncto que apicis albo. Posticae fuscae, immaculatae, caudis subarcuatis, obtusis, distantibus. Subtus anticae cinerascentes, strigis tenuissimis, fuscis, puncto que apicis albo. Posticae cinerascentes, strigis tenuissimis lineaque transversali fuscis punctisque quatuor albis ad marginem posticum. Corpus fuscum, collari pilis fulvis.

*Eribotes.* 183. *P. D. F.* alis integerrimis, subcaudatis, fulvis: basi coerulecentibus, subtus griseis.

Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*

Corpus medium, nigrum. Alae anticae ferrugineæ, basi cyaneæ, apice fuscae. Margo interior parum emarginatus. Posticae subcaudatae, ferrugineæ, basi cyaneæ. Subtus omnes griseæ.

*Morus.* 184. *P. D. F.* alis integris, subcaudatis, supra fuscis coeruleo-nitentibus, subtus griseis.

Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*

Medius. Alae anticae fuscae, basi coerulecentes marginaque interiori valde emarginato. Posticae subcaudatae, fuscae, basi coerulecentes. Subtus omnes griseo-virescentes.

185. P. D. F. alis integerrimis; anticis falcatis, rufis; apice nigris, macula marginali alba. *Orion.*  
apice nigris, macula marginali alba.

Habitat Surinami. *Mus. D. Hunter.*

**Magnus.** Antennae extrorfundi crassiores. Corpus fuscum. Alae anticae falcatae, rufae, apice late nigrae, macula alba ad marginem crassiorem: subtus variegatae, striga media undata, nigra. Posticae rotundatae, integrae, nigrae, basi subferruginea, margine postico palecente; subtus variegatae, striga undata, nigra.

186. P. D. F. alis integerrimis, atris, fascia anticarum coerulea, posticarum ferruginea: subtus viridibus. *Obrius.*

Papilio Obrinus. Variet. *E. Linn. Mus. Lud. Ulr.* 255.

Habitat in India.

187. P. D. F. alis integerrimis, supra fuscis, fascia coerulea maculaque ferruginea; subtus viridibus, fascia albicante. *Ancaeus.*

Papilio Ancaea. *Linn. Syst. Nat.* II. 781. 184.?

Habitat in India.

Alae omnes supra fuscae, anticis macula magna ferruginea, iride nigricante, pone hanc fascia coerulea, nitida et macula parva coerulea ad apicem alae. Posticae punctis tribus parvis nigris: subtus omnes virides, anticis fascia pallide-coerulecente, posticis strigis tribus punctisque duobus ferrugineo-fuscis.

188. P. D. F. alis integerrimis, fuscis: anticis fascia flava ocelloque subtripupillato, posticis ocellis quinque. *Clytus.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 768. 124. *Mus. Lud. Ulr.* 268.

Habitat in Africa.

189. P. D. F. alis integerrimis, fuscis, area rufa: anticis ocello bipupillato; posticis subtus septem punctatis. *Hyperbius.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 769. 130. *Mus. L. U.* 257.

Habitat in Africa.

Ocellus ad apicem alae anticae niger, punctis duabus albis.

- Aeropus.** 190. P. D. F. alis integerrimis, fuscis, fascia lutea: anticus subtus basi ocello unico. *Linn. Syst. Nat.* II. 769. 128. *Mus. Lud. Ulv.* 256. *Seb. Mus.* 4. tab. 9. fig. 3. 4.  
Habitat in Indiis.
- Canthus.** 191. P. D. F. alis integris, supra fuscis, immaculatis: posticis subtus ocellis sex.  
Papilio Canthus alis integerrimis, fuscis: subtus primoribus ocellis quatuor, posticis senis. *Linn. Syst. Nat.* II. 768. 129.  
Papilio Eurydice. *Amoen. acad.* 6. p. 406. 65.  
Habitat in America boreali.  
Alae omnes supra fuscae, immaculatae, subtus pallidiores, strigis duabus obliquis ferrugineis. Anticae ocellis tribus parvis obsoletis, posticae margine strigoso, ocellis sex, quinto maximo, sexto ad angulum ani minutissimo.
- Hyperanthus.** 192. P. D. F. alis integerrimis, fuscis: subtus anticus ocellis tribus, posticis duobus tribusque. *Linn. Syst. Nat.* II. 768. 127. *Fn. Sv.* 1043. *Geoff. Inf.* 2. 47. 14.  
Papilio Polymeda. *Scop. carn.* 434.  
Papilio media tota pulla prona alarum parte ocellis aliquot, e puncto albo, dupli circulo nigro et fordide luteo cincto, compositis. *Raj. Inf.* 129. 7. *Ammir.* tab. 30.  
*Sepp. Inf.* I. p. 24. tab. 4.  
Habitat in Europae graminibus.  
Variat alis supra ocellatis et immaculatis.
- Zangis.** 193. P. D. F. alis integerrimis, fuscis: omnibus subtus ocello unico; anteriarum bipupillato.  
Habitat in Carolina. *Mus. D. Hunter.*  
Statura P. Hyperanthi. Alae anticae supra fuscae, immaculatae, subtus strigis obscurioribus ocelloque magno atro, annulo flavo cincto, pupilla gemina nivea. Posticae supra fuscae, apice subferrugineae punctoque ad angulum ani subocellari, nigro: subtus fuscae, strigis duabus undatis, obscurioribus, apice pallidioribus, fusco-undatis punctisque quatuor parvis niveis. Ocellus parvus ater, annulo flavo cinctus, pupilla marginali nivea.

194. P. D. F. alis integerrimis, fuscis: anticis ocellis utrinque duobus, posticis supra uno, subtus quatuor; omnibus pupilla gemina. *Eurytus.*

Habitat in Iamaica. *Mus. D. Hunter.*

Antennae albo nigroque annulatae, apice ferrugineae.

Alae omnes integerrimae, supra fuscae, margine strigis undatis obscurioribus. Anticae ocellis duobus, posticae uno, omnibus atris, annulo flavescente cinctis pupillaque gemina argentea: subtus pallidiores, strigis duabus fuscis. Anticae ocellis duobus atris, iride flava pupillaque gemina argentea. Inter ocellos maculae duae argenteae. Posticae ocellis quatuor atris, pupilla gemina per paria approximatis, primo et quarto minoribus. Inter 2 et 3. maculae duae argenteae.

195. P. D. F. alis integerrimis, supra fuscis, immaculatis: posticis subtus ocellis sex; tribus coecis. *Hermes.*

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

Statura P. Hyperanthi. Corpus fuscum. Alae omnes supra fuscae, immaculatae, subtus pallidiores, strigis duabus undatis, obscuris. Ocelli tres obsoleti in alis anticis et sex majores in posticis atri, iride flava, pupilla nivea, e quibus tamen 1. 3. 4. coeci.

196. P. D. F. alis integerrimis, disco flavo: posticis ocello supra uno, subtus duobus. *Irius.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Statura praecedentis. Corpus fuscum. Alae anticae fuscae, fascia vel potius macula magna disci flava: subtus concolores, oculo parvo ante apicem. Posticae fuscae, fascia late ferruginea ocelloque atro, iride ferruginea pupillaque nivea: subtus fuscae, apice pallidae, ocellis duobus magnis atris, annulo ferrugineo et lato argenteo cinctis, pupilla nivea. Macula parva argentea inter ocellos. Margo alarum terminatur striga argentea.

Variat alis totis flavescentibus, margine solo fuso.

**Mineus.** 197. P. D. F. alis integerrimis, fuscis: anticis supra ocello unico, posticis subtus septem fasciaque alba.

Papilio Mineus alis integerrimis, subfuscis; subtus posticis ocellis septem; anticis duobus; supra unico.

*Linn. Syst. Nat.* II. 768. 126.

Habitat in China.

Alae posticae supra immaculatae, subtus fascia obliqua alba, ocellis septem.

**Medus.** 198. P. D. F. alis integerrimis, fuscis: subtus striga nivea ocellisque anticarum duobus, posticarum tribus.

Habitat in Capite Bonae Spei.

Alae omnes supra fuscae, immaculatae; subtus fuscae, striga communi nivea, quae nec marginem anteriores alae anticae, nec interiorem posticae attingit. Ocelli duo atri, iride flava, pupilla alba in alis anticis et tres in posticis, ocello tertio minore.

**Perseus.** 199. P. D. F. alis integerrimis, fuscis: subtus punctis ocellaribus; anticis tribus, posticis septem.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Corpus fuscum, immaculatum. Alae anticae fuscae, mox immaculatae, mox ocello parvo, pupilla alba ante apicem. Posticae fuscae, immaculatae. Subtus omnes basi fuscae, apice dilutiores, anticis punctis tribus, posticis septem albis subocellaribus.

**Terminus.** 200. P. D. F. alis integris, fuscis, area rufa; supra anticis ocello unico, posticis quatuor.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Statura praecedentium. Alae anticae fuscae, area late rufa ocelloque atro, pupilla alba: subtus basi fuscae, apice pallidae, ocellis quinque fere obsoletis strigaque undata fusca ante marginem. Posticae supra fuscae, area rufescente ocellisque quatuor atris, iride ferruginea pupillaque alba. Ocellus quartus fere obsoletus; subtus basi fuscae, striga obscuriore, apice pallidae, ocellis sex, 2. 3. 6. majoribus. Ante marginem striga undata fusca.

**Sirius.** 201. P. D. F. alis integerrimis, obscure rufis; supra anticis ocellis duobus; posticis quatuor.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Alae

Alae anticae obscure rufae, apice fuscantes, ocellis duobus ferrugineis, iride fusca, annulo atro cincta pupillaque alba; subtus glaucae, arcubus duobus strigaque ferrugineis, apice obscuriores, ocellis sex, quinto majori. Posticae obscure rufae, margine fuso, strigis obscurioribus. Ante marginem ocelli quatuor intermediis majoribus; subtus basi glaucae arcubus duobus strigaque medio ferrugineis, apice obscurioribus, ocellis septem, ultimo ad angulum ani minutissimo,

202. P. D. F. alis integerrimis, fuscis: anticis utrinque *Arctous*, ocello bipupillato, posticis supra subcoecis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Parvus, fuscus. Alae anticae concolores, fuscae, ocello magno nigro, iride ferruginea pupillaque gemina alba. Posticae fuscae, ocello minuto, subtus griseae, ocello magis distincto,

\* *Nymphales Gemmati.*

203. P. N. G. alis angulato-dentatis, fulvis, nigro maculatis: singulis ocello coeruleo. *Linn. Syst. Nat. 11. 769. 131. Fn. Sv. 1048. Geoff. Inf. 2. 36. 2.* Io.

Papilio elegantissima, singulis alis singulis maculis oculos imitantibus, perpelle depictis. *Raj. Inf. 422. 14.*

Oculis Pavonis. *Goed. tab. 1. fig. 23.*

*Hoeffnag. Pieltur. tab. 12. fig. 9.*

*Merian. Europ. 1. tab. 26.*

*Alb. Inf. tab. 3, fig. 4.*

*Reaum. Inf. 1. tab. 25. fig. 1. 2.*

*Roef. Inf. 1. Pap. 1. tab. 3.*

*Wilks pap. tab. 3, a. 2.*

*Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 1.*

Habitat in urtica, humulo.

Larva gregaria, spinosa, atra, albo punctata, pedibus posticis ferrugineis,

Puppa decemdentata, viridis, aureo-punctata, postice bifida.

*Almana.* 204. P. N. G. alis angulatis, fulvis, nigro-maculatis: posticis ocello majori, pupilla gemina, omnibus subtus brunneis.

Papilio Almana alis angulatis, luteis; singulis supra ocellis sesquialteris: anteriore pupilla gemina.

*Linn. Syst. Nat. II. 769. 132. Mus. Lud. Utr. 272.*

*Kleemann. Ins. I. tab. 5. fig. 3. 4.*

*Edw. Av. tab. 84.*

Habitat in Asia.

*Asterie.* 205. P. N. G. alis dentatis, luteo variis: posticis ocello majori, pupilla gemina; subtus pallidis ocellis subtribus.

Papilio Asterie alis dentatis, luteo variis, singulis utrinque ocellis sesquialteris: anteriore pupilla gemina.

*Linn. Syst. Nat. II. 769. 133.*

Habitat in acantho spinoso Indiae orientalis.

*Oenone.* 206. P. N. G. alis denticulatis, luteis, margine nigris: posticis basi cyaneis.

Papilio Oenone alis denticulatis: primoribus albido-maculatis, subbiocellatis; posticis basi cyaneis, ocellis duobus.

*Linn. Syst. Nat. II. 770. 135. Mus. Lud. Utr. 274. 275.*

*Kleemann. Ins. I. tab. 3. fig. 1. 2.*

*Petiv. Gazoph. tab. 4. fig. 3.*

*Edw. Av. tab. 37.*

*Seb. Mus. 4. tab. 14. fig. 15. 16.*

— — — tab. 30. fig. 17. 18.

Habitat in Asia.

Ocelli valde variant.

*Lemonias.* 207. P. N. G. alis dentatis, fuscis, flavo punctatis: omnibus ocello unico.

*Linn. Syst. Nat. II. 770. 136. Mus. Lud. Utr. 277.*

Habitat Ruelliis Indiae orientalis. *Koenig.*

Variat pupilla gemina et simplici, ocelloque unico, et sesquialtero.

*Orithya.* 208. P. N. G. alis dentatis, fuscis: omnibus supra ocellis duobus; anticis subtus unico.

*Linn. Syst. Nat. II. 770. 137. Mus. Lud. Utr. 278.*

*Roes. Ins. 4. tab. 6. fig. 2.*

*Edw.*

*Edw. Av.* 26. tab. 26.

*Seb. Mus.* 4. tab. 5. fig. 13. 14.

Habitat in China, in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Variat alis posticis, supra disco coeruleo et fusco.

209. P. N. G. alis dentatis, supra fuscis, coeruleo-micantibus: anticis ocellis duobus punctisque duobus albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 770. 138.

Habitat in Africa.

Ocelli ad marginem exteriorem, inter quos puncta duo alba.

210. P. N. G. alis dentatis, supra coeruleo, fusco alboque marmoratis: omnibus ocellis sex. *Feronia.*

Papilio Feronia alis dentatis, supra coeruleo fuscoque undatis: omnibus ocellis sex. *Linn. Syst. Nat.* II. 770. 140. *Mus. Lud. Ulv.* 283.

*Clerk. Icon.* tab. 31. fig. 1.

*Drury Inf.* tab. 10. fig. 1. 2.

*Aubent. miscell.* tab. 92. fig. 7. 8.

*Seb. Mus.* 4. tab. 10. fig. 15. 16.

Habitat in India orientali.

Ocelli supra pupilla alba, subtus coeci.

211. P. N. G. alis subdentatis, fuscis: utrinque anticis sesquiocello; posticis ocellis supra tribus, subtus sex. *Linn. Syst. Nat.* II. 771. 141. *Fn. Sv.* 1049. *Maera.*

Papilio alis fulvo fuscoque nebulosis: primariis sesquiocello, secundariis supra tribus, infra septem ocellis. *Geoff. Inf.* 2. 50.

Papilio media alis fulvo s. rufo et nigricante colore variis, cum ocello prope extimum angulum alarum exteriorum. *Raj. Inf.* 123. 15.

*Robert. Icon.* tab. 15. fig. 2.

*Merian. Europ.* I. tab. 27. fig. 16. 17.

*Wilk. pap.* 53. tab. 2. 6. 3.

*Anniral.* tab. 5.

Habitat in Europae gramine.

Larva subvillosa, virescens.

Puppa virescens, obtuse bifida: lateribus echinatis. *Scop.*

- Zelima.** 212. P. N. G. alis angulatis, flavis, fuscō subfasciatis: posticis utrinque ocellis sex; subtus striga alba.  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
 Statura P. Megaerae. Alae anticae angulatae, flavae, annulis duobus baseos fasciisque aliquot apicis fuscis. Ocelli sex parvi ferruginei, pupilla coerulescente ante apicem, quorum secundus major. Puncta alba in margine. Subtus fuscae, fasciis obscurioribus ocellisque obsoletis. Posticae flavae, margine reundo, striis fuscis. Ocelli sex ferruginei, pupilla coerulescente ante marginem, subtus fuscae, striga media alba obliqua ad marginem exteriorem macularis, ad interiorem obsoleta. Ocelli sex ante marginem posticum.
- Megaera.** 213. P. N. G. alis dentatis, luteis, fuscō fasciatis: anticis ocello, posticis supra quinis, subtus sex. *Linn. Syst. Nat. II. 771. 142.*  
 Habitat in Europae graminosis.
- Aegeria.** 214. P. N. G. alis dentatis, fuscis, luteo-maculatis: utrinque anticis ocello; posticis supra ocellis, subtus punctis quatuor. *Linn. Syst. Nat. II. 771. 143.*  
 Papilio alis rotundatis, dentatis, fuscis, fulvo-maculatis, anticis ocello unico: secundariis superne quadruplici. *Geoff. Inf. 2. 48. 16.*  
*Reaum. Inf. 1. tab. 27. sig. 16. 17.*  
*Wilk. pap. 53. tab. 2. b. 4.*  
*Roef. Inf. 4. tab. 33. fig. 3. 4.*  
*Edw. Av. tab. 178.*  
*Sepp. Inf. 1. 33. tab. 6.*  
*Schaeff. Icon. tab. 65. fig. 1. 2.*  
 Habitat in Europae graminibus.  
 Larva viridis, albo-lineata, cauda bifida.  
 Puppa rufescens.
- Xiphia.** 215. P. N. G. alis dentatis, fuscis, flavo-maculatis: utrinque anticis ocello posticisque supra tribus subtus quatuor.  
 Habitat in Madera. *Mus. Banks.*  
 Affinitas summa praecedentis. Alae omnes dentatae, finibus albis. Anticae concolores, fuscae, flavo-maculatae ocelloque ante apicem atro, pupilla alba.  
 Posti-

Posticae fuscae, macula media undata, flava. Pone hanc ocelli tres nigri, iride ferruginea, pupilla alba et quartus ferrugineus absque iride aut pupilla; subtus basi dentato fuscae, in medio fascia obsoleta alba, postice cinerascentes, ocellis quatuor, quarto remoto.

216. P. N. G. alis dentatis, fulvis, apice nigris, albo maculatis: posticis ocellis supra quinque coecis, subtus septem pupillatis. *Minerva.*

Habitat in America. *v. Robr.*

Alae anticae fulvae, apice nigrae, maculis quatuor vel quinque albis. Litura flavescens ante nigredinem apicis; subtus cinerascentes, lineolis duabus ferrugineis, litura flavescente et maculis quatuor albis. Posticae dentatae, supra fulvae, striga marginali ocellisque quinque coecis fuscis; subtus cinerascentes, ocellis septem, pupilla albicante.

217. P. N. G. alis subdentatis, fuscis, ocello unico: posticis subtus duobus. *Penelope.*

Habitat in America. *Drury.*

Alae supra omnes fuscae, ocello omnibus unico nigro, pupilla violaceo-argentea, vivacissima; subtus cinnereo flavoque nebulosae, strigis duabus ferrugineis obliquis, anticis ocello unico, pupilla dupli argentea. Maculae duae approximatae, argenteae ad utrumque latus ocelli. Posticae ocellis duobus majoribus, pupilla dupli argentea et inter hos maculae duae approximatae ejusdem coloris.

218. P. N. G. alis angulatis, pallidis, strigis undatis, fuscis: *Iatrophae.*  
anticis ocello unico, posticis duobus.

Papilio Iatrophae alis angulatis, pallidis: lineis undulatis: primoribus puncto unico; posticis duobus nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 779. 172. Mus. L. U. 289.*  
*Amoen. acad. 6. 408. 73.*

*Gronov. Gazoph. 2. 197. 790.*

*Merian. Sur. tab. 4.*

Habitat in Americae meridionalis Iatrophae, in nova Hollandia. *Dom. Banks.*

*Laomedea*, 219. P. N. G. alis dentatis, cinerascentibus: supra anticis ocellis sex, posticis quinque; quibusdam coecis.  
*Linn. Syst. Nat. II. 772. 144.*

Papilio Atlites. *Linn. Amoen. acad. VI. 407. 72.*  
*Drury Ins. I. tab. 5. fig. 3.*

Habitat in India orientali.

*Libye*. 220. P. N. G. alis dentatis, fuscis, subtus lineatis; posticis ocellis sex, pupilla argentea. *Linn. Syst. N. II. 772. 146.*  
Habitat in India.  
Alae anticae subtus ocello unico, posticis sex fuscis.

*Hedonia*. 221. P. N. G. alis dentatis, concoloribus, griseis: singulis ocellis sex ferrugineis. *Linn. Syst. Nat. II. 774. 153.* *Mus. Lud. Ulv. 279.*  
Papilio Luzonicus fuliginosus, oculatus et undulatus.  
*Petiv. Gazoph. tab. 39. fig. 4.*  
Habitat in Asia.

*Dejanira*. 222. P. N. G. alis dentatis, fuscis: anticis ocellis utrinque quinque; posticis sex fascia que alba repanda.  
*Linn. Syst. Nat. II. 774. 154.* *Mus. Lud. Ulv. 282.*  
Papilio Achine. *Scop. carn. 433.*  
*Roef. Ins. 4. tab. 33. fig. 1. 2.*  
Habitat in rhamno alpino Germaniae.

*Pegala*. 223. P. N. G. alis dentatis, fuscis: anticis fascia rufa ocelloque unico, posticis supra ocello, subtus sex.  
Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*  
Magnitudo P. Semle. Corpus fuscum. Alae anticae fuscae, fascia lata rufa, quae tamen margines haud attingit. Ocellus utrinque unicus, pupilla alba. Posticae supra fuscae, ocello atro, iride fulva pupillaque alba, subtus variegatae, ocellis sex atris, iride ferruginea pupillaque albida. Tres e his ocellis ad marginem tenuiorem connati, quintus maximus.  
Variat interdum ocello primo et quarto obsoletis.

*Semele*. 224. P. N. G. alis dentatis, fuscis, fulvo subfasciatis: posticis albo nigroque variegatis.  
Papilio Semele alis dentatis, fulvo nigroque nebulosis: anticis utrinque ocellis duobus; posticis supra unico. *Linn. Syst. Nat. II. 772. 148.* *Fn. Sv. 1051.*

Papi-

Papilio majuscula, alis pullis cum duplo in exteriorebus macula lutea et duplo ocello nigro. *Raj.*  
*Inf.* 128. 6.

*Hoeffn.* *Inf.* 2. tab. 8.

*Petiv.* *Gazoph.* tab. 14. fig. 9.

Habitat in Europae sylvis.

Alae anticae subtus flavescentes.

225. P. N. G. alis dentatis, fuscis, fascia pallida: anticis ocellis supra duobus, subtus uno. *Hermione.*

Papilio Hermione alis dentatis, fuscis, fascia pallida: primis ocello, posticis supra puncto. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 773. 149. *Mus. Lud. Ulv.* 281.

Papilio alis rotundatis, dentatis, nigro-fuscis, omnibus fascia albida, primariis ocello duplo, secundariis uno. *Geoff.* *Inf.* 2. 46. 13.

Papilio lusitanicus oculatus et marmoratus. *Petiv.* *Gazoph.* 12. tab. 7. fig. 5.

Papilio Fagi. *Scop. carn.* 428.

*Roef.* *Inf.* 3. tab. 34. fig. 5. 6.

*Schaeff.* *Icon.* tab. 82. fig. 1. 2.

Habitat in Germania, Gallia.

Similis P. Semele, at major.

226. P. N. G. alis dentatis, fuscis: fascia utrinque alba: anticis ocello uno. *Circe.*

*Roef.* *Inf.* 4. tab. 27. fig. 3. 4.

Habitat in Europa.

Pro varietate P. Semele habet *Linné*, at distinctus videtur.

227. P. N. G. alis dentatis, fuscis, concoloribus: anticis *Phaedra*. ocellis duobus violaceis. *Linn.* *Syst. Nat.* II. 773.  
150. *Mus. Lud. Ulv.* 280.

Papilio Dryas. *Scop. carn.* 429.

*Sepp.* *Inf.* 1. p. 1. f. 3. tab. 3.

Habitat in Europa.

228. P. N. G. alis dentatis, fulvis, apice nigris, ocello uno: posticis subtus cinereis, ocellis tribus minutissimis. *Merope.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Corpus fuscum, palpis acuminatis. Alae anticae fulvae,

apice nigrae, maculis tribus flavescentibus.

Ocel-

Ocellus magnus niger, iride fulva pupillaque coerulecente ante marginem, subtus concolores. Posticae fulvae, strigis duabus undatis; posteriore abbreviata margineque repando fuscis. Ocellus magnus niger, iride flava pupillaque coerulecente inter strigas, subtus obscure cinereae, punctis tribus ocellaribus, parvis, ultimo ad angulum ani majori.

- Ligea.* 229. P. N. G. alis dentatis, fuscis, fascia rufa: utrinque anticis ocellis quatuor, posticis tribus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 772. 144. *Fn. Sv.* 1050.  
*Alb. Inf.* tab. 5. fig. 1.  
 Habitat in Europae sylvis.

- Galathea.* 230. P. N. G. alis dentatis, albo nigroque variis: subtus anticis ocello unico, posticis quinque obsoletis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 772. 147.  
 Papilio alis rotundatis, albis, lineis maculisque nigris, pulcre tessellatis. *Geoff. Inf.* 2. 74. 46.  
 Papilio media, alis albo et nigro coloribus pulcre variegatis. *Raj. Inf.* 116. 9.  
 Papilio leucomelanos. *Petiv. Mus.* 3. 3. tab. 1. fig. 3.  
*Wilks pap.* 52. tab. 2. b. 1.  
*Roef. Inf.* 3. tab. 37. fig. 1. 2.  
*Schaeff. Icon.* tab. 12. fig. 5. 6.  
 — — tab. 30. fig. 9. 10.  
 Habitat in Europae gramine.

- Egaea.* 231. P. N. G. alis dentatis: supra nigris, fascia communis alba: posticis subtus ocellis duobus.  
 Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*  
 Parvus. Alae omnes supra nigrae, basi cyaneo nitentes, in medio fascia communis anteriorum interrupta, alba. Maculae duas parvae, albae versus apicem alae anterioris; subtus anticae fuscae, maculis albis lunulaque media ferruginea. Posticae basi fasciis albis fuscisque alternis, disco niveo, macula biloba, fusca, et in hac ocelli duo atri, iride ferruginea pupillaque magna, cyanea. Margo posterior glaucescens.

232. P. N. G. alis subdentatis, supra viridibus: posticis subtus disco albo; ocellis duobus. *Serina.*

Habitat in Iamaica. *Mus. D. Hunter.*

Statura praecedentis, cui subtus simillimus, at supra alae omnes virides, margine fuscescente.

233. P. N. G. alis dentatis, fuscis, disco fulvo: anticis *Pilosellae.* utrinque ocello nigro, pupilla gemina.

Papilio alis rotundatis, fulvis, oris fuscis, primariis ocello duplice continuo, secundariis duobus parvulis, infra fusco cinereoque nebulosis. *Geoff. Inf. 2. 52. 20.*

Papilio Tithonus alis subdentatis, concoloribus, disco luteis: primoribus ocello bipupillato; posticis punctis duobus albis. *Linn. Mant. 1. 537.*

*Sepp. Inf. 1. p. 21. tab. 3.*

Habitat in pilosella, plantagine Germaniae.

Larva virescens, albo-lineata, capite fusco.

234. P. N. G. alis dentatis, fulvis: posticis subtus disco *Cadma.* albo; ocellis duobus, pupilla didyma, coerulea.

Papilio Cadma. *Drury Inf. 2. tab. 18. fig. 1. 2.*

Habitat in America meridionali.

Parvus. Alae anticae fulvae, apice nigrae, fulvo maculatae; subtus concolores, macula apicis alba. Posticae supra fulvae, striga marginali obsoleta, fusca; subtus cinereae, disco albo, qui utrinque striga ferruginea includitur. Ocelli duo magni, cinerei in disco, iride fusca pupillaque magna didyma, coerulecente.

235. P. N. G. alis dentatis, fuscis: anticis subtus luteis, ocello utrinque unico; posticis subtus punctis tribus. *Linu. Syft. Nat. 11. 774. 156. Fn. Sv. 1053.* *Ianira.*

Papilio alis rotundatis, fuscis, primariis subtus fulvis, ocello unico. *Geoff. Inf. 2. 49. 17.*

Papilio media alis pullis. *Raj. Inf. 124. 16.*

Habitat in Europae sylvis.

Alter sexus P. *Partinae;* *Scopoli.*

*Iurtina.* 236. P. N. G. alis subdentatis, fuscis: anticis supra litura flava, ocello utrinque unico. *Linn. Syst. Nat.* 11. 774. 155. *Fn. Sv.* 152.

Papilio alis rotundatis, dentatis, supra fuscis: primariis macula fulva, infra e fulvo et fusco undulatis: primoribus utrinque ocello. *Geoff. Inf.* 2. 50. 18.

Papilio media alis exterioribus superne media parte rufis, oris pullis. *Raj. Inf.* 114. 17.

*Hoeffn. Inf.* 1. tab. 1. fig. 1.

*Alb. Inf.* tab. 53.

*Reaum. Inf.* 1. tab. 11. fig. 1.

*Wilk. pap.* 53. tab. 2. b. 2.

*Roef. Inf.* 3. tab. 34. fig. 7. 8.

*Sepp. Inf.* 1. p. 29. tab. 5.

*Schaeff. Icon.* tab. 58. fig. 2. 3.

Habitat frequens in Europae graminosis.

Larva villosa, viridis, linea laterali alba, cauda bifida.

Puppa flavescens.

*Gonerilla.* 237. P. N. G. alis dentatis, nigris, albo maculatis: fascia communi rufa: posticis ocellis quatuor.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Banks.*

Statura P. Cardui. Corpus fuscum, antennis apice puncto ferrugineo. Alae dentatae, anticae supra nigrae, fascia in medio lata ferruginea et pone hanc maculae tres aut quatuor albae; subtus basi fuscae, margine albo transversim striato, in medio rufae, macula ad marginem crassiorem atra, iride coerulea, apice fusco cinereoque variegatae. Posticae supra nigrae, fascia lata ferruginea et in hac ocelli quatuor atri, pupilla coerulescente quorum duo ultimi fere connati; subtus variegatae, ocellis duabus coecis.

*Itea.* 238. P. N. G. alis dentatis, nigris: anticis fascia punctisque flavis; posticis disco rufo, ocellis quatuor.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Banks.*

Summa praecedentis affinitas, cuius forte mera varietas. Differt tamen alis anticis basi rufo nitentibus fasciaque media haud rufa, sed flava, et posticis toto disco rufo, ocellis quatuor minutissimis.

239. P. N. G. alis dentatis, fulvis, albo nigroque variegatis: posticis subtus ocellis quatuor. *Linn. Syst. Nat.* II. 774. 157. *Fn. Sv.* 1054. *Geoff. Inf.* 2. 41. 7.  
*Papilio major* pulchra, nigro rubro albo coloribus varia. *Cardui.*  
*Raj. Inf.* 122. 13.  
*Hoeffn. Inf.* tab. 7. fig. 3.  
*Alb. Inf.* tab. 56.  
*Reaum. Inf.* I. tab. 26. fig. II. 12.  
*Wilks pap.* 56. tab. 3. a. 3.  
*Roef. Inf.* I. pap. 1. tab. 10.  
*Schaeff. Icon.* tab. 97. fig. 5. 6.  
*Habitat* in Europae, Africæ carduis.  
*Larva* solitaria, spinosa, fusca, lineis flavis: laterali-  
bus interruptis.  
*Puppa* fusca, lineis cinereis punctisque aureis.
240. P. N. G. alis subangulatis, fulvis, albo nigroque variis: posticis albo reticulatis ocellisque duobus. *Huntera.*  
*Papilio Cardui Virginiensis.* *Drury Inf.* I. tab. 5. fig. 1.  
*Papilio Belladonna Virginiana* oculis subtus minoribus.  
*Petiv. Gazoph. Dec.* 4. tab. 33. fig. 5.  
*Habitat* in Americae balsamita.  
*Praecedenti* affinis, at distinctus.  
*Larva* viridis, nigro annulata.
241. P. N. G. alis dentatis, subconcoloribus, fuscescentibus, fascia lutea; posticis ocellis quinque. *Linn. Syst. Nat.* II. 775. 158. *Mus. Lud. Ulr.* 284.  
*Tulbaghia.*  
*Seb. Mus.* 4. tab. 19. fig. II. 12.  
*Habitat* ad Cap. Bon. Sp.
242. P. N. G. alis crenatis, nigris, concoloribus: posticis disco fulvo: ocellis septem. *Linn. Syst. Nat.* II. 775. 159. *Mus. Lud. Ulr.* 285.  
*Pipileis.*  
*Clerk. Icon.* tab. 26. fig. 2.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 44. fig. 12. 13. 16. 17.  
*— — — tab. 46. fig. 13. 14.*  
*Habitat* in Indiis.
243. P. N. G. alis angulatis, supra fuscis: anticis disco flavescente, ocello atro: pupilla gemina. *Bankia.*  
*Habitat* in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
*Statura et magnitudo* P. Ledae. Alae omnes angulatae, luridae. Anticae ocello atro, pupilla alba duplicata.

Posticae puncto minutissimo, albo ad angulum ani: subtus omnes brunneae, atornis strigisque anticarum duobus, posticarum unica, obscurioribus. Puncta tria minutissima, virescentia in alis posticis et unicum in anticis.

- Solandra.** 244. P. N. G. alis angulatis, fuscis: anticis ocello fuscis: subtus quatuor.

Habitat in insula Otaheity maris pacifici. *Mus. Banks.*  
Statura praecedentis. Alae anticae angulatae, fuscae,  
litura apicis flava, ocello fuscum, pupilla gemina alba,  
anteriore majore; subtus griseae, ocellis duobus,  
anteriore minore. Posticae angulatae et fere cau-  
datae, fuscae, ocellis duobus approximatis nigris,  
iride flava, pupilla alba; subtus griseae sive cine-  
reo fuscoque variae, ocellis quatuor, primo et  
ultimo majoribus.

- Morna.** 245. P. N. G. alis dentatis, fuscis: posticis ocellis utrin-  
que duobus punctisque tribus albis.

Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*

Alae anticae fuscae, puncto apicis albo. Posticae den-  
tatae, obscuriores versus marginem posticum, ocel-  
lis duobus atris, coecis, iride lata coerulea pun-  
ctisque tribus albis. Macula coerulea ad angulum  
ani. Subtus omnes basi cinerascentes, maculis ni-  
gris; posticae fuscae, striga cinerea, in qua in alis  
posticis ocelli duo cocci, atri, iride coerulescente.  
Puncta praeterea tria alba in disco.

- Leda.** 246. P. N. G. alis angulatis, fuscis: anticis supra ocello  
geminato; subtus griseo reticulatis, posticis ocellis  
sex: *Linu. Syst. Nat.* II. 773. 151.

*Edw. Av.* 297.

*Drury Ins.* I. tab. 15. fig. 5. 6.

*Seb. Mus.* 4. tab. 42. fig. 5. 6.

Habitat in Africæ Sierra Leon.

- Europa.** 247: P. N. G. alis angulatis, fuscis: posticis subtus fascia  
ocellari albida.

Habitat in America. *Mus. Monson.*

Variat sexu. Alter alis anticis supra fuscis, fascia ma-  
culisque aliquot apicis albis, subtus fascia strigaque  
albis.

albis. Ocelli quatuor parvi approximati et fere obsoleti, pupilla fusca versus apicem. Posticae angulatae, supra fuscae, margine striga alba repanda maculisque aliquot obscurioribus in disco; subtus striga baseos marginisque alba, in medio fascia lata ex ocellis sex confluentibus, iride alba, pupilla magna nigra, ocello postico pupilla dupli.

Sexus alter supra immaculatus et subtus in alis anticis ocelli sex.

248. P. N. G. alis dentatis, utrinque fascia albida interrupta ocelloque unico.

Papilio Iris alis subdentatis, griseis: fascia utrinque alba, interrupta: posticis supra uniocellatis. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 775. 161.

Papilio alis angulatis, supra nigro-violaceis, albo-fasciatis, subtus fulvo, fusco albidoque variis, singulari ocello nigro, coeruleo. *Geoff. Inf.* 2. 61. 29.

Papilio major nigra s. pulla. *Raj. Inf.* 126. 2.

*Roef. Inf.* 3. tab. 42.

*Harris Inf.* tab. 3. fig. a—n.

*Wilks pap.* 63. tab. 1. a. 2.

*Ledermull. micr.* 89. tab. 49.

*Sultz. Inf.* tab. 14. fig. 86.

Habitat in salice, fraxino.

Variat colore nigro et flavo, at semper colore coeruleo splendet.

Larva seabra, viridis, lineis obliquis, albis, capite spinis duabus. *Roef. Inf.* 4. tab. 31. fig. 6.

Puppa compressa, bicornis, virescens.

\* *Nymphales Phalerati.*

249. P. N. P. alis dentato-caudatis: anticis basi rubris, apice nigris, albo-maculatis. *Acheronta.*

Habitat in Brasilia. *Druzy.*

Magnitudo P. Populi. Alae anticae subfalcatae, basi rufae, immaculatae, apice nigrae, maculis quatuor transversis, per paria approximatis, albis et unica solitaria ad marginem crassiorem: subtus glaucae, basi maculis tribus virescentibus; in medio striga tenuis, undata, nigra; apice fascia obscurior, quae ad marginem crassiorem terminatur macula alba.

Alae

Alae

Alae posticae dentatae caudataeque, fuscae, ferrugineo nitentes, immaculatae; subtus glaucae, basi maculis tribus ocellaribus, virescentibus; in medio striga undata, nigra fasciaque fusca. Punctum distinctum, atrum versus marginem posticum,

*Tringlody.* 250. P. N. P. alis dentato-caudatis, rufis: striga marginata. neque postico fuscis.

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Statura praecedentis. Antennae extrorsum crassiores, nigrae. Ala anticae falcatae, rufae, macula media, striga marginata postico fuscis. Posticae dentato-caudatae, rufae, striga media marginata postico fuscis. Puncta aliquot ferruginea, obsoleta in margine fusco; subtus omnes griseae sive cinereae, fusco irroratae.

*Populi.* 251. P. N. P. alis dentatis, fuscis, albo-fasciatis maculatisque, subtus luteis, albo fasciatis: maculis coerulecentibus. *Linn. Syst. Nat.* II, 776. 16. 2. *Fu. Sv.* 1055.

Papilio mediae magnitudinis elegantissima, alis supinis nigris, cum area transversa, alba: pronis variis coloribus depictis, *Raj. Inf.* 127. 3.

*Uddm. Diff.* 54. fig. 15.

*Clerk. Act. Holm.* 1753. p. 278. tab. 7.

*Schaeff. Icon.* tab. 40. fig. 8. 9.

*Seb. Mus.* tab. 12. fig. 25. 26.

*Roef. Inf.* 3. tab. 33. fig. 1. 2.

— — 4. tab. 31. fig. 1. 2.

Habitat in populo tremula,

Larva spinosa, variegata, capite caudaque fulvis.

Puppa flavescens, nigro-punctata: postice gibbere notata.

*Chrysippe.* 252. P. N. P. alis dentatis, nigris: area communi rufa: posticis subtus fuscis, atro maculatis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Affinis sequenti. Alae omnes dentatae, supra nigræ, area communi rufa, immaculata et fascia abbreviata alba in alis anticis. Subtus anticae basi rufae, margine crassiori albo nigroque maculato, postice fuscae, fascia abbreviata punctisque albis. Posticae fuscae, basi

basi cinerascentes, strigis plurimis subinterruptis, atris: in medio et versus marginem striga macularis, atra.

253. P. N. P. alis dentatis, nigris, albo maculatis: area communi rubra, subtus marmoratis. *Linn. Syst. Nat.* II. 776. 163. *Amoen. acad.* 6. 409. 76. *Clerk. Icon.* tab. 36. fig. 1.

Papilio Biblis. *Drury Inf.* 1. tab. 4. fig. 2.

Habitat in India.

Linea e punctis nigris in area rubra alarum posticarum.

254. P. N. P. alis dentatis, nigris: anticis fascia, posticis disco nigro - punctato albis. *Cyane.*

Papilio Cyane. *Drury Inf.* 1. tab. 4. fig. 1.

Habitat in India.

Affinis praecedenti.

255. P. N. P. alis dentatis, nigris: fascia communis alba: posticis subtus basi flavis, nigro - striatis. *Zenobia.*

Habitat in Sierra Leon. *Mus. Banks.*

Alae nigrae, fascia lata alba, anteriorum interrupta, nec marginem attingit. Margo sinibus albis. Subtus concolores, at posticae basi flavae, nervis striisque atris.

256. P. N. P. alis angulatis, nigris: limbo albido. *Linn. Syst. Nat.* II. 776. 165. *Fn. Sv.* 1056. *Geoff. Inf.*

2. 35. 1.

Papilio maxima nigra, alis utrisque limbo lato albo cinctis. *Raj. Inf.* 135. 136.

*Schaeff. Elem.* tab. 94. fig. 1.

— — *Icon.* tab. 70. fig. 1. 2.

*de Geer Inf.* 1. tab. 21. fig. 8. 9.

*Wilk. pap.* 58. tab. 2. a. 10.

*Sultz. Inf.* 1. tab. 14. fig. 85.

*Roef. Inf.* 1. *pap.* 1. tab. 1.

Habitat in Europae, Americae betula alba, salice.

Larva gregaria, spinosa, nigra: maculis dorsalibus quadratis, ferrugineis.

Puppa dentata, nigra; fulvo punctata.

**Ceres.** 257. P. N. P. alis dentatis, nigris: anticis fascia alba, posticis disco coerulecente: puncto atro.

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Banks.*

Corpus fuscum, palpis antennarumque clava ferrugineis. Alae anticae nigrae, fascia lata abbreviata alba ante apicem. Apex ipse albicat. Macula communis coerulescens ad marginem interiorem. Posticae nigrae, disco coerulecente nitido, puncto medio atro; subtus alae anticae cinereae, punctis tribus nigris distinctis ad basin et fascia alba ante apicem. Posticae griseae, basi nigro maculatae, et ante marginem posticum fascia macularis nigra.

**Atalanta.** 258. P. N. P. alis dentatis, nigris, albo maculatis: fascia communi purpurea; anticis utrinque, posticis marginali. *Linn. Syst. Nat.* II. 779. 175. *Fn. Sv.* 1060.

Papilio alis nigris, albo maculatis, omnibus fascia arcuata, coccinea. *Geoff. Inf.* 2. 40. 6.

Papilio major nigricans, alis maculis rubris et albis pulcre illustratis. *Raj. Inf.* 126. I.

*Alb. Inf.* tab. 3. fig. 4.

*Reaum. Inf.* I. tab. 10. fig. 8. 9.

*de Geer Inf.* I. tab. 22. fig. 5.

*Harris. Inf.* 12. tab. 6. fig. a-h.

*Roof. Inf.* I. pap. I. tab. 6.

*Wilk. pap.* 55. tab. 3. a. I.

*Ammiral. Inf.* tab. 24.

*Sepp. Inf.* I. p. 4. tab. I.

Habitat in urticis Europæ, Asiae, Americae.

Larva solitaria, spinosa, virescens, linea laterali flavicante.

Puppa dentata, nigricans, subtus cinerea, punctis aureis.

**Charonia.** 259. P. N. P. alis dentatis, nigris: fascia coerulecente.

Papilio Charonia. *Drury Inf.* I. tab. 15. fig. I. 2.

Habitat in India.

Alae omnes nigrae, obscurae, fascia lata coerulea, in qua aliquot puncta nigra sparsa. Subtus variegatae.

**Prosope.** 260. P. N. P. alis dentatis, fuscis: fascia communi fulva; anteriorum punctis duobus nigris.

Habitat in nova Hollandia.

Anten-

Antennae nigrae, subtus ferrugineae. Corpus fuscum. Alae antieae fuscae, in medio fascia lata fulva, punctis duobus nigris; apice obscuriores, macula una alterare fulva; subtus concolores, at pallidiores et striga postica e punctis nigris. Posticae fuscae, fascia media lata, fulva, immaculata, apice obscuriores; subtus pallidiores, striga postica undata, alba punctisque quinque nigris, annulo obsoleto, ferrugineo cinctis.

261. P. N. P. alis dentatis, concoloribus, atris: posticis fascia maculari sanguinea. *Biblis.*

Habitat in America,

Alae omnes atrae, anticis loco fasciae pallidioribus, posticis fascia e maculis septem sanguineis, apice emarginatis,

262. P. N. P. alis angulatis, fulvis, nigro - maculatis: anticis supra punctis quatuor nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 777. 166. Fn. Sv. 1057. Geoff. Inf. 2. 37. 3.* *polycheleros.*

Papilio urticariam referens major, quam Ulmariam vocitare soliti sumus. *Raj. 118. 2.*

*Merian. Eur. 2. tab. 2.*

*Alb. Inf. tab. 55.*

*Frisch. Inf. 6. tab. 3.*

*Reaum. Inf. 1. tab. 23. fig. 2.*

*Ammir. tab. 15.*

*Roef. Inf. 1. pap. 1. tab. 2.*

*Wilk. pap. 56. tab. 3. a. 5.*

Habitat in Pomonae arboribus.

Larva gregaria, spinosa, nigricans: linea laterali flava.

Puppa incarnata.

263. P. N. P. alis angulatis, fulvis, nigro - maculatis: anticis supra punctis nigris tribus. *Linn. Syst. Nat. II. 777. 167. Fn. Sv. 1058. Geoff. Inf. 2. 37. 4.* *Urticaria.*

Papilio urticaria vulgatissima, rufo, nigro, coeruleo et albo coloribus varia. *Raj. Inf. 117. 1.*

*Robert. Icon. tab. 5.*

*Hoeffn. piæt. 2. fig. 16.*

*Bradl. nat. tab. 27. fig. 2.*

*Merian. Eur. 1. tab. 44.*

*Alb. Inf. tab. 4. fig. 51.*

*Harris. Inf. tab. II. fig. 2 - 12.*

*Gord. Inf. 3. tab. 3.*

*Reaum. Inf. I. tab. 26. fig. 6. 7.*

*Roef. Inf. I. pap. I. tab. 4.*

*Wilk. pap. 56. tab. 3. a. 3.*

*Sepp. Inf. I. p. 17. tab. 2.*

Habitat in *urtica dioica*, *vulgatissimus*.

Larva *gregaria*, *spinosa*, *fusco viridique variegata*,  
capite *nigro*.

Puppa *dentata*, *fusca*, *maculis collaribus aureis*.

Variat interdum tota *aurea*.

*Direc.* 264. P. N. P. alis angulatis, fuscis: fascia anticarum fla-  
vescente; subtus nigro-undulatis. *Linn. Syst. Nat.*  
II. 778. 771. *Mus. Lud. Ulr.* 287.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 10. fig. 1. 2. 7. 8.  
— — — tab. 13. fig. 9. 10.

Habitat in *Indiis*.

Statura praecedentis. Alae posticae obtuse angulatae.

*C. album*, 265. P. N. P. alis angulatis, fulvis, nigro-maculatis:  
posticis subtus C albo notatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 778.  
168. *Fn. Sv.* 1059. *Geoff. Inf.* 2. 38. 5.

Papilio *ulmariae* similis. *Raj. Inf.* 118. 3.

*Robert. Icon.* tab. 23.

*Merian. Eur.* I. tab. 14. fig. 1.

*Frisch. Inf.* 4. tab. 4.

*Reaum. Inf.* I. tab. 27. fig. 9. 10.

*de Geer Inf.* I. tab. 20. fig. 9. 10.

*Harris. Inf.* tab. I. fig. a-d.

*Roef. Inf. I. pap. I. tab. 5.*

*Wilk. pap. 57. tab. 3. a. C.*

Habitat in *urtica*, *humulo*, *rubo*.

Larva *solitaria*, *spinosa*, *fulva*: dorso antice *flavo*,  
postice *albo*.

Puppa *carnea*, *medio coarctato*, *punctis aureis*.

*C. aureum*. 266. P. N. P. alis dentato-caudatis, fulvis, nigro macu-  
latis: posticis subtus C *aureo* notatis. *Linn. Syst. Nat.*  
II. 778. 169.

Habitat in *Asia*.

Affinis praecedenti, at duplo major.

267. P. N. P. alis angulatis, fulvis: strigis nigris undulatis; anticis puncto marginali albo. *Linn. Syst. Nat.* II. 778. 170. *Amoen. acad.* 6. 407, 71. *Ariadne.*  
 Habitat in Iava.  
 Alae subtus obscuriores s. fuscae, fasciis obscurioribus.
268. P. N. P. alis dentato-caudatis, fulvis, nigro-maculatis: subtus griseis, nigro irroratis. *Portia.*  
 Habitat in America. v. *Rothr.*  
 Corpus fulvum, antennis nigris. Alae anticae falcatae, fulvae, puncto ad marginem crassiores, striga media undata et margine postico nigris. Posticae dentato-caudatae, fulvae, apice obscuriores. Subtus omnes griseae, nigro irroratae, basi obscuriores. Puncta duo distincta nigra in alis posticis ad marginem posticum.  
 Varietas paulo minor alis anticis minus falcatis fulvis, puncto unico nigro. An mas?
269. P. N. P. alis dentatis, nigris: anticis maculis duabus; posticis solitaria, albo-coerulea. *Linn. Syst. Nat.* II. 781. 188. *Mus. Lud. Utr.* 295. *Gronov. Zooph.* 789. *Bolina.*  
*Clerk. Icon.* tab. 21. fig. 2.  
*Dury Inf.* 1. tab. 14. fig. 1. 2.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 25. fig. 15. 16.  
 Habitat in Portulaca Indiae orientalis. *Koenig.*
270. P. N. P. alis dentatis, nigris: anticis margine exteriori albo maculatis; posticis albo luteoque triplici ordine. *Linn. Syst. Nat.* II. 781. 189. *Mus. Lud. Utr.* 296. *Clytia.*  
 Habitat in India.  
 Alae concolores. Angulus ani fulvus, macula nigra. Corpus nigrum, albo maculatum.
271. P. N. P. alis angulato-dentatis: supra fuscis, albo-punctatis: fascia rubra, linea undata, nigra. *Linn. Syst. Nat.* II. 779. 174. *Amathea.*  
*Clerk. Icon.* tab. 40. fig. 3.  
 Habitat in Indiis.  
 Fascia rubra in alis anticis marginem anticum, in posticis posticum haud attingit.

*Leucothoe.* 272. P. N. P. alis dentatis, supra fuscis, fasciis tribus albis: subtus luteis; fasciis tribus albis, nigro notatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 780. 179. *Mus. L. U.* 292.

*Seb. Mus.* 4. tab. 45. fig. 1. 2.

*Aubent. miscell.* tab. 91. fig. 3. 4.

Habitat in Asia.

*Medea.* 273. P. N. P. alis dentatis, falcatis, nigris: fasciis tribus macularibus flavis, angulo ani rubro.

Habitat in India. *Drury.*

Summa affinitas praecedentis. Antennae obtusae, subfiliformes. Alae omnes atrae, fasciis tribus macularibus flavis. Punctum parvum rubrum versus apicem alae anticae et ad angulum ani posticae subtus fusco alboque variegatae.

*Melicerta.* 274. P. N. P. alis dentatis, concoloribus, atris, albo-punctatis fasciaque communi alba: anteriarum interrupta.

Papilio Melicerta. *Drury Inf.* 2. tab. 19. fig. 3. 4.

Habitat in Sierra Leon Africæ.

Praecedenti minor. Antennae nigrae, clava apice ferruginea. Thorax niger, albo punctatus. Alae anticae nigrae, basi apiceque albo-punctatae, in medio fascia lata alba, versus marginem tenuiorem interrupta. Posticae fascia media lata alba et margine albo punctato.

*Dorcas.* 275. P. N. P. alis dentatis, albis: margine flavo. Posticis subtus flavis, fasciis duabus albis.

Habitat in Carolina. *Mus. D. Hunter.*

Statura P. Leucothoe, at minor. Alae dentatae, supra omnes albae, limbo exteriori flavo. Margò ipse terminatur striga undata, fusca. Lunula ferruginea ad marginem crassiorem alae anticae; subtus anticae concolores, punctis aliquot apicis albis, posticae flavae, fasciis duabus albis, posteriore maculari.

*Amphino.* 276. P. N. P. alis dentatis, nigris, coeruleo-nebulosis: anticis fascia utrinque alba, posticis subtus rubro-radiatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 779. 176.

*Kleeman. Inf.* 1. tab. 10. fig. 1. 2.

*Merian. Sur.* tab. 7.

Habitat in America meridionali.

277. P. N. P. alis dentatis, atris: fascia alba: anticarum terminata macula rufa. *Nerina.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Magna. Antennae nigrae, clava apice ferruginea.

Caput nigrum, punctis quatuor verticalibus albis.

Thorax niger, pectore ferrugineo, albo-maculato.

Abdomen nigrum, ventre fusco, lineis duabus punctorum albidorum.

Alae atrae, fascia abbreviata, ante apicem e maculis quinque albis, ad marginem tenuiorem terminata macula magna rufa.

Puncta aliquot alba marginalia; subtus concolores, at pallidiores, et lunulae duea albae ad marginem crassioram.

Posticae atrae, in medio fascia lata alba, marginibus coerulecentibus.

Margo posticus albo-maculatus; subtus pallidiores, fascia media, striga punctorum ante marginem lunulisque marginalibus albis.

278. P. N. P. alis dentatis, fuscis: fascia communi arcuata, alba, marginibus coerulecente. *Linn. Syst.* *Venilia.*

*Nat. II. 780. 177. Mus. Lud. Ulr. 290.*

*Clerk. Icon. tab. 32. fig. 4.*

*Seb. Mus. 4. tab. 16. fig. 3. 4. 8. 9.*

Habitat in Indiis.

279. P. N. P. alis dentatis, atris: fascia coerulea, interrupta: singulis punctis septem albidis, marginalibus. *Linn. Syst. Nat. II. 780. 178. Mus. L. Ulr. 291.* *Alimena.*

*Seb. Mus. 4. tab. 11. fig. 13. 14.*

Habitat in Indiis.

280. P. N. P. alis dentatis, fulvis: fasciis tribus fuscis; anticarum longitudinalibus, posticarum transversis. *Linn. Syst. Nat. II. 780. 180. Mus. Lud. Ulr. 293.* *Phaerusa.*

*Roef. Ins. 4. tab. 2. fig. 1.*

Habitat in Indiis.

281. P. N. P. alis dentatis, fulvis: anticis strigis duabus, posticis margine postico nigris. *Iulia.*

Habitat in America. *v. Rohr.*

Statura praecedentis. Corpus fulvum, antennis nigris.

Alae anticae oblongae, subfalcatae, fulvae, strigis duabus apicis nigris, exteriore obsoletiore. Margo posticus nigricat et apex alae tenuissime albicat.

*Alae*

Alae posticae dentatae, fulvae, margine postico nigro, in quo tamen strigae duae tenuissimae, fulvae; subtus omnes cinerascentes: posticis macula baseos sanguinea et litura alba ad angulum ani.

- Laura.* 282. P. N. P. alis angulato-dentatis, fuscis: fascia communis dimidiato-fulva; posticis subtus argenteis: fascia nivea.

Papilio Laure. *Drury Inf.* 2. tab. 17. fig. 5. 6.

Habitat in Iamaica.

Alarum fascia antice fulva, postice nivea.

- Iphicla.* 283. P. N. P. alis dentatis, supra fuscis: fascia communis alba maculaque ferruginea anguli ani. *Linn. Syst. Nat.* II. 780. 181. *Mus. Lud. Ulr.* 311.  
*Drury Inf.* 1. tab. 14. fig. 3. 4.  
*Clerk. Inf.* tab. 41. fig. 3.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 13. fig. 5. 6.  
 — — tab. 30. fig. 15. 16.

Habitat in America meridionali.

- Delila.* 284. P. N. P. alis dentatis, oblongis, fulvis: anticis lunula nigra.

Habitat in America. *Eaton.*

Statura oblonga P. Phaerusa. Alae concolores, fulvae: anticis lunula nigra ad marginem exteriorem.

- Dido.* 285. P. N. P. alis dentatis, oblongis, nigris, viridi-maculatis: posticis fascia maculisque septem transversis, coeruleoscentibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 782. 192. *Amoen. acad.* 6. 408. 74.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 4. fig. 13. 14.  
*Merian. Sur.* 3. tab. 3.

Habitat in America.

- Neaerea.* 286. P. N. P. alis dentatis, supra fuscis, albo maculatis, subtus maculis albis, linea rubra cinctis. *Linn. Syst. Nat.* II. 782. 190. *Mus. Lud. Ulr.* 297.  
*Edw. Av.* 33. tab. 33.

Habitat in India.

Angulus ani ruber.

287. P. N. P. alis subdentatis; anticis nigris, basi fascia-  
que flavis, posticis flavis: subtus fasciis fuscis.  
*Linn. Syst. Nat. II. 782. 191. Mus. Lud. Ulr. 298.*  
*Seb. Mus. 4. tab. 27. fig. 1. 2.*  
— — tab. 30. fig. 7. 8.

Habitat in India.

288. P. N. P. alis dentatis, dilatato - venosis, nigris: ma-  
culis albis, sagittatis: posticis subtus maculis mar-  
ginalibus luteis. *Linn. Syst. Nat. II. 782. 195. Mus.*  
*Lud. Ulr. 301.*  
*Clerk. Icon. tab. 16. fig. 3.*  
*Ehret. pięt. tab. 17.*

Habitat in Asia.

289. P. N. P. alis subrepandis, concoloribus, nigris: *assimilis.*  
punctis coerulescenti - albidis; posticis punctis  
coccineis. *Linn. Syst. Nat. II. 782. 194. Mus. Lud.*  
*Ulr. 300.*  
*Clerk. Icon. tab. 16. fig. 1.*  
*Drury Inf. I. tab. 17. fig. 3. 4.*

Habitat in China.

290. P. N. P. alis subrepandis, concoloribus: punctis *similis.*  
coerulescenti - albis, versus basin lineatis. *Linn. Syst.*  
*Nat. II. 782. 193. Mus. Lud. Ulr. 299.*  
*Clerk. Icon. tab. 16. fig. 2.*  
*Petiv. Garoph. tab. 92. fig. 13.*

Habitat in Asia.

291. P. N. P. alis dentatis, nigris, albo maculatis: posti-  
cis subtus limbo nigro flavo alboque maculato. *affinis.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Caput, thorax et pectus atra, albo - punctata. Alae  
anticae concolores, nigrae, macula magna oblonga  
disci punctisque plurimis ante apicem albis. Posti-  
cae nigrae, disco strigaque punctorum ante margi-  
nem albis; subtus discus albus, limbo late fusco,  
ordine punctorum flavorum et duobus ordinibus  
punctorum alborum. Abdomen supra nigrum,  
subtus flavum.

- Panope.** 292. P. N. P. alis dentatis, fuscis, concoloribus: margine exteriori albo-maculato, angulo ani fulvo.  
**Papilio Panope** alis dentatis, fuscis, concoloribus, limbo exteriore albo-maculatis; posticis margine luteo maculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 782. 196.  
 Habitat in Asia.
- Nauplia.** 293. P. N. P. alis subdentatis, fuscis: anticis maculis quatuor, posticis fascia albidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 783. 197. *Mus. Lud. Ulr.* 309.  
*Clerk. Icon.* tab. 46. fig. 1. 2.  
 Habitat in India.  
 Fascia alarum posticarum linea nigra cincta.
- Sibilla.** 294. P. N. P. alis dentatis, supra nigris, subtus ferrugineis: fascia utrinque maculari alba. *Linn. Syst. Nat.* II. 781. 186. *Mus. Lud. Ulr.* 303.  
**Papilio** alis dentatis, supra nigris, subtus fusco-rubris, utrinque maculis albis, fasciatim posticis. *Geoff. Inf.* 2. 73. 45.  
**Papilio major** nigra s. pulla, alis supina parte maculis albis notatis. *Raj. Inf.* 126. 2.  
**Papilio Sibilla.** *Drury Inf.* I. tab. 16. fig. 1. 2.  
**Papilio rivularis.** *Scop. carn.* 443.  
*Roef. Inf.* 3. tab. 70. fig. 1. 2. 3.  
**B.** **Papilio Camilla** alis dentatis, fuscis, subconcoloribus, albo fasciatis maculatisque, angulo ani rubro. *Linn. Syst. Nat.* II. 781. 187.  
*Roef. Inf.* 3. tab. 33. fig. 3.  
*Petiv. Gazoph.* 72. tab. 12. fig. 10.  
 Habitat in Xylosteo, Caprifolio.  
 Larva viridis, capite spinisque rubris.  
 Puppa viridis, aureo-maculata: antice bicornis.
- Maja.** 295. P. N. P. alis dentatis, fuscis: anticis apice albo maculatis: posticis subtus cinereis, punctis quatuor virescentibus.  
 Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*  
 Magnitudo praecedentis. Mas antentis fuscis, albo annulatis, clava apice fulva. Corpus fuscum. Alae anticae fuscae, apice atrae, maculis sex albis: 1. 3. 2., subtus griseae, fascia ante apicem fusca, maculis subquinque albis. Posticae supra fuscae, immaculatae, subtus

subtus basi late emarginatae, griseae, punctis quatuor virescentibus, per paria approximatis, annulo fusco obsoleto cinctis. Versus marginem posticum striga undata, obsoleta, fusca.

Foemina alis supra coeruleo-nitentibus maculisque albis, obsoletis.

296. P. N. P. alis dentatis, nigris: fascia communi flava, *Pelarga*, nigro-punctata.

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

Corpus fuscum. Alae anticae fuscae, maculis duabus flexuosis ad marginem crassiorem baseos, in medio fascia lata flava, punctis tribus nigris; postice obsolete albo-punctatae; subtus concolores, at pallidiores. Posticae fuscae, fascia lata flava, punctis sex nigris margineque obsolete albo-punctato.

297. P. N. P. alis dentatis, supra fuscis, albo punctatis, *Melantha*. subtus brunneis.

Habitat in Guinea. *Mus. Banks.*

Alae omnes supra fuscae, basi lineolis aliquot albis, apice strigis tribus punctorum alborum, subtus brunneae, apice striga e punctis obscurioribus.

298. P. N. P. alis dentatis, fuscis: posticis subtus griseo-marmoratis. *Melissa.*

Habitat in insula Terre neuve Americae. *Mus. Banks.*

Alae supra fuscae, immaculatae. Posticae subtus albo nigroque variae.

299. P. N. P. alis dentatis, variegatis: supra anticis punctis sex, posticis quatuor rubris. *Linn. Syst. Nat. II.* 783. 200. *Rumina.*

Papilio tetrapus, alis ex coccineo, luteo, argenteo nigroque variegatis, primoribus rotundioribus. *Osb. It. 51.*

*Drury Ins. I. tab. 2. fig. 1.*

*Roef. Ins. 4. tab. 7.*

*Catesb. Car. 2. 95. tab. 95.*

Habitat in Europa australi.

300. P. N. P. alis dentatis, fuscis: fascia anticis fulva, posticis alba. *Linn. Syst. Nat. II.* 781. 183. *Mus. L. U.* 312. *Elea.*

Habitat in Indiis.

*Lena.* 301. P. N. P. alis subdentatis, fuscis: posticis postice atris, albo coeruleoque punctatis: subtus biocellatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 784. 206.

*Kleemann. Inf.* I. tab. 10. fig. 3. 4.

Habitat in America.

*Niphe.* 302. P. N. P. alis dentatis, luteis: anticis apice nigris, fascia albida: posticis subtus argentatis, ocellis quinque. *Linn. Syst. Nat.* II. 785. 208.

*Papilio Niphe. Drury Inf.* I. tab. 6. fig. 1.

*Papilio Hyperbius. Linn. Amoen. acad.* 6. 408. 75.

*Anh. miscell.* tab. 93. fig. 1. 2.

Habitat in China.

*Lescina.* 303. P. N. P. alis dentatis, fuscis, testaceo maculatis: subtus fasciis duabus macularum albidorum. *Linn. Syst. Nat.* II. 784. 203. *Fn. Sv.* 1061.

*Papilio fritillarius minor. Raj. Inf.* 122. 12.

*Petiv. Gazoph.* tab. 16. fig. 10.

*Schaeff. Icon.* tab. 3. fig. 6.

Habitat in Europae graminibus.

*Cinxia.* 304. P. N. P. alis dentatis, fulvis, nigro maculatis: posticis subtus fasciis tribus albidis, nigro maculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 784. 205. *Fn. Sv.* 1063. *Geoff. Inf.* 2. 45. 12.

*Papilio fritillarius fasciis subtus pallidis. Raj. Inf.* 121. 9.

*Petiv. Gazoph.* tab. 18. fig. 10.

*Wilks pap.* 58. tab. 3. a. 8.

*Roef. Inf.* 4. tab. 13.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 9.

*Schaeff. Elem.* tab. 1. fig. 9.

Habitat in Hieracio Pilosella.

Larva spinosa, atra, linea laterali e punctis albis.

Puppa fusca, subtus punctis fulvis linea ta.

*Dia.* 305. P. N. P. alis fulvis, nigro-maculatis: posticis fasciis tribus virescentibus: fimbria punctata.

*Papilio Dia alis dentatis, fuscis, testaceo-maculatis: subtus maculis quatuor ordinibusque punctorum duobus argenteis. Linn. Syst. Nat.* II. 785. 207.

*Papilio fritillaria fimbria punctata. Raj. Inf.* 121. 11.

*Roef. Inf.* 4. tab. 13. fig. 1. 2. 3. 6. 7.

Habitat in plantagine.

Simil-

Simillimus P. Cinxiae, at differt loco, larva, ordine punctorum nigrorum versus apicem, maculis omnibus magis irregularibus et fasciis griseo-virescentibus.

Larva grisea, spinarum albarum ferruginearumque ordinibus alternis.

Puppa flavescens, nigro variegata.

306. P. N. P. alis dentatis, variegatis, subtus reticulatis: *Levana*.  
anticis supra maculis aliquot albis. *Linn. Syst. Nat.*

II. 783. 201.

*Roef. Inf. 1. pap. 1. tab. 9.*

Habitat in urtica dioica.

Larva gregaria, spinosa, atra, pedibus rufis, capite bispinoso.

Puppa dentata, fusca, thorace subtus flavescente.

307. P. N. P. alis dentatis, fuscis: fascia utrinque alba, *Prorsa*.  
anticis interrupta: subtus albo-reticulatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 783. 202.

*Roef. Inf. 1. pap. 1. tab. 8.*

*Merian. Eur. 88. fig. 1.*

Habitat in urtica dioica.

Larva gregaria, spinosa, fusco fulvoque variegata,  
capite bispinoso.

Puppa dentata, supra fusca, subtus pallescens.

308. P. N. P. alis dentatis, fulvis, nigro-maculatis: subtus lineis argenteis transversis. *Linn. Syst. Nat.* II. 785. 209. *Fn. Sv. 1064. Geoff. Inf. 2. 42. 8.* *Paphia*.

Papilio major, alis fulvis, maculis nigris supina parte,  
prona transversis argenteis depicta. *Raj. Inf. 119. 4.*

*Roef. Inf. 1. pap. 1. tab. 7.*

*Wilks pap. 57. tab. 2. a. 7.*

*Schaeff. Elem. tab. 94. fig. 2.*

— — *Icon. tab. 97. fig. 3. 4.*

Habitat in Urtica.

Larva solitaria, spinosa, fulva, linea dorsali flava:  
spinis collaribus longissimis.

Puppa grisea, collo coarctato, dentibus sex punctis  
que quatuor antieis aureis.

- Cytherea.* 309. P. N. P. alis crenatis, flavis: fascia communis argentea, subtus fascia lanceolata, argentea. *Linn. Syst. Nat.* II. 785. 210. *Mus. Lud. Ulr.* 305. *Clerk. Icon.* tab. 39. fig. 3. *Seb. Mus.* 4. tab. 13. fig. 11. 12. — — tab. 31. fig. 5. 6.

Habitat in Indiis.

- Aglaja.* 310. P. N. P. alis dentatis, fulvis, nigro - maculatis: subtus maculis 21 argenteis. *Linn. Syst. Nat.* II. 785. 211. *Fn. Sv.* 1065. *Geoff. Inf.* 2. 42. 9. *Papilio major*, alis fulvis, supina parte maculis nigris crebris, prona etiam argenteis depictis. *Raj. Inf.* 119. 5. *Wilks pap.* 59. tab. 2. a. 12. *Schaeff. Icon.* tab. 7. fig. 1. 2.

Habitat in Europae viola.

Larva solitaria, spinosa, atra, maculis quadratis lateralibus ferrugineis.

Puppa fusca.

- Cybele.* 311. P. N. P. alis dentatis, fulvis, nigro maculatis, subtus maculis 34 argenteis. Habitat in America. Statura praecedentis. Alae omnes dentatae, luteae, nigro - maculatae. Subtus puncta octo in alis antecesis et 26 in posticis argentea.

- Idalia.* 312. P. N. P. alis dentatis, fulvis, nigro - maculatis: subtus maculis 37 argenteis: posticis supra coeruleis, albo punctatis.

Papilio Idalia. *Drury Inf.* 1. tab. 13. fig. 1. 2. 3.

Habitat in America boreali.

Antennae fulvae, clava nigra. Alae anticae fulvae, nigro maculatae, subtus maculis 11 albis. Posticae coerulescentes, striga duplice anteriori e punctis albis, posteriori e fulvis. Subtus fuscae, maculis 16 argenteis.

Sexus alter margine alarum anticarum albo - maculato et puncta posticarum omnia flava.

*Adippe.*

313. P. N. P. alis dentatis, fulvis, nigro - maculatis: subtus maculis 23 argenteis. *Linn. Syst. Nat.* II. 786.  
212. *Schaeff. Icon.* tab. 61.

Habitat in Europa.

Simillimus P. Aglajae, at subtus ordo punctorum ferrugineorum plerisque pupilla argentea.

314. P. N. P. alis dentatis, luteis, nigro - maculatis: subtus maculis 37 argenteis. *Linn. Syst. Nat.* II. 786.

213. *Fn. Sv.* 1068. *Geoff. Inf.* 2. 43. 10.

Papilio Regensis minor aureus, maculis argenteis, subtus perbelle notatus. *Raj. Inf.* 120. 6.

*Hoeffn. pict.* tab. II. fig. II.*Robert. Icon.* tab. 12.*Merian. Europ.* 2. tab. 157.*Koef. Inf.* 3. tab. 10.*Schaeff. Icon.* tab. I. fig. II..

Habitat in Europa.

Larva spinosa, fusca, nigro - maculata lineaque dorsali alba.

Puppa crenata, antice fusca, postice virescens.

315. P. N. P. alis dentatis, fulvis, nigro - maculatis: subtus maculis 9 argenteis. *Linn. Syst. Nat.* II. 786.

214. *Fn. Sv.* 1069. *Geoff. Inf.* 2. 44. II.

Papilio fritillarius major alis fulvis, superne maculis nigris, tessellatis. *Raj. Inf.* 120. 7.

*Petiv. Mus.* 35. 382.

Habitat in Europa, America septentrionali.

316. P. N. P. alis dentatis, fulvis, nigro - maculatis: subtus maculis pallidis punctisque quatuor argenteis,

~~ocellatis.~~ *Linn. Syst. Nat.* II. 786. 215. *Fn. Sv.* 1067.

Habitat in Europa.

*Niobe.*

317. P. N. P. alis dentatis, fulvis, nigro - maculatis: posticis subtus apice argentatis: maculis ocellaribus fulvis sex.

Habitat in America boreali. *Ammiral.*

Parvus in hac familia. Antennae cinereo fuscoque variegatae, clava fulva. Alae dentatae, in primis basi nigro maculatae. Subtus anticae fulvae, nigro maculatae, apice litura obsoleta, argentea.

Kk 3

Posti-

*Bellona.*

Posticae basi dilutiores, strigis obscurioribus maculaque obsolete argentea ad marginem crassorem; postice fusco argento-nitentes, maculis sex fulvis, annulo brunneo cinctis.

- Phalantha.* 318. P. N. P. alis dentatis, fulvis, nigro maculatis: posticis subtus apice glaucis: punctis ocellaribus fulvis tribus.

*Papilio Phalantha.* *Drury Ins.* 1. tab. 21. fig. 1. 2.  
Habitat in India orientali.

- Vanillae.* 319. P. N. P. alis dentatis, fulvis, nigro maculatis: subtus maculis 30 argenteis. *Linn. Syst. Nat.* II. 787.

216. *Mus. Lud. Ulv.* 306.

*Clerk. Icon.* tab. 40. fig. 2.

*Aubent. miscell.* tab. 70. fig. 2. 3.

*Merian. Sur.* 25. tab. 25.

*Sloan. Iam.* 2. tab. 239. fig. 23. 24.

Habitat in Epidendro Vanilla Americae.

\* *Plebeji Rurales.*

- Cupido.* 320. P. P. R. alis posticis sexdentato-caudatis, subtus albidis: maculis argenteis. *Linn. Syst. Nat.* II. 787.

217. *Mus. Lud. Ulv.* 313.

*Petiv. Gazoph.* tab. 10. fig. 9.

*Roef. Ins.* 4. tab. 3. fig. 7.

*Merian. Sur.* tab. 10.

*Aub. miscell.* tab. 18. fig. 4. 5.

*Seb. Mus.* 4. tab. 33. fig. 5—8.

Habitat in Gossypio Americes.

Larva alba, nigro-punctata.

- Amor.* 321. P. P. R. alis tricaudatis, fuscis: subtus disco variegato strigaque postica aurea.

Habitat in India orientali. *Mus. Tottianum.*

Magnitudo P. Argioli. Antennae albo nigroque annulatae, clava apice ferruginea. Corpus fuscum. Alae supra fuscae, anticis macula media alba, posticis fascia terminali rufa. Caudae tres filiformes, intermedia longiore. Subtus discus albo nigro flavoque variegatus; limbus fuscus, striga marginali in anticis alba, in posticis aurea. Maculae duae parvae, atrae ad angulum ani.

322. P. P. R. alis tricaudatis, fuscis, subtus albo maculatis: posticis supra albis. *Hymen.*  
*Habitat in Sierra Leon Africæ. Mus. Bankianum.*  
*Statura praecedentis. Alae anticae supra fuscae, macula communi albida ad marginem tenuiorem; subtus fuscae, lineolis variis transversis, albis. Posticae tricaudatae, albidae, macula communi marginis anterioris fusca; subtus fuscae, lineolis plurimis albidis. Margo posticus pallidus, macula strigaque terminali atris.*
323. P. P. R. alis bicaudatis, supra fuscis, fulvo maculatis: subtus strigis flavis, fulvis argenteisque variegatis. *Vulcanus.*  
*Habitat in India orientali. Mus. Tottianum.*  
*Corpus fuscum, striis lateralibus abdominis albis. Alae supra fuscae, anticis maculis quatuor transversalibus fulvis, secunda extus bifida. Posticae fascia marginali fulva punctoque anguli ani atro, iride aurea. Caudae duae filiformes, basi fulvae, medio atrae, apice albae; subtus fasciis flavis fulvisque alternis variegatae et in omni fascia fulva margines obscuriores et in medio striga argentea vivissima. Puncta duo atra ad angulum ani.*
324. P. P. R. alis bicaudatis, fuscis: macula rufa, subtus *Endymion.*  
*fascia maculisque duobus terminalibus rufis.*  
*Habitat in Brasilia. Mus. Bankianum.*  
*Affinis sequenti. Antennæ nigrae, albo-annulatae. Alae supra fuscae, macula magna rufa, quæ fere totum discum occupat. Caudae duae nigrae, apice albae, exteriore multo breviore; subtus alae pallidiores, fascia lata rufa, quæ striga alba terminatur. Ad angulum ani maculae duae rufae, pupilla atra.*
325. P. P. R. alis bicaudatis, supra fuscis, subtus pallensibus: fascia rufa ocelloque terminali rubro. *Echion.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 788. 224.*  
*Kleemann. Ins. I. tab. 7. fig. 3. 4.*  
*Habitat in America.*  
*Alae supra interdum coeruleo-nitidae.*

*Sphinx.* 326. P. P. R. alis bicaudatis, coerulescentibus: subtus cinereis, angulo ani macula gemina atra.

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Alae supra cyaneae, nitidae, margine anticarum fuscō.

Subtus cinereae, strigis duabus undatis, fuscis. Maculae duae atrae ad angulum ani, quarum altera antice lunula rufa cingitur, altera major in ipsa cauda alae. Caudae duae, anterior tenuissima, porrecta, atra, apice alba: posterior rotundata, brevior, supra tecta macula rufo-coerulescente, subtus macula magna atra.

*Marsyas.* 327. P. P. R. alis bicaudatis, supra coeruleis, subtus coerulecentibus: punctis atris. *Linn. Syst. Nat.* II. 788. 223. *Mus. Lud. Ulr.* 315. *Clerk. Icon.* tab. 41. fig. 1. *Kleemann. Ins.* I. tab. 5. fig. 1. 2.

*Edw. Av.* 81. tab. 81.

*Seb. Mus.* tab. 5. fig. 9. 10.

— — tab. 34. fig. 15. 16.

Habitat in America.

*Thero.* 328. P. P. R. alis dentatis, subbicaudatis, nigricantibus: maculis fulvis; subtus maculis argenteis. *Linn. Syst. Nat.* II. 787. 219. *Mus. Lud. Ulr.* 328.

Habitat in Africa.

*Centaurus.* 329. P. P. R. alis caudatis, coerulescentibus; limbo fuscō, subtus cinereis: maculis baseos ocellaribus.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Alae anticae supra coerulescentes, margine exteriori et postico fuscis; subtus cinereae, maculis quatuor vel quinque fuscis, annulo albo cinctis, pone has fascia fuscā, albo-marginata, quae tamē marginem tenuiorem haud attingit. Posticae coerulescentes, limbo fuscō; subtus cinereae, basi maculis sex vel septem fuscis, annulo albido cinctis; apice obsolete undatae.

*Betulae.* 330. P. P. R. alis subcaudatis, fuscis, subtus luteis: posticis strigis duabus albīs.

Papilio Betulae alis subcaudatis, fuscis, primoribus macula reniformi, fulva; subtus luteis, fascia fulva. *Linn. Syst. Nat.* II. 787. 226. *Fn. Sv.* 1070.

Papi-

Papilio supra fuscus macula fulva, subtus fulvus, linea dupli transversa albida, alis secundariis in imo caudatis. *Geoff. Inf.* 2. 58. 27.

Papilio minor alis exterioribus nigricantibus, macula in medio lata, arcuata, fulva. *Raj. Inf.* 130. 10.

*Wilks. pap.* 61. tab. 1. a. 2.

*Roef. Inf.* 1. *pap.* 2. tab. 6.

*Hoeffnag. Inf.* tab. 12. fig. 1.

*Alb. Inf.* tab. 5. fig. 7.

*Petiv. Gazoph.* tab. II. fig. II.

Habitat in betula, pruno spinosa.

Mas macula alarum fulva distinguitur.

Larva obesa, viridis: lineis duabus dorsalibus striisque obliquis transversis lateralibus, albis.

Puppa glabra, ferruginea.

331. P. P. R. alis subcaudatis, supra fuscis: posticis subtus fascia marginali fulva, nigro-punctata. *Linn. Syst. Nat.* II. 788. 221. *Fn. Sv.* 1071.

*Roef. Inf.* 1. *pap.* 2. tab. 7.

*Reaum. Inf.* 1. tab. 28. fig. 6. 7.

*Schaeff. Elem.* tab. 94. fig. 5.

— — *Icon.* tab. 14. fig. 1. 2.

Habitat in pruno.

Larva obesa, viridis, linea laterali albicante, dorso dentato.

Puppa fusca, capite albo.

332. P. P. R. alis subcaudatis, coerulescentibus: subtus cinereis, striga alba puncto que ani gemino fulvo. *Linn. Syst. Nat.* II. 788. 222. *Fn. Sv.* 1072.

Papilio supra coeruleus, subtus fuscus, linea transversali undata, albicante, alis secundariis infra macula dupli fulva et in imo caudatis. *Geoff. Inf.* 2. 57. 26.

Papilio alis latis exterius versicoloribus e nigro et coeruleo, imo margine nigro cum fimbria alba cinctis. *Raj. Inf.* 130. 9.

*Petiv. Gazoph.* tab. II. fig. 9.

*Albin. Inf.* tab. 52. fig. a. b.

*Roef. Inf.* 1. *pap.* 2. tab. 9.

*Wilks pap.* 61. tab. 1. a. 1.

Habitat in quercu.

*Quercus.*

Larva obesa, supra rosea: lineis tribus punctorum viridium.

Puppa glabra, ferruginea: lineis tribus dorsalibus punctorum fuscorum.

- Boëticus.* 333. P. P. R. alis caudatis, coerulecentibus, subtus cinereis, albo-undatis; angulo ani ocello gemino aurato. *Linn. Syst. Nat.* II. 789. 226.

Habitat in India. *Koenig.* In nova Hollandia. *Banks.* Cauda apice alba. Ocelli duo subtus ad angulum ani, iride aurata, pupilla nigra.

- Strephon.* 334. P. P. R. alis caudatis, fuscis, disco coerulecentibus, subtus cinereis: fascia alba, angulo ani ocello gemino rufo.

Habitat in India orientali.

Praecedenti valde affinis, distinctus tamen et minor. Alae subtus haud albo-undatae, sed fascia unica obliqua, et ocelli rufi pupilla nigra.

- Cleon.* 335. P. P. R. alis caudatis, fuscis; subtus cinereis: anticis striga, posticis fascia sanguinea, angulo ani ocello gemino rufo.

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

Antennae albo nigroque annulatae, clava nigra, puncto apicis fusco. Alae omnes supra fuscae, puncto parvo rubro ad angulum ani. Cauda elongata, linearis, nigra, apice alba. Subtus cinereae, lunulis marginalibus pallidioribus, anticis striga obscure sanguinea, posticis fascia lata, obliqua, dentata, sanguinea. Ad angulum ani ocelli duo rufi, pupilla atra. Tibiae nigro punctatae.

- Eryx.* 336. P. P. R. alis caudatis, nigris, subtus viridibus, posticis margine subdentato maculatoque. *Linn. Mant.* I. 537.

*Aubent. miscell.* tab. 71. fig. 4. 5.

Habitat in China.

- Aeolus.* 337. P. P. R. alis caudatis, cyaneis: anticis macula nigra; omnibus subtus fascia alba, nigro-striata.

*Aubent. miscell.* tab. 18. fig. 6. 7.

Habitat in Indiis.

Statura P. quercus. Antennae clavatae, nigrae. Alae anticae supra cyaneae, nitidissimae, macula media apiceque nigris. Posticae cyaneae, nitidissimae, margine nigro caudaque tenuissima nigra, apice alba; subtus omnes obscurae, fascia lata alba, striis variis nigris interrupta. Punctum parvum rubrum ad basin anteriorum et macula rubra cum aliquot albis ad apicem posticarum.

338. P. P. R. alis caudatis, fuscis, subtus viridibus, stigma argentea. *Simaëthis.*

Papilio Simaëthis. *Drury Inf.* 1. tab. 1. fig. 3.

Habitat in Indiis.

Statura P. Rubi.

339. P. P. R. alis subcaudatis, supra fuscis, subtus viridibus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 791. 237. *Fu. Sv.* 1077.

Papilio alis rotundatis, integerrimis, subtus viridibus, immaculatis. *Geoff. Inf.* 2. 64.

Papilio parva, alis supinis pullis, pronis, viridibus. *Raj. Inf.* 133. 22.

*Alt. Inf.* tab. 5. fig. 8.

*Wilks pap.* 62. tab. 1. a. 2.

*Petiv. Gazoph.* tab. 2. fig. 11.

*Schaeff. Icon.* tab. 29. fig. 5. 6.

Habitat in Rubo.

*Rubi.*

340. P. P. R. alis caudatis? fuscis, subtus striga obliqua nivea, posticis fascia submarginali rufa. *Ixion.*

Habitat in India. *Mus. Tottianum.*

Alae supra fuscae, coeruleo-nitentes; subtus obscure cinereae, anticis striga obliqua abbreviata, nivea; posticis punctis duobus baseos strigaque media niveis, apice fascia rufa, antice nigro-punctata.

341. P. P. R. alis caudatis, albis: supra limbo punctisque disci nigris, subtus angulo ani punctis tribus aureis. *Rofimon.*

Habitat in India. *Mus. Tottianum.*

Alae supra albae, limbo toto et punctis disci nigris. Basis alarum coeruleo colore splendet. Cauda linearis nigra, apice alba. Subtus alae totae albae, maculis plurimis nigris sparsis, quarum prima baseos longior fere fasciam constituit. Ad angulum ani puncta tria parva, aucta, nitida.

342. P.

*Narcissus.* 342. P. P. R. alis dentatis, fuscis: disco coerulecente, subtus fasciis maculisque sanguineis, argento marginatis.  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Antennae albo nigroque variegatae, clava apice rufa.  
Alae anticae fuscae, macula communi coerulea, nitida, subtus fuscae, margine exteriore flavescente.  
Lineae duae argenteae a basi ad medium alae, pone has lineola transversa punctaque tria argentea, tunc macula magna transversa rufa, argento marginata, et denique ad apicem puncta quinque argentea, pupilla atra. Posticae dentatae, nigrae, disco coeruleo, nitido; subtus fuscae, macula oblonga ad basin, pone hanc macula magna ovata, in medio fasciae duae, posteriore interrupta; omnes sanguineae, argento marginatae. Margo posticus sanguineus, striga argentea.

*Apelles.* 343. P. P. R. alis dentatis, fulvis: limbo fuso, posticis subtus fasciis rufis, argento marginatis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Affinis praecedentis. Antennae albo annulatae, apice fulvae. Alae anticae fulvae, apice fuscae; subtus flavescentes, lineolis tribus argenteis, anteriore breviore, a basi ad medium ductis; pone has macula transversa parva, rufa, punctaque sex argentea ad marginem crassiores. Margo posticus terminatur punctis quinque argenteis, pupilla nigra. Posticae fulvae, limbo fuso; subtus griseae, fasciis quatuor subinterruptis, rufis, argento marginatis. Ad angulum ani maculae tres transversales atrae. Margo posticus terminatur striga argentea.

An mas praecedentis?

*Thysbe.* 344. P. P. R. alis denticulatis, subcaudatis, fulvis, nigro maculatis: posticis subtus striatis auroque maculatis.  
*Linn. Syst. Nat. II. 789. 228. Mus. Lind. Ulr. 330.*

Habitat in Africa.

*Arion.* 345. P. P. R. alis ecaudatis, supra fuscis, disco coeruleo, maculis atris; subtus canis: punctis ocellaribus.  
*Linn. Syst. Nat. II. 789. 230. Fn. Sv. 1073.*

Papilio minor coerulescens. *Petiv. Gaz. tab. 35. fig. 2.*  
*Roeßl. Ins. 3. tab. 45. f. 3. 4.*

*Sultz.*

*Sultz. Inf.* 3. tab. 14. fig. 87.

*Poda Inf.* tab. 2. fig. 4.

*Schaeff. Icon.* tab. 98. fig. 5. 6.

Habitat in Europae pinetis.

346. P. P. R. alis ecaudatis: posticis subtus limbo ferrugineo: ocellis coeruleo - argenteis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 789. 232. *Fn. Sv.* 1074.

*Argus.*

Papilio alis rotundatis, integerrimis, fuscis, fascia marginali fulva, subtus cinereis: ocellis numerosis.

*Geoff. Inf.* 2. 63. 32.

Papilio parva, alis superne pullis cum ordine macularum lutearum ad inium marginem. *Raj. Inf.* 131. 12. *de Geer Inf.* tab. 4. fig. 14. 15.

*Wilks pap.* 63. tab. 1. a. 1.

*Merian. Eur.* tab. 153.

*Hoeffn. Inf.* 1. tab. 4.

*Robert. Icon.* tab. 17.

*Schaeff. Icon.* tab. 29. fig. 3. 4.

β. Papilio alis rotundatis, coeruleis; subtus ocellis numerosis. *Geoff. Inf.* 2. 61. 30.

Papilio parva, alis superne coeruleis; subtus cinereis, maculis nigris, circulo purpurascente cinctis punctisque nigris depictis. *Raj. Inf.* 131. 11.

γ. Papilio alis rotundatis, coeruleis, subtus ocellorum fascia solitaria. *Geoff. Inf.* 2. 63. 31.

Papilio minor alis supinis purpureo - coeruleis, subtus ocellorum fascia solitaria. *Raj. Inf.* 132. 17.

*Roef. Inf.* 3. tab. 37. fig. 4.

Habitat in Europae rhamno.

347. P. P. R. alis caudatis: supra coeruleis, margine nigris; subtus albidis, punctis nigris sparsis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 790. 234. *Fn. Sv.* 1076.

*Robert. Icon.* tab. 30.

Habitat in Europae pratis.

348. P. P. R. alis integerrimis, fuscis: subtus cinereis; anticis angulo postico punto gemino nigro.

Habitat in nova Hollandia. *Muf. Banks.*

Medius. Antennae albo nigroque annulatae, clava fusca. Alae integerrimae, supra fuscae, nitidae, imma-

immaculatae, subtus cinereae, atomis obsoletis, fuscis. Puncta duo magna, distincta ad angulum posticum alae anticae.

- Parsimon.** 349. P. P. R. alis integris, fuscis, subtus cinereis, albo undatis; posticis basi punctis ocellaribus nigris, apice ocello.

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Banks.*

Major. Antennæ albo-annulatae, clava fulva. Alae omnes supra fuscae, immaculatae, subtus cinereae, macula media reniformi fasciisque posticis lunularibus albidis: posticae ad basin punctis quinque atris, annulo albo cinctis et ad angulum ani ocellus ater, annulo antice rufo, postice aureo cinctus.

Variat supra alis anticis macula media nigra et posticis lunulis apicis albis maculaque rufa.

- Damoetes.** 350. P. P. R. alis integerrimis, fuscis: subtus cinereo-undatis; posticis ocello gemino aurato.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Parvus ex hac familia. Alae omnes integerrimae, supra fuscae, immaculatae, subtus griseae, cinereo-undatae. Ocelli duo atri, annulo antice flavo, postice aureo cincti, interiore minore ad angulum ani.

- Hylax.** 351. P. P. R. alis integerrimis: supra fuscis, immaculatis; subtus cinereis, nigro punctatis.

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Minimus in hoc genere. Antennæ fusco alboque annulatae. Alae rotundatae, supra fuscae, immaculatae, subtus cinereae, punctis nigris, postice arcubus fuscis.

- Caricae.** 352. P. P. R. alis integerrimis, fuscis: disco communis albo, limbo cinereo, subocellato. *Linn. Syst. Nat.* II. 792. 244. *Mus. Lud. Ulr.* 324.

*Clerk. Icon.* tab. 20. fig. 2.

*Merian. Sur.* 40. tab. 40. fig. 1.

*Aubent. miscell.* tab. 92. fig. 3.

Habitat in Carica Americes.

353. P. P. R. alis subangulatis, fuscis: macula albida, subtus basi albis strigaque rufa. *Midas.*

Habitat in Indiis. *Mus. Allemann.*

Statura praecedentis. Alae omnes supra fuscae, maculis anticarum duabus, posticarum unica albidis. Subtus anticae basi albae, cingente striga ferruginea semicirculari. Versus apicem macula alba. Posticae basi ultra medium albae, apice fuscae, striga ferruginea, in qua aliquot puncta nigra.

354. P. P. R. alis subangulatis, fulvis: margine fusco, subtus punctis nigris albisque. *Virgaureae.*

Papilio Virgaureae alis angulatis, fulvis, margine fusco, punctis atris sparsis. *Linn. Syst. Nat. II. 793.*

*Fn. Sv. 1079.*

*Geoff. Inf. 2. 65. 35.*

*Roef. Inf. 3. tab. 45. fig. 5. 6.*

Habitat in Solidagine Virgaurea.

355. P. P. R. alis subintegris, fulvis, nigro punctatis: subtus canescentibus. *Linn. Syst. Nat. II. 793. 252.*

*Fn. Sv. 1078.*

Papilio alis rotundatis, fulvis, utrinque punctis nigris.

*Geoff. Inf. 2. 65. 36.*

Papilio parva alis exterioribus circa margines nigris, media parte rufis, maculis nigris pictis. *Raj. Inf. 125. 20.*

*Merian. Eur. tab. 164.*

*Roef. Inf. 3. tab. 45. fig. 5. 6.*

Habitat in Europa.

356. P. P. R. alis ecaudatis, disco fulvo, nigro punctato: subtus purpurascentibus, maculis argenteis. *Linn. Syst. Nat. II. 789. 227. Mus. Lud. Ulr. 329.*

Habitat in Guinea.

357. P. P. R. alis integris, disco fulvo, nigro maculato: anticis subtus argenteo maculatis. *Linn. Syst. Nat. II. 789. 231. Mus. Lud. Ulr. 331.* *Zeuxo.*

Habitat in Africa.

Alae anticae subtus maculis plurimis nigris sparsis, pupilla coeruleo - argentea. Posticae immaculatae.

358. P.

- Lara.** 358. P. P. R. alis integerrimis, subtestaceis: supra anticis uniocellatis, posticis biocellatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 791. 238. *Mus. Lud. Ulv.* 320.  
**Habitat** in Africa..  
 Ocelli nigri, iride alba. Subtus alae anticae ocellis duobus, posticae coecae.
- Cephus.** 359. P. P. R. alis integris, fuscis: subtus coeruleo-fasciatis: anticis ocello uno, posticis quatuor.  
**Habitat** in Indiis. *Gronovius.*  
 Alae integrae, fuscae, supra immaculatae, subtus fasciis plurimis approximatis coeruleis. Ocellus parvus in apice alae anterioris et quatuor in posticis, per paria approximati.
- Metis.** 360. P. P. R. alis integerrimis, fuscis: maculis fulvis sparsis, posticis subtus immaculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 792. 245. *Mus. Lud. Ulv.* 325.  
**Papilio Metis.** *Drury Ins.* 2. tab. 16. fig. 3. 4.  
**Habitat** ad Cap. Bonae Spei.
- Neleus.** 361. P. P. R. alis integerrimis, concoloribus, nigris: anticis punctis decem albis: posticis disco toto albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 792. 246. *Mus. L. U.* 260.  
*Clerk. Icon.* tab. 45. fig. 2.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 30. fig. II. 12.  
**Habitat** in Indiis.
- Athemon.** 362. P. P. R. alis integerrimis, subfuscis: disco communis albo: fascia postica dimidiata, fusca. *Linn. Syst. Nat.* II. 792. 243. *Mus. Lud. Ulv.* 323.  
*Clerk. Icon.* tab. 57. fig. 2.  
 — — tab. 46. fig. 3.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 27. fig. 25. 26.  
**Habitat** in America.
- Talans.** 363. P. P. R. alis integerrimis, concoloribus, fuscis: anticis punctis albis basique sanguineis, posticis disco albo. *Linn. Syst. Nat.* II. 792. 247. *Amoen. acad.* 6. 407. 70.  
*Clerk. Icon.* tab. 45. fig. 1.  
*Seb. Mus.* 4. tab. 57. fig. 18.  
**Habitat** in Indiis.

364. P. P. R. alis integerrimis, concoloribus, atris: anticus fascia linearis rubra. *Linn. Syst. Nat.* II. 792.  
 248. *Mus. Lud. Ulr.* 326.  
*Clerk. Icon.* tab. 45. fig. 4.  
 Habitat in America.
365. P. P. R. alis angulatis, fuscis: omnibus striga rubra; subtus cinereo-punctatis. *Papilio* alis subangulatis, utrinque atris: omnibus fascia linearis rubra. *Linn. Syst. Nat.* II. 793. 250.  
*Mus. Lud. Ulr.* 332.  
*Papilio Lysippus. Drury Inf.* I. tab. 2. fig. 2.  
*Clerk. Icon.* tab. 22. fig. 2.  
 Habitat in America.
366. P. P. R. alis integerrimis, nigris, concoloribus: anticus fascia duplice fulva. *Linn. Syst. Nat.* II. 793. 251. *Mus. Lud. Ulr.* 319.  
 Habitat in Indiis.  
 Macula minor fulva, fascias uniens. Alae posticae nigrae, immaculatae.
367. P. P. R. alis ecaudatis, fuscis, subtus maculatis: posticis postice supra ocellis duobus, subtus uno. *Linn. Syst. Nat.* II. 790. 233.  
 Habitat in Africa.
368. P. P. R. alis integerrimis, flavis: subtus anticus ocello uno, posticis cinereis: fascia ocellisque quatuor obliteratis. *Linn. Syst. Nat.* II. 791. 239.  
*Fn. Sv.* 1044.  
*Papilio Menalces. Scopol. Ent.* 458.  
*Papilio* alis rotundatis, fulvis, oris fuscis, primariis subtus ocello uno, secundariis subtus albo cinereo-que variegatis. *Geoff. Inf.* 2. 53. 21.  
*Papilio parvus* e fulvo et fusco bicolor, fulvo medium alam, fusco oras extremas occupante, cum ocello ad extremum angulum alarum exteriorum. *Raj. Inf.* 125. 19.  
*Roef. Inf.* 2. tab. 34. fig. 7. 8.  
*Merian. Eur.* tab. 134.  
 Habitat in Europae pratis sylvaticis.

- Arcanius.** 369. P. P. R. alis integerrimis, ferrugineis: subtus anticis ocello unico, posticis quinis: primo fascia remoto. *Linn. Syst. Nat. II. 791. 242. Fn. Sv. 1045.*
- Papilio alis rotundatis: primoribus fulvis, oris fuscis, subtus ocello unico: posticis supra fuscis, infra cinereis, fascia alba ocellisque quinque. *Geoff. Ins. 2. 53. 22.*
- Papilio Amyntas.** *Scop. Entom. 457.*  
- *Schaeff. Elem. tab. 94. fig. 3.*  
Habitat in Europae sylvis.
- Morpheus.** 370. P. P. R. alis integerrimis, fulvis, nigro maculatis: posticis utrinque striga punctorum nigrorum.  
Habitat in America boreali.
- Parvus: magnitudine P. Pamphili. Alae omnes integerrimae, fulvae, maculis marginaque nigris. Posticae punctis sex nigris in strigam dispositis versus marginem posticum. Subtus anticae fulvae, nigro maculatae; posticae pallescentes, strigis undatis margine punctisque sex fuscis. Antennae nigrae, albo annulatae, apice fulvae. Corpus supra fuscum, subtus cinereum.
- Sabaens.** 371. P. P. R. alis integerrimis, fuscis: posticis supra ocellis quatuor coecis; subtus sex pupillatis.  
Habitat in Lipsiae nemoribus.
- Statura omnino sequentis. Corpus nigrum. Antennae nigro alboque annulatae. Alae anticae supra fuscae, immaculatae, subtus ocello parvo strigaque postica argentea. Posticae fuscae, ocellis quatuor coecis, intermediis duobus majoribus, subtus basi fuscae, fascia dentata alba, apice fulvae, ocellis sex, pupilla alba strigaque marginali argentea.
- Hero.** 372. P. P. R. alis integerrimis, fuscis: subtus anticis ocello, posticis senis. *Linn. Syst. Nat. II. 793. 253. Fn. Sv. 1047.*  
Habitat in Europa.
- \* *Plebeji Urbicolae.*
- Exclamationis.** 373. P. P. U. alis integris, divaricatis, fuscis: anticis lineola punctoque flavescensibus.  
Habitat in India. *Koenig.*

Statu-

Statura sequentis, at paulo major. Corpus totum fuscum. Alae fuscae, anticis macula linearis flavescente et sub macula punctum ejusdem coloris.

374. P. P. U. alis integerrimis, divaricatis, fulvis, lineola nigra: subtus punctis albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 793. 256. *Fn. Sv.* 1080.

Papilio alis divaricatis, fulvis, limbo nervisque nigris, primariis macula oblonga nigra. *Geoff. Ins.* 2. 66. 37. *Petiv. Gazoph.* tab. 24. fig. 7. 8. 9. *Merian. Eur.* 15. tab. 48.

Habitat in Europa.

Larva viridis, albo punctata.

Puppa elongata, cylindrica.

375. P. P. U. alis divaricatis, fulvis: fascia obliqua marginaque postico nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 794. 257. *Amoen. acad.* 4. 410. 80.

Habitat in India. *Mus. Tottianum.*

Affinis praecedenti alis, antennis mucronatis, clava subtus fulva. Lingua nigra.

376. P. P. U. alis divaricatis, fulvis: macula media marginaque striato fuscis.

Habitat in India. *Mus. Tottianum.*

Summa affinitas P. Commatis. Antennae nigro fulvoque annulatae, clava uncinata, basi fulva, apice nigra. Alae omnes fulvae, anticis, macula magna media marginaque postico fuscis. Posticae margine exteriori et postico fuscis; subtus alae fulvae, immaculatae.

377. P. P. U. alis integerrimis, divaricatis, fuscis, flavo maculatis.

Habitat Lipsiae.

Statura P. commatis. Antennae uncinatae, nigro alboque annulatae, apice lutescentes. Alae omnes fuscae, maculis plurimis lutescentibus.

378. P. P. U. alis caudatis, fuscis, subtus brunneis, striga flavescente.

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Banks.*

Statura et magnitudo P. Proteus. Alae caudatae, cauda filiformi longitudine fere alae, fuscae, macula

*Commata.*

*Angias.*

*Coloss.*

*Silenus;*

baseos coerulea; subtus omnes brunneae, striga unica pallidiore. Antennae extrorsum crassiores, obtusae.

*Proteus.* 379. P. P. U. alis caudatis, fuscis: maculis fenestratis, antennis uncinatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 794. 259.  
*Mus. Lud. Ulr.* 333.

*Clerk. Icon.* tab. 42. fig. I. 3.

*Merian. Sur.* tab. 63. fig. 2.

Habitat in Americes gramine.

Valde variat maculis alarum.

*Faunus.* 380. P. P. U. alis caudatis hyalinis: margine strigaque nigris.

Habitat in Indiis. *Mus. Hagenense.*

Statura praecedentis. Corpus nigrum. Alae omnes hyalinae, concolores, margine et striga tenuissima nigris. Cauda porrecta longitudine fere alarum. Angulus ani macula coccinea.

*Licuris.* 381. P. P. U. alis caudatis, nigris: fasciis duabus hyalinis. Habitat in Indiis. *Mus. Hagenense.*

Antennae et alae nigrae, fasciis duabus obliquis, hyalinis. Cauda longissima maculis duabus parvis rubris ad angulum ani.

*Tityrus.* 382. P. P. U. alis subcaudatis, fuscis: anticis utrinque fascia flava, posticis subtus nivea.

Papilionoides caroliniana fusca, signatura aurea pellucida, subtus albida. *Petiv. Gazoph.* 51. tab. 32. fig. 5. Habitat in America.

Antennae nigrae, uncinatae. Alae anticae concolores, fuscescentes, fascia abbreviata, macula una alterave apicis flavis: posticae subcaudatae, supra immaculatae, subtus fascia lata albissima.

*Thyrsis.* 383. P. P. U. alis subcaudatis, fuscis: anticis fascia flava, subtus omnibus purpureis, flavo irroratis.

Habitat in America.

Alae anticae fuscae, fascia media flava et punctis tribus parvis ad apicem; posticae pilosae, fuseae, immaculatae. Subtus omnes purpurascentes, atomis innumeris et anticis fascia maculisque tribus apicis flavis.

384. P. P. U. alis subcaudatis, fuscis, fenestrato maculatis: posticis subtus puncto baseos atro. *Amyntas.*  
 Habitat in America. *Mus. Tottianum.*  
 Antennae uncinatae, apice subferrugineae. Alae posticae supra immaculatae, subtus glaucae, fasciis tribus obscurioribus et puncto distincto atro ad basin.
385. P. P. U. alis subcaudatis, fuscis: anticis flavo maculatis; posticis subtus fusco glaucoque variis. *Coridon.*  
 Habitat in Iamaica. *Mus. D. Hunter.*  
 Praecedenti nimis affinis. Antennae uncinatae, fuscae, subtus ferrugineae. Corpus fuscum, abdomine subtus ferrugineo. Alae anticae concolores, fuscae, maculis aliquot flavis in disco. Margo posticus albus, fusco punctatus. Posticae supra fuscae, immaculatae, margine postico albo, fusco punctato; subtus fusco\*glaucoque variae.
386. P. P. U. alis subcaudatis, fuscis: anticis fascia lutescente exteriore maculaque coerulea postica subtusque ocello. *Linn. Syst. Nat. II. 794. 262. Amoen. acad. 6. 409. 78.*  
*Clerk. Icon. tab. 36. fig. 2.*  
*Seb. Mus. 4. tab. 41. fig. 17. 18.*  
 Habitat in Indiis. *Aetorion.*
387. P. P. U. alis ecaudatis, nigricantibus: posticis subtus fascia coerulescente. *Alexis.*  
 Habitat in India. *Mus. Tottianum.*  
 Antennae uncinatae, nigrae.
388. P. P. U. alis ecaudatis, fuscis: maculis aliquot fenestratis, antennis uncinatis. *Linn. Syst. Nat. II. 794. 260.*  
 Habitat in India. *Tbrax.*  
 Antennae nigrae, albo annulatae. Maculae alarum 4 f. 5.
389. P. P. U. alis ecaudatis, flavo maculatis: posticis subtus punctis sex niveis. *Iacchus.*  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
 Antennae uncinatae, albo nigroque annulatae. Alae anticae concolores, fuscae, maculis sex fenestrato flavis.  
 L1 3

flavis. Posticae fuscae, supra macula flava disci, subtus punctis sex niveis, quorum unicum in medio et quinque ad apicem.

- Eixaet.** 390. P. P. U. alis rotundatis, fusca: basi virentibus: posticis subtus fascia lactea. *Linn. Syst. Nat.* II. 595. 264. *Mus. Lud. Ulr.* 335.  
*Clerk. Icon.* tab. 42. fig. 4.

Habitat in America.

Nimis affinis *P. Tityro*, cuius forte varietas.

- Polycletus.** 391. P. P. U. alis subcaudatis, viridi-fusca: anticis macula alba; subtus argenteo punctatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 795. 265. *Mus. Lud. Ulr.* 336.  
*Clerk. Icon.* tab. 271. fig. 2.

Habitat in Indiis.

- Philemon.** 392. P. P. U. alis rotundatis, integerrimis, atris, immaculatis, antennis uncinatis.

Habitat in America.

Antennae albo annulatae. Alae omnes atrae, immaculatae, subholosericeae.

- Phidias.** 393. P. P. U. alis integris, atris, intentibus, margine albis, ore anoque rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 795. 263. *Mus. Lud. Ulr.* 334.

*Clerk. Icon.* tab. 44. fig. 1-4.

*Petiv. Gazoph.* tab. 43. fig. 15.

Habitat in Asia.

- Syrichtus.** 394. P. P. U. alis rotundatis, integris, nigro alboque variis: posticis subtus cinereis: strigis undatis, nigris.

Habitat in America.

Antennae nigrae, clava subtus ferruginea.

- Maimon.** 395. P. P. U. alis integris, albis, margineque maculisque nigris.

Habitat in Asia.

Statura P. malvae. Antennae albo nigroque annulatae, clava picea. Thorax niger. Abdomen cinereum, dorso fuscum. Alae disco albo, coeruleo, parum niente, maculis confluentibus nigris. Margo niger. Subtus omnes albae, maculis plurimis nigris.

396. P. P. U. alis dentatis, divaricatis, nigris, albo maculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 795. 267. *Fn. Sv.* 1081. *Malvae.*

Papilio Morio. *Scop. carn.* 461.

*Geoff. Inf.* 2. 67. 38.

*Petiv. Gazoph.* tab. 36. fig. 6.

*Merian. Eur.* 1. tab. 38.

*Reaum. Inf.* 1. tab. II. fig. 6. 7.

*Roef. Inf.* 1. *pap.* 2. tab. 10.

*Wilks pap.* 54. tab. 2. c. 1.

*Hoefnag. Inf.* tab. 2.

*Schœff. Elem.* tab. 94. fig. 9.

Habitat in malva, althaea.

Larva grisea, capite nigro, collo punctis quatuor sulphureis.

Puppa gibba, coerulescens.

397. P. P. U. alis integerrimis, concoloribus, albis: *Menalces.* ,  
margine nigro.

Habitat in Indiis:

Statura praecedentis. Alae omnes concolores, albae,  
anticis apice margineque nigro striatis, posticis  
margine nigro.

398. P. P. U. alis denticulatis, divaricatis, fuscis, obso- *Tages.*  
lete albo punctatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 795. 268.  
— *Fn. Sv.* 1082.

Papilio alis divaricatis, cinereis, punctorum alborum  
serie dupli transversa. *Geoff. Inf.* 2. 68. 39.

Habitat in Europa.

399. P. P. U. alis integerrimis, subreversis, fuscis: an- *Niso.*  
ticis supra punctis quatuor albis sparsis. *Linn. Syst.*  
*Nat.* II. 796. 270. *Muf. Lud. Ulr.* 339.

Habitat in America. *v. Rohr.*

400. P. P. U. alis integerrimis, reversis, nigrantibus, *Spio.*  
undique albo maculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 796. 271.  
*Muf. Lud. Ulr.* 330.

Habitat in India.

Alae reversae speciem distinguunt.

*Pygmaeus.* 401. P. P. U. alis integerrimis, fuscis, immaculatis.

Habitat in India. *Koenig.*

Parvus in hoc genere. Corpus fuscum, ore albo.

Antennae clava elongata, rufescente. Alae omnes  
fuscæ, immaculatae.

139. SPHINX. *Palpi* duo reflexi, pilosi.

*Lingua* spiralis plerisque  
exserta.

*Antennæ* squamatae.

*ocellata.* 1. S. alis angulatis: posticis rufis, ocello coeruleo.

Sphinx ocellata alis repandis: posticis ocellatis. *Linn.*  
*Syl. Nat.* II. 796. 1. *Fn. Sv.* 1083.

Sphinx elinguis, alis angulatis: superioribus fuscis,  
inferioribus rubris, ocello coerulecente. *Geoff. Inf.*  
2. 79. 1.

Phalaena major corpore crasso, alis angulis interiori-  
bus macula ophtalmoide insignibus. *Raj. Inf.* 361. 58.

Phalaena alis inferioribus macula ophtalmoide insigni-  
bus. *Alb. Inf.* tab. 8. fig. 2.

Phalaena subulicornis elinguis, alis inferioribus ocello  
nigro, iride fusca, pupilla coerulea. *Leche nov. Inf.*  
*sp.* 58. fig. 8.

*Drury Inf.* 2. tab. 25. fig. 2. 3.

*Sepp. Inf.* 3. p. II. tab. 2.

*Ammiral. Inf.* tab. 1.

*Harris. Inf.* II. tab. 5. fig. a — h.

*Roef. Inf.* I. *phal.* I. tab. I.

*Merian. Eur.* 2. tab. 87.

*Sultz. Inf.* tab. 15. fig. 89.

*Schaeff. Icon.* tab. 99. fig. 5. 6.

Habitat in Europæ, Americæ spiraea, falice, pomona.

Larva solitaria, caudata, scabra, viridis, striis obli-  
quis lateralibus albis punctisque ocellaribus flavis.

Eruca maxima elegans, ligustrinae similis, cauda cor-  
nuta. *Raj. Inf.* 148. 2.

Puppa fusca, dorso atro.

2. S. alis angulatis, brunneis: anticis puncto subocellari atro. *Sphinx lugubris*.  
*Sphinx lugubris* alis angulatis, ferrugineo - fuscis: puncto atro. *Linn. Mant.* 537.  
*Sphinx lugubris*. *Drury Inf.* tab. 28. fig. 2,  
 Habitat in America.
3. S. alis dentatis, reversis, griseis: posticis basi ferrugineis, anticis puncto albo. *Linn. Syst. Nat.* II. 797.  
 2. *Fn. Sv.* 1084. *Mus. Lud. Utr.* 342.  
*Sphinx elinguis*, alis ferratis, cinereo - fuscis, anticis fasciis obscurioribus transversis, inferioribus basi macula fulva. *Geoff. Inf.* 2. 81. 3.  
*Sepp. Inf.* 3. p. 3. tab. 1.  
*Roef. Inf.* 3. tab. 3.  
*Merian. Eur.* 3. tab. 37.  
*Wilks pap.* II. tab. B. C.  
*Anmir.* tab. 10.  
*de Geer Inf.* 1. tab. 8. fig. 5.  
*Alb. Inf.* tab. 37. fig. C.  
*Schaeff. Icon.* tab. 100. fig. C.  
 Habitat in populo, salice.  
*Larva solitaria*, caudata, scabra, viridis, utrinque linea striisque transversalibus obliquis, albis.  
*Puppa obscure grisea*, postice ferruginea.
4. S. alis angulatis, virescenti - nebulosis, saturatius fasciatis: posticis supra luteo testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 797. 3. *Fn. Sv.* 1085. *Mus. L. Utr.* 343.  
*Sphinx elinguis* alis laceris superioribus cinereo - virescentibus, fascia obscuriori transversa inaequali, inferioribus fusco aurantiis. *Geoff. Inf.* 2. 80. 2.  
*Merian. Eur.* 2. tab. 24.  
*Wilks pap.* 10. tab. 1. B. 4.  
*Alb. Inf.* tab. 10.  
*Frisch. Inf.* 7. tab. 2.  
*Roef. Inf.* 1. phal. 1. tab. 2.  
*Schaeff. Elem.* tab. 116. fig. 1.  
 — — *Icon.* tab. 100. fig. 1. 2.  
 Habitat in Europae tilia.  
*Larva solitaria*, caudata, scabra, antice attenuata, viridis, striis lateralibus obliquis sanguineis flavisque.  
*Puppa obscure fusca*.

*Nerii.* 5. S. alis subangulatis, viridibus: fasciis variis pallidioribus, saturationibus flavescentibusque. *Linn. Syst. Nat.* II. 798. 5.

*Roef. Inf.* 3. tab. 16.

*Fisch. Inf.* 7. tab. 3.

*Schaeff. Icon.* tab. 100. fig. 3. 4.

Habitat in Nerio.

Larva solitaria, caudata, albo punctata, collo ocello utrinque coeruleo, cauda deflexa, subarticulata.

Puppa flava, linea dorsali punctisque lateralibus nigris.

*obscura.* 6. S. alis dentatis: posticis rubris; margine nigro, ab domine supra pallido, immaculato.

Habitat in America.

Statura S. Ello, at paulo minor. Corpus cinereum.

Alae anticae dentatae, cinereae, immaculatae: posticae rubrae terminantur fascia fusca. Abdomen supra cinereum, immaculatum, subtus album, atomis rufis irroratum et utrinque punctis quatuor parvis, nigris.

*Ello.* 7. S. alis subdentatis: posticis rufis, margine nigris, ab domine pallido: cingulis atris.

Sphinx Ello alis integris: posticis rufis, margine crassiore nigris, abdomine pallido cingulis atris. *Linn. Syst. Nat.* II. 800. 15. *Mus. L. U.* 351.

Sphinx Ello. *Drury Inf.* I. tab. 27. fig. 3.

Habitat in Indiis.

*Iatropbae.* 8. S. alis subdentatis: posticis nigris, basi rufis fascia que fenestrata, capite bicorni.

Sphinx Antaeus. *Drury Inf.* 2. tab. 25. fig. 1.

*Merian. Surin.* tab. 38.

Habitat in Ameriae Iatropa gossypifolia.

Nostratis multo major. Corpus griseum. Caput cornubus duobus incurvis validis ante oculos. Thorax linea laterali atra. Abdomen linea laterali atra maculisque trium parium fulvis, subtus album, utrinque maculis tribus nigris. Alae anticae subdentatae, cinereae, nigro-undatae, puncto medio distincto. Margo posticus albo maculatus. Alae posti-

posticæ atræ, basi rufæ, in medio fascia e maculis  
fenestratis. Subtus omnes fuscae, litura fulva.

Larva viridis, cauda moniliformi.

Puppa brunnea, cauda cylindrica, inflexa.

9. *S. alis integris: omnibus margine postico albo pun-* *carolina.*  
*ctatis, abdomine ocellis sex parium fulvis. Linn.*

*Syst. Nat. II. 798. 7. Mus. Lud. Uhr. 346.*

*Sphinx carolina. Drury Inf. I. tab. 25. fig. I.*

*Merian. Sur. 57. tab. 57.*

*Brown. Iam. 438. tab. 43. fig. 17.*

Habitat in Americae Psidio.

10. *S. alis integerrimis, griseis, postis fulvis: strigis fuscis. Strigilis.*

*Sphinx strigilis alis integris, superioribus supra nebulosi-*  
*loſis, puncto fulco; inferioribus luteis, strigis fuscis.*

*Linn. Mant. I. 538.*

*Sphinx strigilis. Drury Inf. I. tab. 28. fig. 4.*

Habitat in insula St. Crucis Americae.

Corpus magnum. Caput flavescens, palpis fronte-  
que fulvis. Thorax flavescens, linea laterali  
fulva. Alae anticae oblongae, margine interiori  
emarginatae, griseae, viridi-maculatae. Posticae  
fulvae, strigis tribus tenuissimis margineque fuscis.  
Abdomen supra flavescens, striis obliquis latera-  
libus viridibus, subtus fulvum.

11. *S. alis integris: posticis luteis, fasciis fuscis, abdo-* *Atropos.*

*mene luteo, cingulis nigris. Linn. Syst. Nat. II. 799.*

*9. Mus. Lud. Uhr. 348.*

*Sphinx spirilinguis, alis superioribus fulco-nebulosi-*  
*inferioribus abdomineque fasciis transversis luteis,*  
*thorace maculis caput mortuum referentibus. Geoff.*

*Inf. 2. 85. 8.*

*Alb. Inf. tab. 6.*

*Reaum. Inf. I. tab. 14.*

— — — 2. tab. 24.

*Roeſ. Inf. 3. tab. I. 2.*

*Acta Bresl. Secl. 13 et 37.*

*Sultz. Inf. tab. 15. fig. 88.*

*Wilks pap. 9. tab. I. B. I.*

*Hasselqu. Itin. 417. 104. 105.*

*Schaeff. Icon. tab. 99. fig. I. 2.*

Habi-

Habitat in jasmino Europae australis, Aegypti.  
 Larva solitaria, caudata, flava, nigro punctata: lineis  
     lateralibus transversis, dimidiato coeruleis viridibus-  
     que, cauda deflexa.  
 Puppa brunnea, stigmatibus utrinque quinque nigris.

*Clotho.* 12. S. alis integerrimis: anticis viridibus, posticis disco  
     coerulecente, abdomine subtus utrinque punctis  
     quinque niveis.

Habitat - - - - D. Yeats.

Caput et thorax supra viridia. Abdomen supra viri-  
     de, atomis ferrugineis, subtus magis pallidum,  
     utrinque punctis quinque albissimis. Alae anticae  
     virides, fascia media obscuriore maculaque ferrugi-  
     nea. Posticae limbo pallescente, disco coerulecente.  
     Linea ferruginea ad angulum ani. Subtus omnes  
     flavescentes, strigis duabus obscurioribus. Anticae  
     disco viridi.

*Ficus.* 13. S. alis fusco-nebulosis: posticis fascia nigra angulo-  
     que ani albo. *Linn. Syst. Nat.* 11. 800. 15. *Mus. Lud. Utr.* 353.

*Clerk. Icon.* tab. 49. fig. 2.

*Drury Ins.* 2. tab. 26. fig. 1.

*Merian. Sur.* tab. 33.

Habitat in America.

Larva viridis, flavo lineata, capite caudaque nigris.

Puppa brunnea.

*Tetrio.* 14. S. alis dentatis, cinereis, fusco variis, abdomine  
     subtus albo, punctis quatuor ferrugineis.

Sphinx Tetrio alis denticulatis, cano-nebulosis, abdo-  
     mine subtus maculis quatuor nigris. *Linn. Mant.* 538.

Habitat in America meridionali.

*rufiflora.* 15. S. alis variegatis: puncto medio albo, abdomine ocel-  
     lis trium parium fulvis.

Habitat in America.

Media. Antennae uncinatae, ferrugineae, racchi alba.  
 Corpus et alae anticae albo, nigro ferrugineoque  
     variegatae, puncto alarum distincto albo in medio.  
 Posticae nigrantes, albo maculatae; subtus omnes  
     cincreeae.

16. *S. alis integris*, canis: anticis lineolis tribus confer-  
tis, nigris, abdome fuscō: cingulis albīs. *Pinastrī.*

*Sphinx Pinastrī* alis integris, canis, margine postico  
albo maculato, abdome fuscō, cingulis albīs.  
*Linn. Syſt. Nat.* II. 802. 22. *Fn. Sv.* 1088.

*Phalaena ſubulicornis*, fuscō-cinerea, thorace hirſtu-  
to, grifeo, lineis duabus nigris longitudinalibus.  
*Gadd. Diff.* 28.

*Drury Inf.* I. tab. 27. fig. 2.

*Sepp. Inf.* 3. p. 23. tab. 5.

*Roef. Inf.* I. *phal.* I. tab. 6.

*de Geer Inf.* I. tab. 10. fig. I. 2. 3.

*Reaum. Inf.* I. tab. 13. fig. 8.

Habitat in pino.

Larva caudata, virescens, linea dorsali ferruginea, la-  
terali flava, stigmatibus ferrugineis, subocellaribus.

Puppa brunnea.

17. *S. alis integris*, fuscis: vitta anticis pallida; posticis  
rubra. *Linn. Syſt. Nat.* II. 802. 19. *Fn. Sv.* 1086. *Euphor-  
biae.*  
*Maf. Lud. Uhr.* 356.

*Sphinx spirilinguis*, alis viridi, fulvo purpureoque  
varie fasciatis et maculatis, subtus purpureis.

*Geoff. Inf.* 2. 87. II.

*Drury Inf.* I. tab. 29. fig. 3.

*Roef. Inf.* I. *Phal.* I. tab. 3.

*Frisch. Inf.* 2. tab. II.

*Reaum. Inf.* I. tab. 13. fig. I. 4. 5. 6.

*de Geer Inf.* I. tab. 8. fig. 6—II.

*Schaeff. Icon.* tab. 78. fig. 12.

— — — tab. 99. fig. 3. 4.

Habitat in Euphorbia, Galio.

Larva caudata, nigra, albo punctata: linea dorsali  
sanguinea; laterali punctisque flavicantibus.

Puppa brunnea, stigmatibus nigris.

18. *S. alis virescentibus*: fascia striisque albīs; posticis *lineata*.  
nigris: fascia rubra.

Habitat in America.

Statura praecedentis. Caput virescens, stria lateralī  
alba. Thorax virescens, striis tribus albīs dupli-  
catis. Abdomen cinereum, albo nigroque macula-  
tum. Alae anticae integerrimae, virescentes, fascia  
media

media striisque sex fasciam secantibus abbreviatis, albis. Margo posticus cinerascens. Alae posticae atrae, fascia media lata, rufa; subtus omnes cinerascentes, atomis viridibus.

- Vitis.* 19. S. alis integris, virescentibus, fascia vittaque albis: posticis cinereis, fascia nigra marginaque rufo. *Sphinx Vitis* alis cinereis, fusco variis: posticis margine interiori sanguineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 801. 16. *Mus. Lud. Utr.* 354.

*Sphinx Vitis.* *Drury Inf.* I. tab. 28. fig. 1.  
*Merian. Sur.* tab. 47. fig. 1.

Habitat in Americae vite, magnolia glauca.

- Satellitia.* 20. S. alis integris, griseo-nebulosis: anticis puncto nigro ocellari, fessu altero; posticis basi cinereis. *Linn. Mant.* I. 539.

*Sphinx satellitia.* *Drury Inf.* I. tab. 29. fig. 1. 2.

Habitat in Iamaica.

- Oldenlandiae.* 21. S. alis integerrimis, griseis: vitta argentea puncto que medio fusco, abdomine lineis tribus punctorum nigrorum.

Habitat in Indiae Oldenlandiis, vite. *Koenig.*

Media. Caput griseum, ore lineaque laterali albidis. Thorax griseus, linea laterali cinerea et tenuiori argentea. Abdomen acutum, griseum, lineis tribus punctorum argenteorum, quae tamen basin abdominis haud attingunt. Puncta linearum lateralium duplicita. Subtus cinereum, utrinque punctis quatuor nigris. Alae integerrimae, griseae, puncto medio fusco et vitta argentea, a medio marginis tenuioris ad apicem alae ducta. Margo alae parum argentatus; posticae cinereae, basi sanguineae, apice fascia atra.

- Boerhaaviae.* 22. S. alis integris, cinereis: posticis rubris, apice fuscis, abdomine griseo, utrinque linea aurea.

Habitat in Indiae Boerhaviis. *Koenig.*

Praecedenti duplo minor. Caput et thorax virescentia, ore lineaque laterali albis. Pedes album, lateribus ferrugineis. Abdomen griseum, linea utrinque laterali aurea, quae tamen basin haud attingit.

Alae

Alae antice griseae, strigis obliquis obsoletis tribus virescentibus punctoque medio fuscō. Posticae sanguineae, apice fuscae, margine exteriori et postico tenuissime albicantibus; subtus variegatae.

23. S. alis integris, fuscis: anticis punctis duobus approximatis, albis. *didyma.*

Habitat in America. *Mus. Banks.*

Caput et antennae griseae, oculis virescentibus. Alae obscurae, strigis aliquot obsoletis indistinctis, obscurioribus. Puncta duo approximata, alba, posteriore majore, sublunato in medio alae anticae. Abdomen fuscō griseoque annulatum.

24. S. alis integris: anticis griseis, lunula media argentea, posticis rufescentibus. *Parce.*

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

Praecedenti affinis. Caput cinereum. Thorax cinereus, antice utrinque macula magna fusca. Abdomen griseum, punctis dorsalibus parvis, trium parium fuscis. Alae anticae griseae, macula magna, lunata, argentea, nitida. Posticae rufescentes, immaculatae; subtus omnes griseae.

25. S. alis integris, viridi purpureoque variis: posticis rubris, basi atris. *Linn. Syl. Nat. II. 801. 17. Fn. Sv. 1089. Mus. Linn. Ulv. 355.* *Elpenor.*

Sphinx spirilinguis, alis viridi purpureoque fasciatis, fasciis linearibus transversis. *Geoff. Inf. 2. 86. 10.*

Phalaena major, cauda acuta, alis angustis, acutis, ex viridi fulvo et purpureo colore variis.

*Raj. Inf. 145. 2.*

*Frisch. Inf. 13. 4. tab. 2.*

*de Geer Inf. 1. 694. tab. 9. fig. 8. 9.*

*Petiv. Gazoph. tab. 40. fig. 11. 12. 17.*

*Wilks pop. II. tab. 1. B.*

*Harris Inf. 14. tab. 7. fig. a—h.*

*Alb. Inf. tab. 9. fig. 13.*

*Roef. Inf. 1. phal. 1. tab. 4.*

*Merian. Eur. 2. tab. 33. fig. 73.*

Habitat in Epilopio angustifolio, Impatiante, Convolvulo.

Thorax viridis, striis quatuor sanguineis.

Larva caudata, fusco maculata, ocellis collaribus, utrinque duobus coeruleis.

Puppa antice obscure grisea, postice fusca, stigmatibus obscurioribus.

**Porcellus.** 26. S. alis integris, flavo purpureoque variis, abdomine subtus sanguineo, albo punctato.

Sphinx Porcellus alis integris, margine rubris: posticis basi fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 801. 18. *Fn. Sc.* 1090.

Sphinx spirilinguis, alis viridi purpureoque fasciatis, fasciis ferratis, transversis. *Geoff. Inf.* 2. 88. 12.

*Roef. Inf.* 1. *phal.* 1. tab. 5.

*Alb. Inf.* tab. 9.

*Merian. Eur.* 3. tab. 22.

Habitat in Epilobio, Impatiante.

Larva ecaudata, fusca, ocellis utrinque tribus collaribus coeruleis.

Puppa nigricans.

**Convolvuli.** 27. S. alis integris, nebulosis: posticis subfasciatis, abdomine cingulis rubris, atris albisque.

Sphinx Convolvuli alis integris: posticis nigro fasciatis, margine postico albo punctatis, abdomine rubro, cingulis atris. *Linn. Syst. Nat.* II. 798. 6. *Mus. Lud. Utr.* 345.

Sphinx spirilinguis, alis omnibus fuscis, fasciis dentatis, obscurioribus, abdomine fasciis transversis rubris. *Geoff. Inf.* 2. 86. 9.

*Drury Inf.* 1. tab. 25. fig. 4.

*Roef. Inf.* 1. *phal.* 1. tab. 7.

*Sepp. Inf.* 3. p. 19. tab. 4.

*Merian. Europ.* 39. tab. 75. fig. 2.

*Reaum. Inf.* 1. tab. 13. fig. 8.

*Wilks pap.* 10. tab. 1. B. 2.

*Goed. Inf.* 3. tab. 5.

Habitat in Convolvulo Europae.

Larva caudata, utrinque lineis lateralibus obliquis albis punctisque subocellatis.

Puppa brunnea, cornu reflexo, involuto.

28. S. alis integris: posticis rufis; fasciis tribus nigris, abdomen rubro: cingulis nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 799. 8. *Fn. Sv.* 1087. *Liguſtri.*

*Sphinx spirilinguis* alis superioribus fuscis, inferioribus abdomineque fasciis transversis rubris. *Geoff. Inf.* 2. 84. 7.

*Phalaena maxima*, cauda acuta, alis angustis, longis, acutis, abdomen roseo, areolis nigris. *Raj. Inf.* 144. 1. *Swammerd. Bibl.* tab. 29. fig. 1. 2. 3.

*Roef. Inf.* T. 3. p. 25. tab. 5.

*de Geer Inf.* 1. tab. 1. fig. 6.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 20. fig. 1—4.

*Wilks pap.* 10. tab. 1. B. 3.

*Harris Inf.* tab. 2. fig. a—f.

*Schueff. Elem.* tab. 116. fig. 2.

*Alt. Inf.* tab. 7. fig. 10.

Habitat in ligastro, syringa, fraxino, sambuco.

Larva caudata, viridis, striis lateralibus obliquis, ante incornatis, postice albis.

Quiescit corpore antico erecto pedibus elevatis.

Puppa fusca, cauda quadridentata.

29. S. alis integris: posticis nigro-fasciatis; basi sanguineis, margine albo punctatis, abdomen cingulis sanguineis atrisque. *cingulata.*

Habitat in America. *v. Robr.*

Corpus cinereum. Thorax linea laterali nigricante.

Abdomen fasciis alternis interruptis, sanguineis et atris, subtus albuni, punctis utrinque quinque nigris. Alae anticae cinereo atroque undatae, puncto medio distincto albo, et margine postico albo punctato. Posticae basi sanguineae, fasciis tribus atris, apice cinereae, margine albo punctato. Subtus omnes fuscae.

30. S. alis integris, griseis, striis albis: posticis fuscis, maculis sex rubris. *Celerio.*

*Sphinx Celerio* alis integris, griseis, lineola albo-nigra; inferioribus basi rubris, maculis sex. *Linn. Syst. Nat.* II. 800. 12.

*Roef. Inf.* 3. tab. 8.

*Frisch. Inf.* 13. tab. 1. fig. 2.

*Raj. Inf.* 159. 9.

*Petiv. Gazoph.* tab. 12. fig. 9.

Habitat in vite.

Larva caudata, fusca, lineis duabus lateralibus albis, ocellisque utrinque duobus collaribus.

Puppa antice fusca, postice brunnea.

*Alecto.* 31. S. alis integris: anticis supra griseis; posticis rubris, basi margineque atris. *Linn. Syst. Nat.* 11. 802. 30.  
*Mus. Lud. Ulr.* 357.

Sphinx *Alecto*. *Drury Inf.* 2. tab. 27. fig. 4.

Habitat in India.

Antennae supra albae, subtus brunneae.

*Gnoma.* 32. S. alis integris, cinereis: posticis supra vitta nigra.

Habitat in India. *Koenig.*

Statura et magnitudo praecedentis. Caput et thorax virescentia, linea laterali alba. Abdomen cinereum, utrinque macula baseos fusca. Pectus album. Alae integrae. Anticae cinereae, puncto medio minutissimo, fusco: posticae cinereae, vitta lata atra a margine tenuiore baseos ad apicem alae ducta, subtus omnes cinereae, atomis strigaque virescentibus.

*Hesperiæ.* 33. S. alis integris: anticis viridi - nebulosis, posticis fuscis, immaculatis.

Habitat in India orientali. *Mus. Tottianum.*

Corpus supra viride, abdome maculis lateralibus obscurioribus. Alae anticae virescentes, subnebulosae: posticae obscure fuscae, immaculatae. Subtus omnes griseae, strigis obsoletis obscurioribus.

*Labruscaæ.* 34. S. alis subfuscis: anticis subtus puncto albo, abdominis lateribus punctis quinque albis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 800. 14. *Mus. Lud. Ulr.* 352.

*Clerk. Icon.* 47. fig. 3.

*Merian. Sur.* tab. 34.

Habitat in Americes vite.

Larva caudata, brunnea, albo maculata, postice ocello albo. *Mer.*

35. S. alis integris; posticis subtus luteis, abdomine cinereo: cingulis atris. *Linn. Syst. Nat.* II. 800. II.  
*Mus. Lud. Ulr.* 350.

*Clerk. Icon.* tab. 47. fig. 1.

*Merian. Sur.* tab. 64. fig. 1. 2.

Habitat in Carica Americes.

Larva viridi flavoque variegata.

Puppa testacea.

36. S. alis integris, griseis, puncto fusco: posticis nigris, terfa.  
 basi fasciaque maculari albis.

Sphinx terfa alis integerrimis, glaucescentibus, fusco  
 lineatis: subtus testaceis, fusco punctatis. *Linn.*  
*Mant.* I. 358.

Sphinx terfa. *Drury Inf.* I. tab. 28. fig. 3.

Habitat in America meridionali.

37. S. alis ferrugineis: vitta nigricante. *Linn. Syst. Nat.* Thyelia.  
 II. 803. 24. *Mus. Lud. Ulr.* 360.

*Clerk. Icon.* tab. 46. fig. 4.

Habitat in Indiis.

Parva. Thorax lineis longitudinalibus fuscis.

#### 140. SESIA. *Palpi reflexi.*

*Lingua exserta, truncata.*

*Antennae cylindricae, extror-  
 sum crassiores.*

1. S. abdomine barbato: segmento tertio niveo. *Tantalus.*  
 Sphinx Tantalus. *Linn. Syst. Nat.* II. 803. 25. *Mus.*  
*Lud. Ulr.* 361.

Habitat in Europa australi, Aegypto.

2. S. alis fenestratis, abdomine barbato, viridi: cingulo *Hylas.*  
 purpureo.

Sphinx Hylas alis fenestratis, abdomine fascia purpu-  
 rascente. *Linn. Mant.* I. 539.

Habitat in China.

Anus barbatus, barbae lateribus nigris, puncto ba-  
 seos albo.

*stellata-* 3. S. abdomine barbato; lateribus albo nigroque variis: alis posticis ferrugineis.

*Sphinx stellatarum.* *Linn. Syst. Nat.* II. 803. 27. *Fn. Sv.* 1091.

*Sphinx spirilinguis*, alis superioribus fuscis, nebulosis, inferioribus ferrugineis. *Geoff. Inf.* 2. 8. 3. 6. tab. II. fig. 5.

*Papilio velocissima*, alis albis brevibus, corpore crasso: inter volandum stridorem edens. *Raj. Inf.* 133. 1.

*Roeſ. Inf.* 1. *pbal.* 1. tab. 8.

*Bradl. nat.* tab. 26. fig. 1. A.

*Reaum. Inf.* 1. tab. 12. fig. 5. 6.

*Merian. Eur.* 2. 33. tab. 29.

*Schaeff. Elem.* tab. 116. fig. 3.

— — *Icoñ.* tab. 16. fig. 1.

Habitat in Gallio, Rubia, reliquisque stellatis.

Larva caudata, albo punctata, cauda subulata, coerulea, apice ferruginea.

Puppa fusca.

*Thysbe.* 4. S. abdomine barbato, postice fusco, alis nigris: macula hyalina.

Habitat in America. *Drury.*

Statura S. Hylas. Antennae nigrae, apice uncinatae.

Caput et thorax supra viridia, subtus alba. Abdomen basi virescens, postice dilute fuscum, punctis utrinque lateralibus tribus albis. Alae omnes fuscae, nitidae, macula magna hyalina, nervis divisa. Basis alae anticae parum virescit.

*fucifor-* 5. S. abdomine barbato, nigro: fascia flavescente, alis fenestratis: margine nigro.

*Sphinx fuciformis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 803. 28. *Fn. Sv.* 1092.

*Sphinx elinguis*, alis lanceolatis, vitreis, venis nigris: superioribus macula limboque nigris fulvoque nebulosis. *Geoff. Inf.* 2. 82.

*Roeſ. Inf.* 3. tab. 38.

— — 4. tab. 34. fig. 1 — 4.

*Bradl. nat.* 26. fig. 1. B.

*Sulz. Inf.* tab. 15. fig. 90.

*Poda Inf.* tab. 2. fig. 6.

*Schaeff. Icon.* tab. 16. fig. 1.

Habitat in Lonicera.

Barba abdominis nigra, in medio alba.

Larva viridis, linea laterali flava: segmentis utrinque maculis duabus brunneis.

6. *S. alis fenestratis*, abdomen flavo: incisuris atris, *apiformis*.  
thorace nigro: maculis duabus flavis.

*Sphinx apiformis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 804. 29. *Fn.*  
*Sv.* 1093.

*Clerk. Icon.* tab. 9. fig. 2.

*Sphinx scopigera.* *Scop. carn.* 477.

Habitat in Europae floribus.

7. *S. alis hyalinis*, margine strigaque nigris, ano barbato, sanguineo. *haemorrhoidalis.*

Habitat in Indiis.

*Media.* Alae hyalinae, margine undique et striga tenuissima nigris. Abdomen coerulescens, ano coccineo.

8. *S. alis hyalinis*, margine fasciaque nigris, abdomen barbato: cingulo fulvo. *culiciformis.*

*Sphinx culiciformis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 804. 30. *Fn.*

*Sv.* 1094. *Amoen. acad.* 5. tab. 3. fig. 204.

*Clerk. Icon.* tab. 9. fig. 3.

Habitat in Europae floribus.

Antennae ante apicem albae.

9. *S. alis fenestratis*, margine fasciaque nigris, abdomen barbato, nigro; incisuris alternis, margine flavis. *tipuliformis.*

*Linn. Syst. Nat.* II. 804. 32. *Fn. Sv.* 1096.

*Clerk. Icon.* tab. 9. fig. 31.

Habitat in Europae floribus.

Affinis praecedenti.

Variat interdum ab domine toto atro.

141. ZYGAENA. *Palpi reflexi.**Lingua exserta, setacea.**Antennae saepius medio crassiores.*

*Filipendulae.* 1. *Z. alis anticis cyaneis: punctis sex rubris, posticis rubris, immaculatis.*

*Sphinx Filipendulae.* *Linn. Syst. Nat.* II. 805. 34.  
*Fn. Sv.* 1097.

*Sphinx spirilinguis, alis superioribus subcoeruleis, punctis sex rubris, inferioribus rubris.* *Geoff. Inf.* 88. 13.

*Papilio pratensis, alis pendulis minor, corpore crasso, nigro, alis externis coeruleo-nigricantibus cum maculis sanguineis.* *Raj. Inf.* 134. 2.

*Papilionoides virescens maculis quinque miniatis ornatus.* *Petiv. Mus.* 36. 330.

*Leopardus sylvestris.* *Albin. Inf.* tab. 82. fig. C. D.  
*Mouff. Inf.* p. 97. fig. infim.

*Merian. Eur.* 2. p. 27. tab. 17. fig. 67.

*Reaum. Inf.* I. tab. 12. fig. 14—17.

— — 2. tab. 2. fig. 2.

*Roef. Inf.* I. phal. 2. tab. 57.

*Harris. Inf.* 2. tab. I. fig. c — h.

*Sultz. Inf.* tab. 15. fig. 91.

*Wilks pap.* 46. tab. I. a. I.

*Schaeff. Icon.* tab. 16. fig. 6. 7.

*Habitat in Spiraea Filipendula.*

*Larva obesa, caudata, sulphurea, lineis quatuor punctorum nigrorum.*

*Puppa fusca, medio sulphureo, stigmatibus fuscis.*

*Phegea.* 2. *Z. viridi-atra, alis punctis fenestratis: anteriorum sex, posteriorum duobus, ab domine cingulo luteo.*

*Sphinx Phegea.* *Linn. Syst. Nat.* II. 805. 35. *Mus. Lud. Ulr.* 364.

*Frisch. Inf.* 6. 33. tab. 15.

*Habitat frequens in Germaniae Erica.*

*Larva fusca, capite pedibusque rufis: dorso fasciulato.*

3. Z. cyanea, alis anticis punctis sex rubris, posticis *Ephialtes.*  
unico, abdomine cingulo rubro.  
Sphinx Ephialtes. *Linn. Syst. Nat.* II. 806. 36.  
*Schaeff. Icon.* tab. 71. fig. 1.  
Habitat in Europa australiori.  
Præcedentis affinis.
4. Z. nigra, alis anticis maculis sex, posticis basi macu- *annulata.*  
laque flavis: abdomine flavo, annulato.  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
Affinis sequenti. Antennæ subfiliformes, nigrae.  
Caput flavum. Thorax niger, fascia antica flava.  
Scutellum flavum. Abdomen nigrum, segmentorum  
marginibus flavis. Alae anticae nigrae, maculis sex  
flavis. 1. 2. 3., posticae nigrae, basi flavae, puncto  
nigro et in medio macula flava.
5. Z. nigra, alis anticis fusco - cinereis: punctis quinque *caffra.*  
sanguineis, posticis rubris.  
Sphinx caffra. *Linn. Syst. Nat.* II. 806. 37. *Mus. Lud.*  
*Ulr.* 362.  
Sphinx carniolica. *Scop. Ent. carn.* 478.  
*Gronov. Zooph.* 830.  
Habitat in australioribus, calidioribus.  
Thorax niger, utrinque punctis duobus rubris.
6. Z. alis fuscis: maculis duabus albis, abdomine cyaneo: *guineensis.*  
cingulo fulvo.  
Habitat in Guinea. *D. Schloffer.*  
Antennæ pectinatae, nigrae, apice setaceæ. Caput  
et thorax nigra, cyaneo nitida. Abdomen cyaneum,  
nitidum, cingulo albo baseos et fulvo in medio:  
subtus albicans, apice cyaneum. Alae omnes  
fuscæ, maculis duabus albis, altera ad basin, altera  
ad apicem.
7. Z. alis nigris, punctis fenestratis, anticis sex, posticis *Cerbera.*  
duobus: abdomine cingulis sanguineis.  
Sphinx Cerbera. *Linn. Syst. Nat.* II. 808. 38. *Mus.*  
*Lud. Ulr.* 363.  
*Drury Ins.* I. tab. 26. fig. 2.  
Habitat in Aethiopia.  
Z. Phegeæ fere duplo minor.

*Thetis.* 8. Z. coerulea, humeris rubro punctatis, alis nigris: anticis apice, posticis disco hyalinis.

Sphinx *Thetis*. *Linn. Mant.* 1. 539.

*Drury Ins.* 1. tab. 26. fig. 4.

Habitat in Iamaica.

*fenestrata.* 9. Z. alis fuscis, maculis anticarum quatuor, posticarum unica hyalinis, abdomine flavo nigroque annulato.

Sphinx *fenestrata*. *Drury Ins.* 2. tab. 28. fig. 5.

Habitat in China.

Antennae cylindricae, nigrae, ante apicem albae.

Caput flavum, fascia inter antennas nigra. Thorax

flavus antice maculisque dorsalibus tribus nigris.

Abdomen cylindricum, cingulis septem flavis et sex

nigris alternis. Anus niger. Alae fuscae, nervis

baseos flavis. Macula magna hyalina, puncto fusco,

fere in duas divisa ad marginem tenuiorem; ma-

cula secunda ad marginem crassiorem a priori ner-

vo flavo distincta, tertia et quarta versus apicem mi-

nores. Alae posticae macula magna hyalina in disco.

*Cassandra.* 10. Z. nigra, abdomine utrinque maculis quinque coe-  
ruleis, ano, ore basique femorum abdominisque  
coccineis.

Sphinx *Cassandra*. *Linn. Syst. Nat.* 11. 806. 41.

Habitat in America.

Alae nigrae, immaculatae.

*Eryx.* 11. Z. alis atris: anticis basi aureis; macula media abdo-  
mineque subtus sanguineis.

Habitat in America meridionali. *Yeats.*

Antennae nigrae, apice supra albae. Caput viridi-  
aureum, nitens, postice nigro-maculatum. Thorax  
niger, antice maculis quatuor, et in dorso trium  
parium viridi-aureis. Abdomen atrum, maculis  
utrinque septem, anticis quatuor viridi-aureis, posti-  
cis tribus coeruleis. Anus ater; abdomen subtus san-  
guineum, basi utrinque maculis duabus viridi-aureis.  
Alae anticae concolores, atrae, basi aureae, margine  
exteriori tamen atro. Macula sanguinea, reniformis in medio. Posticae supra atrae, immaculatae;  
subtus atrae, basi maculisque duabus viridi-aureis.  
Pedes variegati.

12. Z. alis atris: disco hyalino, abdomine nigro: lineis tribus aureis, ano fulvo. *Melissa.*

Habitat - - - - *Yeats.*

Statura omnino Z. Polymenae. Caput et thorax nigra.

Macula in vertice et duae in margine antico thoracis obsoletae, aureae. Pectus nigrum, albo maculatum. Abdomen nigrum, supra lineis tribus aureis, lateralibus latioribus, subtus utrinque punctis quatuor albis. Anus fulvus. Alae omnes hyalinae, limbo fasciaque media abbreviata atris.

13. Z. nigra, alis maculis luteis: anticarum tribus, *Posticarum* duabus; abdomine cingulis duobus coccineis. *Polymena.*

*Sphinx Polymena. Linn. Syst. Nat. II. 806. 40.*

*Drury Inf. I. tab. 26. fig. 1.*

Papilio parva, alis nigris: maculis fulvis variis. *Raj.*  
*Inf. 135.*

Habitat in China.

14. Z. alis nigris: maculis duabus luteis, abdomine cingulis rubris, nigris, cyaneis alboque. *Lethe.*

Habitat in Africa. *Drury.*

Praecedenti nimis affinis, nitidissima. Antennae nigrae, superne ante apicem albae. Caput cyaneum, nitidum, palpis nigris. Thorax niger, lobo antico lineisque tribus dorsalibus cyaneis. Punctum coecineum utrinque ante alas. Abdomen cylindricum, nitidum, cingulis diversicoloribus variegatum. Cingulum baseos rufum, utrinque album, dein cingula duo cyanea et duo nigra alterna, tunc rufum, postea sequitur album et denique tria ultima segmenta cyanea, ano rufo. Alae atrae, omnibus maculis duabus luteis, et anticis inter maculas lunula cyanea.

15. Z. alis concoloribus, rubris: maculis nigris, margine nigro connexis. *fausta.*

*Sphinx fausta. Linn. Syst. Nat. II. 807. 42.*

Habitat in Europa australi.

Statura et antennae Z. Filipendulæ.

*infausta*. 16. Z. nigra, alis fuscis: posticis interius sanguineis, antennis pectinatis.

*Sphinx infausta*. *Linn. Syst. Nat.* II. 807. 43.

Habitat in Europa australi.

Statura Z. pugione, at minor.

*pugione*. 17. Z. cyanea, albo punctata, alis rubris: margine postico fusco.

*Sphinx pugione*. *Linn. Syst. Nat.* II. 807. 45.

Habitat in America.

Antennae pectinatae, apice rubrae.

*pectinicornis*. 18. Z. subfuscata, alis violaceis: fasciis duabus albis sub-interruptis, collari sanguineo.

*Sphinx pectinicornis*. *Linn. Syst. Nat.* II. 807. 44.

*Edw. Av.* 5. 36. tab. 226.

Habitat in America.

*Pylotis*. 19. Z. alis nigricantibus: anticis fascia obliqua nivea.

*Phalaena Pylotis*. *Drury Ins.* 2. tab. 5. fig. 3.

Habitat in Carolina.

Statura praecedentis. Antennae pectinatae, apice simplices. Corpus nigrum, ore anoque flavescens. Palpi apice nigri. Alae anticae fuscae, fascia magna, obliqua, alba; posticae obscuriores, immaculatae.

*Auge*. 20. Z. sanguineo cyaneoque variegata, alis fenestratis: marginibus nigris.

*Sphinx Auge nigra*, lateribus sanguinea, alis fenestratis postice nigris, antennis pectinatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 807. 46.

Habitat in America.

Antennae nigrae, pectinatae. Thoracis et abdominis dorsum postice cyaneum.

*capistrata*. 21. Z. alis nigris: anticis fasciis duabus, posticis disco-fenestratis, abdomine sanguineo: dorso nigro.

Habitat in America. *Mus. Tottianum*.

Statura Z. Ephialtes. Antennae nigrae, apice albae. Thorax niger, punctis duobus anticis habenisque fulvis. Abdomen sanguineum, dorso nigro, utrinque ferrato. Alae anticae atrae, puncto baseos fasciisque duabus latis fenestratis. Pedes nigri.

22. Z.

22. Z. alis fuscis: anticis maculis quinque fenestratis, posticis brevissimis: macula flava. *diptera.*

Habitat in India orientali. *Mus. Tottianum.*

Parva: statura Z. Statices. Caput nigrum, fronte flava antennisque pectinatis. Thorax niger, puncto utrinque antico flavo. Abdomen nigrum, fasciis duabus flavis, altera baseos, altera versus apicem. Anus barbatus, niger. Alae anticae fuscae, maculis quinque fenestratis, quarum tres marginales, interiores duplicatae. Alae posticae minutissimae, atrae, macula magna flava.

23. Z. alis hyalinis: macula fusca, posticis brevissimis, filiformibus, nigris. *halterata.*

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

Antennæ pectinatae, fuscae. Corpus nigrum, abdomen supra et subtus basi flavescente. Orbita oculorum postice sanguinea. Tibiae flavescentes. Alae anticae magnæ, hyalinae, margine omni tenuissime maculaque magna ad marginem crassiorem fuscis. Alae posticae minutæ, filiformes, nigrae.

24. Z. alis anticis fuscis; posticis hyalinis, pedibus posticis elongatis, hirsutissimis. *tibialis.*

*Sphinx tibialis. Drury Ins. 2. tab. 28. fig. 2.*

Habitat in Africa.

Antennæ subpectinatae.

25. Z. atra, alis basi luteis. *Pholus.*

*Sphinx Pholus. Drury Ins. 2. tab. 28. fig. 3.*

Habitat in Africa.

Statura Z. Statices. Corpus totum atrum, alis omnibus basi luteis.

26. Z. viridi-coerulea, alis posticis fuscis. *Statics.*

*Sphinx Statices. Linn. Syst. Nat. 11. 808. 47. Fn. Sv. 1098.*

Phalaena pectinicornis, spirilinguis, viridi-coerulea, nitens, alis posticis fuscis. *Geoff. Ins. 2. 129. 40.*

Papilio parva, alis pendulis, corpore et alis undique viridibus, aut coeruleis. *Raj. Ins. 134. 3.*

*Robert. Icon. tab. 30. fig. 1.*

*Papi.*

*Papilionoides pratensis viridis minor.* Petiv. Mus.  
35. 329.  
*Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 9.*  
Habitat in Europae pratis.

*Ackaron.* 27. Z. *cyanea*, alis fuscis, ano rufo.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Statura praecedentis. Antennae in medio crassiores,  
nigrae. Caput et thorax nitida, cyanea. Abdomen  
cyaneum, ano villoso, rufo. Alae omnes obscurae,  
fuscæ, immaculatae.

*Styx.* 28. Z. *corpore aliquæ cyaneis*, thorace rufo.

Habitat in Africa. *Drury.*

Parva: statura praecedentium. Caput, abdomen, alae,  
pedes cyanea, immaculata. Thorax superne, uti  
et parum sub alis, rufus.

## 142. BOMBYX. *Palpi duo compressi, pilosi.*

*Lingua brevis, membranacea.*

*Antennæ filiformes.*

\* *Alis patulis.*

*Atlas.* 1. B. alis patentibus, falcatis, luteo variis: macula fene-  
strata; anticis sesquialtera.

Phalaena *Atlas.* Linn. Syst. Nat. II. 808. 1. *Mus. Lud.*  
*Utr.* 366.

*Merian.* Sur. 52. tab. 52.

*Petiv. Gazoph.* tab. 8. fig. 7.

*Valent. Mus.* 2. p. 168. tab. 54.

*Knorr Del.* tab. C. 4. fig. 1.

*Seb. Mus.* 4. tab. 57. fig. 1. 3.

— — — tab. 58. fig. 6. 10.

Habitat in Americae, Asiae, citro.

Larva verticillata, verrucis pilosis, net folliculos gran-  
des, tenaces, vix extricandos.

2. B.

2. B. alis patentibus, falcatis, luteo variis: macula fene-  
strata, posticis rotundatis. *Hesperus.*

Phalaena *Hesperus*. *Linn. Syst. Nat.* II. 809. 2. *Mus.*  
*Lud. Ulr.* 267.

*Merian. Sur.* 65. tab. 65.

*Seb. Mus.* 4. tab. 57. fig. 4..6.

— — tab. 58. fig. 12. 13.

Habitat in Americes citro.

Larva tota glabra.

3. B. alis patentibus, griseis: fascia fulva, anticis ocello subfenestrato, ferrugineo. *Cecropia.*

Phalaena *Cecropia*. *Linn. Syst. Nat.* II. 809. 3. *Mus.*  
*Lud. Ulr.* 368.

*Drury Ins.* 1. tab. 18. fig. 2.

*Clerk. Icon.* tab. 49. fig. 1.

*Seb. Mus.* 4. tab. 58. fig. 4. 5?

*Catesb. Carol.* p. 86. tab. 86.

Habitat in America septentrionali.

4. B. alis patentibus, falcatis, concoloribus, flavis: strigis rufis ocelloque fenestrato. *Paphia.*

Phalaena *Paphia pectinicornis*, elinguis, flava, alis falcatis, concoloribus, ocello fenestratis. *Linn. Syst. Nat.* II. 809. 4. *Mus. Lud. Ulr.* 369.

*Petiv. Gazoph.* tab. 29. fig. 3.

*Rumph. amb.* 3. tab. 75.

*Seb. Mus.* 4. tab. 23. fig. 5. 6.

Habitat in Asia.

Alae omnes flavae. Anticae falcatae, strigis duabus violaceo - rubris, anteriore undata. Ocellus in medio disci iride sulphurea, pupilla fenestrata. Posticae ocello medio majori, margine nigro, iride coerulea, pupilla fenestrata; versus apicem striga nigro - violacea.

5. B. alis patentibus, concoloribus, griseis, strigis cinereis ocelloque fenestratis. *Cytherea.*

Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Statura praecedentis. Antennae pectinatae, ferrugineae. Corpus hirtum, rufescens. Alae vix falcatae, griseae, strigis duabus albis, anteriore undata.

Inter strigas ocellus magnus sulphureus, iride nigra, annulo

annulo albo cincta pupillaque magna fenestrata. Ocelli alarum posticarum concolores, at paulo maiores. Subtus concolores striga tantum unica.

*Mylitta.* 6. B. alis patentibus, falcatis, flavis: striga ferruginea ocelloque fenestrato partito.

Phalaena Mylitta. *Drury Inf.* 2. tab. 5. fig. 1.

Habitat in Iamboliferis Indiæ orientalis. *Koenig.*  
Ocellus magnus in disco, pupilla fenestrata, quae nervo elevato ferrugineo in medio dividitur.  
Iris grisea, postice annulo atro, antice ferrugineo latiori lunula alba cincta.

*Promethea.* 7. B. alis patulis subfalcatis, margine griseis: anticis utrinque ocello atro.

Phalaena Promethea. *Drury Inf.* 2. tab. 11. fig. 1. 2. Mas. tab. 12. fig. 1. 2. Foem.

Habitat in America.

Mas alis atris, foemina ferrugineis.

Larva viridis, nigro-punctata: antice spinis quatuor rubris.

*nictitans.* 8. B. alis patentibus, fusco-incarnatis: posticis ocello ferrugineo; pupilla fenestrata.

Habitat - - - - *Muf. Banks.*

Praecedenti minor. Alae anticae fusco-incarnatae, striga postica obscuriore. Posticae rotundatae, concolores, ocello magno ferrugineo, annulo fusco incarnatoque cincto, pupilla parva fenestrata. Subtus omnes obscurae, striga obscuriore.

*Luna.* 9. B. alis patentibus, caudatis, concoloribus, virescentibus: ocello disci lunato.

Phalaena Luna. *Linn. Syst. Nat.* II. 810. 5. *Muf. Lud. Ulr.* 370.

*Clerk. Icon.* tab. 52. fig. 1.

*Drury Inf.* 1. tab. 24. fig. 1.

*Petiv. Gazoph.* tab. 14. fig. 5.

*Catesb. Carol.* 2. 84. tab. 84.

Habitat in America boreali.

Corpus lana alba tectum.

10. B. alis patentibus, concoloribus, flavis: anticis feneſtra. *feneſtra.*  
neſtra dupli; posticis simplici.

Phalaena feneſtra. *Linn. Syst. Nat. II. 811. 9. Mus. L.  
Ulr. 372.*

*Clerk. Icon. tab. 55. fig. 1.*

Habitat in Indiis.

11. B. alis patentibus, fuscis: anticis fascia fenestrata brevi. *perſpicua.*

Phalaena perſpicua. *Linn. Syst. Nat. II. 811. 10. Mus.  
Lud. Ulr. 373.*

Habitat in Indiis.

Minor B. Tau.

12. B. alis patulis, concoloribus, luteis: apice maculis- *militaris.*  
que violaceis; anticis extus albo maculatis.

Phalaena militaris. *Linn. Syst. Nat. II. 811. 12. Mus.  
Lud. Ulr. 375.*

*Roef. Inf. 4. tab. 6. fig. 3.*

Habitat in Asia, China.

13. B. alis patentibus, rotundatis, medio albis: anticis *Caſtalia.*  
ocello, posticis puncto fuscō.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Statura B. pavoniae. Thorax fuscus, pectore albo.

Abdomen supra griseum, subtus album, punctis la-  
teralibus nigris. Pedes hirti, supra fuscī, subtus  
coccinei. Alae anticae basi fuscae, medio albidae,  
ocello magno coerulecente, annulo nigro cincto,  
dein fuscae, margine postico cinereo, strigis duabus  
undatis, fuscis.

14. B. alis patentibus, rotundatis, griseo - nebulosis, sub- *pavonia.*  
fasciatis: ocello nictitante, subfenestrato.

Phalaena pavonia. *Linn. Syst. Nat. II. 810. 7. Fn.  
Sv. 1099.*

a. Phalaena pećtinicornis, elinguis, alis cinereo - fuscis,  
planiusculis, singulis ocello fasciaque fusca. *Geoff.  
Inf. 2. 100. 3.*

Phalaena major pulcra, maculis ophtalmoidibus in fin-  
gulis alis singulis. *Raj. Inf. 146. 1.*

*Wilks pap. 15. tab. 2. a. 3.*

*Roef. Inf. 1. phal. 2. tab. 5.*

*Alb. Inf. tab. 37.*

*Schaeff.*

*Schaeff. Elem.* tab. 98. fig. 2.

— — *Icon.* tab. 89. fig. 2 — 5.

*Merian. Eur.* tab. 13. fig. 23.

*de Geer Inf.* I. tab. 19. fig. 1 — 12.

- major.* b. *Phalaena pectinicornis elinguis*, alis cinereo-fuscis, planiusculis, singulis ocello major. *Geoff. Inf.* 2. 100. I. *Roef. Inf.* 4. tab. 15. 16. 17. *Reaum. Inf.* I. tab. 47. 48. 49. *Knorr. Delic.* tab. C. 2. fig. 2. *Seb. Mus.* 4. tab. 60. fig. 9 — 14.

Habitat in Erica, Pomonae arboribus.

Mas antennis magis pectinatis alisque posticis basi flavescentibus.

Larva gregaria, viridis, verticillata, verrucis rubris flavisque piliferis: pilis setaceis.

Puppa nigricans, folliculata: folliculo apice foramine elastico dehiscente.

- Tau.* 15. B. alis patulis, testaceis: ocello subviolaceo; pupilla hastata, alba.

*Phalaena Tau. Linn. Syst. Nat.* II. 811. 8. *Fn. Sv.* 1100.

*Aet. Holm.* 1749. 130. tab. 4. fig. 8.

*Schaeff. Icon.* tab. 85. fig. 4 — 6.

*Roef. Inf.* 4. tab. 7. fig. 3. 4.

Habitat in betula.

Ocellus in alis anticus utrinque, in posticis subtus pupilla hastata majori alba, absque iride.

Larva viridis, striis obliquis lateralibus albis, dorso nodoso.

Puppa brunnea, pilosa. *Roef. Inf.* 3. tab. 68.

- Io.* 16. B. alis patulis, flavis: anticus subtus, posticis supra ocello atro: pupilla alba.

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Statura B. Tau. Antennae flavescentes, valde pectinatae. Caput et thorax hirta, flava. Alae anticae flavae, macula media ferruginea. Subtus flavae, ocello atro, in medio pupilla alba. Pone ocellum striga rufa. Posticae supra flavae, ocello medio magno atro, pupilla linearis alba. Pone ocellum striga semicircularis atra et alia ferruginea. Subtus flavae, striga ferruginea.

17. B. alis patulis, rotundatis, nigris, fascia alba: macula subocellari nigra. *Proserpina.*

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Statura praecedentis. Antennae valde pectinatae, atrae, Caput atrum. Thorax ater, fascia antica pallida. Abdomen atrum, ano rufescente. Alae concolores, fuliginoso-nigrae, in medio fascia lata alba, in qua macula nigra pupilla lunata alba. Pedes atri, femoribus ferrugineis.

18. B. alis patulis, dentatis, nebulosis, linea pallida: antennae ocello lunato puncto que.

*Phalaena occidua. Linn. Syst. Nat. II. 812. 14. Mus. Lud. Ulr. 379.*

*Clerk. Icon. tab. 54. fig. 1.*

Habitat in America.

Pedes fusci, albo annulati.

\*\* *Alis reversis.*

19. B. alis reversis, dentatis, ferrugineis, ore tibiisque nigris. *quercifolia.*

*Phalaena quercifolia elinguis, alis reversis, semitectis, dentatis, ferrugineis, margine postico nigris. Linn. Syst. Nat. II. 812. 18. Fn. Sv. 1110.*

*Phalaena pectinicornis, elinguis, tota rufa, alarum margine serrato. Geoff. Ins. 2. 110.*

*Phalaena tota obscure rufa. Raj. Ins. 141. 1.*

*Alb. Ins. 1. tab. 16.*

*Merian. Eur. tab. 1. fig. 3.*

*Frisch. Ins. 3. tab. 1. fig. 3.*

*Roef. Ins. 1. phal. 2. tab. 41.*

*Reaum. Ins. 2. tab. 23.*

*Wilks pap. 27. tab. 3. b. 1.*

*Sulz. Ins. tab. 16. fig. 93.*

*Poda tab. 2. fig. 7.*

*Schaeff. Icon. tab. 71. fig. 4. 5.*

Habitat in pyro, gramine, salice.

Larva subcaudata, pilosa, ferruginea, collaribus coeruleis.

Larva maxima ex albo et nigro coloribus variegata.

*Raj. Ins. 342. 2.*

Pupa folliculata, fusca: fasciis rubris.

*ilicifolia*. 20. B. alis reversis, semitectis, ferratis, griseis, margine postico albo punctato.

Phalaena ilicifolia. *Linn. Syst. Nat.* II. 813. 19. *Fn. Sv.* 1109.

*de Geer Inf.* I. tab. 14. fig. 7. 9.

Habitat in salice.

Praecedenti nimis affinis videtur.

*capensis*. 21. B. alis reversis, heluolis: anticis strigis duabus repandis, albis; posteriore nigro inducta.

Phalaena capensis. *Linn. Syst. Nat.* II. 813. 20.

Habitat in Africa.

Abdomen flavum. Plantae geniculis albis.

*Australa-* *fiae*. 22. B. alis reversis, heluolis: posticis basi subtus ferrugineis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Statura praecedentium. Palpi magni, valde compressi, obtusissimi. Corpus heluolum. Alae reverfae, integrae, heluolae. Posticae subtus a basi ad medium ferrugineae.

*Fagi*. 23. B. alis reversis, rufo-cinereis: fasciis duabus linearibus luteis, flexuosis.

Phalaena Fagi. *Linn. Syst. Nat.* II. 816. 30. *Fn. Sv.* 1113. *Albin. Inf.* tab. 58.

*Aet. Hohn.* 1749. 132. tab. 4. fig. 10 — 14.

*Roef. Inf.* 3. tab. 12.

Habitat in fago, corylo, betula.

Larva brunnea: dorso dentato, pedibus sex anterioribus elongatis, cauda reflexa, corniculis duobus. Quiescit capite caudaque elevatis, pedibus anticus pendentibus.

Puppa folliculata, brunnea.

*Quercus*. 24. B. alis reversis, ferrugineis: striga flava puncto-que albo.

Phalaena Quercus. *Linn. Syst. Nat.* II. 814. 25. *Fn. Sv.* 1106. *Geff. Inf.* 2. 111. 13.

Phalaena maxima fulva, alarum exteriorum superioritate intensius colorata, cum macula in medio alba, inferiore dilutiore. *Raj. Inf.* 142. 2.

*Merian. Eur.* I. tab. 10.

*Petiv.*

*Petiv. Gazoph.* tab. 45. fig. 5.

*Albin. Inf.* tab. 18. fig. 25.

*Roeſ. Inf.* 1. *phal.* 2. tab. 35.

*Goed. Inf.* 1. 51. tab. 7.

*Réaum. Inf.* 1. tab. 35.

*Wilks pap.* 22. tab. 3. a. II. 12.

*Ammir.* tab. 31.

*Schaeff. Icon.* tab. 82. fig. 1 — 3.

Habitat in quercu, salice.

Larva pilosa, grisea, nigro-annulata alboque maculata.

Puppa dense folliculata, viridis, antice fusca.

Mas alis brunneis, foemina pallidioribus.

25. B. alis reversis, testaceis, fusco irroratis punctoque *stigma*, centrali niveo.

Habitat in America meridionali. *Mus. D. Hunter.*

Caput testaceum, hirtum. Antennae breves. Alae anticae testaceae, fusco irroratae, in medio puncto centrali albo et postice striga obliqua, fusca. Posticæ testaceae, immaculatae; subtus omnes testaceae, striga atomisque fuscis.

26. B. alis reversis, dentatis, flavis: strigis duabus fuscis *Prunt.* punctoque albo.

*Phalaena Pruni. Linn. Syst. Nat.* II. 813. 22.

*Roeſ. Inf.* 1. *phal.* 2. tab. 36.

Habitat in pruno.

Larva laevis, cinerea, coeruleo lineata, collo lateribusque fasciculato pilosis, pedibus posticis porrectis, distantibus.

Puppa folliculata, antice nigra, postice brunnea.

27. B. alis subreversis, integris, cinerascentibus: strigis duabus nigris; anticis puncto medio fulvo. *Amphimo-*

*me.*

Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Banks.*

Antennae valde pectinatae, fuscae. Corpus hirtum, fulvum, thorace lineis duabus, abdominis dorso cingulis tibiisque nigris. Alae integrae, cinereae, strigis duabus undatis, nigris, et inter has strigas in anticis punctum magnum fulvum. Subtus striga unica recta.

*potatoria.* 28. B. alis reversis, subdentatis, flavis, striga fulva re-pandaque, punctis duobus albis.

*Phalaena potatoria.* *Linn. Syst. Nat.* 11. 813. 23.

*Phalaena maxima* alis e fulvo flavicantibus. *Raj. Inf.* 143. 3.

*Goed. Inf.* 1. tab. 12.

*Alb. Inf.* 1. tab. 17.

*Merian. Eur.* 27. tab. 16.

*Wilks pap.* 27. tab. 3. b. 2.

*Sepp. Inf.* 4. 37. tab. 8.

*Roef. Inf.* 1. phal. 2. tab. 11.

Habitat in Europae graminibus.

Larva caudata, cristata, pilosa, lateribus albo maculatis.

Puppa folliculata, brunnea.

Ova oblonga, plumbea, utrinque annulo punctoque medio viridibus.

*ocularia.* 29. B. alis subreversis, albis: punctis ocellaribus nigris, numerosis.

Habitat in America meridionali. *Mus. D. Hunter.*

Magna. Antennae filiformes, nigrae. Caput album, puncto utrinque sub antennis fusco. Thorax albus, punctis ocellaribus duodecim 2. 4. 6., dorsalibus duobus majoribus flexuosis. Alae concolores; anticae albae, apice obscuriores, punctis plurimis ocellaribus nigris, sparsis. Posticae parum rever-sae, albae, punctis nigris. Pedes albi, tibiis nigro annulatis. Abdomen supra nigrum, subtus album, lateribus sanguineis.

*Hibisci.* 30. B. alis subreversis, concoloribus, luteis: anticis stri-gis duabus, posticis unica.

Habitat in Hibisco populneo Indiae orientalis. *Mus. Tottianum.*

Affinis B. potatoria. Corpus flavescens, thorace ante-luteo. Alae integrae, anticis strigis duabus fuscis, anteriore abbreviata; posticis unica.

*Cerasi.* 31. B. alis reversis, luteis: strigis duabus punctoque me-dio fuscis posticoque albo.

Habitat in pruno ceraso Angliae. *Lee.*

Statura omnino B. Pruni, at paulo minor. Antennae racchi albae. Corpus villosum, flavum. Alae anticae

ticeae luteae, strigis duabus fuscis, anteriore multo majore. Inter strigas punctum parvum fuscum et ad apicem alae punctum album, annulo fusco cinctum. Alae posticae pallidae; subtus pallidiores, puncto medio fuscus.

32. B. alis reversis, griseis: fascia ferruginea punctoque triangulari albo. Pini.

*Phalaena Pini.* *Linn. Syst. Nat.* II. 814. 24. *Fn. Sv.* 1104.

*Merian. Eur.* tab. 22.

*Frisch. Ins.* 10. tab. 10.

*Wilks pap.* 29. tab. 3. b. 5.

*Roef. Ins.* 1. *phal.* 2. tab. 59.

*Schaeff. Icon.* tab. 86. fig. 1—3.

Habitat in pino.

Larva subcaudata, albo, griseo fuscoque variegata, collaribus coeruleis: punctis utrinque rufis.

Puppa folliculata, fusca.

33. B. alis reversis, fuscis: anticis punto fascia marginata postico luteis. dumeti.

*Phalaena dumeti.* *Linn. Syst. Nat.* II. 815. 26. *Fn. Sv.*

1107. *Petiv. Gaz.* tab. 45. fig. 13.

Habitat in Europa.

Abdomen flavum.

34. B. alis reversis, griseis: strigis nigro-albis, thorace antice albo. versicolora.

*Phalaena versicolora.* *Linn. Syst. Nat.* II. 817. 32.

*Fn. Sv.* 1111.

*Phalaena alis lineis albis et nigris undatis.* *Gadd.*

*Satag.* 82.

*Roef. Ins.* 3. tab. 39. fig. 3.

*Wilks pap.* 45. tab. 1. a. 1.

Habitat in Europa.

35. B. alis reversis, cervinis: strigis duabus albidis, subtus nullis. Rubi.

*Phalaena Rubi.* *Linn. Syst. Nat.* II. 813. 21. *Fn. Sv.* 1103.

*Wilks pap.* 25. tab. 3. a. 19.

*Ammiral. Ins.* tab. 32.

*Roef. Ins.* 3. tab. 49.

Habitat in rubo, salice.

Larva pilosa, subtus nigra, supra ferruginea, annulis nigris.

Puppa folliculata, nigricans, annulis tribus luteis.

*Vinula*. 36. B. alis subreversis, fusco venosis striatisque, corpore albo, nigro punctato.

Phalaena Vinula. *Linn. Syst. Nat.* II. 815. 29. *Fn. Sv.* 1112.

Phalaena pectinicornis, elinguis, alis deflexis, albidis, diaphanis, vasis obscuris. *Geoff. Inf.* 2. 104. 5.

Phalaena alis amplis, exterioribus cinereis, maculis et lineis nigris eleganter depictis. *Raj. Inf.* 153. 5.

*Goed. Inf.* 1. tab. 65.

— — 2. tab. 37.

*Merian Europ.* tab. 39. fig. 140.

*Albin. Inf.* II. tab. 5.

*Frisch. Inf.* 6. tab. 8.

*Roef. Inf.* 1. phal. 2. tab. 19.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 21.

*de Geer Inf.* 1. tab. 23, fig. 12.

*Wilks pap.* tab. 13. fig. 1. e. 1.

Habitat in salice, populo.

Larva solitaria, gibba, viridis, dorso fusco, cauda bisepta.

Eruca bicauda elegantissima, Vinula dicta. *Raj. Inf.* 153. 3.

Puppa folliculata, fusca.

*Lanestris*. 37. B. alis reversis, ferrugineis: striga alba; anticis puncto basique albis.

Phalaena lanestris. *Linn. Syst. Nat.* II. 815. 28. *Fn. Sv.* 1105.

*Roef. Inf.* 1. phal. 2. tab. 62.

*Schaeff. Icon.* tab. 88. fig. 10. II.

*Wilks pap.* 25. tab. 3. a. 18.

Habitat in tilia, pruno spinosa, salice.

Larva gregaria, pilosa, nigra: segmento singulo punctis tribus albis inter maculas duas rubras penicillatas.

Puppa folliculata, sulphurea,

Ova lana densa cinerea testa.

*Populi*. 38. B. fusca, antice pallida, alis reversis fuscescentibus: striga sesquialtera repanda, albida.

Phalaena Populi. *Linn. Syst. Nat.* II. 818. 34. *Fn. Sv.* 1101.

*Wilks pap.* 23. tab. 3. a. 13.

*Roef. Inf.* 1. phal. 2. tab. 60.

Habi-

Habitat in populo, Pomone arboribus.

Larva cinerea, dorso obscuriore: segmentis singulis punctis duorum parium rubris.

Puppa folliculata, antice fusca, postice rufa.

39. B. alis reversis, ferrugineis, unicoloribus: puncto albo. *Catax.*

Phalaena Catax. *Linn. Syst. Nat.* II. 815. 27. *Fn. Sv.* 1108.

*Roef. Inf.* 4. tab. 34.

Habitat in Europa.

Larva viridis: linea laterali alba, cornu rufo.

Puppa folliculata, atra: postice strigis flavis.

40. B. alis reveris, fuscouscentibus: striga obscuriore. *processio-*  
*neæ.* *Phalaena processionea.* *Linn. Syst. Nat.* II. 819. 37.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 11.

Habitat in querco.

Larva gregaria, pilosa, fusco'-cinerea, dorso nigrante: verrucis luteis. Incedunt per paria inaequalia numero. Exuviae tactu inflammationes excitant.

41. B. alis reversis, pallidis: strigis tribus obsoletis, fuscis. *Mori.*  
*Phalaena Mori.* *Linn. Syst. Nat.* II. 817. 33. *Amcen.*

*acad.* 4. 563.

*Phalaena pectinicornis,* elinguis, tota alba, alis deflexis, *Bombyx dicta.* *Geoff. Inf.* 2. 116. 18.

*Merian. Eur.* 1. tab. 1.

*Blank. Inf.* 60. tab. 9.

*Alb. Inf.* tab. 12. fig. 16.

*Bradl. nat.* tab. 27. fig. 1.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 5. fig. 2.

*Roef. Inf.* 3. tab. 7. 8.

*Ammiral. Inf.* tab. 9.

*Goed. Inf.* 112. tab. 42.

Habitat in moro Chinae.

Larva caudata, nuda, albida.

Puppa folliculata, brunnea.

Tempore Imperatoris Iustiniani primo in Europa  
introducta.

42. B. alis reversis, griseis: strigis duabus ferrugineis; *Neustria.*  
subtus unica.

*Phalaena Neustria.* *Linn. Syst. Nat.* II. 818. 35.

N n 4

Phala-

*Phalaena pectinicornis*, elinguis, alis deflexis, pallidis, fascia alarum transversali saturatiore. *Geoff.*  
*Inf.* 2. 114. 16.

*Phalaena media*, tota cinerea. *Raj.* *Inf.* 214. 8.

*Alb.* *Inf.* 19. fig. 27.

*Frisch.* *Inf.* 1. tab. 2.

*Reaum.* *Inf.* 2. tab. 4. fig. 1—11.

*Roef.* *Inf.* 1. *phal.* 2. tab. 6.

*Goed.* *Inf.* 1. 57. tab. 10.

*Wilks pap.* 21, tab. 3, a, 10.

Habitat in Pomonae arboribus polyphaga.

Larva gregaria, glauca: lineis utrinque tribus rubris dorsalique alba.

Puppa folliculata, fusca,

*castrensis.* 43. B. alis reversis, obscuris: fasciis duabus pallidis.

*Phalaena castrensis* elinguis, alis reversis, griseis; strigis duabus pallidis, subtus unica. *Linn. Syst. Nat.* 11. 818. 36.

*Frisch.* *Inf.* 10. tab. 8.

*de Geer* *Inf.* 1. tab. 13, fig. 4—6.

*Roef.* *Inf.* 4. tab. 14.

Habitat in alchemilla, millefolio, polyphaga.

Larva gregaria, pilosa, coerulea, lineis rubris, nigro maculatis,

Puppa folliculata, obscura,

*Hieracii.* 44. B. alis subreversis, atro-fuliginosis.

*Phalaena atra* elinguis, tota atra. *Linn. Syst. Nat.* 11. 823. 49.

Habitat in Delphinio, Hieracio.

Larva pilosa, atra, linea dorsali sanguinea.

Puppa folliculata, ferrugineo-fusca,

\* \* \* *Alis deflexis.*

*lagopus.* 45. B. alis deflexis, flavescens: atomis strigisque duabus fuscis, pedibus anticis porrectis, hirsutissimis.

Habitat in China. *Mus. Monson.*

Corpus inter maximas, Antennae subpectinatae,

Thorax laevis, fuscescens. Alae flavescentes, fusco irroratae, strigis in medio duabus obliquis, fuscis.

Inter has strigas maculae duae ordinariae fuscae, altera

altera orbiculata, altera reniformis. Versus apicem  
alae striga tenuis alboidea. Posticae flavescentes. Pe-  
des antici porrecti, femoribus tibiisque villo flavo  
hirsutissimis, intermedii femoribus subtus hirsutis.

46. B. alis flavis, fusco maculatis: omnibus macula sub- *imperialis.*  
ocellari ferruginea.

Phalaena *imperialis*. Drury Inf. 1. tab. 9. fig. 1. 2.

Habitat in India.

Thorax hirtus, flavus, fusco varius. Abdomen fla-  
vum, dorso fusco, punctis flavis.

47. B. alis deflexis, cinereis: atomis strigisque unda- *crafficornis.*  
tis, fuscis.

Habitat in India. Drury.

Corpus magnum. Caput fuscum, antennis pectinatis,  
flexuosis, basi craffissimis, apice tenuioribus. Tho-  
rax et abdomen fusca. Alae anticae cinereae, atomis  
plurimis fuscis et postice strigis duabus valde unda-  
tis, fuscis. Posticae cinereae, immaculatae; subtus  
omnes cinereae, striga fusca.

48. B. alis deflexis, nebulosis, thorace postice fascia atra, *Cossus.*  
antennis lamellatis.

Phalaena *Cossus*. Linn. Syst. Nat. 11. 827. 63. Fn. Sv. III4.

Phalaena pectinicornis, elinguis, alis albo - cinereis,  
striis transversis, nebulosis, nigris, abdome annu-  
lis albis. Geoff. Inf. 2. 102. 4.

Phalaena grandis alis cinerascentibus, lineolis creber-  
rimis nigricantibus. Raj. Inf. 150. 2.

Gronov. Zooph. 204. 837.

Goed. Inf. 2. tab. 33.

Petiv. Gazoph. tab. 51. fig. 9.

Merian. Eur. tab. 36.

Alb. Inf. tab. 35. fig. 56.

Frisch. Inf. 7. tab. 1.

Roes. Inf. 1. phal. 2. tab. 18.

Reaum. Inf. 1. tab. 17. fig. 1 — 5.

Lyonett. Leff. tab. 1. fig. 17 — 22.

Wilks pap. 15. tab. 2. a. 2.

Schaeff. Icon. tab. 61. fig. 1. 2.

Habitat in ligno putrescente.

Larva subpilosa, incarnata: dorso sanguineo, capite nigro. Romanis in deliciis fuit, teste *Plinio*. vid. *Lyonet. monogr.*

Eruca maxima subterranea, raris pilis obsita, supina parte tota, excepto capite, rubra, prona flava. *Raj. Inf. 351. 25.*

Puppa folliculata: antice brunnea, postice flava.

*dispar.* 49. B. alis deflexis: masculis griseo fuscoque nebulosis; foemineis albidis, lituris nigris.

Phalaena dispar. *Linn. Syst. Nat. II. 821. 44.*

Phalaena pectinicornis, elinguis, alis deflexis, albis, fascia quadruplici transversa nigra, acute undulata. *Geoff. Inf. 2. 112. 14.*

*Merian. Eur. I. tab. 18.*

*Frisch. Inf. I. 14. tab. 3.*

*Reaum. Inf. 2. tab. 1. fig. 11 — 14.*

*Wilks pap. 20. tab. 3. a. 7.*

*Roef. Inf. I. phal. 2. tab. 3.*

*Schaeff. Icon. tab. 28. fig. 3 — 6.*

Habitat in Pomonae arboribus polyphaga: hortorum pestis.

Larva pilosa, albo lineata: punctis anticis coeruleis, posticis rubris. Manus pruritu inficit.

Puppa folliculata, punctis quatuor anticis nigris. Tacta in gyrum se volvit.

Mas alis fusco - griseis, nebulosis.

Foemina duplo major, alis albis, lituris nigris, ova pilis pulverulentis obducit.

*pudibunda.* 50. B. alis deflexis, cinereis: fasciis tribus fuscis, linearibus, undatis.

Phalaena pudibunda. *Linn. Syst. N. II. 824. 54. Fn. Sv. 1118.*

Phalaena pectinicornis, elinguis, alis deflexis, cinereo-undulatis, fasciis transversis, obscurioribus, capite inter pedes porrectos. *Geoff. Inf. 2. 112. 15.*

Phalaena cinerea, alis oblongis, exterioribus quatuor lineis nigricantibus transversis, distinctis.

*Raj. Inf. 185. 7.*

*Goed. Inf. 3. tab. 5.*

*Merian. Europ. I. tab. 47.*

*Alb. Inf. tab. 26.*

*Reaum. Inf. I. tab. 33. fig. 4 — 12.*

*Roef.*

*Roef. Inf. 1. phal. 2. tab. 38.*

*de Geer Inf. 1. tab. 16. fig. II. 12.*

*Wilks pap. 30. tab. 3. c. 2.*

*Ammiral. tab. 18.*

*Schaeff. Icon. tab. 44. fig. 9. 10.*

Habitat in Pomonae arboribus, corylo, polyphaga.

Larva fasciculata, pilosa, flava, capite luteo, caudae fasciculo longiori rubro, dorsi quatuor albis.

Eruca major pulcherrima pilosa, e viridi flavicans.

*Raj. Inf. 344. 9.*

Puppa folliculata: antice nigra, postice brunnea, flavo maculata.

51. B. alis deflexis, cinereis: atomis nigris strigisque duabus fulvis, repandis.

Phalaena fascelina elinguis, cristata, cinerea, alis superioribus antice fasciis duabus angustis, fulvo-fuscis, scutello bipunctato, fulvo. *Linn. Syst. Nat. II. 825. 55. Fn. Sv. III. 9.*

Phalaena obsoleta cinerea. *Raj. Inf. 186. 8.*

*Goed. Inf. 1. tab. 36.*

*Merian. Eur. tab. 8.*

*de Geer Inf. 1. tab. 15. fig. 15.*

*Roef. Inf. 1. phal. 2. tab. 37. mal.*

*Wilks pap. 30. tab. 3. c. 1.*

Habitat in leontodo, trifolio, rubo, populo.

Larva pilosa, fasciculata, rubro punctata: fasciculis quinque dorsalibus albis, capitis anique fuscis.

Puppa folliculata, brunnea, linea dorso pilosa.

52. B. alis deflexis, cinereis: strigis duabus ferrugineis maculaque terminali flava.

Phalaena bucephala. *Linn. Syst. N. II. 816. 31. Fn. Sv. III. 15.*

Phalaena pectinicornis, elinguis, alis tubiformibus, superioribus cinereis, fascia dupli ferruginea et extremo circulariter pallescente, subtus omnibus flavescentibus, fascia undulata, fusca. *Geoff. Inf. 2. 123. 28.*

Phalaena media, alis oblongis, ex rufo, cinereo, fulvo et albidente variis. *Raj. Inf. 162. 14.*

*Goed. Inf. 1. tab. 34.*

*Merian. Europ. 3. tab. 41.*

*Alb. Inf. tab. 23. fig. 33.*

*Frisch. Inf. II. tab. 4.*

*fascelina.*

*bucephala.*

*de Geer*

*de Geer Inf.* 1. tab. 13. fig. 14—19.

*Roef. Inf.* 1. *phal.* 2. tab. 14.

*Wilks pap.* 21. tab 3. a. 8.

*Schaeff. Icon.* tab. 31. fig. 10. 11.

Habitat in tilia, quercu, Pomonae arboribus.

Larva pilosa, nigra, annulis lineisque luteis: punctis  
albis lateralibus.

Puppa nuda, postice corniculis duobus.

*coeruleocephala.* 53. B. alis deflexis, griseis: fasciis duabus ferrugineis  
maculaque albida duplicato-didyma.

Phalaena coeruleocephala elinguis, cristata, alis deflexis,  
griseis: stigmatibus albidis, coadunatis. *Linn.*  
*Syst. Nat.* 11. 826. 59. *Fn. Sv.* 1117.

Phalaena pectinicornis, elinguis, alis deflexis, fuscis,  
macula duplii albo-flavescente, geminata. *Geoff.*  
*Inf.* 2. 122. 27.

Phalaena alis exterioribus pullis duabus tribusve  
maculis albis, e duobus circulis compositis, contiguis  
notatis. *Raj. Inf.* 163. 17.

*Goed. Inf.* 1. tab. 61.

*Merian. Eur.* tab. 9.

*Alb. Inf.* tab. 13. fig. 17.

*Frisch. Inf.* 10. tab. 3. fig. 4.

*Reaum. Inf.* 1. tab. 18. fig. 6—9.

*Roef. Inf.* 1. *phal.* 2. tab. 16.

*Wilks pap.* 6. tab. 1. a. 12.

Habitat in Pomonae arboribus.

Larva nuda, coerulescens, luteo lineata, nigro punctata.

Eruca rarius pilosa, mali, pyri. *Raj. Inf.* 163. 17.

Puppa folliculata, brunnea.

Imago thorace antice ferrugineo, postice griseo.

*Dione.* 54. B. alis deflexis, albis, nigro striatis, punctatisque;  
subtus margine purpureo.

Habitat in America. *Mus. Monson.*

Antennae pectinatae. Thorax cinereus, lineis tribus  
nigris. Abdomen subtus nigro punctatum. Alae  
anticae albae, basi nigro striatae, apice punctatae,  
subtus margine crassiori et postico purpureis.  
Posticae albae, punctis paueis nigris.

55. B. alis deflexis, dorso dentatis apicibusque macula grisea subocellari, antennis squamatis. *Ziczac.*

*Phalaena Ziczac. Linn. Syst. Nat. II. 827. 61. Fn. Sv. 1116.*

*Phalaena pectinicornis, elinguis, alis exterioribus fuscis, venis plurimis, fascia circulari et marginis interioris appendice nigricantibus, inferioribus nigricantibus, limbo linearifusco. Geoff. Inf. 2. 124. 29.*

*Goed. Inf. 3. tab. E.*

*Merian. Eur. tab. 147.*

*Alb. Inf. tab. 14. fig. 20.*

*Frisch. Inf. 3. tab. 1. fig. 2.*

*Reaum. Inf. 2. tab. 22. fig. 9 — 16.*

*Roef. Inf. 1. phal. 2. tab. 20.*

*de Geer Inf. 1. tab. 6. fig. 1 — 10.*

*Wilks pap. 12. tab. 1. d. 1.*

*Schaeff. Icon. tab. 69. fig. 2. 3.*

Habitat in salice.

Larva solitaria, nuda, dorso gibberibus duobus, cauda rufa.

Puppa folliculata, brunnea.

56. B. alis deflexis, glaucis: fascia ferruginea; puncto nigro, albo annulato, thorace variegato. *Coryli.*

*Phalaena Coryli elinguis, thorace variegato, alis antice griseo - nebulosis, postice coerulescenti - glaucis, antennis flavis. Linn. Syst. Nat. II. 823. 50. Fn. Sv. 1123.*

*Alb. Inf. tab. 90.*

*Wilks pap. 31. tab. 3. c. 5.*

*de Geer Inf. 1. tab. 18. fig. 4. 5.*

*Roef. Inf. 1. phal. 2. tab. 58.*

Habitat in corylo.

Larva fascicularis, pilosa, rubra, fasciculis dorsalibus duobus, caudae unico, collaribus longioribus.

Puppa folliculata, antice nigra, postice brunnea.

57. B. aliis deflexis, ferrugineis: puncto medio albo striaque punctata fusca. *Alphaea.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Statura B. catax, at alae haud reversae. Antennae breves, pectinatae. Corpus hirtum, ferrugineum, immaculatum. Alae anticae integrae, ferrugineae, puncto parvo medio albo, posticeque striga e punctis fuscis. Posticae immaculatae.

*monacha.* 58. B. alis deflexis, albis, atro-undatis, abdominis incisuris sanguineis.

Phalaena monacha. *Linn. Syst. Nat.* II. 821. 43. *Fn. Sv.* 1130.

Phalaena media ex cinereo albicante et nigro coloribus varia. *Raj. Inf.* 158. 7.

*Wilks pap.* 19. tab. 3. a. 4.

*Schaeff. Icon.* tab. 68. fig. 2. 3.

Habitat in salice, malo, larice, rubo.

Larva fusco-cinerea, fasciculis dorsi rubris, segmento secundo macula cordata nigra.

Eruca Rubum idaeum depascens. *Raj. Inf.* 159. 8.

Puppa nigra.

*flava.* 59. B. alis deflexis, flavissimis: apice punctis tribus nigris.

Habitat in India. *Koenig.*

Antennae breves, pectinatae. Thorax pilosus, flavus.

Alae flavissimae, anticus punctis tribus nigris, duobus ad apicem et uno ad angulum ani.

*lutea.* 60. B. alis deflexis, flavissimis, immaculatis.

Habitat in nova Hollandia. *Muy. Banks.*

Affinis praecedenti, at alae omnes immaculatae. Corpus totum flavum, oculis solis nigris.

*curtula.* 61. B. alis deflexis, glaucis: strigis albis maculaque apicis fusca.

Phalaena curtula elinguis, thorace ferruginato, alis deflexis, glaucis; striga alba, apicibus macula testacea. *Linn. Syst. Nat.* II. 823. 52. *Fn. Sv.* 1124.

*Sepp. Inf.* 4. 4. tab. 1. fig. 13 — 18.

*Roef. Inf.* 3. tab. 43.

— — 4. tab. 11. fig. 1 — 6.

*Frisch. Inf.* 5. tab. 6.

Habitat in salice, populo.

Larva solitaria, pilosa, fusca: stria dorsali incarnata, verrucis duabus elevatis punctisque laterilibus rufis.

Puppa fasciculata, brunnea.

Imago sequenti affinis. Thorax macula antica brunnea.

62. B. alis deflexis, griseis: strigis tribus pallidis, sub-anastomosantibus, thorace ferruginato. *anastomosis.*

*Phalaena anastomosis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 824. 53.

*Fn. Sv.* 1124.

*Goed. Inf.* I. tab. 33.

*Roef. Inf.* I. *phal.* 2. tab. 26.

Habitat in salice.

Larva fusca, dorso albo-punctato lineaque laterali flava, rubro-punctata, tubere humeri anique.

Puppa folliculata, nigra, striis duabus rubris.

63. B. alis deflexis, cinerascentibus, oo notatis.

*Oo.*

*Phalaena Oo.* *Linn. Syst. Nat.* II. 832. 81. *Fn. Sv.* 1139.

*Wilks pap.* 6. tab. I. a. II.

*Roef. Inf.* I. *phal.* 2. tab. 63.

Habitat in quercu.

Larva nuda, rubra: punctis lineisque albis; dorsali interrupta, capite nigro.

Puppa nuda, rubra: stigmatibus albis.

64. B. alis deflexis, dentatis, albidis, nigro-venosis, *palpina*, palpis porrectis, pennaceis.

*Phalaena palpina.* *Linn. Syst. Nat.* II. 828. 64.

*Sepp. Inf.* 4. 17. tab. 4.

*de Geer Inf.* I. tab. 4. fig. 7.

Habitat in salice.

Larva solitaria, nuda, viridis: linea laterali flava.

65. B. alis deflexis, denticulatis, ferrugineis: denticulo-capucinaque dorsali reflexo.

*Phalaena capucina.* *Linn. Syst. Nat.* II. 832. 79.

Habitat in Europae plantis.

66. B. alis deflexis, denticulatis, brunneis: omnibus camelinae.

denticulo dorsali.

*Phalaena camelina.* *Linn. Syst. Nat.* II. 832. 80. *Fn.*

*Sv.* 1145.

*Roef. Inf.* I. *phal.* 2. tab. 28.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 20. fig. 13.

Habitat in tilia, alno, betula.

Sedens erigit a tergo cristas 2., quarum prior ex alarum anticarum, posterior ex posticarum dentibus five lobulis conniventibus.

Larva

*Larva nuda, virescens, corniculis duobus caudalibus, stigmatibus purpureis.*

*Puppa folliculata, antice brunnea, postice fusca.*

*aulica.* 67. *B. alis deflexis: anticis griseis, flavo punctatis; posticis fulvis, nigro maculatis.*

*Phalaena aulica. Linn. Syst. Nat. II. 829. 68. Fn. Sv. 1133. Clerk. Icon. tab. 4. fig. 3.*

*Merian. Europ. 2. tab. 8.*

*Alb. Inf. tab. 22.*

*Wilks Inf. 19. tab. 3. a. 3.*

*Habitat in cynoglosso, angelica, urtica.*

*Parva: alis anticis maculis quinque; anteriore longiore.*

*lubricipe-* 68. *B. alis deflexis, albidis: punctis nigris, abdomine quinquefariam nigro-punctato.*

*Phalaena lubricipedata. Linn. Syst. Nat. II. 829. 69. Fn. Sv. 1138.*

*Phalaena pectinicornis, elinguis, alis deflexis, albidis, punctis nigris, abdomine ordinibus quinque punctorum. Geoff. Inf. 2. 118. 21.*

*Goed. Inf. 1. tab. 23. 38.*

*Merian. Europ. 1. tab. 46. fig. 65.*

*Alb. Inf. tab. 24. fig. 36.*

*Frisch. Inf. 3. tab. 8.*

*Reaum. Inf. 2. tab. 1. fig. 7—9.*

*Roef. Inf. 1. phal. 2. tab. 46. et 47.*

*de Geer Inf. 1. tab. 11. fig. 7. 8.*

*Schaeff. Icon. tab. 24. fig. 8. 9.*

*Habitat in quercu, atriplice, oleribus, polyphaga.*

*Variat alarum colore et punctorum numero.*

*Larva pilosa, fusca, punctis coeruleis lineaque dorsali pallida.*

*Puppa folliculata, coerulescens: stigmatibus rubris.*

*laeta.* 69. *B. alis deflexis: anticis niveis; fascia lata nigra, antennae simplicibus.*

*Habitat in Suecia.*

*Caput et thorax nivea, nigro irrorata. Antennae simplices, brunneae. Pectus fuscum. Alae anticae niveae, fascia lata, media nigra. Margo posticus nigropunctatus. Posticae basi cinereae, apice fuscae. Subtus omnes griseae.*

70. B. alis deflexis, canis: maculis duabus dorsalibus fuscis, antennis apice setaceis. *Milbau-  
fieri.*  
*Milhauser Monogr. Dresd. 1763. tab. I.*  
 Habitat Dresdæ.  
 Larva viridis: spinis dorsalibus furcatis, pedibus subcaudalibus nullis.  
 Puppa folliculata, brunnea; antice acuminato-emarginata.
71. B. alis deflexis, fuscis, albo-striatis: stigmatibus albis; pupilla brunnea. *popularis.*  
 Habitat in Germania. *de Hattorf.*  
 Rusticæ major. Antennæ fuscae, valde pectinatae. Thorax haud cristatus, fusco cinereoque nebulosus. Abdomen griseum, ano barbato. Alae anticae fuscae, nervis albis striatae. In medio stigmata ordinaria alba; anteriori orbiculato, posteriori reniformi, pupilla brunnea. Posticae cinereac, immaculatae.
72. B. alis deflexis: anticis griseis; apice albo nigro-striatis. *strigula,*  
 Habitat Dresdæ Saxoniae.  
 Statura et magnitudo B. graminis. Corpus cinereum. Alae griseae, basi strigis obsoletis abbreviatis fuscis semicirculisque cinereis. In medio maculae ordinariae, antica minutissima annulo nigro cincta, postica transversa. Apex alae striis nigris albisque. Alae posticae basi cinereæ, apice fuscae. Antennæ filiformes.
73. B. alis deflexis, albis, v nigro notatis. *Vnigrum.*  
 Habitat in Saxoniae tilia.  
 Statura B. salicis. Antennarum radii ferruginei. Corpus albicans, pedibus nigro-annulatis. Alae albifimæ; anticae V nigro inscriptæ, cujus crura posteriore spectant.  
 Larva fasciculata: fasciculis dorsalibus octo, anticis posticisque albis, collari hirsutissimo.  
 Puppa viridis: macula thoracis nigra.
74. B. alis deflexis, niveis, ano barbato, ferrugineo. *chrysor-  
Phalaena chrysorrhœa. Linn. Syst. Nat. II. 822. 45. rheæ.  
Fn. Sv. 1128. Geoff. Inf. 2. 117. 20.  
Raj. Inf. 156. 1.*

*Merian. Eur.* 1. 8. tab. 20.

*Frisch. Inf.* 3. 28. tab. 8.

*Reaum. Inf.* 1. tab. 16. fig. 11.

*Roeß. Inf.* 1. phal. 2. tab. 22.

*Wilks pap.* 28. tab. 3. b. 3.

*Edw. Av.* 122. tab. 122.

Habitat in Pomonae arboribus, polyphaga.

Antennae niveae, radiis ferrugineis.

Larva gregaria, pilosa, nigricans: lineis duabus dorsibus rubris: lateribus albo-fasciculatis.

Eruca media pilosa, humeris in gibbum elatis, albo-nigro rubroque coloribus varia. *Raj. Inf.* 343. 5.

Puppa folliculata, nigricans.

Ova lutea lana copiosa fulva tegit.

*Salicis.* 75. B. alis deflexis, albis, pedibus nigris, albo-annulatis.

*Phalaena Salicis.* *Linn. Syst. Nat.* 11. 822. 46. *Fn. Sv.* 1129.

*Phalaena pectinicornis,* elinguis, alis deflexis, albis, pedum annulis antennisque nigris. *Geoff. Inf.* 2. 116. 19.

*Goed. Inf.* 1. tab. 3.

*Blank Inf.* tab. 8. fig. A. D.

*Merian. Eur.* 1. tab. 30.

*Alb. Inf.* tab. 84. fig. a-d.

*Frisch. Inf.* 1. tab. 4.

*Reaum. Inf.* 1. tab. 34. fig. 4-6.

*Harris Inf.* 2. tab. 5. fig. k-p.

*Roeß. Inf.* 1. phal. 2. tab. 9.

*de Geer. Inf.* 1. tab. II. fig. 13. 14.

*Wilks pap.* 21. tab. 3. a. 9.

Habitat in salice, populo.

Larva pilosa, nigra: dorso longitudinaliter albo-maculato rubroque punctato.

Puppa folliculata, pilosa, brunnea.

*tibialis.* 76. B. alis deflexis, niveis, tibiis anticis flavescentibus, nigro punctatis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Affinis praecedenti. Antennae fuscae, simplices. Corpus et alae niveae, immaculatae. Pedes nivei, plantis fuscis. Femora antica dorso fusco, tibiae anticae flavescentes, punctis quatuor nigris.

77. B. alis deflexis, albidis: costa palpisque ferrugineis. *obsoleta.*  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
 Statura praecedentium. Antennae pectinatae, nigrae,  
 racchi alba. Palpi magni, compressi, ferruginei.  
 Thorax hirtus, albus. Abdomen cinereum. Alae  
 omnes albidae, anticis costa ferruginea.
78. B. alis deflexis: anticis cinereis, posticis niveis. *Corones.*  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
 Antennae pectinatae. Caput et thorax cinerea, ore  
 subsanguineo. Abdomen nivellum. Alae anticae  
 cinereae, margine exteriori sanguineo: posticae  
 niveae, striga postica fusca.
79. B. alis deflexis, flavescentibus: basi coeruleo - macu- *festiva.*  
 latis, apice nigro punctatis.  
 Habitat in America. *Mus. Dr. Hunter.*  
 Antennae filiformes, nigrae. Thorax flavesiens, lineis  
 tribus coeruleofuscis. Alae deflexae, flavae, basi  
 maculis duabus longitudinalibus coeruleis, in medio  
 fascia bifida coerulea: striga albicante, apice lineae  
 tres punctorum albidorum. Posticae fuscae.
80. B. alis deflexis, luteis: margine sanguineo lunulaque *Russula.*  
 fusca, posticis subtus immaculatis.  
*Phalaena Russula.* *Linn. Syst. Nat.* II. 830. 71.  
*Phalaena Sannio.* *Linn. Fn. Sv.* 1135.  
*Phalaena pectinicornis,* spirilinguis, alis deflexis, pal-  
 lido - luteis, limbo roseo, superioribus macula, in-  
 ferioribus fascia dupli fusca. *Geoff. Inf.* 2. 129. 39.  
*\*Robert. Icon.* tab. 30. fig. 1.  
*Raj. Inf.* 228. 75.  
*Schaeff. Icon.* tab. 83. fig. 4. 5.
- β. *Phalaena Russula.* *Linn. Fn. Sv.* 1156.  
*Clerk. Icon.* tab. 4. fig. 1.  
*Kleemann. Inf.* 1. tab. 20.  
 Habitat in lactuca, scabiosa.
81. B. alis deflexis, luteis: anticis flavis, nigro - striatis, *grammi-*  
 posticis fascia terminali nigra. *ca.*  
*Phalaena grammica.* *Linn. Syst. Nat.* II. 831. 75. *Fn. Sv.*  
 1134. *Geoff. Inf.* 2. 115. 17.

- Linn. Amoen. acad. 5. tab. 3. fig. 31.*  
*Merian. Europ. 1. tab. 5.*  
*Schaeff. Icon. tab. 92. 2.*  
*Roef. Inf. 4. tab. 21. fig. A — D.*  
 Habitat in plantagine.  
 Larva fusca: linea dorsali alba, pedibus rufis.  
 Puppa nuda, brunnea.
- purpurea.*** 82. B. alis deflexis: anticis flavis, fusco punctatis, posticis rubris, nigro maculatis.  
*Phalaena purpurea. Linn. Syst. Nat. II. 828. 67.*  
*Geoff. Inf. 2. 105. 6.*  
*Merian. Europ. 1. tab. 6.*  
*Alb. Inf. tab. 22.*  
*Seb. Mus. 4. tab. 59. fig. 4. 5.*  
*Roef. Inf. 1. phal. 2. tab. 10.*  
 Habitat in ribe.  
 Larva hirsuta, grisea, albo maculata, odorem Mari veri spargit. *Roefel.*  
 Puppa nuda, brunnea.
- Plantaginis.*** 83. B. alis deflexis, atris: rivulis albis, posticis luteis: margine maculisque nigris.  
*Phalaena Plantaginis elinguis, alis deflexis, atris, rivulis flavis, inferioribus rubro maculatis. Linn. Syst. Nat. II. 820. 42. Fn. Sv. 1132.*  
*Phalaena pectinicornis, elinguis, alis deflexis, superioribus fuscis, maculis luteis, inferioribus rubris, maculis quatuor nigris. Geoff. Inf. 2. 109. 10.*  
*Phalaena alpicola. Scopol. carn. 507.*  
*Wilks pap. 24. tab. 3. a. 5.*  
*Roef. Inf. 4. tab. 24.*  
 Habitat in plantagine, ulmo.  
 Mas fulvus, foemina coccinea.  
 Larva pilosa, atra: dorso brunneo,  
 Puppa atra.
- Vidua.*** 84. B. alis deflexis, fuscis: anticis cinereo - subfasciatis, posticis macula baseos fasciaque rufis.  
 Habitat in Anglia.  
 Statura B. Plantaginis, at paulo major. Antennae tenues, pectinatae. Corpus nigrum, immaculatum, subtus cinereo - pubescens. Alae anticae supra fuscæ, fasciis

fasciis strigisque cinereis, indistinctis, subtus ferrugineae, striga, ad marginem crassiorem majori, apiceque fuscis. Posticae concolores, basi fuscae, macula magna oblonga ferruginea ad marginem exteriorem, in medio fascia lata dentata, ferruginea. Margo posticus fuscus.

85. B. alis deflexis, atris: maculis octo albis, posticis *villica*.  
flavis, nigro maculatis.

*Phalaena villica*. *Linn. Syst. Nat.* II. 820. 41.

*Geoff. Ins.* 2. 106. 1.

*Harris Ins.* 9. tab. 4.

*Raj. Ins.* 156. 4.

*Alb. Ins.* tab. 21.

*Frisch. Ins.* 10. tab. 2.

*Reaum. Ins.* 1. tab. 31. fig. 4 - 6.

*Roef. Ins.* 4. tab. 28. fig. 2.

— — tab. 29. fig. 1 - 4.

*Wilks pap.* 18. tab. 3. a. 2.

Habitat in oleribus, urtica, millefolio, polyphaga.

Larva hirsuta, nigricans, fulvo maculata, capite pedibusque rufis.

Puppa folliculata, nigra.

86. B. alis deflexis, albis, nigro fasciatis: posticis sanguineis, nigro maculatis.

*Phalaena Hebe elinguis*, alis deflexis, atris: fasciis albis, inferioribus rubris: maculis nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 820. 40.

*Phalaena elinguis*, pectinicornis, alis deflexis, superioribus albidis, rivulis transversis, nigris, inferioribus roseis, macula triplici nigra. *Geoff. Ins.* 2. 109. 9.

*Phalaena festiva*. *Berl. Mag.* 2. 416. 32.

*Frisch. Ins.* 7. tab. 9.

*Roef. Ins.* 4. tab. 27. fig. 1. 2.

*Schaeff. elem.* tab. 98. fig. 1.

Habitat in artemisia.

Abdomen sanguineum: dorso anoque atris.

87. B. alis deflexis, fuscis: rivulis albis: posticis purpureis, nigro punctatis.

*Hebe*.

*Caja*.

*Phalaena Caja.* *Linn. Syst. Nat.* II. 819. 38. *Fn. Sv.* 1131.

*Geoff. Inf.* 2. 108. 8.

*Raj. Inf.* 151. 3.

*Merian. Eur.* tab. 5.

*Alb. Inf.* tab. 20. fig. C. D.

*Frisch. Inf.* 2. tab. 9.

*Sepp. Inf.* 4. 9. tab. 2.

*Roof. Inf.* 1. phal. 2. tab. 1.

*Goeed. Inf.* 1. p. 37. tab. 17.

*Reaum. Inf.* 1. tab. 36. fig. 6. 7.

*de Geer. Inf.* 1. tab. 12. fig. 8. 9.

*Blank. Inf.* tab. 9. fig. A. C.

*Wilks pap.* 18. tab. 3. a. 1.

*Sulz. Inf.* tab. 16. fig. 94.

*Schaeff. Icon.* tab. 29. fig. 7. 8.

Habitat in oleribus, polyphaga.

Larva solitaria, hirta, nigricans: segmentis utrinque punctis tribus elevatis, coerulecentibus.

Eruca densius pilosa, pilis longissimis incanis, fulvis et nigris varia. *Raj. Inf.* 152. 7.

Puppa folliculata, nigra, opaca.

*Virgo.* 88. B. alis deflexis, atris: rivulis rubicundis, posticis rubris, nigro punctatis.

*Phalaena Virgo.* *Linn. Syst. Nat.* II. 820. 39. *Mus. L. V.* 381.

*Clerk. Icon.* tab. 42. fig. 5.

Habitat in America.

Paulo minor B. Caja, et rivuli alarum anticarum plures reticulati. Abdomen supra rubrum, subtus nigrum.

*deflorata.* 89. B. alis deflexis, albis, nigro maculatis: posticis subtus atris; fasciis albis.

Habitat in America. *Mus. Dr. Hunter.*

Caput album, fronte nigra. Antennae nigrae. Thorax niveus punctis duobus dorsalibus, duobusque utrinque minoribus nigris. Alae albae, maculis plurimiis nigris sparsis. Abdomen subtus album, linea punctorum nigrorum. Pedes nigri, tibiis basi albis.

\*\*\*\* Alis

\* \* \* \* \* *Alis incumbentibus.*

90. B. alis incumbentibus: anticis purpurascens; maculis ocellaribus atris, posticis rubris, nigro maculatis.

*Crotalariae.*Habitat in Crotalariis Indiae orientalis. *Koenig.*

Statura et magnitudo B. Herae. Antennae nigrae, subpectinatae. Thorax griseus, punctis sex nigris. Abdomen rubrum, punctis nigris lineatum. Alae anticae pallide purpurascentes, obscure subfasciatae maculisque plurimis nigris sparsis, iride flavescente cinetis; subtus fuscescentes, maculis confluentibus margineque fuscis. Posticae rubrae, nigro maculatae.

91. B. alis incumbentibus, obscuris: maculis numerosis subocellaribus, fuscis, posticis rubris, nigro maculatis.

*Ricini.*

Habitat in Indiae orientalis ricino. *Muf. Tottianum.*  
Statura omnino praecedentis, at alae multo obscuriores et pupillae macularum fuscae, iride cinerea. Thorax fuscus, utrinque macula ocellari. Abdomen sanguineum cingulis anusque maculis tribus fuscis, intermedia majori.

92. B. alis incumbentibus, virescenti-nigris: rivulis flavis, posticis rubicundis: maculis tribus nigris.

Phalaena Hera. *Linn. Syst. Nat. II. 834. 91.**Geoff. Inf. 2. 145. 74.*Phalaena Plantaginis. *Scop. carn. 505.**Schaeff. elem. tab. 10. fig. 1.**- - - Icon. tab. 29. fig. 1. 2.**Mouff. Inf. 91. 7. fig. 4.**Roef. Inf. 4. tab. 28. fig. 3.*

Habitat in Europa australiori.

*Hera.*

93. B. alis incumbentibus, atris: maculis albo-flavescens; posticis rubris, nigro maculatis.

Phalaena Dominula. *Linn. Syst. Nat. II. 834. 90.**Merian. Europ. 2. tab. 38.**Alb. Inf. tab. 22.**Wilks pap. 19. tab. 3. a. 3.**Schaeff. Icon. tab. 77. fig. 3. 4.**Roef. Inf. 3. tab. 47.**Dominula.*

Habitat in lamio, salice, polyphaga.

Larva pilosa, atra; lineis tribus flavis albo maculatis.

Puppa brunnea intra folliculum communem.

- crecula.* 94. B. alis incumbentibus corporeque atris albo punctatis.

Habitat in America.

Statura praecedentis. Alae omnes atrae, punctis plurimis distinctis, albis. Macula oblonga sanguinea, punctis duobus nigris ad basin alae anticae. Caput thorax et abdomen nigra, albo punctata.

- Leétrix.* 95. B. alis incumbentibus, nigris, maculis coeruleis, flavis albisque, posticis rubro alboque maculatis.

Phalaena leétrix. *Linn. Syst. Nat.* II. 834. 89. *Mus. L. V.* 389.

*Eém. Av.* tab. 318.

Habitat in China.

Abdomen rubrum, fasciis nigris.

- Furcula.* 96. B. thorace variegato, alis griseis, basi apiceque albis, nigro punctatis.

Phalaena Furcula. *Linn. Syst. Nat.* II. 823. 51. *Fn. Sv.* 1122. *Wilks pap.* 13. tab. I. fig. 1.

*Sepp. Inf.* 4. 29. tab. 6.

Habitat in salice.

Larva solitaria, nuda, bicaudata, viridis.

- Matronula.* 97. B. alis anticis fuscis, exterius flavo maculatis, posticis flavis, nigro maculatis.

Phalaena Matronula. *Linn. Syst. Nat.* II. 835. 92.

*Roel. Inf.* 3. tab. 39. fig. 1. 2.

Habitat in Germania.

- antiqua.* 98. B. alis incumbentibus: anticis ferrugineis; lunula alba anguli postici: foemina aptera.

Phalaena antiqua. *Linn. Syst. Nat.* II. 825. 56. *Fn. Sv.* 1120. *Geoff. Inf.* 2. 119. 23.

Phalaena cinerea, ventricosa, corpore brevi, alarum expers. *Raj. Inf.* 173. 24.

*Goed. Inf.* 2. tab. 29. 30.

*Swamm. bibl.* tab. 33. fig. 3. 6.

*Merian. Eur.* tab. 84.

*Alb.*

*Alb. Inf.* tab. 89.

*Reaum. Inf.* 1. tab. 19. fig. 12. 17.

*de Geer. Inf.* 1. tab. 17. fig. 13. 14.

*Roef. Inf.* 1. phal. 2. tab. 39.

— — 3. tab. 13.

*Wilks pap.* 30. tab. 3. c. 3.

Habitat in pruno, tilia, alno, polyphaga.

Larva fasciculata: fasciculis dorsalibus quatuor albis, antennalibus caudalique obscuris.

Eruca sublutea, pilosa, quatuor in medio dorso agminulis pilorum longiorum luteorum et longo pilorum nigrorum penicillo in cauda. *Raj. Inf.* 344. 8.

Puppa folliculata, nigro luteoque variegata.

99. B. alis incumbentibus, fuscis: maculis duabus albis oppositis, foemina aptera. *Phalaena gono-*  
*stigma.*

*Phalaena gonostigma.* *Linn. Syst. Nat.* II. 826. 57.

*Alb. Inf.* tab. 90.

*Wilks pap.* 31. fig. 3. c. 4.

*Roef. Inf.* 1. phal. 2. tab. 40.

Habitat in betula, quercu.

Diffrer manifeste a praecedente. Alae ochraceae, maculis duabus albis, altera ad angulum ani, altera opposita ad marginem crassiorem maculae ferrugineae innata.

Larva gregaria, fasciculata: fasciculis octo dorsalibus albis, collaribus duobus analique nigris.

Puppa antice flava, postice nigra.

100. B. alis convolutis, flavis: fasciis sex punctorum nigrorum ocellatorum, posticis nigro punctatis. *Phalaena Pylotis.*

*Drury. Inf.* 2. tab. 6. fig. 3.

*Phalaena cribraria.* *Clerk. Icon.* tab. 54. fig. 4.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Alae posticae flavae, punctis decem atris.

101. B. alis convolutis, flavis: fasciis sex punctorum nigrorum, posticis rubris: apice nigris. *Phalaena bella.*

*Linn. Syst. Nat.* II. 884. 348. *Mus.*

*L. V.* 399.

Phalaena minor fulva, maculis nigris, alba linea pulcre adspersis. *Raj. Inf.* 211. 1.

*Petiv. Gazoph.* 1. tab. 3. fig. 1.

*Catesb. Carol.* 2. 96. tab. 96.

Habitat in America septentrionali.

*pulchella.* 102. B. alis albis: anticis nigro sanguineoque punctatis: posticis apice nigris.

Phalaena pulchella. *Linn. Syst. Nat.* 11. 884. 349.

*Petiv. Gazoph.* 1. tab. 3. fig. 3.

Habitat in Europa australi, Oriente, America, in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

*Ornatrīx.* 103. B. alis depresso, rubris, atro punctatis: posticis albo nigroque variis.

Phalaena ornatrīx. *Linn. Syst. Nat.* 11. 839. 110. *Mus. L. V.* 384.

*Drury. Inf.* 1. tab. 74. fig. 3.

*Seb. Mus.* 4. tab. 39. fig. 19. 20.

Habitat in America.

Nimis affinis B. bellae.

*Jesuita.* 104. B. alis incumbentibus, atris: stria fulva.

Habitat in Indiis.

Antennae pectinatae, apice setaceae. Corpus nigrum.

Alae incumbentibus, omnes atrae, obscurae, stria lata fulva a basi ad apicem ducta, marginem posticum tamen haud attingit. Basis marginis exterioris alarum posticarum etiam fulva.

*veflita.* 105. B. alis incumbentibus, nigris, immaculatis, abdomine subtus villoso, albo.

Habitat in Saxoniae corylo.

Antennae nigrae, pectinatae. Thorax tomento cinerascente testus. Abdomen supra nigrum, subtus lana densa alba vestitum. Alae atrae, immaculatae, margine exteriori parum albicante.

Larva grisea, nigro. punctata degit intra cylindrum e graminibus aridis filo connexis constructum, quem foliis adfigit.

*Graminis.* 106. B. alis depresso, griseis: linea trifurca puncto que albidis.

Phalaena Graminis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 830. 73. *Fu. Sv.* 1140.

Aet.

*Aet. Holm.* 1742. 40. tab. 2.

*Raj. Inf.* 228. 104?

Habitat in gramine, prata devastans.

107. B. alis incumbentibus, atris, rubro flavoque variegatis: posticis nigris, margine flavo. *Gloriosae.*

Habitat in *Gloriosa Indiae orientalis*. *Muf. Tottianum*.

Media. Caput nigrum, puncto utrinque baseos flavo.

Antennae setaceae. Thorax ater, postice punctis quatuor fulvis. Alae anticae atrae, basi litura rubra, punctis duobus nigris, postea striga flexuosa flava, tunc stigmata ordinaria flava, anteriore orbiculato pupilla nigra, posteriori reniformi pupilla rubra, denique striga undata flava fasciaque macularis rubra. Ala terminatur ad marginem exteriorem et ad angulum ani macula majori flava. Posticae, uti omnes, subtus nigrae, margine flavo. Abdomen nigrum, ano flavo. Pedes nigri, flavo maculati.

108. B. alis incumbentibus, atris, ante marginem subferrugineis: posticis albis. *Crini.*

Habitat in *Crino asiatico Indiae orientalis*. *Muf. Tottianum*.

Corpus magnitudine praecedentis. Antennae setaceae. Caput et thorax hirta, atra. Abdomen cinereum. Alae atrae, nitidae, stigmate medio reniformi, ferrugineo: postice subferrugineae, margine tamen ipso nigro, striga undata atra.

109. B. alis incumbentibus, roseis: strigis tribus fuscis, secunda undata, tertia punctata. *rosea.*

*Phalaena pectinicornis*, elinguis, alis deflexis, roseis, superioribus punctorum arcuumque nigrorum ordine duplo. *Geoff. Inf.* 2. 121. 25.

*Phalaena minor*, alis velut miniaceis, punctis et lineolis nigris in medio notatis. *Raj. Inf.* 227. 86.

Habitat in Europae hortis.

Abdomen subtus nigrum.

110. B. alis incumbentibus, atra, collari sanguineo, abdome flavo. *rubricollis.*

*Phalaena rubricollis*. *Linn. Syst. Nat.* II. 840. 113. *Fn. Sv.* 1154.

*Phalaena*

*Phalaena feticornis*, spirilinguis, alis deflexis, nigricantibus, collari purpureo, abdomine flavo. *Geoff. Inf.* 2. 148. 79. tab. 12. fig. 6.  
*Clerk. Icon.* tab. 2. fig. 3.  
*Schaeff. Icon.* tab. 59. fig. 8. 9.  
*Habitat* in Europae sylvis.

*fuliginosa*. III. B. alis incumbentibus, rubro - fuliginosis: puncto gemino nigro, abdomine sanguineo: dorso nigro.  
*Phalaena fuliginosa* spirilinguis, laevis, alis deflexis, rufo - fuliginosis, puncto gemino nigro; inferioribus rubro marginatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 836. 95.  
*Fn. Sv.* 1159.  
*Phalaena minor* alis obscure rufis seu pullis duabus maculis nigris notatis. *Raj. Inf.* 228. 13.  
*Ammiral. Inf.* tab. 30.  
*Roef. Inf.* 1. phal. 2. tab. 43.  
*Wilks pap.* 23. tab. 3. a. 14.  
*Habitat* in rapa, sinapi, gramine.  
*Larva* pilosa, ferruginea, capite pedibusque anticis atris.  
*Puppa* folliculata, atra: postice flavo fasciata.

*cribrum*. II. B. alis incumbentibus: anticis albis, transverse nigro punctatis.  
*Phalaena cribrum*. *Linn. Syst. Nat.* II. 831. 76. *Fn. Sv.* 1136.  
*Habitat* in Europa boreali.  
*Anus* flavescens.

*Jacobae-*  
*ae*. III. B. alis incumbentibus, fuscis: linea punctisque duobus rubris, posticis rubris, nigro marginatis.  
*Phalaena Jacobaeae*. *Linn. Syst. Nat.* II. 839. III. *Fn. Sv.* 1155.  
*Geoff. Inf.* 2. 146. 75.  
*Phalaena media*, alis exterioribus colore nigro et sanguineo variis, extimo duntaxat margine nigro. *Raj. Inf.* 168. 26.  
*Rob. Icon.* 1. tab. 20.  
*Blank. Inf.* tab. 1. fig. G. K.  
*Petiv. Gazoph.* tab. 33. fig. 6.  
*Merian. Eur.* 3. tab. 28.  
*Alb. Inf.* tab. 34. fig. G. H.

- Goed.* *Inf.* 1. 56. tab. 9.  
*Reaum.* *Inf.* 1. tab. 16. fig. 4 — 7.  
*Roef.* *Inf.* 1. phal. 2. tab. 49.  
*Wilks pap.* 26. tab. 3. a. 1.  
*Harris Inf.* 8. tab. 4.  
*Ammiral.* tab. 3.  
*Edw. Av.* tab. 271.  
*Schaeff. elem.* tab. 98. fig. 3.  
 — — *Icon.* tab. 47. fig. 2. 3.

Habitat in Senecione Jacobaea.  
 Larva subpilosa, atra, flavo-annulata.  
 Eruca glabra, ex nigro et flavo annulatim variegata.  
*Raj. Inf.* 169. 26.  
 Puppa tenuissime folliculata, testacea.

#### 143. HEPIALVS. *Palpi* reflexi, pilosi.

*Linguae* rudimentum bifidum inter palpos.

*Antennae* moniliformes.

1. *H. alis flavis, fulvo-striatis; maris niveis.* *Humuli.*  
 Phalaena Humuli elinguis, fulva, antennis thorace brevioribus: maris alis niveis. *Linn. Syst. Nat.* II. 833. 84. *Fn. Sv.* 1147.
- Phalaena media, alis longis, in foemina flavis, cum lineis rubentibus, in mare albis.* *Raj. Inf.* 157. 3. *de Geer. Inf.* 1. tab. 7. fig. 5. 6.  
 Habitat in Lupuli radicibus Erysiphen caussans.  
 Ova innumera, minima, nigra.
2. *H. alis cinereis: striga albidiore.* *lupulinus.*  
 Phalaena lupulina elinguis, lutea, antennis thorace brevioribus, alis macula arcuque cinerascente. *Linn. Syst. Nat.* II. 833. 86. *Fn. Sv.* 1149.  
*Clerk. Icon.* tab. 9. fig. 4.  
 Habitat in Europa boreali.
3. *H. luteus, alis deflexis: anticis fasciis duabus albidis, obliquis, punctato interruptis.* *hectus.*  
 Phalaena hecta. *Linn. Syst. Nat.* II. 833. 85. *Fn. Sv.* 1148.  
*de Geer. Inf.* 1. tab. 7. fig. 11.

Habitat

Habitat in Europae sylvis.

Vespere in aere fluctuat motu pendulo, at solitarius.

*scalaris.* 4. H. niveus, strigis numerosis, abbreviatis, nigris, striaque longitudinali fulva.

Habitat in China. *Mus. Monson.*

Statura H. Aesculi, at longior. Caput fulvum. Thorax niveus, striga antica nigra lineaque dorsali lata, fulva. Alae anticae niveae, linea longitudinali fulva, a basi fere ad apicem alae dueta, quae strigis numerosissimis transversalibus, abbreviatis, atris secatur. Posticae albae, immaculatae.

*Aesculi.* 5. H. niveus, alis punctis numerosis, coeruleo-nigris, thorace senis.

Phalaena Aesculi clinguis, laevis, nivea, antennis thorace brevioribus, alis punctis numerosis coeruleo-nigris, thorace senis. *Linn. Syst. Nat.* II. 833. 83. *Fu. Sv.* 1150.

*Poda Inf.* 88. 16.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 38. fig. 1 — 4.

*Koenf. Inf.* 3. tab. 48. fig. 5. 6.

Habitat in pyro, aesculo.

Larva flava, nigro punctata, capite caudaque nigris.

*pyrinus.* 6. H. niveus, alis punctis numerosis transversalibus, nigris, thorace duodecim cyaneis.

Habitat in America boreali.

Statura et summa affinitas praecedentis. Caput niveum, fronte cyanea. Thorax laevis, niveus, punctis duodecim cyaneis, 2. 4. 4. 2. Alae anticae punctis numerosissimis per fascias dispositis, nigris. Costa exterior subferruginea. Femora antica superne cyanea.

144. NOCTVA. *Palpi* compressi, pilosi, apice cylindrici, nudi.

*Lingua* porrecta, cornea.

*Antennae* setaceae.

\* *Alis patulis.*

*Lunus.* 1. N. alis patulis, caudatis, undulatis: ocellis caudalibus subternis.

Phalaena

**Phalaena Lunus seticornis**, spirilinguis, alis caudatis, fusco luteoque undulatis: ocellis caudalibus subternis. *Linn. Syst. Nat. II. 810. 6. Mus. L. V. 371.*

*Clerk. Icon. tab. 52. fig. 2.*

Habitat in India.

2. N. alis patulis, concoloribus, albo nigroque reticulatis nebulosisque. *Strix.*

**Phalaena Strix.** *Linn. Syst. Nat. II. 833. 82. Mus.*

*L. V. 377.*

*Clerk. Icon. tab. 51. fig. 1.*

*Merian. Sur. 20. tab. 20.*

*Seb. Mus. 4. tab. 39. fig. 12. 14.*

— — tab. 57. fig. 7. 9.

Habitat in America meridionali.

Larva nigra, annulis lineaque lateralii virescentibus.

3. N. alis patulis, dentatis, fuscis, nigro - undulatis: anticis macula magna ocellari, nigra. *Bubo.*

Habitat in China. *Mus. Monson.*

Statura N. Strigis, at paulo minor. Palpi apice cylindrici, nudi. Corpus fuscum. Alae omnes dentatae, obscure fuscae, strigis nigris undulatae. Anticae in medio annulo magno nigro, fusco cincto, absque pupilla. Subtus fuscae, strigis duabus; altera e punctis, altera e lunulis albis.

4. N. alis patulis, dentatis, brunneis, nigro - undulatis maculisque tribus marginalibus fuscis. *Aluco.*

Habitat in China. *Mus. Monson.*

Praecedente paulo minor. Alae omnes dentatae, brunneae, strigis aliquot undatis nigris et maculis tribus distinctis fuscis ad marginem crassiorem. In medio alae anticae maculae duas oblongae, cinereae, nigro-irroratae, fere obsoletae; subtus fuscae, posticis albo nigroque undatis. Tibiae anticae albo annulatae.

5. N. alis patulis, dentatis, fuscis, nigro - undulatis: anticis ocello coerulescente. *Caprimulgus.*

Habitat in China. *Mus. Monson.*

Magnitudo praecedentis. Corpus fuscum, immacula-  
tuin. Alae omnes dentatae, obscure fuscae, strigis  
undatis

undatis, nigris. In medio alae anticae ocellus coeruleo-nigra, iride duplice nigra; subtus fuscae, arcu baseos nigro et striga apicis e punctis albis.

- Uhula.* 6. N. alis patulis, dentatis, nigro-undulatis: anticis fascia abbreviata alba maculaque subocellari.

Habitat in India. *Drury.*

Alae anticae dentatae, fuscae, nigro-undulatae. In media macula magna subocellaris, iride atra, linea flexuosa, coerulea pupillaque brunnea. Versus apicem fascia abbreviata, vel potius macula linearis transversa alba, margines haud attingens. Alae posticae dentatae, fusco nigroque undatae: subtus fuscae, anticis fascia interrupta, posticis macula alba.

- spiralis.* 7. N. alis patulis, griseo fuscoque undatis: anticis linea spirali convoluta, nigra.

Habitat in China. *Mus. Monson.*

Caput et thorax cinerascentia, immaculata. Alae patulae, integrae, fuscae, strigis undatis griseis obscurioribusque. In medio alae anticae linea magna spiralis, convoluta, nigra. Subtus rufescentes, puncto baseos, fasciis tribus lunulisque marginalibus fuscis. Abdomen supra griseum, cingulis fuscis, subtus rubrum, punctis lateralibus nigris.

- illibata.* 8. N. alis patulis, fuscis: macula apicis nigra.

Habitat in India. *Mus. Banks.*

Praecedentibus minor. Macula apicis ad marginem crassiorem.

\* \* *Thorace laevi, alis planis, incumbentibus.*

- scrobiculata.* 9. N. laevis, alis incumbentibus, subdentatis, griseis, scrobiculo baseos nigro: posticis vitta marginalia atra.

Habitat in India orientali. *Mus. Tottianum.*

Rustica major. Thorax laevis, immaculatus. Alae anticae planae, basi scrobiculo nigro notatae, apice obscuriores, margine albo punctato. Posticae strigis undatis, fuscis vittaque lata atra ad marginem exteriorem: subtus omnes griseae, striga puncto que anteriore fuscis.

10. *N. laevis*, alis incumbentibus, dentatis, griseis; posticis luteis: lunula limboque nigris. *Dioscoreae.*  
*Phalaena fullonica seticornis*, spirilinguis, alis flavis: inferioribus concoloribus, disco flavis, lunula limboque nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 812. 16.*  
*Clerk. Icon. tab. 48. fig. 1. 2. 3.*  
Habitat in Indiae orientalis *Dioscoreis*. *Koenig.*  
Alae anticae colore variant. Margo interior alarum late emarginatus.
11. *N. laevis*, alis incumbentibus: anticis flavis; linea *hybrida*. nivea, limbo pallidiore, fusco maculato.  
Habitat in India. *Koenig.* In nova Hollandia. *Banks.*  
Statura et summa affinitas praecedentis. Corpus cinereum, palpis porrectis, apice nigris. Oculi glauci, nigro punctati. Alae anticae disco glauco, linea recta nivea, limbus pallidior, maculis punctisque plurimis fuscis, margine tenuiore solo immaculato; subtus subferruginea, fasciis duabus fuscis. Posticae dentatae, fulvae, puncto medio magno orbiculato margineque postico albo maculato nigris.
12. *N. laevis*, alis incumbentibus, cintereis: posticis rufescensibus; macula atra. *microrrhoea.*  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
Caput et thorax cinerea, immaculata. Abdomen supra subsanguineum. Alae anticae obscure cinereae, arcu medio fusco. Posticae rufescentes, macula media atra. Margo posticus cinerascit.
13. *N. laevis*, alis incumbentibus, griseis, punctis strigisque quatuor undatis, fuscis: posticis apice nigris, albo maculatis. *serva.*  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
Corpus magnum, fuscum, subtus pallidius. Alae anticae griseae, striga in ipsa basi, secunda antice, tertia fere obsoleta in medio et quarta magis distincta magisque undulata pone medium. Loco stigmatum puncta quatuor nigra, unico anteriori solitario. Posticae albidae, apice nigrae, punctis tribus albis. Subtus omnes griseae, strigis duabus fuscis. Versus marginem posticum striga punctorum parvorum, nigrorum.

*Astrea.* 14. N. laevis, alis incumbentibus, concoloribus, fuscis: disco hyalino, thorace niveo, nigro punctato.

*Sphinx Astreus. Drury Inf. 2. tab. 28. fig. 4.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Antennae vix pectinatae, fuscae, primo articulo sanguineo. Palpi sanguinei, puncto medio apicisque nigro. Caput niveum, puncto frontali et verticali niveis. Thorax niveus, lobo antico punctis quatuor, dorso sex vel octo et postice quatuor in quadrato positis, nigris. Alae omnes concolores, fuscae, basi albae, punctis parvis nigris. Discus alae subhyalinus, lunula fusca. Abdomen supra sanguineum, subtus niveum, lateribus striis duabus punctorum nigrorum.

*Quercus.* 15. N. laevis, alis incumbentibus, griseis: strigis tribus fuscis.

Habitat in Europae quercu.

Magnitudo N. Brassicae. Alae obscure griseae, strigis tribus fuscis absque maculis ordinariis.

*4 punctata.* 16. N. laevis, alis incumbentibus, griseis, fusco-undatis: punctis quatuor marginis exterioris nigris.

Habitat in Anglia. *Mus. Monson.*

Alae griseae, strigis obsoletis undulatae. Stigmata ordinaria parva, obsoleta, posteriori albo punctata. Puncta quatuor nigra ad marginem crassiorem. Margo posticus obscurior. Posticae striga marginali punctata, fusca.

*pallens.* 17. N. laevis, alis incumbentibus, pallidis, immaculatis: marginibus posticis subtus nigro punctatis.

*Phalaena pallens. Linn. Syst. Nat. II. 838. 107. Fn. Sv. 1175.*

*Clerk. Icon. tab. 4. fig. 6.*

Habitat in Europa.

*complana.* 18. N. laevis, alis depresso-plumbeis: margine exteriori pallidis, posticis totis flavis.

*Phalaena complana. Linn. Syst. Nat. II. 840. 115. Fn. Sv. 1153.*

*Abb. Inf. tab. 70. fig. G. H.*

Habitat in Europae quercu.

Varietatem vidi alis anticis totis pallidis.

19. N. laevis, alis depressis, luteis: anticis punctis duobus cyaneis. *quadra.*

*Phalaena quadra.* *Linn. Syst. Nat.* II. 840. 114.

*Wilks pap.* 24. tab. 3. a. 17.

*Poda Inf.* tab. 2. fig. 8.

*Schaeff. Elem.* tab. 98. fig. 5.

*Roef. Inf.* I. *phal.* 2. tab. 17.

Habitat in pino, quercu.

Larva pilosa: dorso punctis rubris maculaque nigro, lateribus lineis nigris.

Puppa folliculata, atra.

20. N. laevis, alis incumbentibus, cinereis, thorace flavo. *deplana.*

*Phalaena deplana spirilinguis,* laevis, alis depressis; superioribus lividis, margine baseos nigris. *Linn. Mant.* I. 539.

Habitat in Europae hortis.

Praecedenti valde affinis. Pedes antici cyanei.

21. N. laevis, alis planis: anticis cinereis; strigis duabus flavis posticeque puncto fuscō. *narbœna.*

*Phalaena narbonea.* *Linn. Syst. Nat.* II. 837. 103.

Habitat in Europa australi.

Strigæ duæ lineares in medio alae. Ante marginem posticum punctum fuscum, annulo dimidiatō luteo cinctum.

\* \* \* *Thorace laevi. Alis deflexis.*

22. N. laevis, alis deflexis, cinereis: basi fulvo albo nigroque maculatis, antennis pectinatis, apice setaceis. *Ficus;*

Habitat in siccū racemosa Indiae orientalis. *Mus. Totianum.*

Palpi apice cylindrici, puncto medio apiceque nigris.

Antennæ pectinatae, apice setaceæ. Caput fulvum, immaculatum. Thorax laevis, fulvus, puncto utrinque atro. Alae rotundatae, integrae: anticae cinerascentes, albo striatae, basi inacula longa marginali fulva, in qua puncta sex nigra et tria alba, quorum maius maculam fulvam terminat. Ad marginem tenuiorem maculae duæ albae, quarum anterior major, puncto lunulaque nigris, posterior minor, puncto nigro. Posticæ flavæ, maculis aliquot

aliquot nigris: subtus flavescentes, nigro maculatae. Abdomen cinereum, vtrinque punctis duobus nigris.

*Caricae.* 23. N. laevis, alis deflexis, cinereis: striis punctoque medio albis, basi fulvis: punctis quinque atris.

Habitat in siccu Indiae orientalis. *Mus. Tottianum.*

- Praecedenti minor. Antennae nigrae, filiformes. Caput fulvum, puncto baseos apiceque nigris. Thorax fulvus, punctis nigris tribus. Alae rotundatae, cinereae, striis plurimis ramosis et puncto medio distincto albis. Basis alarum fulva, punctis quinque approximatis, nigris. Posticae flavae, nigro maculatae.

*coronata.* 24. N. laevis, alis deflexis, fuscis: strigis tribus obscurioribus stigmateque postico nigro-punctato.

Habitat in China.

Caput et thorax fusca, immaculata. Alae anticae fuscae strigis tribus, quae e lineola obscuriore et pallidiore connatis consistunt. In medio alae maculae duae ordinariae, quarum anterior parva, rotundata, posterior major, reniformis, punctis septem nigris. Posticae flavae, fasciis duabus nigris; subtus omnes obscure flavescentes. Abdomen flavum, cingulis nigris. Pedes antici hirsutissimi.

*leonina.* 25. N. laevis, alis deflexis, brunneis: stigmatibus griseis, posticis flavis: maculis duabus nigris, abdome cingulis nigris.

Habitat in India. *Mus. Banks.*

Antennae subpectinatae. Caput et thorax brunnea, immaculata. Abdomen flavum, cingulis dorsalibus nigris. Alae integrae, brunneae, strigis quatuor obscurioribus, quarum tertia albo punctata, quarta strigae albae connata. Posticae flavae, maculis duabus magnis nigris; subtus omnes flavescentes. Pedes flavi, hirsutissimi.

*Dama.* 26. N. laevis, alis deflexis, fuscis, albo striatis: posticis albis; margine nigro.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Antennae pectinatae, nigrae. Caput fulvum, palpis linea apiceque nigris. Thorax fulvus, punctis anticus

ticis duobus dorsalibusque quatuor nigris. Abdomen fulvum, nigro maculatum. Alae anticae integrae, fuscae, striis albis, quarum media major in medio dilatata maculam format: subtus fuscae, macula media alba. Posticae supra albae, margine postico nigro, subtus albae: limbo toto nigro.

27. N. laevis, alis deflexis, variegatis: posticis atris, *marginalia*.  
margine albo.

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Corpus medium, griseum, abdomine supra atro. Alae anticae deflexae, griseae, ferrugineo-variae, strigis duabus undatis, nigris: subtus nigrae, fasciis duabus albis, anteriore abbreviata. Posticae concolores, atrae, margine postico albo.

28. N. laevis, alis deflexis: anticis fuscis; maculis quinque incarnatis, posticis albidis. *Batis.*

*Phalaena Batis. Linn. Syst. Nat. II. 836. 97. Fn. Sv. 1158.*

*Merian. Europ. 3. tab. 21. fig. 1.*

*Reaum. Ins. 1. tab. 7. fig. 2.*

*Roef. Ins. 4. tab. 26.*

Habitat in rubo.

Larva nuda, ferruginea: antice posticeque gibba.

Puppa postice attenuata, fusca.

29. N. laevis, alis deflexis, concoloribus, fulvis: *Fulvia.* *margine nigro.*

*Phalaena Fulvia. Linn. Syst. Nat. II. 836. 96. Mus. Lud. Utr. 383.*

*Clerk. Icon. tab. 55. fig. 6.*

Habitat in Indiis.

Abdomen nigrum, subtus flavum.

30. N. laevis, alis deflexis, griseis: macula magna marginali flava, posticis flavis, apice fuscis. *sagitta.*

Habitat in India. *Koenig.*

Palpi porrecti. Antennae setaceae. Caput griseum, fronte acuminata. Thorax griseus. Abdomen flavum. Alae anticae griseae, macula magna atra in medio marginis crassioris. Posticae luteae, margine postico fusco. Subtus anticae fuscae, posticae luteae, margine fusco.

*glyphica*. 31. N. alis deflexis, cinereo fuscoque variegatis: subtus luteis, fusco - fasciatis.

Phalaena *glyphica* spirilinguis, laevis, alis patulis, fuscouscentibus: maculis hieroglyphicis, nigris; subtus fascia atra. *Linn. Syst. Nat.* II. 838. 105. *Fn. Sv.* 1161.

Phalaena *seticornis*, spirilinguis, alis patentibus, supra fuscis, pone subtus flavescentibus. *Geoff. Ins.* 2. 136. 55.

*Hoeffnag. piæt.* 4. tab. II. fig. 3.

*Reaum. Ins.* I. tab. 49. fig. 14.

Habitat in verbasci.

*dipsacea*. 32. N. alis deflexis, pallidis: fascia lata fusca, posticis nigro albo variis.

Phalaena *dipsacea*. *Linn. Syst. Nat.* II. 856. 185.  
*Merian. Europ.* 2. tab. 49.

Habitat in Sueciae agris fecaliniis.

*Mi.* 33. N. laevis, alis deflexis, fusco cinereoque variegatis: subtus w nigro.

Phalaena *Mi* spirilinguis, laevis, alis deflexis, cinereis, signo securis pallido - marginato, subtus W nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 838. 106. *Fn. Sv.* 1262.

Habitat in Europa.

Affinis praecedenti.

*vulpina*. 34. N. laevis, alis deflexis: anticis obscure cinereis, immaculatis, posticis apice nigris, albo maculatis.

Habitat in India orientali. *Muf. Tottianum*.

*Rustica major*. Caput, thorax et alae anticae obscure cinereae, immaculatae, posticae basi cinereae, apice nigrae, macula ad angulum ani duabusque marginalibus albis.

*destituta*. 35. N. laevis, alis incumbentibus, griseis, fusco maculatis: striga alba fuscae innata, submarginali.

Habitat in China. *Muf. Monson*.

Magnitudo N. *Dioscoreae*, obscure grisea, maculis minoribus irregularibus, fuscis. Striga albicans, fusco marginata, fere marginalis. Fascia obsoleta, fusca, a medio marginis tenuioris ad apicem alae ducta. Posticae concolores, at magis undulatae. Subtus griseac,

griseae, strigis duabus fuscis, anteriori undata, posteriori maculari. Feinora et tibiae hirsutissima.

36. N. laevis, alis deflexis: anticis variegatis, posticis *tigrina*: nigris: fascia maculisque tribus marginalibus albis.

Habitat in India orientali. *Mus. Tottianum.*

Rustica major. Caput et thorax cinerea, immaculata.

Alae anticae cinereac, basi obscuriores, qui color striga fusca terminatur; in medio immaculatae, apice fusco, cinereo rufoque variegatae, punctis tribus costalibus albis, distinctis: subtus nigrae, fascia alba margineque cinereo. Posticae nigrae, fascia media maculisque tribus ad marginem posticum albis. Subtus griseae, fusco-undatae.

37. N. laevis, alis deflexis, fuscis: macula magna atra; *geometrica*: fasciis duabus, anteriore nivea.

Habitat in India orientali. *Mus. Tottianum.*

Rustica media corpore fusco. Alae pallide fuscae, in medio macula magna quadrata, atra, quae marginem exteriorem haud attingit. In hac macula fascia lata nivea in medio et alia marginalis brunnea, quae antice striga alba terminatur. Posticae, uti omnes, subtus nigrae, fascia margineque albis.

38. N. laevis, alis deflexis, fuscis: fasciis duabus niveis; *folidia*: posteriore unidentata.

Habitat in India orientali. *Mus. Tottianum.*

Statura praecedentis. Thorax et abdomen cinerea.

Alae obscure fuscae, fasciis duabus albis, quarum posterior antice dentem emittit. Posticae fuscae, fascia punctoque anali albis.

39. N. laevis, alis deflexis corporeque albis, antennis *nivea*. linguaque testaceis. *Linn. Syst. Nat. II. 838. 208.*

Habitat in Norwegia.

Tota nivea, solis antennis linguaque testaceis.

40. N. laevis, alis deflexis, fuscis: strigis tribus coerulecentibus, brunneae adnatis. *inclita*.

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

Parva. Corpus fuscum, antennis simplicibus. Alae deflexae, fuscae: anticae punto coeruleo, nitido ad marginem crassiorem baseos, tunc strigae tres

coerulecentes, quarum anterior postice, posteriores duae antice strigae brunneae adnatae. Posticae fuscae, macula coerulecente ad angulum ani. Subtus fuscae, immaculatae,

- trapezina.* 41. N. laevis, alis deflexis, albidis; fascia latissima saturatio; puncto nigro margineque punctato.

Phalaena trapezina. *Linn. Syst. Nat.* II. 836. 99. *Fn. Sv.* 1157.

*Merian. Europ.* tab. II.

Habitat in Europa.

- Cerasi.* 42. N. laevis, alis deflexis; griseo-ferrugineis: maculis strigaque postica flavescentibus; margine nigro punctato.

*Roeß. Ins. 1. phal. 2. tab. 53.*

Habitat in ceraso Angliae, Germaniae.

Alae posticae cinereae, nitidae, subtus puncto magno centrali, fuscō.

Larva flavescentis, striis tribus sulphureis, capite coeruleo.

Pupa nuda, brunnea: postice bidentata.

- undata.* 43. N. laevis, alis deflexis, griseis: strigis undatis, fuscis, posticis cinereis: fascia marginali nigra.

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Rustica media. Antennae subferrugineae. Caput et thorax subvirescentia. Alae anticae griseae, supra maculis ordinariis strigisque aliquot undatis, tere obsoletis, fuscis: subtus maculis duabus fasciaque postica nigris, quae tamen marginem tenuiorem haud attingit. Posticae cinereae, utrinque fascia marginali nigricante.

- vittata.* 44. N. laevis, alis dentatis, deflexis, cinereis: strigis fuscis, posticis flavescentibus: vitta marginali atra.

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Rustica media. Antennae rufescentes, longitudine corporis. Alae cinereae, strigis undatis, fuscis, ad basin annulus fuscus et in medio macula reniformis. Posticae flavescentes, apice strigis tribus fuscis vittaque magna atra ad marginem exteriorem. Margo tamen ipse flavescit.

45. N. laevis, alis deflexis, cinereis: fascia obliqua stri- *frugalis.*  
gaque punctorum nigrorum.  
Habitat in India. *Koenig.*  
Rustica media, cinerea. Alae anticae puncto centrali  
parvo, fusco. Fascia obsoleta, fusca, obliqua, a me-  
dio marginis tenuioris ad apicem alae ducta. Pone  
fasciam hanc striga transversa punctorum nigrorum.
46. N. laevis, alis deflexis, flavis: strigis undatis, fer- *flava.*  
rugineis.  
Habitat in India orientali. *Koenig.*  
Parva in hoc genere. Tota flavescens, alis anticas  
strigis pluriimis undatis ferrugineis; posticis palli-  
dioribus, immaculatis.
47. N. laevis, alis deflexis, angulatis, flavis: strigis *stigmati-*  
obscurioribus stigmataque niveo. *zans.*  
Habitat in India. *Mus. Tottianum.*  
Parva. Antennae cinereae. Caput et thorax flava. Alae  
anticae margine postico angulatae, flavae, strigis  
tribus fuscis, undatis. Loco stigmatum punctum  
niveum. Posticae cinereae; subtus omnes obscurae,  
striga undata, fusca.
48. N. laevis, alis deflexis, fuscis: fascia lata viridi. *equestris.*  
Habitat in India. *Koenig.*  
Parva. Caput et thorax virescentia, antennis fuscis.  
Alae anticae fuscae, in medio fascia lata viridi: po-  
sticae pallescentes, immaculatae. Pedes fusi.
49. N. laevis, alis deflexis, albis: macula postica vi- *rejecta.*  
rescente.  
Habitat in India. *Koenig.*  
Parva. Alae albae, anticas macula magna lunari virescen-  
te versus marginem posticum. Posticae immaculatae.
50. N. laevis, alis deflexis: anticas fusco-nebulosis; li- *litura.*  
tura maculaque cinereis, posticis niveis.  
Habitat in India orientali. *Koenig.*  
Media: statura N. Atriplicis. Thorax cinereus, antice  
fuscus. Alae anticae nebulosae, litura magna in  
medio et macula sub litura cinereis. Fascia pallide  
coerulescens pone lituram. Margo posticus cinereo-  
striatus. Alae posticae niveae, immaculatae.

\* \* \* \* *Thorace cristato: alis incumbentibus.*

- sponsa.* 51. N. cristata, alis planis, cinerascentibus, fusco-undulatis: posticis rubris, fasciis duabus nigris, abdomine undique cinereo.

*Phalaena sponsa.* *Linn. Syst. Nat.* II. 841. 118.

*Phalaena seticornis,* spirilinguis, alis deflexis, anticis cinereo fuscoque nebulosis; inferioribus rubris, fascia dupli transversa, nigra. *Geoff. Inf.* 2. 150. 82. *Merian. Eur.* 2. tab. 14.

*Reaum. Inf.* 1. tab. 32. fig. 1—7.

*Roeß. Inf.* 4. tab. 19.

Habitat in quercu.

Larva nodosa, dorso verrucoso, capite coerulecente, corpore variegato.

Puppa folliculata, coerulescens.

- nupta.* 52. N. cristata, alis planis, cinerascentibus: posticis rubris; fasciis nigris, abdomine cano: subtus albo.

*Phalaena nupta.* *Linn. Syst. Nat.* II. 841. 119.

*Raj. Inf.* 152. 4.

*Wilks pap.* 33. tab. I. a. I.

*Uddm. Diff.* 73. tab. 10.

*Roeß. Inf.* 4. tab. 15.

Habitat in salice vitellina Europae.

- pacta.* 53. N. cristata, alis grisecentibus: posticis rubris; fasciis duabus nigris, abdomine supra rubro.

*Phalaena pacta.* *Linn. Syst. Nat.* II. 841. 120. *Fn. Sv.* 1166.

*Merian. Inf.* 3. tab. 38. fig. 139.

*Wilks pap.* 17. tab. 2. b. I.

*Roeß. Inf.* 1. phal. 2. tab. 15.

*Sepp. Inf.* 4. p. 33. tab. 7.

Habitat in salice, quercu.

Praecedentibus nimis affinis.

- Fraxini.* 54. N. cristata, alis dentatis, cinereo-nebulosis: posticis supra nigris; fascia coerulecente.

*Phalaena Fraxini.* *Linn. Syst. Nat.* II. 843. 125. *Fn. Sv.* 1165.

*Phalaena seticornis,* spirilinguis, alis deflexis, superioribus cinereo fuscoque undulatis, inferioribus nigris, fascia transversa coerulea. *Geoff. Inf.* 2. 151. 83.

*Roeß. Inf.* 4. tab. 28. fig. 1.

*Merian.*

*Merian. Europ.* tab. 46.

*Ammiral. Inf.* tab. 25.

*Wilks pap.* 45. tab. 1. a. 2.

Habitat in fraxino, populo.

55. N. cristata, alis incumbentibus: posticis rubris; fascia **pronuba**.  
atra submarginali.

Phalaena pronuba. *Linn. Syst. N.* II. 842. 121. *Fn. Sc.* II 67.

*Geoff. Inf.* 2. 146. 76.

*Raj. Inf.* 237. 18.

*Goed. Inf.* 1. tab. 14.

*Blank. Inf.* tab. 6. fig. D. F.

*Merian. Eur.* tab. 49.

*Alb. Inf.* tab. 72. fig. C. D.

*Frisch. Inf.* 10. tab. 15. fig. 4.

*Roef. Inf.* 4. tab. 32.

*Reaum. Inf.* 1. tab. 41. fig. 4.

— — 2. tab. 14. fig. 89.

*Ammiral.* tab. 8.

*Wilks pap.* 1. tab. 1. a. 1.

Habitat in cheirantho, thlaspi, senecione.

Larva virescens, lineis dorsalibus duabus nigris, in-  
terruptis.

Puppa nuda, rubra.

Imago alaruin anticarum colore valde variat.

56. N. cristata, alis planis: anticis fuscis, strigis angula-  
tis, albis nigrisque, posticis flavis: fasciis duabus **Paranym-  
pha**.  
arcuatis, atris.

Phalaena Paranympha alis deflexis, cano fuliginosoque  
undulatis, inferioribus luteis: fasciis duabus arcua-  
tis, atris. *Linn. Syst. Nat.* II. 842. 122.

Phalaena fulminea. *Scopoli Inf.* 510.

*Roef. Inf.* 4. tab. 18. fig. 1. 2.

Habitat in Germaniae pruno.

57. N. cristata, alis planis, griseo - fasciatis: posticis he-  
tuolis: macula lineari atra.

Phalaena fimbria. *Linn. Syst. Nat.* II. 842. 123.

*Schreber. Inf.* fig. 9.

Habitat in Germaniae nemoribus.

- Angur.* 58. *N. cristata*, alis planis, fuscis: characteribus atris.  
Habitat in Germania. *de Hattorf.*  
Statura praecedentis. Caput et thorax fusca, immaculata, collari erecto, cristato. Alae anticae fuscae, characteribus variis strigaque postica ex arcubus atris: posticae fuscae, immaculatae. Subtus omnes griseae, posticis puncto centrali strigaque postica fuscis.
- mercator- ria.* 59. *N. cristata*, alis incumbentibus, ferrugineis: strigis fuscis, undatis, posticis apice nigris, albo maculatis.  
Habitat in India orientali. *Koenig.*  
Magnitudo *N. pronubae*. Alae anticae ferrugineae, maculis ordinariis strigisque aliquot undatis, pone maculas fuscis. Margo posticus tenuissime albicat. Subtus cinerascentes, macula media fasciaque postica fuscis. Posticae cinereae, apice nigrae, lineola transversa maculisque marginalibus duabus albis; subtus cinerascentes, strigis undatis obscurioribus.
- partita.* 60. *N. cristata*, alis incumbentibus, subdentatis, griseis: macula baseos atra, stigmatibus duobus brunneis strigaque media alba.  
Habitat in India. *Koenig.*  
Antennae brunneae. Caput et thorax cinerea. Alae griseae, anticis basi macula circulari atra vel potius maculis tribus lineola parva connexis. In medio alae stigmata duo approximata, brunnea, altero minore, dein striga cinerea, quae tamen marginem exteriorem haud attingit. Macula nigra ad marginem exteriorem, apice alae obscuriore, margine ipso repando rufescente. Posticae cinereae, apice fuscae; subtus omnes cinereae.
- maura.* 61. *N. cristata*, alis incumbentibus, dentatis, cinereo nigroque variis: subtus margine albo.  
Phalaena maura spirilinguis, cristata, alis depresso-fasciis duabus nigris; inferioribus nigris, fascia alba. *Linn. Syst. Nat. II. 843. 124.*  
*Schaeff. Icon. tab. I. fig. 5. 6.*  
Habitat in Germania, in Anglia frequens.
- libatrix.* 62. *N. cristata*, alis incumbentibus, dentato-erosis, rufo-griseis: punctis duabus albis.  
Phalaena Libatrix. *Linn. Syst. N. II. 831. 78. Fn. Sv. II 43.*  
Phalaec-

*Phalaena pectinicornis*, elinguis, alis cinereo flavoque rufis, margine laceris. *Geoff. Inf.* 2. 121. 26.

*Phalaena media*, domestica, alis exterioribus rubro, rufo, cinereo et albicante colore variis, cum transversa linea albicante, imo margine laciniato. *Raj. Inf.* 183. 2.

*Phalaena salictaria*. *Pod. Inf.* 92. tab. 2. fig. 9.

*Goed. Inf.* 1. tab. 67.

*Petiv. Gazoph.* tab. 19. fig. 4.

*Alb. Inf.* tab. 32. fig. 50.

*Roef. Inf.* 4. tab. 20.

Habitat in glechomate, rosa, salice.

Larva nuda, viridis, flavo-aunulata: lineis tribus fuscis stigmatibusque rubris.

Puppa folliculata, nigra.

63. N. alis incumbentibus, fuscis: margine crassiori albo. *plecta.*

*Phalaena plecta spirilinguis*, subcristata, alis brunneis, linea nigra margineque crassiori albido. *Linn. Syst. Nat.* II. 851. 157. *Fn. Sv.* 1216.

*Kleemann. Inf.* 1. tab. 23.

Habitat in Europa.

Larva viridis: capite brunneo.

Puppa folliculata, atra.

64. N. cristata, alis planis, fusco cinereoque nebulosis: *polymita*.  
angulo ani macula atra.

*Phalaena polymita spirilinguis*, cristata, alis cinereis, fasciatis, macula atra minima marginis tenuioris. *Linn. Syst. Nat.* II. 855. 180. *Fn. Sv.* 1217.

Habitat in Europa.

Thorax cinereus, arcubus duobus anticis nigris maculisque tribus posticis albidis.

65. N. cristata, alis incumbentibus, fuscis: lineola atra maculaque cordata, posticis albis. *exclamationis.*

*Phalaena exclamationis*. *Linn. Syst. Nat.* II. 850. 155.  
*Fn. Sv.* 1190.

*Clerk. Icon.* tab. 1. fig. 4.

Habitat in Europae hortis.

66. N.

*I album.* 66. N. cristata, grisea, alis incumbentibus: anticis I  
albo notatis.

Phalaena I album. *Linn. Syst. Nat.* II. 850. 154.  
Habitat in Europa australi.

Litera I. alba longitudinalis in medio alae.

*citrago.* 67. N. cristata, alis incumbentibus, luteis, ferrugineo-  
subfasciatis.

Phalaena citrago spirilinguis, cristata, alis depresso-  
luteis: superioribus fasciis tribus ferrugineis, obli-  
quis. *Linn. Syst. Nat.* II. 857. 189. *Fn. Sv.* 1174.

*Alb. Inf.* tab. 33.

*Wilks Inf.* 5. tab. I. a. 8.

Habitat in pado, salice.

Larva nuda, fusca: lateribus flavis.

*pagana.* 68. N. cristata, alis incumbentibus, griseo-fuscis: pun-  
ctis marginalibus fuscis quinque, albis tribus, posti-  
cis albis, fascia nigra.

Habitat in India. *Koenig.*

Rustica media. Caput et thorax grisea. Alae obscure  
griseae, punctis quinque fuscis et tribus albis ad  
marginem crassiores. Posticeae, uti omnes, subtus  
albae, fascia lata marginali nigra.

\*\*\*\*\* *Thorace cristato: alis deflexis.*

*Chrysitis.* 69. N. cristata, alis deflexis, orichalceis, margine fascia-  
que griseis.

Phalaena Chrysitis. *Linn. Syst. Nat.* II. 843. 126. *Fn.*  
*Sv.* 169.

Phalaena seticornis, spirilinguis, aliis deflexis, ferru-  
gineo-fuscis, fascia duplice transversa, viridi-aurea.  
*Geoff. Inf.* 2. 149. 97.

Phalaena media, aliis exterioribus duplice arcu trans-  
verso, viridi-aurato, serici instar splendente, in-  
signibus. *Raj. Inf.* 182. 45.

*Sepp. Inf.* 5. p. 4. tab. I. fig. 7—12.

*Merian. Eur.* I. tab. 39.

*Roel. Inf.* I. phal. 2. tab. 31.

*Alb. Inf.* tab. 71.

Habitat in carduis, urtica, mentha.

Larva solitaria, gibbosa, viridis, albo-striata.

Eruca

**Eruca Geometra majuscula**, coloribus coeruleo-viridi et albicante varia. *Raj. Inf.* 183.

Puppa fusca.

70. N. cristata, alis deflexis, fuscis: macula magna luna- *orichal-*  
ta, orichalcea.

Habitat in India. *Koenig.*

Statura praecedentis. Alae fuscae, anticis macula lu-  
nari orichalcea, nitida, posticis immaculatis.

71. N. cristata, alis deflexis: anticis flavo fuscoque va- *Festucae.*  
riis: maculis tribus argenteis.

Phalaena Festucae. *Linn. Syst. N.* II. 845. 131. *Fn. Sv.* 1170.

*Alb. Inf.* tab. 84. fig. G. H.

*Petiv. Gazoph.* tab. 7. fig. 7.

*Wilks pap.* 8. tab. 1. a. 17.

*Act. Holm.* 1748. tab. 6. fig. 3. 4.

Habitat in absinthio, festuca fluitante.

Larva nuda, viridis.

72. N. cristata, alis deflexis: anticis fuscis & aureo *Gamma.*  
inscriptis.

Phalaena Gamma. *Linn. Syst. Nat.* II. 843. 127. *Fn. Sv.*

1171. *Geoff. Inf.* 2. 156. 92. *Raj. Inf.* 163. 16.

*Sepp. Inf.* 5. p. 1. tab. 1—6.

*Goed. Inf.* 2. tab. 21.

*Blanks Inf.* tab. 8. fig. N. P.

*Petiv. Gazoph.* 64. fig. 6.

*Merian. Eur.* 82. fig. 78.

*Alb. Inf.* tab. 79. fig. G. H.

*Frisch. Inf.* 5. tab. 15.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 26. fig. 5.

*Wilks pap.* 34. tab. 2. a. 1.

*Schaeff. Icon.* tab. 84. fig. 5.

Habitat in leguminibus, oleribus, polyphaga.

Larva geomitra, dodecapoda, viridis: striis dorsalibus  
albis, laterali flava, capite fuso.

Puppa folliculata, brunnea.

73. N. cristata, alis deflexis: anticis fusco cinereoque *Interroga-*  
variis; signo? albo inscriptis. *tionis.*

Phalaena Interrogationis. *Linn. Syst. Nat.* II. 884. 129.

*Fn. Sv.* 1172. *Clerk. Icon.* tab. 6. fig. 7.

Habitat in Europa.

- signata.* 74. N. cristata, alis deflexis, obscuris, basi nigro punctatis, signo medio? aureo inscriptis.  
 Habitat in India. *Koenig.*  
 Statura omnino praecedentis, at minor. Alae anticae griseae, basi punctis tribus nigris, in medio signum? aureum, vivacissimum. Apex alae erectus. Abdomen fasciculis duabus erectis, posteriore minore.
- Peponis.* 75. N. cristata, alis deflexis, griseis: macula apicis dorsalique brunneo-aurea.  
 Habitat in peponibus Indiae orientalis. *Koenig.*  
 Statura praecedentium. Alae griseae, macula magna apicis et alia ad marginem tenuiorem brunneis, auro certo situ nitentibus.
- Jota.* 76. N. cristata, alis deflexis: anticis ferrugineo-griseis, i resupinato aureo inscriptis.  
*Phalaena Jota.* *Linn. Syst. Nat.* II. 844. 130.  
 Habitat in urtica, lamio albo.  
 Larva dodecapoda, nuda, viridis, albo maculata.
- pauperata.* 77. N. cristata, alis deflexis, fuscis, cinereo variegatis: posticis albo-hyalinis.  
 Habitat in China. *Mus. Monson.*  
 Magnitudo N. Chrysitis. Thorax fuscus, strigis cinereis. Alae fusco cinereoque variegatae, ante apicem fuscescentes, striis aliquot brevissimis, nigris. Margo tamen ipse cinereo fuscoque varius. Posticae hyalino-albae, striga marginis alba.
- meticulo-sa.* 78. N. cristata, alis deflexis, eroso-dentatis, pallidis: anticis basi incarnata; triangulo fuscō.  
*Phalaena meticulosa.* *Linn. Syst. Nat.* II. 845. 132.  
*Fn. Sv.* 1164.  
*Phalaena seticornis*, spirilinguis, alis deflexis, margine erosis, cinereo-fuscis, superioribus triangulo marginali fuscescente, incarnatum includente, thorace gibbo. *Geoff. Inf.* 2. 151. 84.  
*Goed. Inf.* 1. tab. 56.  
*Merian. Europ.* tab. 24.  
*Reaum. Inf.* 1. tab. 8. fig. 25. 26.  
 — — — tab. 14. fig. 12. 13.  
*Alb. Inf.* tab. 13.  
*Roef. Inf.* 4. tab. 9.

*de Geer Inf.* 1. tab. 5. fig. 14.

*Wilks pap.* 3. tab. 1. a. 3.

Habitat in cheirantho, mercuriali, urtica.

Larva nuda, viridis: linea dorsali interrupta lateraliter busque albis.

Puppa folliculata, fusca, postice rubra.

79. N. cristata, alis deflexis, fuso ferrugineoque variegatis, dorso emarginatis, fronte fulva. *lacera.*

Habitat in China. *Mus. Monson.*

Frons fulva. Thorax cinereus, antice fulvus. Abdomen cinereum. Alae anticae fusco ferrugineoque variae, ad angulum ani macula flava lunula nigra. In margine tenuiore alae emarginatura lata. Posticæ, uti omnes, subtus cinereae.

80. N. cristata, alis deflexis: anticis supra decorticatis. *derasa.*

Phalaena derasa. *Linn. Syst. Nat.* II. 851. 158.

Habitat in Europa, Anglia.

81. N. cristata, alis deflexis, dentatis, brunneis: anticis puncto flavo inter punctula duo alba. *satellitia.*

Phalaena satellitia. *Linn. Syst. Nat.* II. 855. 176.

*Roef. Inf.* 3. tab. 50.

Habitat in Grossularia.

Larva nigra: linea laterali alba.

Puppa brunnea, postice obtuse tridentata.

82. N. cristata, alis deflexis, ferrugineis: maculis tribus costalibus albis, postice punctis nigris duobus. *diffinis.*

Phalaena diffinis. *Linn. Syst. Nat.* II. 848. 146.

Habitat in Europa, Anglia.

83. N. cristata, alis deflexis, ferrugineis: angulo inferiore puncto nigro gemino, posticis nigris. *affinis.*

Phalaena affinis. *Linn. Syst. Nat.* II. 848. 144.

Habitat in Europa.

Alae posticae nigrae, margine testaceo.

84. N. cristata, alis deflexis: maculis tribus longitudinalibus rotundatis atomisque sulphureis adspersis. *triptera.*

Phalaena triptera. *Linn. Syst. Nat.* II. 848. 145.

Habitat in Europa.

Alae posticae albae, immaculatae.

- margina-* 85. *N. cristata*, alis deflexis, flavescentibus: strigis fer-  
ruginis, postice fuscis.  
ta. Habitat in Europa.  
Media. Caput et thorax flavescentia. Alae flavae, strigis tribus undatis maculisque ordinariis ferruginis.  
Margo posticus late fuscus, striga unica undata  
obscure.
- Absinthii.* 86. *N. cristata*, alis deflexis, canis: fasciis punctisque  
in tetragonum positis, nigris.  
Phalaena absinthii spirilinguis, cristata, alis cinerascen-  
tibus, nigrante fasciatis punctatisque, inferioribus  
albidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 845. 133. *Fn. Sv.* 1182.  
*Clerk. Icon.* tab. 8. fig. 19.  
Phalaena seticornis, spirilinguis, alis deflexis, albo-  
cinereis, lineis longis nigris. *Geoff. Inf.* 2. 158. 95.  
*Frisch. Inf.* 7. p. 19. tab. 12.  
*Roef. Inf.* 1. *phal.* 2. tab. 61.  
Habitat in absinthio.  
Larva viridis, maculis flavis rufisque lineata.  
Puppa folliculata, brunnea, antice viridis.
- Delphinii.* 87. *N. cristata*, alis deflexis, purpurascens: fasciis  
duabus flavis, posticis obscuris.  
Phalaena Delphinii. *Linn. Syst. Nat.* II. 857. 188.  
Phalaena seticornis, spirilinguis, alis deflexis, roseis,  
superioribus fascia dupli limboque albidis. *Geoff.*  
*Inf.* 2. 164. 109.  
*Merian. Europ.* I. tab. 40.  
*Wilks pap.* 3. tab. 1. a. 4.  
*Roef. Inf.* 1. *phal.* 2. tab. 12.  
Habitat in Delphinio.  
Larva laevis, nuda, flavescens, nigro punctata lineis-  
que duabus flavicantibus.  
Puppa brunnea.
- Pisi.* 88. *N. cristata*, alis deflexis, ferrugineis, bimaculatis:  
striga postica undata, pallida.  
Phalaena Pisi. *Linn. Syst. Nat.* II. 854. 172. *Fn. Sv.* 1206.  
*Raj. Inf.* 160. 10.  
*Wilks pap.* 4. tab. 1. a. 7.  
*Roef. Inf.* 1. *phal.* 2. tab. 52.  
Habitat in piso, genista.

Larva

Larva nuda, ferruginea: lineis quatuor flavis, capite incarnato.

Puppa fusca, incisuris sanguineis.

89. N. cristata, alis deflexis, pallide incarnatis: macula *mendica*, media fusca: stigmatibus flavis.

Habitat in Germania. *v. Hattorff.*

Thorax fuscus, margine antico albicante. Alae anticae subincarnatae, strigis plurimis undatis, fuscis. In medio alae macula magna fusca, et in hac stigmata ordinaria flavissima, anteriore orbiculato, posteriore reniformi, subtus flavescentes striga fusca.

90. N. cristata, alis deflexis, bimaculatis: margine tenuiore coerulescente. *Oxyacanthae.*

Phalaena Oxyacanthae. *Linn. Syst. Nat. II. 852. 165.*

*Fn. Sv. 1207.*

*Alb. Inf. tab. 14.*

*Wilks pap. 12. tab. 1. c. 1.*

*Roef. Inf. 1. phal. 2. tab. 33.*

Habitat in oxyacantha, atriplice, pruno spinosa.

Larva nuda, albo nigroque varia, cauda gibba.

Puppa folliculata, flava.

91. N. cristata, alis deflexis: anticis fusco-nebulosis, litura media flava, bifida. *Atriplicis.*

Phalaena Atriplicis. *Linn. Syst. Nat. II. 854. 173. Fn. Sv. 1196.*

Phalaena seticornis, spirilinguis, alis deflexis, nebulosis, fascia vna alterave aurea. *Geoff. Inf. 2. 159. 97.*

*Wilks pap. 3. tab. 1. a. 2.*

*Roef. Inf. 1. phal. 2. tab. 31.*

Habitat in atriplice, rumice.

Larva nuda, rufescens, albo punctata lineaque dorsali fusca.

Puppa brunnea.

92. N. cristata, alis deflexis, basi cinereis: macula magna sinuata, nigra. *sinuata.*

Habitat in India. *Muf. Tortianum.*

Parva. Thorax antice brunneus, postice cinereus. Alae anticae basi cinereae, macula magna sinuata ad marginem interiorem, apice fuscae, margine dilutiore

striga punctorum nigrorum. Posticae obscurae. Subtus omnes cinereac, striga undata, fusca.

*bistrioni*. 93. N. cristata, alis deflexis, variegatis; posticis albiscata. striga marginali nigra.

Habitat in India. *Koenig.*

Rustica media. Alae anticae fusco cinereoque variegatae, postice striatae. Posticae niveae, striga tenuissima nigra ad marginem posticum.

*praecox*. 94. N. cristata, alis deflexis, cinereis, bimaculatis: postice fascia rufa, abbreviata.

*Phalaena praecox*. *Linn. Syst. Nat.* II. 854. 174.

*Roef. Inf.* 1. phal. 2. tab. 51.

Habitat in Soncho oleraceo.

Larva nuda, grisea: linea dorsali alba.

Puppa brunnea.

*pyramidea*. 95. N. cristata, alis fuscis: strigis tribus undatis, flavescenscentibus, repandis: posticis ferrugineis.

*Phalaena pyramidea spirilinguis*, cristata, alis cinescentibus, superioribus strigis tribus undatis, flavescenscentibus, repandis maculaque fusca. *Linn. Syst. Nat.* II. 856. 181.

*Phalaena seticornis*, spirilinguis, alis deflexis, superioribus fuscis, lineis transversis undulatis, nigris, inferioribus ferrugineis. *Geoff. Inf.* 2. 160. 99.

*Phalaena media*, alis longis, angustis, exterioribus lineis et arcolis nigris, albis, atro-rubentibus, transversis, pulcre depictis, interioribus obscure rubris.

*Raj. Inf.* 159. 9.

*Merian. Europ.* 2. p. 23. tab. 9.

*Reaum. Inf.* 1. tab. 15. fig. 1 — 5.

*Ammiral. tab.* II.

*Roef. Inf.* 1. phal. 2. tab. II.

Habitat in pruno, juglante, quercu.

Larva nuda, viridis: linea dorsali lateralibusque albiscostata conico-gibba.

*Eruca viridis*, glabra, laevis, lineis albis secundum longitudinem ductis varia, angulosa, in extremo dorso eminentia rotata. *Raj. Inf.* 159. 9.

Puppa brunnea.

96. N. cristata, alis deflexis, fuscis: stignatibus marginatis strigisque pallidis, reticulatis. *typica.*

*Phalaena typica.* *Linn. Syst. Nat.* II. 857. 186. *Fn.*  
*Sv.* 1195.

*Roef. Inf.* 1. *phal.* 2. *tab.* 5. 6.

Habitat in salice.

Larva nuda, grisea, lateribus albis: linea nigra.

Puppa folliculata, brunnea.

97. N. cristata, alis deflexis: anticis ferrugineis, lunula lutescente strigaque alba, postice bidentata. *oleracea.*

*Phalaena oleracea.* *Linn. Syst. Nat.* II. 853. 171. *Fn.*  
*Sv.* 1197.

*Phalaena* alis exterioribus atro-rubentibus cum lineola alba prope imum marginem transversa, duos cuspides ad ipsum marginem emitte. *Raj. Inf.* 166. 21.

*Frisch. Inf.* 7. -*tab.* 21.

*Ammiral. Inf.* *tab.* 7.

*Reaum. Inf.* 2. *tab.* 39. *fig.* 4.

*Roef. Inf.* 1. *phal.* 2. *tab.* 32.

Habitat in oleribus, polyphaga.

Larva nuda, livida, nigro punctata: linea dorsali fusca, lateraliter alba.

Puppa nuda, nigricans.

98. N. cristata, alis deflexis, atris: posticis basi niveis. *leucomelas.*

*Phalaena leucomelas.* *Linn. Syst. Nat.* II. 856. 183. *Fn.*  
*Sv.* 1184.

*Phalaena setricornis*, spirilinguis, alis deflexis, undulato-nigris, inferioribus basi albis. *Geoff. Inf.* 2.  
149. 80.

*Clerk. Icon.* *tab.* 1. *fig.* 2.

Habitat in Europae hortis.

99. N. cristata, alis deflexis, fuscis: fascia grisea, apice bifida, flavo marginata. *rivularis.*

Habitat in Saxonia.

Thorax strigis cinereis nigrisque variegatus. Alae fuscæ, basi strigis aliquot undatis, fuscis, in medio fascia lata grisea, ad marginem crassiorem bifida: laciniis flavo marginatis. Margo ipse nigro cinereo-que variegatus. Pone fasciam striga undata, flavi-  
cans. Subtus alae griseae, fascia fusca.

*aprilina*. 100. N. cristata, alis deflexis: anticis virentibus, maculis variis atris; postice utrinque punctis trigonis.

Phalaena aprilina. *Linn. Syst. Nat.* II. 847. 138. *Fn. Sv.* 1178.

Phalaena media pulcherrima, alis oblongis, exterioribus dilute coeruleo-viridibus, maculis et lineolis nigris, perbellè depictis. *Raj. Inf.* 158. 4.  
*de Geer Inf.* I. tab. 5. fig. 22. 23.  
*Schaeff. Icon.* tab. 92. fig. 3.  
*Roef. Inf.* 3. tab. 39. fig. fig. 4.

Habitat in quercu.

Larva cinereo brunneoque variegata: linea dorsali alba, interrupta segmentoque singulo puncto albo.

*ludifica*. 101. N. cristata, alis deflexis: anticis abdomineque flavo, trifariam nigro punctato.

Phalaena ludifica. *Linn. Syst. Nat.* II. 848. 143. *Fn. Sv.* 1177.

Habitat in Europa.

Thorax inaculatus.

*Lichenis*. 102. N. cristata, alis deflexis: anticis virentibus, maculis variis atris; subtus fuscis.

Habitat in Germaniae lichenibus.

Summa affinitas N. aprilinae, at duplo minor et puncta postica trigona desunt. Antennae fuscae.

*Algae*. 103. N. cristata, alis deflexis: anticis fuscis; fasciis duabus viridibus.

Habitat in lichene saxatili Germaniae.

Statura praecedentis. Caput et thorax cinereo-fusca. Alae anticae fuscae, fascia lata viridi baseos et alia obsoletiori repanda apicis. Posticae cinereae, subtus puncto centrali nigro.

*Pfi.* 104. N. cristata, alis deflexis, cinereis: anticis lineola baseos characteribus nigris.

Phalaena Pfi. *Linn. Syst. Nat.* II. 846. 135. *Fn. Sv.* 1181.

*Geoff. Inf.* 2. 155. 91.

*Goed Inf.* I. tab. 22.

*Merian. Eur.* 3. tab. 42.

*Alb. Inf.* tab. 86.

*Frisch. Inf.* 2. tab. 2.

*Reaum. Inf.* 1. tab. 42. fig. 5. 6.

*Roef. Inf.* 1. *phal.* 2. tab. 7. 8.

*Ammiral. Inf.* tab. 13.

*Wilks pap.* 28. tab. 3. b. 4.

Habitat in Pomonae arboribus, alno, quercu, polyphaga.

Larva pilosa: dorso flavo, lateribus nigris, rubro maculatis, thorace cornu erecto, nigro.

Puppa folliculata, brunnea.

105. N. cristata, alis deflexis, canis: anticis  $\chi$  nigro notatis.

*Chi.*

*Phalaena Chi.* *Linn. Syst. Nat.* II. 846. 136. *Fn. Sv.* 1180.

*Phalaena seticornis*, spirilinguis, alis deflexis, superioribus cinereo fuscoque nebulosis, lineis undulatis et omicro nigris, inferioribus cinereis. *Geoff. Inf.* 2. 156. 93.

*Alb. Inf.* tab. 83. fig. C. D.

*Roef. Inf.* 1. *phal.* 2. tab. 13.

Habitat in aquilegia, soncho.

Larva nuda, viridis: lineis lateralibus duabus albis.

Puppa folliculata, fusca.

106. N. cristata, alis deflexis, fusco-nebulosis, stigmate reniformi, albo: pupilla lunari flava.

*Perficulariae.*

*Phalaena Perficulariae.* *Linn. Syst. Nat.* II. 847. 142. *Fn. Sv.* 1208.

*Phalaena seticornis*, spirilinguis, alis deflexis, superioribus fuscis, lineis undulatis et omicro nigris, inferioribus cinereis. *Geoff. Inf.* 2. 157. 94.

*Ammiral. Inf.* tab. 157.

*Roef. Inf.* 1. *phal.* 2. tab. 30.

Habitat in Pomonae arboribus, polyphaga.

Larva nuda, viridis: linea dorsali alba, secundo segmento macula quadrata atra, cauda conica.

Puppa brunnea.

107. N. cristata, alis deflexis: anticis fuscis; punctis nigris tribus approximatis, posticis lividis.

*Tragopoginis.*

*Phalaena Tragopoginis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 855. 177. *Fn. Sv.* 1189.

*Frisch. Inf.* 2. p. 33. tab. 7.

Habitat in tragopogine, spinachia, rumice, ferrula arvensi.

Larva viridis: lineis sex albis stigmatibusque albis.

*turca.* 108. N. cristata, alis deflexis, flavescentibus: strigis duabus fuscis lunulaque lutea.

Phalaena turca. *Linn. Syst. Nat.* II. 847. 140.  
*Fn. Sv.* 1221.

Habitat in Europa boreali.

Alae subtus pallidae, striga fusca.

*polyodon.* 109. N. cristata, alis deflexis, dentatis, nebulosis: striga postica dentata, alba.

Phalaena polyodon spirilinguis, cristata, cinereo-nebulosa, margine postico multidentato. *Linn. Syst. Nat.* II. 853. 170. *Fn. Sv.* 1219.

Habitat in Europa.

Alae subtus cinereae, areu puncto que fuscis.

*Eremita.* 110. N. cristata, alis deflexis, ferrugineis: strigis duabus undatis, albis; anteriore obsoleta, posteriore repanda.

Habitat Lipsiae.

Media. Alae anticae ferrugineae, striga antica nivea, dimidiato-fusca, postica repanda, flexuosa. Ante strigam posteriorem color saturatior. Margo posterior nigro punctatus. Alae posticae cinereae. Subtus cinereae, anticis apice, posticis punto strigaque postica fuscis.

*nigricans.* III. N. cristata, alis deflexis, nigricantibus: stigmatis ordinariis pallidioribus.

Phalaena nigricans. *Linn. Syst. Nat.* II. 855. 178. *Fn. Sv.* 1220.

Habitat in Europa.

Puncta aliquot minutissima ad marginem crassiores.

*oculea.* 112. N. cristata, alis deflexis, ferrugineo fuscoque variis: stigmate reniformi, pallido.

Habitat in Suecia.

Statura et magnitudo sequentis. Alae ad marginem tenuiorem rufescentes, ad crassiores fuscae. Macula ordinaria pallida, reniformis.

113. N.

113. N. cristata, alis deflexis: anticis cinereis, strigis *flavicornis*, tribus atris, antennis luteis.

*Phalaena flavicornis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 856. 182. *Fn.*  
*Sv.* 1204.

*Clerk. Icon.* tab. 6. fig. 9.

*Schaeff. Icon.* tab. 90. fig. 3.

Habitat in Pomonae arboribus.

Larva nigra, albo punctata, capite brunneo.

114. N. cristata, alis deflexis: anticis arcu duplici contrario maculisque tribus glaucis intermediis. *triplacia.*

*Phalaena triplacia.* *Linn. Syst. Nat.* II. 854. 175. *Fn.*  
*Sv.* 1202.

*de Geer Inf.* I. tab. 6. fig. 20. 21.

*Merian. Europ.* tab. 97.

*Roeß. Inf.* I. *phal.* 2. tab. 34.

Habitat in soncho, humulo, urtica.

Larva nuda, viridis: gibberibus 2. dorsi et 1. ani fuscis.

Puppa folliculata, brunnea.

115. N. cristata, alis deflexis, cinereis, fusco-subundatis margineque exteriori punctato: subtus pallidis: fascia fusca. *trifitis.*

Habitat in Suecia.

Alae cinereae, nitentes, strigis undulatis, paucis undatis. Margo exterior nigro punctatus. Subtus pallidae, fascia nigra.

116. N. cristata, alis lanceolatis, convolutis, fusco cinereoque nebulosis: punctis quatuor marginalibus albis. *exoleta.*

*Phalaena exoleta spirilinguis, cristata, alis lanceolatis, convolutis, exoletis, dorso fuscescentibus, collari impresso.* *Linn. Syst. Nat.* II. 849. 151. *Fn. Sv.* 1185.

*Frisch. Inf.* 5. tab. II. fig. 1.

*Wilks pap.* 8. tab. I. a. 18.

*Roeß. Inf.* I. *phal.* 2. tab. 24.

*Sultz. Inf.* tab. 16. fig. 95.

*Schaeff. Icon.* tab. 24. fig. 6. 7.

Habitat in chenopodio, atriplice, oleribus.

Larva nuda, viridis, punctata: linea laterali albida.

Puppa nuda, brunnea.

*Verbasci.* 117. N. cristata, alis deflexis, dentato-erosis; margine laterali fusco, immaculato.

Phalaena Verbasci. *Linn. Syst. Nat.* II. 850. 153. *Fn. Sv.* 1186.

Phalaena seticornis, spirilinguis, alis deflexis, fusco-cinereis, superioribus fuscis, longitudinaliter striatis. *Geoff. Inf.* 2. 158. 96.

Phalaena media, alis exterioribus cinereis, lineis et maculis nigris varie depictis. *Raj. Inf.* 168. 25.

*Merian. Europ.* 3. tab. 29.

*Frisch. Inf.* 6. tab. 9.

*Roef. Inf.* I. phal. 2. tab. 23.

*Reaum. Inf.* I. tab. 43. fig. 9 — 11.

*Wilks pap.* 7. tab. I. a. 15.

Habitat in verbasco, scrophularia.

Larva nuda, cinerea, flavo nigroque punctata.

Eruca verbascum depascens cinerea, pulcre variegata.

*Raj. Inf.* 168. 25. et 352. 31.

Pupa folliculata, lutea: stigmatibus nigris.

*umbratica.* 118. N. cristata, alis lanceolatis, canis, striatis, thoracis valvulis lunatis.

Phalaena umbratica. *Linn. Syst. Nat.* II. 849. 150. *Fn. Sv.* 1184.

*Roef. Inf.* I. phal. 2. tab. 25.

Habitat in soncho.

Larva nuda, nigricans, trifariam rubro punctata, cauda acuminata.

Pupa brunnea.

*putris.* 119. N. cristata, alis deflexis, obsoletis, subpunctatis: margine exteriori fusco, adjecta macula subocellari.

Phalaena putris. *Linn. Syst. Nat.* II. 850. 152. *Fn. Sv.* 1187.

Habitat in Europa.

Statura N. Verbasci, at multo brevior. Thorax ante pallide testaceus.

*rurea.* 120. N. cristata, alis deflexis, griseo fuscoque variis; posticis fuscis: margine crassiori albo.

Habitat in Anglia.

Caput fulvum, oculis atris. Palpi fuscii, apice albicans. Thorax et abdomen cinerea. Alae anticae griseae, basi ad marginem tenuorem lineola fusca, in medio ad marginem crassiorem macula magna fusca, in qua maculae ordinariae. Pone hanc puncta tria parva alba marginis crassioris et aliquot fusca, sparsa in disco. Margo denique et macula ad angulum ani fuscae. Posticae supra fuscae, margine exteriori et postico albidis; subtus pallidae, puncto arcuque fuscis.

121. N. cristata, alis deflexis, ferrugineis, albo maculatis: posticis luteis: fascia lata nigra, submarginali. *Myrtilli.*

Phalaena *Myrtilli* cristata, alis griseis, albo variis, inferioribus antice albis, postice nigris. *Linn. Syst.*

*Nat.* II. 853. 167. *Fn. Sv.* 1168.

*Roef. Inf.* 4. tab. II. fig. A. B. C.

Habitat in vaccinio uliginoso.

Larva nuda, viridis, dorso quinque tuberculato, capite coeruleo.

Puppa brunnea, stigmatibus albis.

122. N. cristata, alis deflexis, fuscis: posticis nigris, *Arbuti.* fascia flava.

Habitat in Anglia.

Statura praecedentis, at paulo minor. Alae anticae fuscae, nitentes, striga obsoleta undata, obscuriore; posticae nigrae, fascia media lata flava marginaque albicante. Subtus anticae fuscae, fascia flava: posticae flavescentes.

#### 145. PHALAENA. *Palpi* cylindrici.

*Lingua* porrecta, membranacea.

*Antennae* filiformes.

\* *Antennis pectinatis.*

- I. P. bipectinicornis, alis angulatis, niveis, immaculatis, antennis apice setaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 856. 194. *Fn. Sv.* 1226. *lactearia.*

Phalaen-

Phalaena pectinicornis, spirilinguis, alis patentibus, rotundatis, niveis, corpore flavo. *Geoff. Ins. 2. 131. 44.*

Phalaena lactearia. *Scopol. carn. 529.*

Habitat in Europae nemoribus.

Tenerrima et fere pellucida.

*nivearia.* 2. P. pectinicornis, alis subangulatis, albis: margine postico anticisque subtus fuscis, posticis puncto centrali nigro.

Habitat in Anglia.

Parva, tenera. Corpus album, oculis nigris antennisque fusca. Alae supra albae, margine fusco. In posticis punctum centrale nigrum. Subtus anticae obscure fuscae, puncto centrali nigro: posticae subangulatae, albae, puncto centrali nigro margineque postico fusco.

*vernaria.* 3. P. pectinicornis, alis angulatis, virescentibus: strigis duabus albis, repandis, antennis apice setaceis. *Linn. Syst. Nat. II. 858. 195. Fn. Sv. 1227.*

*Roeß. Ins. 1. phal. 3. tab. 13.*

Habitat in jasmino, syringa.

Margo alarum fusco punctatus.

Larva ferruginea, albo nigroque varia, capite dentato.

*putataria.* 4. P. pectinicornis, alis angulatis, albis: strigis duabus candidis, repandis, antennis apice setaceis. *Linn. Syst. Nat. II. 859. 196. Fn. Sv. 1225.*

*Clerk. Icon. tab. 3. fig. 9.*

Habitat in Europae nemoribus.

*friataria.* 5. P. pectinicornis, alis angulatis, albidis: strigis duabus flavescentibus, obsoletis. *Linn. Syst. Nat. II. 859. 197.*

*Clerk. Icon. tab. 55. fig. 4.*

Habitat in Europae umbrosis.

Alae omnes albidae, strigis anteriorum duabus, posteriorum unica, flavescentibus.

*punctaria.* 6. P. pectinicornis, alis subangulatis, cinereis: striga ferruginea ordineque punctorum nigrorum. *Linn. Syst. Nat. II. 859. 200. Fn. Sv. 1250.*

*Clerk. Icon. tab. 5. fig. 11.*

Habitat in Europa, Anglia.

7. P. pectinicornis, alis angulatis: omnibus pallidis, amataria.  
pulverulentis; fascia purpurea recta strigaque fusca,  
repanda. *Linn. Syst. Nat.* 11. 859. 201. *Fn. Sv.* 1223.

Phalaena pectinicornis, elinguis, alis patentibus, an-  
gulatis, cinereis, fascia dupli transversa puncto-  
que obscuriore atomis cinerascentibus. *Geoff. Inf.* 2.  
128. 37.

*Wilks pap.* 37. tab. 1. a. 5.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 29. fig. 1—4.

Habitat in Europae quercu.

Larva viridis, cingulis supra flavis, subtus rubris.

8. P. pectinicornis, alis falcatis, glaucis: anticis undis  
fasciaque griseis, puncto fusco. *Linn. Syst. Nat.* 11. falcata-  
859. 202. *Fn. Sv.* 1224. ria.

*de Geer. Inf.* 1. tab. 24. fig. 7.

Habitat in betula alba, alno.

9. P. pectinicornis, alis subfalcatis, luteis: fascia saturata-  
tiori, antennis apice setaceis. cultraria.

Habitat in Germania.

Statura omnino praecedentis, at minor. Alae omnes  
flavescentes; fascia lata saturatiore, quae ad margi-  
nem futuratiorem adhuc latior. Subtus omnes ful-  
phureae, immaculatae.

10. P. pectinicornis, alis caudato-angulatis, flavescenti- sambuca-  
bus: strigis duabus obscurioribus, posticis apice bi- ria.  
punctatis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 860. 203. *Fn. Sv.* 1222.

Phalaena seticornis, spirilinguis, alis patentibus, sul-  
phureis, linea dupli transversa, obscuriori; in-  
terioribus caudatis. *Geoff. Inf.* 2. 138. 58.

Phalaena media ochroleucus, alis amplissimis, exterio-  
ribus duabus lineis transversis, e fulvo virentibus,  
interioribus una divisis. *Raj. Inf.* 177. 1.

*Alb. Inf.* tab. 94.

*Sepp. Inf.* 6. p. 1. tab. 1.

*Roes. Inf.* 1. *phal.* 3. tab. 6.

*Goed. Inf.* 2. tab. 34.

*Petiv. Gazoph.* tab. 51. fig. 6.

*Wilks pap.* 38. tab. 1. b. 2.

*Clerk. Icon.* tab. 50. fig. 2.

Habitat in sambuco.

Larva subnodosa, pulla, fusco-lineata.  
 Puppa fusiformis, brunnea, fusco punctata.  
 Ova costata.

*lacertina*. 11. *P. pectinicornis*, alis erosis, lutescentibus: strigis duabus fuscis.

Phalaena lacertiaria pectinicornis, alis erosis, lutescentibus, postice saturatioribus: lineis duabus punctoque fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 860. 204. *Fn. Sv.* 1229.

*Alb. Inf.* tab. 65.

*de Geer Inf.* I. tab. 10. fig. 7. 8.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 22. fig. 4. 6.

*Wilks pap.* 74. tab. 1. c. 3.

Habitat in quercu, betula.

Larva nuda, rubra, dorso angulato.

*alniaria*. 12. *P. pectinicornis*, alis erosis, flavis, fusco-pulveratis: strigis duabus fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 860. 205. *Fn. Sv.* 1230.

*de Geer Inf.* I. tab. 10. fig. 13. 14.

*Roef. Inf.* I. *phal.* 3. tab. 1.

Habitat in Pomonae arboribus.

Larva griseo-fusca, luteo punctata: verrucis dorsilibus tribus remotis; caudalibus quatuor approximatis.

Puppa coerulescens, postice attenuata.

*syringaria*. 13. *P. pectinicornis*, alis suberosis: omnibus griseoflavescensibus; strigis repandis, fuscis albisque. *Linn. Syst. Nat.* II. 860. 206.

Phalaena pectinicornis, alis margine sinuatis, fulvo, nigro, fusco roseoque marmoratis, singulis subtus puncto nigro, superioribus extremo dilatato, recurvis. *Geoff. Inf.* 2. 125. 32.

*Roef. Inf.* I. *phal.* 3. tab. 10.

*Wilks pap.* 39. tab. 1. b. 6.

Habitat in syringa, jasmino.

Larva glauco luteoque varia, dorso aculeis sex: posticis longioribus, recurvis.

Puppa folliculata, farcta, antice grisea, postice brunnea.

14. P. pectinicornis, alis angulato-dentatis: basi rufis, lunula alba, apice cinereis. *Sepp. Inf. 6. p. 9. tab. 2.*  
 Habitat in Germania.  
 Larva grisea, tuberculis dorsalibus didymis, subtus fasciis albidis, nigro punctatis.  
 Puppa folliculata, obtusa, brunnea.
15. P. pectinicornis, albis angulato-dentatis, supra pallidis: strigis ferrugineis, subtus ferrugineis: lunula obscuriore. *dentaria.*  
 Habitat in Anglia. *Mus. Monson.*  
 Alae dentatae, pallide cinereae, strigis tribus marginique ferrugineis. Margo exterior ferrugineo-irroratus. Subtus dilutiores, striga pallida lunulaque centrali obscura.
16. P. bipectinicornis, alis dentatis, albis, fusco-undatis, antennis apice setaceis. *undaria.*  
 Habitat in India. *Koenig.*  
 Antennae longitudine corporis. Alae albae, fasciis strigisque plurimis undatis, fuscis.
17. P. pectinicornis, alis angulatis, flavis, strigis ferrugineis: angulo ani violaceo. *dolabria.*  
 Phalaena dolabraria pectinicornis, alis subflavescensibus: strigis ferrugineis sparsis, lobo postico violaceo. *Linn. Syst. Nat. II. 861. 207.*  
 Habitat in quercu Germaniae, Angliae.
18. P. pectinicornis, alis anticis griseis; posticis ferrugineis. *Rondelia.*  
 Habitat in Rondeletia Indiae orientalis. *Mus. Tottianum.*  
 Parva. Antennae pectinatae, apice setaceae. Alae anticae subangulatae, griseac, basi obscuriores maculisque duabus costalibus ferrugineis. Alae posticae, uti omnes, subtus ferrugineae.
19. P. pectinicornis, alis rotundatis, flavescensibus: strigis tribus purpureis; anteriore obsoletiore. *vibicaria.*  
 Phalaena vibicaria pectinicornis, alis angulatis, glaucescentibus, puncto, fascia strigaque purpureis. *Linn. Syst. Nat. II. 859. 198. Fn. Sv. 1228.*  
 Habitat

Habitat in Europae nemoribus.

Convenit Linnaei descriptio, at alae haud angulatae.

- papilionea-* 20. *P. pectinicornis*, alis viridibus, subrepandis: striga sesquialtera repanda. *Linn. Syst. Nat.* II. 864. 225.  
*ria.* *Fn. Sv.* 1247.  
*Frisch. Inf.* 10. tab. 17.  
*Roef. Inf.* 4. tab. 18. fig. 3.  
Habitat in Europae nemoribus.

- prunaria.* 21. *P. pectinicornis*, alis subdentatis, luteis, fusco-pulverulentis: anticis lunula fusca. *Linn. Syst. Nat.* II. 861. 208. *Fn. Sv.* 1232.  
*Alb. Inf.* 42. tab. 69.  
*Wilks pap.* 40. tab. 1. b. 8.  
Habitat in pruno spinosa.  
Larva ferruginea: dorso antice posticeque spinis duabus.

- turcaria.* 22. *P. pectinicornis*, alis griseo-nebulosis: omnibus subtus puncto nigro; lunula alba.  
Habitat in Germania.  
*P. papilionariae* paulo minor. Alae omnes supra nebulosae s. griseae, fusco-irroratae. Subtus omnes cinereae, puncto centrali fusco, in quo lunula parva alba.

- piniaria.* 23. *P. pectinicornis*, alis fuscis, flavo maculatis, subtus nebulosis, fasciis duabus fuscis.

Phalaena piniaria pectinicornis, alis subtus griseis, linea alba interrupta fasciisque duabus obscurioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 861. 210. *Fn. Sv.* 1233.

*Clerk. phal.* tab. 1. fig. 10.

*Ammiral. Inf.* tab. 20.

*Sepp. Inf.* 6. p. 17. tab. 4.

*B. Clerk. Inf.* tab. 4. fig. 11.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 4. fig. 6.

Habitat in pino.

Larva, viridis, supra albo, subtus flavo striata.

Pupa folliculata, brunnea.

- limbaria.* 24. *P. pectinicornis*, alis ferrugineis, limbo nigro: posticis subtus nigris, albo-striatis.

Habitat in Anglia. *Mus. Banks.*

Statura

Statura P. atomariae. Antennae nigrae. Corpus fusco-cinereum. Alae anticae supra ferrugineae, margine crassiori et postico nigris, subtus ferrugineae, fuscō-irroratae: posticae ferrugineae, atomis margineque postico fuscis; subtus nigrae, albo-striatae.

25. P. pectinicornis, alis nigro punctatis maculatisque: melananticis albidis, posticis luteis. *Linn. Syst. Nat. II. ria. 862. 212. Fn. Sv. 1240.*

*Clerk. phal. tab. 4. fig. 2.*

Habitat in Europa.

26. P. pectinicornis, alis omnibus lutescentibus: fasciis atomisque fuscis. *Linn. Syst. Nat. II. 862. 214. Fn. Sv. 1245.*

*Frisch. Ins. 13. p. 12. tab. 5.*

*Alb. Ins. 42. fig. 69.*

Habitat in tilia.

27. P. pectinicornis, alis niveis: strigis tribus fuscis, obfoletis. *Linn. Syst. Nat. II. 864. 223. Fn. Sv. 1251.*

*Clerk. phal. tab. 3. fig. 1.*

Habitat in Europa betula, alno.

28. P. pectinicornis, alis rotundatis, flavis: omnibus ocellariis puncto ocellari albo.

Habitat in India. *Mus. Tottianum.*

Antennae valde pectinatae. Alae supra flavissimae, in medio puncto parvo albo, annulo fuscō cincto. Subtus concolor, at atomis fuscis irroratae.

29. P. pectinicornis, alis cinereis: striga annulo fasciis. que duabus fuscis. *annularia.*

Habitat in Germania.

Patra. Antennae apice setaceae. Alae omnes supra griseae, striga flexuosa baseos annulo medio et fasciis duabus posticis fuscis, quarum anterior dentata, latior. Fone fascias ordo punctorum nigrorum terminalis. Subtus omnes albidae, inimaculatae.

30. P. pectinicornis, alis griseis: atomis fuscis, medio defoliaria, albis: puncto nigro. Foemina aptera, nigro punctata. *Linn. Fn. Sv. 1238.*

Habitat in ceraso, tilia.

Larva ferruginea, stria laterali sulphurea.

Puppa brunnea.

- vespertia*. 31. P. pectinicornis, alis flavescentibus: strigis duabus; posteriore limbum obscurum disterminate. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 864. 224.  
 Habitat in Germania, Anglia.

- Wavaria*. 32. P. pectinicornis, alis cinereis: anticis fasciis quatuor nigris, abbreviatis, inaequalibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 863. 219. *Fn. Sv.* 1248.

Phalaena minor, alis amplis, cinereo albicantibus 4 in exteriorum margine maculis linearibus e rufo nigricantibus. *Raj. Inf.* 179.

*Petiv. Mus.* 3. n. 4.

*Alb. Inf.* 47. fig. 78.

*Merian. Eur.* I. tab. 25. fig. 151.

*Frisch. Inf.* 3. tab. 3. fig. 1.

*Roef. Inf.* 1. *phal.* 3. tab. 4.

*Wilks pap.* 52. tab. 2. a. 2.

*Ammiral. Inf.* tab. 13. fig. 2. 3.

Habitat in ribe, grossularia.

Larva subpilosa, viridis, nigro punctata, linea dorsali lateralibusque flavis.

Puppa nuda, brunnea, acuminata.

- prasinaria*. 33. P. pectinicornis, alis viridibus: strigis tribus; anticis obscurioribus, postica alba.

Habitat in Anglia. *Mus. Banks.*

Strigae anticae obscuriores, undatae, posterior alba, fere recta.

- viridaria*. 34. P. pectinicornis, alis rotundatis, viridibus, albo strigosis maculisque marginalibus atris.

Habitat in Anglia. *Mus. Banks.*

Alae anticae virides, striga baseos alba, quae ad marginem crassiorem terminatur puncto atro. In medio striae duas albae, undatae, quae ad marginem crassiorem terminantur punctis duobus majoribus atris, ad tenuiorem vero fere coeunt puncto unico parvo, atro. Striga postica e punctis obsoletis albis. Puncta aliquot minutissima nigra ad marginem crassiorem et

et unicum maiuscum ad apicem. Margo posticus cinereo fuscoque varius. Alae posticae, uti omnes, subtus cinereae, fusco - strigosae.

35. *P. pectinicornis*, alis fuscis: anticis fascia maculari, *tripunctaria*.  
posticis disco albo.

Phalaena tripunctaria pectinicornis, alis fuscouscentibus: anterioribus fascia interrupta baseo que striga; posterioribus disco albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 864. 226.  
*Mus. L. U.* 392.

*Edw. Av.* 35. tab. 35?

*Petiv. Gazoph.* tab. 28. fig. 8.

Habitat in Asia.

Fascia alarum e maculis quinque constat.

36. *P. pectinicornis*, alis nigris, concoloribus: anticis *Jatropha*-  
maculis duabus, posticis unica, flavis. *Linn. Syst. ria.*  
*Nat.* II. 865. 229. *Mus. L. U.* 395.

*Clerk. Icon.* tab. 55. fig. 3.

*Merian. Sur.* 38. tab. 38. fig. 1.

Habitat in Americae *Jatropha gossypifolia*.

37. *P. pectinicornis*, alis rotundatis, atris, coeruleo-  
striatis maculatisque. *feneſtraria*.

Habitat in China. *Mus. Banks.*

Magna. Caput et thorax nigra, albo punctata. Abdomen supra fuscum, subtus albidum. Alae anticae cyaneo - striatae, spice albo maculatae, posticae cyaneo - striatae.

38. *P. pectinicornis*, alis luteis: margine venisque dilata-  
tatis, ramosis, nigris. *venaria*.

Habitat in Indiis.

Nostratis major. Antennae cyaneae, radiis nigris.  
Caput cyaneum, margine postico albo. Thorax fuscus, maculis cyaneis albisque. Alae flavae, venis versus apicem ramosis, nigris.

39. *P. pectinicornis*, alis omnibus testaceo - pulverulentis: *pulvera-*  
fascia lata, ferruginea. *Linn. Syst. Nat.* II. 862. 215. *ria*.

*Fn. Sv.* 1243.

*Clerk. phal.* tab. 5. fig. 6.

Habitat in Europa.

*fasciaria*. 40. *P. pectinicornis*, alis omnibus rufescentibus: fascia lata, ferruginea; margine albo. *Linn. Syst. Nat.* II. 862. 216. *Fn. Sv.* 1242.

*Clerk. Icon.* tab. 5. fig. 5.

Habitat in Europa.

Fascia lata ferruginea, margine antico et postico albo.

*betularia*. 41. *P. pectinicornis*, alis omnibus albis; atomis nigris, thorace fascia atra, antennis apice setaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 862. 217. *Fn. Sv.* 1287.

*Petiv. Gaz.* tab. 7. fig. 8.

*Alb. Inf.* tab. 91. 92. .

*Wilks pap.* 38. tab. I. b. I.

*de Geer Inf.* I. tab. 17. fig. 22.

*Ammiral. Inf.* tab. 21.

Habitat in betula, salice.

Pedes nigri, albo-annulati.

*sacraria*. 42. *P. pectinicornis*, alis flavis: striga obliqua sanguinea. *Linn. Syst. Nat.* II. 863. 220.

Habitat in Africa.

Antennae apice setaceae. Striga a medio marginis tenuioris ad apicem ducta.

*elingua-  
ria*. 43. *P. pectinicornis*, alis griseis: anticis fascia lata obscuriore; medio puncto nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 862. 211. *Fn. Sv.* 1235.

*Roef. Inf.* I. phal. 3. tab. 9.

Habitat in pyro.

Larva rugosa, cinereo brunneaque variegata.

Puppa folliculata, antice fusca, postice brunnea.

*plumba-  
ria*. 44. *P. pectinicornis*, alis plumbeis: strigis tribus puncto-que medio fuscis.

Habitat in Angliae nemoribus.

Statura praecedentis. Antennae pectinatae, apice setaceae. Corpus plumbeum. Alae anticae plumbeae, striga parva flexuosa baseos diobusque medii rectis fuscis. Inter strigas posticas punctum parvum fulcum. Posticae, uti omnes, subtus cinereae, im- maculatae.

45. *P. pectinicornis*, alis luteis: margine anticarumque *purpura-*  
fasciis duabus purpureis. *Linn. Syst. Nat.* II. 864. *ria.*  
*221. Fn. Sv. 1254.*

*Phalaena pectinicornis*, clinguis, alis deflexis, luteo-  
rubris: fascia dupli transversa, sanguinea. *Geoff.*  
*Ins. 2. 126. 34.*

*Clerk. phal. tab. 9. fig. 11.*

*Goed. Ins. 2. tab. 12.*

Habitat in quercu, pruno spinosa.

46. *P. pectinicornis*, alis atris, albo- subfasciatiss: subtus *fuligina-*  
griseis: fasciis fuscis. *ria.*

*Phalaena fuliginaria pectinicornis*, alis nigris, albo  
punctato undulatis; subtus grisecentibus. *Linn.*  
*Fn. Sv. 1247.*

Habitat in Sueciae Ericetis.

\* \* *Antennis setaceis.*

47. *P. seticornis*, alis angulatis, fuscis: fascia nivea. *fasciata.*

Habitat in Indiis.

*Paulo major P. bilineata.* Alae anticae fuscae, fascia  
lata nivea, quae tamen marginem crassorem slave-  
sentem haud attingit: posticae angulatae, fascia  
media alba. Pone fasciam maculae duae atrae an-  
nulo flavo cinctae. Antennae flavae.

48. *P. seticornis*, alis angulatis, cinereis: anticis li- *regulata.*  
tura fusca.

Habitat in Brasilia. *Mys. Banks.*

*Corpus parvum, cinereum. Alae anticae emarginatae,* obscure cinereae. Litura s. fascia abbreviata,  
fuscata ad marginem crassorem. Emarginatura alae  
lunula fusca. Subtus cinereae, fusco-irroratae stri-  
gisque tribus fuscis, apice subflavescentes. Posticae  
cinereae, puncto parvo centrali strigaque undulata  
marginali fuscis: subtus strigis duabus, atomis pun-  
ctoque medio fuscis, apice subflavescente.

49. *P. seticornis*, alis falcatis, fulvis: punctis duobus *falcata.*  
fuscis inter strigas luteas.

Habitat in Anglia.

*Statura P. falcatariae. Alae falcatae, fulvae, strigis dua-*  
bus undatis, luteis, inter quas puncta duo fusca

approximata. Versus apicem alae litura fusca.  
Alae posticae dilutiores. Subtus omnes flavae, im-  
maculatae.

**demandata.** 50. *P. seticornis*, alis subangulatis, lutescentibus: strigis  
tribus punctoque medio fuscis.

Habitat Lipsiae.

Statura *P. amatariae*, at minor. Alae omnes flavescentes, purpureo subtilissime irroratae. Strigae tres repandae, postica terminali. Punctum fuscum in medio alae inter primam et secundam strigam.

**explanata.** 51. *P. seticornis*, alis dentatis, ferrugineis: fascia fusca;  
puncto nigro.

Habitat in China. *Mus. Monson.*

Affinitas summa *P. dubitatae*. Alae omnes dentatae, subferrugineae, fascia in medio lata, fusca, quae utrinque striga alba tenuissima includitur. Punctum nigrum in medio fasciae. Terminantur alae striga albida nigraque undata.

**dimidia-  
ta.** 52. *P. seticornis*, alis dentatis: antice flavis, postice fuscis.  
Habitat in Anglia. *Mus. Monson.*

Statura et magnitudo *P. prunariae*. Alae rotundatae, dentatae, antice flavae, atomis puncto strigisque duabus fuscis, postice fuscae.

**irrorata.** 53. *P. seticornis*, alis dentatis, flavis, fusco-irroratis;  
subtus macula fasciaque postica fuscis.

Habitat in India orientali. *Mus. Tottianum.*

Statura magna, *P. prunariae*. Alae omnes dentatae, flavescentes, fusco densissime irroratae. Subtus omnes flavescentes, lunula media fasciaque postica lata fuscis.

**viridata.** 54. *P. seticornis*, alis angulatis: omnibus viridibus; striga pallida. *Linn. Syst. Nat. II. 865, 230, Fn. Sv. 1256.*  
*Harris. Ins. 7, tab. 3, fig. e-i.*

Habitat in quercu, oxyacantha.

**notata.** 55. *P. seticornis*, alis angulatis, pallidis: strigis tribus subfuscis, anticis punctis quatuor approximatis.

Phalaena notata seticornis, alis angulatis, pallidis, fasciis tribus subfuscis; anticarum postica nigri-  
cante,

cante, commaculata. *Linn. Syst. Nat.* II. 866. 232.  
*Fn. Sv.* 1258.

*Clerk. phal.* tab. 6. fig. 11.

Habitat in Europae Ericetis.

56. *P. feticornis*, alis pallidis, rufo-pulverulentis: omnibus puncto ocellari albo. *porata.*

Phalaena porata alis subangulatis, pallescentibus; posticis ocello minuto. *Linn. Syst. Nat.* II. 866. 233.?

Habitat in Europa, Anglia.

Alae omnes slavescentes, atomis plurimis rufis irroratae. In medio punctum album, iride nigra. Margo posticus nigro punctatus; subtus alae pallidiores, inmaculatae.

57. *P. feticornis*, alis subemarginatis, pallidis: fasciis emarginata. duabus griseis punctoque fusco.

Phalaena emarginata feticornis, alis omnibus pallidis, emarginato-angulatis: strigis duabus griseis. *Linn. Syst. Nat.* II. 866. 236. *Fn. Sv.* 1257.

*Clerk. phal.* tab. 4. fig. 12.

Habitat in Europa.

58. *P. feticornis*, alis albidis: maculis rotundatis, nigris, anticis strigis luteis. *Linn. Syst. Nat.* II. 867. 242. *grossularia.*  
*Fn. Sv.* 1261.

Phalaena feticornis, spirilinguis, alis patentibus albis, maculis inaequalibus nigris plurimis fasciaque transversa lutea. *Geoff. Inf.* 2. 136. 57.

Phalaena media, alis amplis albis, maculis crebris nigris et lineis transversis luteis variis. *Raj. Inf.* 178. 14.  
*Goed. Inf.* 1. tab. 31.

*Blank. Inf.* tab. 7. fig. E. H.

*Merian. Europ.* 1. tab. 29.

*Alt. Inf.* tab. 43. fig. 71.

*Frisch. Inf.* 3. tab. 2.

*Roef. Inf.* 1. *phal.* 3. tab. 2.

*Wilks pap.* 42. tab. 2. a. 1.

*Edw. Av.* tab. 202.

*Ammiral. Inf.* tab. 26.

Habitat in ribe, grossularia.

Larva geometra subpilosa, supra cinerea, nigro punctata, subtus flava.

Eruca geometra majuscula, albo, nigro et rubro coloribus varia. *Raj. Inf.* 179.

Puppa subfolliculata, atra: fasciis flavis.

**undulata.** 59. P. seticornis, alis omnibus supra strigis consertissimis, undulatis, fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 867. 239. *Fn. Sv.* 1272.

*Clerk. phal.* tab. 6. fig. 3.  
*Uddm. Diff.* 71.

Habitat in salice caprea,

**populata.** 60. P. seticornis, alis flavo-pallidis: anticis subfasciatis, apice subtus fusco contaminatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 868. 244. *Fn. Sv.* 1266.

*Clerk. phal.* tab. 5. fig. 14, 15.

Habitat in populo,

**comitata.** 61. P. seticornis, alis anticis flavescentibus: fasciis tribus griseis, puncto apicisque lineola fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 868. 247. *Fn. Sv.* 1264.

Habitat in Europae nemoribus.

**ulmata.** 62. P. seticornis, alis albis: fasciis duabus ferrugineo-fuscis; postica maculari. *Sepp. Inf.* 6. 13. tab. 3.

Habitat in Angliae ulmo, platano.

Minor P. grossulariatae. Corpus flavum, nigro punctatum. Alae albissimae, fascia baseos fusca, ferrugineo tincta. Fascia altera in medio ad marginem crassiorema macularis. Subtus omnes albae, maculis fuscis.

Larva viridis, nigro-lineata, capite caudaque nigris. Puppa folliculata, coerulescens.

**dealbata.** 63. P. seticornis, alis albis, subtus nigro-venosis. *Linn. Syst. Nat.* II. 870. 256.

Habitat in Germaniae sylvis.

**prunata.** 64. P. seticornis, alis griseis: anticis fasciis duabus pallidis, repandis; postica semiterminali. *Linn. Syst. Nat.* II. 869. 250. *Fn. Sv.* 1267.

*Clerk. phal.* tab. 7. fig. 3.

*Frisch. Inf.* 5. tab. 14.

*Ammiral. Inf.* tab. 23. fig. 1, 4.

Habitat in pruno, ribe,

65. *P. seticornis*, alis flavissimis: anticis maculis costalibus tribus ferrugineis; media subargentea. *Linn.* *Syst. Nat.* II. 868. 243. *Fn. Sv.* 1283. *crataega-*  
*ta.*

Phalaena seticornis, spirilinguis, alis patentibus, luteis, duplice punctorum cinereorum ordine, superioribus maculis duabus et racchi croceo-ferrugineis. *Geoff. Inf.* 2. 139. 59.

*Sepp. Inf.* 6. p. 25. tab. 6.

*Wilks pap.* 39. tab. 1. b. 4.

*Clerk. phal.* tab. 5. fig. 15.

Habitat in crataego.

Larva grisea, tuberculo dorsali didymo.

Puppa fusca, folliculo cinereo, ferrugineo maculato.

66. *P. seticornis*, alis omnibus albis: margine exteriore limbo fuscō interrupto. *Linn. Syst. Nat.* II. 870. 257. *margina-*  
*ta.*  
*Fn. Sv.* 1279.

Phalaena seticornis, spirilinguis, alis patentibus albis, margine undique interrupto fuscis. *Geoff. Inf.* 2. 139. 60.

*Clerk. phal.* tab. 2. fig. 5.

*Sultz. Inf.* tab. 16, fig. 96.

Habitat in corylo.

Interdum maculae aliquot nigrae in disco alae.

67. *P. seticornis*, alis griseis: fasciis tribus viridibus: *miata.*  
intermedia latiore, fuscō-undata.

Phalaena miata seticornis, alis virescenti-undulatis: fascia media lata triplici, o notata. *Linn. Syst. Nat.* II. 869. 249. *Fn. Sv.* 1268.

*Clerk. phal.* tab. 8. fig. 2.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 29. fig. 11 - 13.

*Ammiral. Inf.* tab. 32. fig. 2.

Habitat in Suecia.

68. *P. seticornis*, alis cinereis, postice ferrugineis: striga rufata.  
alba punctisque marginalibus nigris.

Habitat in Anglia.

Palpi apice rotundati, fere uti in Pyralide. Caput, thorax et abdomen cinerea, immaculata. Alae basi cinereae, maculis duabus vel tribus parvis rufis, postice rufescentes, striga alba, quae tamen marginem crassiorem haud attingit. Striga marginalis e punctis nigris.

- albicilla-* 69. *P. feticornis*, alis omnibus nigricantibus: fascia lata alba, immaculata. *Linn. Syst. Nat.* II. 870. 255.  
*Fn. Sv.* 1278.  
*Clerk. phal.* tab. I. fig. 12.  
 Habitat in Europa boreali.
- haftata.* 70. *P. feticornis*, alis omnibus nigris, albo maculatis: fasciis duabus albis, nigro punctatis, hastato-dentatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 870. 254. *Fn. Sv.* 1276.  
*Clerk. phal.* tab. I. fig. 9.  
 Habitat in Europa boreali.  
 Fasciae albae in nostro specimine nigro punctatae.
- triflata.* 71. *P. feticornis*, alis omnibus nigris, albo-subundatis: fasciis duabus albis, undatis, immaculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 869. 252. *Fn. Sv.* 1277.  
*Clerk. phal.* tab. I. fig. 13.  
 Habitat in betula.  
 Minor praecedenti. Fasciae immaculatae.
- clathrata.* 72. *P. feticornis*, alis omnibus flavescensibus: lineis nigris decussatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 867. 238.  
*Fn. Sv.* 1275.  
*Phalaena feticornis*, spirilinguis, alis patentibus fuscis, utrinque maculis albis quadrangulis, tessulatis. *Geoff. Ins.* 2. 135. 53.  
*Clerk. phal.* tab. 2. fig. II.  
*Phalaena retialis.* *Scop. carn.* 536.  
 Habitat in Europae Ericetis.
- chaero-*  
*phyllata.* 73. *P. feticornis*, atra, alis erectis: anticis apice albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 866. 237. *Fn. Sv.* 1274.  
*Petiv. Gazoph.* tab. 69. fig. 8.  
 Habitat in chaerophyllo sylvestri.
- fluctuata.* 74. *P. feticornis*, alis cinerascentibus: anticis fasciis abbreviatis tribus, fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 871. 260.  
*Fn. Sv.* 859.  
*Goed. Ins.* 3. tab. K.  
*Merian. Europ.* tab. 120.  
*Frisch. Ins.* 7. tab. 19.  
 Habitat in Pomonae arboribus.

75. *P. seticornis*, alis luteis, testaceo-undatis: fascia repanda, margine fusco alboque. *Linn. Syst. Nat.* II. 868. 245. *Fn. Sv.* 1284.

*Clerk. phal.* tab. 6. fig. 13.

Habitat in Suecia.

76. *P. seticornis*, alis albis: anticis maculis duabus costalibus, fuscis, *bimaculata*.

Habitat Lipsiae,

Statura et magnitudo *P. ocellatae*. Corpus album, antennis nigris. Alae niveae, atomis aliquot et maculis duabus trigonis costalibus, fuscis: subtus omnes albae, puncto centrali fusco.

77. *P. seticornis*, alis omnibus viridibus: strigis duabus albis, *volutata*.

Habitat in Germania.

Corpus et alae viridia. Strigae duae lineares, anteriore obsoletiore: subtus striga unica obsoleta.

78. *P. seticornis*, alis albidis: fascia lata abbreviata, *ocellata*. fusca; puncto subocellaris atro.

Phalaena *ocellata seticornis*, alis albidis: anticis fasciis duabus fuscescentibus maculaque apicis ocellari dividim. *Linn. Syst. Nat.* II. 870. 258. *Fn. Sv.* 1280.

Habitat in Europa boreali,

Margo posticus pallide fuscus, striga flexuosa alba.

79. *P. seticornis*, alis rotundatis, albis: fasciis duabus punctisque apicis fuscis, *lyncea*.

Habitat in Anglia.

Affinis praecedenti. Caput et thorax fusca. Abdomen album, punctis dorsalibus fuscis. Alae anticae albae, fascia baseos fusca. In medio fascia latior fusca, puncto magno atro. Litura obsoleta, puncto atro versus apicem. Posticae albae, puncto fusco.

80. *P. seticornis*, alis cinereis: posticis supra fuscis, fascia punctisque tribus albis, *Ianata*.

Phalaena *Ianata seticornis*, alis anterioribus subtus cinereis: posticis supra fascia punctisque tribus albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 870. 259. *Mus. Lud. Utr.* 398.

Habitat in Indiis.

Alae anticae cinereae, strigis duabus undatis, remotis obscurioribus.

*brumata.* 81. *P. seticornis*, alis griseo-fuscis: striga nigra, postice pallidioribus, foemina aptera. *Linn. Syst. Nat.* 11. 874. 281. *Fn. Sv.* 1293.

Phalaena alis latis, exterioribus albicantibus cum tintura viridi aut coerulea. *Raj. Inf.* 181. 4.  
*Reaum. Inf.* 2. tab. 30. fig. 8. 9.  
*de Geer Inf.* 1. tab. 24. fig. 11. 19.

Habitat in Pomonae arboribus.

*exspectata.* 82. *P. seticornis*, alis rotundatis, viridibus: margine ferrugineo.

Habitat in Asia. *Drury.*

Alae omnes virides, concolores, immaculatae: margine omni ferrugineo.

*chenopodiata.* 83. *P. seticornis*, alis anticis testaceis: fasciis tribus griseis; puncto prominulo apicisque lineola supra fusca. *Linn. Syst. Nat.* 11. 868. 246. *Fn. Sv.* 1263.

*Albin. Inf.* tab. 47. fig. 79.

*Schaeff. Icon.* tab. 76. fig. 4. 5.

Habitat in chenopodio.

Mas subpectinieornis.

*duplicata.* 84. *P. seticornis*, alis griseis: strigis duabus fuscis, duplicatis.

Habitat in Anglia.

Corpus cinereo-fuscum. Alae anticae griseae, litura baseos fascia obliqua, at haud undata, e strigis duabus composita ante medium, et alia in medio e tribus strigis approximatis undatis constans. Posticae cinereae: subtus omnes cinereae, puncto centrali nigro.

*rectangu-lata.* 85. *P. seticornis*, alis viridibus, fusco-subfasciatis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 872. 270. *Fn. Sv.* 1295.

*Clerk. phal.* tab. 8. fig. 6.

Habitat in Europae sylvis.

Alae anticae virides, atomis, strigis fasciisque fuscis, abbreviatis. Versus apicem alae punctum oblongum nigrum. Alae posticae cinereae, immaculatae: subtus cinereae, anticis costa viridi, fusco-fasciata, posticis puncto arcuque obscurioribus.

86. *P. seticornis*, alis albidis: puncto nigro limboque obscuriore. *Linn. Syst. Nat.* II. 872. 267. *Fn. Sv.* 1294. *succenturiata.*  
*Clerk. phal. tab. 5. fig. 2.*  
Habitat in Europa.
87. *P. seticornis*, alis purpurascensibus, cinereo-undulatis: postice macula didyma, fusca. *Linn. Fn. Sv.* 1292. *ferrugata.*  
Habitat in Europa boreali.
88. *P. seticornis*, alis flavis, nigro-maculatis. *maculata.*  
*Phalaena macularia. Linn. Syst. Nat.* II. 862. 213.  
*Scop. carn.* 557.  
Habitat in Anglia frequens.  
Antennae mihi omnes setaceae.
89. *P. seticornis*, alis rotundatis, niveis, puncto medio fusco margineque nigro punctato. *punctata.*  
Habitat in Anglia.  
*Corpus niveum, immaculatum. Antennae subtus rufae.*  
*Alae albae, puncto medio atro. Margo alarum litura obsoleta fusca punctisque septem nigris. Posticae albae, immaculatae.*
90. *P. seticornis*, alis flavissimis: fascia lata, fusca, retrorsum dentem exserente. *sociata.*  
*Harris Inf. tab.*  
Habitat in Anglia.  
*Parva. Corpus flavescens. Alae rotundatae, incumbentes. Anticae flavae, fascia obsoleta baseos, alia latior, saturatior, in medio dentem retrorsum exserens, apice litura fusca maculaque cinerea. Posticae albae.*
91. *P. seticornis*, alis virescentibus: anticis fasciis duabus purpureis. *Linn. Fn. Sv.* 1302. *purpurata.*  
Habitat in Europa.  
Affinis *P. purpurariae*: attamen distincta.
92. *P. seticornis*, alis niveis: strigis undatis, obscurioribus, margine postico nigro punctato. *immunita.*  
*Phalaena immunitata seticornis, alis albis, concoloribus: strigis pallidis, puncto margineque postico nigro punctato. Linn. Syst. Nat.* II. 871. 264. *Fn. Sv.* 1288.  
*Clerk. phal. tab. 6. fig. 12.*

Phalaena seticornis, spirilinguis, alis patentibus, albidis, atomis cinerafcentibus et fascia undata, ferruginea. *Geoff. Inf.* 2. 140. 63?

Habitat in Anglia.

*cingulata.* 93. P. seticornis, alis omnibus fuscis: striga nivea. *Linn. Syst. Nat.* 11. 874. 280. *Fn. Sv.* 1303.  
*Clerk. phal.* tab. 2. fig. 10.

*niveata.* 94. P. seticornis, alis striatis, niveis, immaculatis.

Habitat in America.

Statura sequentis, at duplo major. Tota nivea, oculis brunneis. Alae immaculatae, venis elevatis striatae.

*cinctata.* 95. P. seticornis, alis niveis: anticis costa ferruginea.

Habitat in America.

Corpus cum alis niveum. Palpi et costa alarum antecarum ferruginei.

*sticticata.* 96. P. seticornis, alis concoloribus, rufis: margine nigro, albo punctato.

Habitat in Africa. *Drury.*

Antennae nigrae, fronte fulva. Thorax niger, punctis tribus dorsalibus albis. Abdomen supra fuscum, albo punctatum, subtus flavum. Alae oblongae, concolores, rufae, margine postico nigro, linea punctorum alborum.

*capitata.* 97. P. seticornis, cinerea, capite thoracis alarumque margine basi ferrugineis.

Habitat in India. *Koenig.*

Statura P. urticatae.

*aestuata.* 98. P. seticornis, cyaneo-nigra, albo maculata.

Phalaena aestuata seticornis, alis fuscis, concoloribus, maculis albis oblongis, coadunatis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 867. 241. *Mus. Lud. Ulr.* 397.

Habitat in Indiis.

Statura P. urticatae, at paulo major. Thorax et abdomen cyanea, striis quatuor albis.

*argentata.* 99. P. seticornis, alis apice flavis: anticis strigis duabus argenteis, posticis macula quadruplici nigra.

Habitat in China. *Mus. Monson.*

Statu-

Statura et magnitudo P. urticatae. Alae anticae basi argenteae, macula magna triangulari fusca ad marginem crassiorem. Apex alae late flavus, strigis duabus argenteis, quae ad marginem crassiorem macula fusca terminantur. Posticae alae argenteae, apice flavescentes, maculis quatuor parvis approximatis, nigro-aeneis.

100. P. seticornis, alis flavis: maculis margineque postico fuscō-ferrugineis. *sulphurata.*

Habitat in Indiis. *Mus. Monson.*

Duplo major P. aestuata. Corpus flavum, gula albicante caudaque fusca. Alae concolores, flavissimae, maculis fuscis irroratae. Margo posticus late fuscus, qui tamen color haud ad marginem crassiorum extenditur.

101. P. seticornis, alis albis, fuscō fasciato-maculatis, *urticata.*  
thorace anoque flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 873. 272.  
*Fn. Sv.* 1297.

Phalaena seticornis, spirilinguis, alis patentibus, albo fuscōque nebulosis, ano flavo. *Geoff. Inf.* 2. 135.

Phalaena minor, alis oblongis ex albo et coeruleo nigrante variis, ad exortum flavis. *Raj. Inf.* 222. 73.  
*Goed. Inf.* 2. tab. 13.

*Periv. Gazoph.* tab. 32. fig. 8.

*Albin. Inf.* tab. 37. fig. 60.

*Reaum. Inf.* I. tab. 49. fig. 17. 18.

*de Geer Inf.* I. tab. 28. fig. 18. 19.

*Roef. Inf.* I. *phal.* 4. tab. 14.

*Harr. Inf.* 13. tab. 6. fig. a-p.

*Schaeff. Elem.* tab. 98. fig. 4.

Habitat in urtica, Pomona.

Larva 16 poda, nuda, albida, dorso fuscō, collari bipunctato. Latet intra folium urticae, quod con-torquet. Conjungit Geometras *Linnaei* cum pyra-lidibus.

Puppa folliculata, brunnea.

102. P. seticornis, alis rotundatis, luteis: puncto ocellari margineque postico fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II.  
873. 273.

Habitat in Europa.

- hyalinata*. 103. *P. seticornis*, alis hyalino-albis, margine nigro cinctis, ano lutescente. *Linn. Syst. Nat.* II. 874. 279.  
Habitat in America, in Asia. *Koenig.*  
Parva. Abdomen cylindricum, niveum, ano valde barbato, barba nigra.
- potamo-gata*. 104. *P. seticornis*, alis cinereis, albo maculatis: anticis obsoletis, reticulatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 873. 275.  
*Fn. Sv.* 1299.  
*Reaum. Inf.* 2. tab. 32. fig. II.  
Habitat in Potamogetone natante.
- nymphaea-ta*. 105. *P. seticornis*, alis cinereis: omnibus conformiter albo maculatis, reticulatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 873. 274.  
*Fn. Sv.* 1298.  
Phalaena minor, alis utrisque albo et fusco colore variis. *Raj. Inf.* 227. 87.  
Habitat in Nymphaea, Lemma.
- lemnata*. 106. *P. seticornis*, alis niveis: posticis fascia terminali nigra; punctis quatuor albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 874. 278.  
*Fn. Sv.* 1301.  
Phalaena aquatica minima alba sive argentea. *Raj. Inf.* 205. 102.  
*Reaum. Inf.* 2. tab. 12. fig. 14. 15.  
*Harris. Inf.* 15. tab. 7. fig. 1 — p.  
Habitat in Lemna aliisque plantis aquaticis.
- perspecta-ta*. 107. *P. seticornis*, alis anticis griseis, hyalino maculatis: posticis hyalinis; margine flavo, hyalino maculato.  
Habitat in India orientali. *Koenig.*  
Magnitudo *P. urticatae*. Antennae corpore longiores.  
Alae anticae fuscae, maculis 8 s. 9 sparsis, albo-fenestratis. Posticae fenestratae, margine postico flavescente et in hoc margine maculae duae hyalinae, annulo fusco cinctae: subtus concolores, at pallidiores.
- indicata*. 108. *P. seticornis*, alis flavis: anticis strigis tribus, duabus undatis, fuscis.  
Habitat in India orientali. *Muf. Tortianum.*  
Parva, tota flava, solis strigis tribus alarum anticarum, duabus posticarum obliquis, fuscis. Alae subtus apice fulcescentes.

109. *P. seticornis*, alis albis: strigis plurimis fuscis. *derogata*:  
 Habitat in India orientali. *Koenig*.  
*Corpus album*, oculis nigris. Alae omnino albae,  
 strigis plurimis, quibusdam undatis, fuscis. Posticae  
 concolores, apice strigis fuscis.
110. *P. seticornis*, alis fusco flavoque variis: maculis *ejectata*.  
 hyalinis sparsis.  
 Habitat in India orientali. *Koenig*.  
*Parva*. Alae concolores, fusco flavoque variegatae  
 maculisque plurimis sparsis hyalinis.
111. *P. seticornis*, flava, alis albo-hyalinis: strigis flavis *fenestrata*.  
 numerosis, subanostomosantibus.  
 Habitat in America.  
*Parva*: statura *P. lemnatae*. Alae omnes hyalinae,  
 strigis sex margineque postico flavis.
- \* \* \* *Alis forcatis*.
112. *P. palpis recurvatis*, alis politis, lutescentibus: stri- *farinalis*.  
 gis repandis albis, basi apiceque glaucis.  
*Phalaena farinalis* palpis recurvatis, alis politis, fusce-  
 scensibus: strigis repandis albidis, area interjecta  
 glauca. *Linn. Syst. Nat.* II. 881. 327. *Fn. Sv.* 1348.  
*Clerk. phal. tab. 2. fig. 14.*  
 Habitat in farina, sedens cauda erecta.
113. *P. palpis recurvatis*, alis glaucis: strigis duabus fuscis, *glaucina-*  
*remotis*. *Liun. Syst. Nat.* II. 881. 328. *Fn. Sv.* 1349. *lis*.  
*Clerk. phal. tab. 3. fig. 4.*  
 Habitat in Europa.
114. *P. palpis brevioribus*, antennis pectinatis, femori- *barbalis*.  
 bus anticis barba porrecta. *Linn. Syst. Nat.* II. 881.  
 329. *Fn. Sv.* 1345.  
*Clerk. phal. tab. 5. fig. 3.*  
 Habitat in Europa.
115. *P. palpis porrectis*, longitudine antennarum pecti- *tentacula-*  
 natarum, alis cinerascentibus: strigis tribus fuscis. *ris*.  
*Linn. Syst. Nat.* II. 881. 330. *Fn. Sv.* 1344.  
*de Geer Ins. I. tab. 5. fig. 1.*  
 Habitat in Europa.

*proboscidalis.* 116. P. palpis porrectis, approximatis, thorace longioribus, alis griseis, strigis ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 881. 331. *Fn. Sv.* 1346.

*Clerk. phal. tab. 5. fig. 4.*

Habitat in Europa.

*rostralis.* 117. P. palpis porrectis, thorace longioribus, alis subgriseis: punctis duobus muricatis lineaque apicis nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 881. 332. *Fn. Sv.* 1347.

*Roeß. Inf. 1. phal. 4. tab. 6.*

Habitat in carpino, humulo.

Larva nuda, 14 poda, viridis: strigis obliquis lineisque lateralibus albis.

Puppa folliculata, brunnea, obtusa, antice carinata.

*nemoralis.* 118. P. palpis recurvatis, alis griseis: strigis tribus fuscis; intermedia flexuosa.

Habitat in Angliae nemoribus.

Magnitudo P. farinalis. Palpi recurvati, porrecti, longitudine thoracis. Caput et thorax grisea, immaculata. Alae obscure griseae, striga anteriore recta, secunda flexuosa, tertia obliqua, ab angulo ani ad apicem alae ducta. Lunula parva fusca in medio inter primam et secundam strigam. Postice terminantur alae striga tenuissima fusca. Subtus puncto, striga margineque punctato.

*palpalis.* 119. P. palpis porrectis, thorace longioribus, alis griseis: posticis margine crassiori albo.

Habitat in Anglia.

Valde affinis P. tentaculari, at alae anticae omnino immaculatae et antennae haud pectinatae.

*forficalis.* 120. P. alis glabris, pallidis: strigis obliquis ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 882. 334. *Fn. Sv.* 1352.

Phalaena seticornis, spirilinguis, triangularis, alis deflexis, flavis: lineis duabus ferrugineis, obliquis. *Gesff. Inf. 2.* 166. 111.

*Reaum. Inf. 1. tab. 16. fig. 13. 14.*

Habitat in Europae brassica.

121. P. albis glabris, pallidis, subfasciatis: subtus fusco- *verticalis*.  
undatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 882. 335. *Fn. Sv.* 1353.

Phalaena seticornis, spirilinguis, triangularis, alis  
deflexis, albo-virescentibus, subtus lineis duabus  
transversis, nigris. *Geoff. Inf.* 2. 166. 112.

Phalaena parva ex albido sublutea, alis exterioribus  
duplici linea transversa nigricante oblique ducta  
notatis. *Raj. Inf.* 207. 48.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 19. fig. 1—5.

*Roef. Inf.* 1. *phal.* 4. tab. 4.

*Wilks pap.* 24. tab. 3. a. 16.

Habitat in urtica.

Larva 16 poda, pilosa, capite pedibusque flavis.

Puppa brunnea, segmentis tribus ultimis denticulo  
notatis.

122. P. palpis recurvatis, alis fuscis, nitidis: anticus *fuscalis*.  
puncto rubocellari niveo.

Habitat in India orientali. *Muf. Tottianum.*

Alae omnes fuscae, nitidae, anticus strigis duabus ob-  
foletis, obscurioribus, quarum anterior ad margi-  
nem crassiorem terminatur puncto albo.

123. P. palpis recurvatis, alis cinereis: linea dorsali *dorsalis*.  
fascia postica fuscis.

Habitat in Brasilia. *Muf. Banks.*

Palpi recurvati, apice acuti. Alae anticae supra  
cinereae, linea magna dorsali abbreviata fascia-  
que postica fuscis. Puncta duo minutissima in me-  
dio alae. Posticae, uti omnes, subtus cinereae,  
immaculatae.

124. P. palpis recurvatis, alis cinereis: margine crassiori *pinguina*.  
nigro, subfasciato. *Linn. Syst. Nat.* II. 882. 336. *lis.*

*Fn. Sv.* 1350.

*Roland. Act. Holm.* 1755. p. 51. tab. 2.

Habitat in pinguibus, butyro, lardo aliisque. Fre-  
quens intra domos et culinas, rarius in ventriculo  
humano, inter vermes pessima, expellenda lichene  
cumatili. *Linn.*

- secalis.* 125. P. alis griseo-fuscis, striatis: macula reniformi, A latino inscripta. *Linn. Syst. Nat.* II. 882. 338.  
*Roland. Act. Holmens.* 1752. 62.  
 Habitat intra secales culmos, eos intra vaginam exedens, ex uno in alterum migrans, unde spicae albae caesiae. *Rol.*
- sanguinalis.* 126. P. alis flavis: fasciis duabus sanguineis; priore exterius dilatata, perforata. *Linn. Syst. Nat.* II. 882. 339.  
 Habitat in Europa.  
 Major P. purpurali.
- stictalis.* 127. P. alis griseis: striga marginali flava margineque nigro, ciliari. *Linn. Syst. Nat.* II. 883. 340. *Fn. Sv.* 1354.  
 Habitat in Europa.
- fascialis.* 128. P. palpis recurvatis, alis fuscis: fasciis duabus flavis.  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
 Parva. Palpi recurvati, acuti. Caput flavum. Thorax fuscus, antice flavescens. Alae fuscae, anticis fasciis duabus latis, flavis, anteriore ad basin, posteriore versus apicem. Alae posticae immaculatae.
- recurvalis.* 129. P. palpis recurvatis, alis fuscis: anticis fasciis duabus albis; posteriore abbreviata.  
 Habitat in India orientali. *Mus. Tottianum.*  
 Parva: statura P. purpuralis. Caput flavescens. Thorax fuscus. Alae omnes fuscae, anticis fascia media, quae marginem exteriorem haud attingit et altera postica brevissima ad marginem crassiorem. Posticae fuscae, fascia in medio.
- punctalis.* 130. P. alis subferrugineis: striga flava, margine crassiori albo punctato.  
 Habitat in Sueciae nemoribus.  
 Alae subferrugineae, striga obliqua flava et punctis 5. f. 6. albis in margine crassiori.
- purpuralis.* 131. P. alis purpurascientibus: omnibus luteo maculatis.  
*Linn. Syst. Nat.* II. 883. 342. *Fn. Sv.* 1356.  
 Habitat in Europa frequens.
- costalis.* 132. P. alis purpurascientibus: maculis duabus costalibus margineque postico flavis.  
 Habitat in Anglia.

Statura P. purpuralis. Caput luteum. Thorax et abdomen purpurascentia. Alae purpurascentes, strigis duabus tenuissimis flavis, quae ad marginem craqio-rem macula flava terminantur. Margo posticus cilia-ris, flavus. Subtus cinereo flavoque variegatae.

## 133. P. alis atris: omnibus maculis duabus niveis.

*atralis.*

Phalaena 8 maculata seticornis, alis nigris: omnibus maculis duabus albis, rotundatis. *Linn. Mant.* 540. Habitat in Anglia.

Statura et magnitudo P. purpuralis. Abdomen nigrum, albo annulatum.

## 134. P. alis flavis: fascia purpurea.

*dentalis.*

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Parva. Alae incumbentes, flavissimae, fascia lata intus dentata, purpurea.

146. PYRALIS. *Palpi* nudiusculi, basi cy-  
lindrici, medio dilatato-  
ovati, apice subulati.

*Lingua* membranacea.

*Antennae* setaceae.

## 1. P. alis albis, macula communi fusca.

*Bankiana.*

Habitat in Anglia.

Magna in hoc genere et statura fere Noctuae. Corpus pallidum, oculis solis nigris. Alae deflexae, striae, macula magna transversali fusca in medio dorsi. Alae subtus obscuriores. Palpi ferruginei.

## 2. P. alis denudatis, albidis: strigis duabus punctoque medio obsolete fuscis.

*mundana.*

Phalaena mundana. *Linn. Syst. Nat.* II. 812. 17. *Fn.*  
*Sv.* 1343.

Habitat in Europa.

3. P. alis anticis viridibus: strigis duabus obliquis flavi-  
cantibus, posticis albis.*prasinana.*

Phalaena prasinana alis superioribus viridibus: strigis duabus obliquis flavis, margine postico, antennis pedi-  
busque fulvis. *Linn. Syst. N.* II. 875. 285. *Fn. Sv.* 1306.

*Phalaena spirilinguis*, humeris latis, alis viridibus, linea dupli transversa albida. *Geoff. Inf.* 2. 172. 124.

*Petiv. Gazoph.* tab. 7. fig. 11.

*Alb. Inf.* tab. 31.

*Roef. Inf.* 4. tab. 10.

*de Geer Inf.* 1. tab. 3.

*Reaum. Inf.* 1. tab. 39. fig. 13. 14.

*Wilks pap.* 6. tab. 1. a. 13.

*Poda. Inf.* 93. tab. 2. fig. 8.

*Ammiral. Inf.* tab. 2. fig. 1.

Habitat in alno, quercu.

Variat antennis pedibusque albis et fulvis.

Larva viridis: linea laterali flavicante, segmento secundo dorsi tuberculato.

Puppa viridis: linea dorsali atra.

*viridana.* 4. P. alis rhombeis: anticis viridibus, immaculatis.

*Phalaena viridana.* *Linn. Syst. Nat.* II. 875. 266.

*Phalaena seticornis*, *spirilinguis*, humeris latis, antennis flavescensibus, alis dilute fuscis. *Geoff. Inf.* 2. 171. 123.

*Frisch. Inf.* 3. tab. 8.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 18. fig. 6. 7.

*Roef. Inf.* 1. *phal.* 4. tab. 1.

*Wilks pap.* 4. tab. 1. n. 5.

Habitat in quercu.

Larva nuda, 16 poda, viridis, nigro punctata: pedibus posticis flavis.

Puppa brunnea: postice stylo bifido.

*clorana.* 5. P. alis rhombeis: anticis viridibus, margine albo.

*Phalaena clorana.* *Linn. Syst. Nat.* II. 876. 287. *Fn. Sv.* 1308.

*Roef. Inf.* 1. *phal.* 4. tab. 3.

Habitat in salicibus.

Praecedenti valde affinis.

*literana.* 6. P. alis rhombeis: anticis viridibus, characteribus atris.

*Phalaena literana.* *Linn. Syst. Nat.* II. 876. 288.

Habitat in Germania.

*uncana.* 7. P. alis fuscis: margine exteriori albido; medio ramum recurvum album introrsum exferente.

*Phalaena uncana.* *Linn. Syst. Nat.* II. 875. 284. *Fn.*  
*Sv.* 1305.

*Clerk. phal.* tab. 3. fig. 7.

Habitat in Europa.

Statura fere Noctuae.

8. *P. alis fuscis: strigis cinereis, sesquitertiis.* *Hattorfia-*  
*Habitat in Germania.* *de Hattorff.* *na.*

Statura *P. rosanae.* Alae depressae, planae, fuscae.  
 Striga parva, cinerea ad basin, altera antice et tertia  
 postice, omnes obliquae cinereae. In medio alae  
 inter secundam tertiamque strigam stigmata duo ob-  
 scuriora. Posticae fuscae.

9. *P. alis anticis testaceo-reticulatis: fascia grisea, ob-* *rosana.*  
*liqua.*

*Phalaena Rosana.* *Linn. Syst. Nat.* II. 876. 293. *Fn.*  
*Sv.* 1314.

*Merian. Eur.* I. p. 7. tab. 19.

Habitat in rosa, berberide.

10. *P. alis cinereo, nigro argenteoque tenuissime fascia-* *decussana.*  
*tis: apice macula subocellari cinerea.*

Habitat Lipsiae.

Basis alarum constat strigis tenuissimis nigris, cinereis  
 argenteisque a se invicem interruptis. In medio,  
 fascia lata obscurior, nigro argenteoque maculata.  
 Postice macula magna cinerea, quam linea duplex  
 argentea includit. Posticae fuscae.

11. *P. alis anticis testaceis: litura communi ferruginea.* *ameriana.*

*Phalaena Ameriana.* *Linn. Syst. Nat.* II. 877. 298.  
*Fn. Sv.* 1310.

*Reaum. Ins.* 2. tab. 18. fig. 6. 7.

Habitat in salice.

12. *P. alis anticis fuscis: maculis quatuor dorsalibus atro-* *maculana.*  
*ferrugineis.*

Habitat in Sveciae nemoribus.

Magna: tota obscure fusca, atomis cinereis irrorata.

Duo paria macularium atro-ferruginearum in dorso.

Subtus omnes, cinereac.

- fuscana.* 13. P. alis anticis fuscis, immaculatis.  
*Phalaena fuscana.* *Linn. Fn. Sv.* 1311.  
*Habitat in Europa.*
- xylosteana.* 14. P. alis anticis testaceis: fascia fusca.  
*Phalaena Xylosteana* alis superioribus testaceis, cruce  
 communi ferruginea. *Linn. Syst. Nat.* II. 876. 295.  
*Fn. Sv.* 1313.  
*Habitat in Europa.*
- ministrana.* 15. P. alis anticis testaceis: margine postico rufo, medio  
 litura ferruginea: lineola alba.  
*Phalaena ministrana.* *Linn. Syst. Nat.* II. 877. 300.  
*Fn. Sv.* 1131.  
*Clerk. phal.* tab. 2. fig. 12.  
*Habitat in Europa boreali.*
- Udmanni-* 16. P. alis cinereis: macula brunnea, communi, trans-  
*ana.* versata.  
*Phalaena Udmanniana.* *Linn. Syst. Nat.* II. 880. 322.  
*Fn. Sv.* 1332.  
*Habitat in Europa boreali.*  
*Sequenti nimis affinis.*
- Solandri-* 17. P. alis pallidis, albo-subfasciatis: macula communi  
*ana.* dorsali, ferruginea.  
*Phalaena Solandriana* alis superioribus pallidis, ma-  
 cula communi dorsali, ferruginea. *Linn. Syst. Nat.* II.  
 878. 310. *Fn. Sv.* 1327.  
*de Geer. Ins.* I. tab. 28. fig. 29. 30.  
*Habitat in betula.*  
*Macula ovata, communis, brunnea cingitur lineola*  
*alba. Margo posticus subfuscus.*
- Zoegana.* 18. P. alis flavis: puncto medio lituraque postica ferru-  
 ginea.  
*Phalaena Zoëgana* alis flavis, puncto medio ferrugineo:  
 postice ferrugineis, macula flava. *Linn. Syst. Nat.* II.  
 876. 289.  
*Clerk. phal.* tab. 4. fig. 4.
19. *Phalaena hamana* alis superioribus flavis, puncto litu-  
 raque postica hamata ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II.  
 876. 290. *Fn. Sv.* 1309.

*Clerk. phal.* tab. 4. fig. 47.

Habitat in Europa boreali.

19. P. alis ex albido - cinereis: postice macula arcuata, *cruciana*: ferruginea.

Phalaena cruciana. *Linn. Syst. Nat.* II. 880. 323. Fn.  
Sv. 1333.

Habitat in Europa.

20. P. alis anticis fuscescentibus: margine exteriori bae- *laetana*: seos niveo, nigro punctato.

Habitat in Sueciae nemoribus.

Media. Caput et thorax nivea. Alae anticae fuscescentes, albido submaculatae. Margo exterior bae- seos late niveus, punctis tribus parvis nigris. Ma- cula brunnea, ad apicem alae lineolis parvis albis. Margo posticus dimidiato - albus.

21. P. alis fuscis: macula communi dorsali rhombea, alba. *Brunni- chana*.  
Phalaena Brunnichana. *Linn. Syst. Nat.* II. 880. 319.

Habitat in Europa.

Margo alarum exterior albo submaculatus, posticus paulo rufescens.

22. P. alis luteis: fasciis tribus arcuatis maculaque disci *arcuana*. atra; punctis tribus argenteis.

Phalaena arcuana alis luteis: fasciis tribus arcuatis, macula nigra tripunctata lineolisque duabus argenteis. *Linn. Syst. Nat.* II. 877. 296. Fn. Sv. 1317.

*Clerk. phal.* tab. 10. fig. 8.

Habitat in Europa.

Lineolae tres argenteae ad basin alarum.

23. P. alis anticis luteis: characteribus J. L. thoraceque *Lecheana*. argenteis.

Phalaena Lecheana. *Linn. Syst. Nat.* II. 877. 301. Fn.  
Sv. 1318.

*Clerk. phal.* tab. 10. fig. 2.

Habitat in Europae pado.

24. P. alis anticis flavissimis, venis sanguineis, reticu- *Christiernana*. latis.

Phalaena Christiernana. *Linn. Syst. Nat.* II. 877. 303.

*Schaeff. Icon.* tab. 2. fig. 12.

Habitat in Europa.

- avellana.* 25. P. alis anticis testaceis: fasciis fuscis, sesquitertiis.  
 Phalaena avellana. *Linn. Syst. Nat.* II. 877. 297. *Fn.*  
*Sv.* 1316.  
 Habitat in corylo, pyro.
- Hastiana.* 26. P. alis anticis fuscis: fascia antrorsum obliqua, alba.  
 Phalaena Hastiana. *Linn. Syst. Nat.* II. 878. 311. *Fn.*  
*Sv.* 1328.  
*Clerk. phal.* tab. 2. fig. 7.  
 Habitat in salice.
- Lediana.* 27. P. alis fuscis: fasciis duabus rubro - argenteis, poste-  
 steriore puncto intruso.  
 Phalaena Lediana. *Linn. Syst. Nat.* II. 879. 313. *Fn.*  
*Sv.* 1330.  
*Clerk. phal.* tab. 10. fig. 12.  
 Habitat in Europae borealis ledo.
- Schalleri-*  
*ana.* 28. P. alis canis: macula marginali ferruginea.  
 Phalaena Schalleriana alis canis; macula laterali ferru-  
 ginea, apicem alae attingente. *Linn. Syst. Nat.* II.  
 879. 315.  
 Habitat in Europa.  
 Minor. Puncta aliquot muricata ad basin alae anticae.
- Modeeria-*  
*na.* 29. P. alis anticis flavescentibus: macula marginali po-  
 sterius fusca. *Linn. Syst. Nat.* II. 880. 321. *Fn.* *Sv.* 1331.  
 Habitat in Europa boreali.  
 Caput et thorax ferruginea. Alae anticae flavae, po-  
 sticae albae.
- Schreberi-*  
*ana.* 30. P. alis anticis griseis: macula marginali trigona, alba.  
 Phalaena Schreberiana. *Linn. Syst. Nat.* II. 879. 316.  
*Fn.* *Sv.* 1338.  
 Habitat in Europa boreali.  
 Maior P. Holmiana.
- Holmiana.* 31. P. alis anticis luteo - ferrugineis: macula marginali  
 trigona, alba.  
 Phalaena Holmiana. *Linn. Syst. Nat.* II. 878. 308. *Fn.*  
*Sv.* 1325.  
*Clerk. phal.* tab. 10. fig. 7.  
 Habitat in Pomonae arboribus.

32. P. alis anticis flavis: fascia obliqua testacea macula- *gnomana*.  
que postica marginali ferruginea.  
Phalaena gnomana. *Linn. Syst. Nat.* II. 876. 294. *Fn.*  
*Sv.* 1337..  
*Clerk. phal.* tab. 4. fig. 13.  
Habitat in Europa.
33. P. alis anticis ferrugineis, fusco maculatis reticula- *oporana*.  
tisque.  
Phalaena oporana. *Linn. Syst. Nat.* II. 876. 292. *Fn.*  
*Sv.* 1315.  
*Wilks pap.* 17. tab. 2. a. 4.  
Habitat in Pomonae arboribus.  
Apex alae prominet. Posticae antice flavae, postice  
fuscæ.
34. P. alis anticis canis: atomis nigris sparsis: posticis *Logiana*.  
exalbidis.  
Phalaena Logiana. *Linn. Syst. Nat.* II. 879. 317. *Fn.*  
*Sv.* 1336.  
*Clerk. phal.* tab. 10. fig. 3.  
Habitat in Europa boreali.
35. P. alis anticis niveis: subtus fuscis.  
Phalaena Govana. *Linn. Syst. Nat.* II. 879. 318. *Fn.* *Govana*.  
*Sv.* 1342.
36. P. alis virescentibus, scabris. *squamana*.  
Habitat in Anglia. *Mus. Monson.*  
Statura P. schallerianæ, at paulo longior. Alae anticae  
virides, squamis hinc inde elevatis scabrae, quæ  
in medio fere fasciam constituunt. Posticae cinereæ.
37. P. alis subcaudatis, flavis, fusco - reticulatis fasciaque  
lata fuscæ, margine crassiori emarginato. *emarginata*.  
Habitat in Anglia. *Lee.*  
Parva. Alae flavæ, strigis plurimis fuscis reticulatae.  
Postice fascia fuscæ, et in hac fascia emarginatura  
marginis crassioris. Apex alae excurrit in dentem  
obtusum.
38. P. alis subcaudatis, griseis: margine interiori fulvo, *caudana*.  
exteriori emarginato.  
Habitat in Anglia.

*Prae-*

Praecedenti valde affinis, at alae griseae, immaculatae, sola striga fulva marginis tenuioris.

*quercana.* 39. P. alis anticis flavis: maculis duabus costalibus sulphureis.

Habitat in Saxoniae quercu.

Media. Antennae albae. Caput et thorax cinerea. Alae anticae flavescentes, punctis duobus centralibus parvis, fuscis; posteriore maiore, oblongo. Margo crassior, macula baseos sulphurea et alia in medio subquadrata. Margo posticus laete sulphureus, striga terminali purpurascente. Subtus omnes exalbidae.

*ocellana.* 40. P. alis cinereis: litura media sanguinea; puncto albido.

Habitat in Anglia. *Mus. Banks.*

Media. Corpus cinereum. Alae anticae cinereae, litura media oblonga, sanguinea, in qua postice punctum parvum, album. Margo posticus nigro punctatus. Alae posticae albae.

*Forskäb-leana.* 41. P. alis anticis luteis, ferrugineo - reticulatis: medio litura fuscescente.

Phalaena Forskähleana. *Linn. Syst. Nat.* II. 878. 304.  
*Fn. Sv.* 1319.

*Clerk. phal. tab. 10. fig. 2. 6.*

Habitat in Europae rosa.

*Loeflingiana.* 42. P. alis anticis flavis, luteo - reticulatis: duplii XX notatis.

Phalaena Loeflingiana. *Linn. Syst. Nat.* II. 878. 305.  
*Fn. Sv.* 1323.

*Clerk. phal. tab. 10. fig. 6.*

Habitat in Europa.

Praecedenti affinis.

*Bergmanniana.* 43. P. alis anticis luteis, flavo punctatis: fasciis quatuor argenteis; tertia bifida.

Phalaena Bergmanniana. *Linn. Syst. Nat.* II. 878. 307.  
*Fn. Sv.* 1314.

*Clerk. phal. tab. 10. fig. 5.*

Habitat in Europa.

44. P. alis albidis: anticis macula medio laterali, fusco-ferruginea. *Alstroemiana.*  
*Phalaena Alstroemiana. Linn. Syst. Nat. II. 879. 314.*  
*Fn. Sv. 1335.*  
*Cerk. phal. tab. 10. fig. 1.*  
*Habitat in Europa.*
45. P. alis anticis nigricantibus: anticis pari punctorum albidorum. *Fabriciana.*  
*Phalaena Fabriciana. Linn. Syst. Nat. II. 880. 324.*  
*Habitat in pruno spinosa, in sepibus frequens.*
46. P. alis ferrugineo-fuscis, argenteo punctatis maculaque dorsali flavicante. *Convagana.*  
*Habitat in Angliae nemoribus, capta d. XXVI Jun. prope Oxoniam.*  
*Minor praecedente. Caput et thorax cinerea. Abdomen fuscum. Alae anticae fuscae, punctis numerosis argenteis, sparsis in disco. Ad marginem crassiorum maculae duae parvae flavescentes, fusco punctatae. In medio dorsi macula maior communis flava. Posticae nigricantes.*
47. P. alis fulvis, apice nigris, fulvo maculatis. *Koenigina.*  
*Habitat in India orientali. Koenig.*  
*Parva. Antennae breves. Alae fulvae, nitidae, apice fuscae, atomis fulvis. Subtus obscurae.*
48. P. alis fuscis: maculis duabus aureis. *aurana.*  
*Habitat in Anglia. Mus. Banks.*  
*Antennae breves, fuscae. Corpus fuscum. Alae fuscae, nitentes, antice macula magna communis et postice macula distincta: fulvo-aureis.*
49. P. alis nebulosis: postice macula rubra, aurea. *pomana.*  
*Phalaena pomonella. Linn. Syst. Nat. II. 892. 401. Fn. Sv. 1418.*  
*Frisch. Inf. 7. tab. 13.*  
*Roeßl. Inf. 1. phal. 4. tab. 10.*  
*Reaum. Inf. 2. tab. 40. fig. 9. 10.*  
*Wilks p.p. 5. tab. 1. a. 9.*  
*Habitat intra Europae poma.*  
*Larva, 15 poda, nuda, rufa, capite nigro.*  
*Puppa folliculata, brunnea.*

*rivellana*. 50. P. alis fuscis: fasciis tribus cinereis; secunda introrsum bifida.

Habitat in Sueciae nemoribus.

Media. Alae anticae fuscae, fasciis tribus cinereis punctoque costali fusco. Fascia secunda ad marginem tenuiorem bifida.

*unguicu-na*. 51. P. alis cinereis, subfasciatis, apice recurvato acuminateis, margine exteriore postico transverse albostriatis.

*Phalaena unguicella*. *Linn. Syst. Nat.* II. 887. 365. *Fn. Sv.* 1382.

*Clerk. phal.* tab. 12. fig. 7.

Habitat in Europa.

*dorsana*. 52. P. alis fuscis: arcu dorsali albo apiceque strigis argenteis.

Habitat in Lipsiae hortis.

Magnitude praecedentis. Alae anticae fuscae, arcu in medio dorsi albo. Margo exterior albo maculatus et postice strigae duae obliquae, argenteae, quae ad angulum ani coeunt. Posticae fuscae, basi albicans.

*strigana*. 53. P. alis flavescensibus, apice strigis ferrugineis argenteisque: puncto triplici atro.

Habitat in Sueciae nemoribus.

Alae flavescentes. Apex in primis ad marginem crassiorem strigis ferrugineis et argenteis variegatus. Alae posticae cinereae.

*Cynosba-na*. 54. P. alis anticis cinereis, apice albis.

*Phalaena Cynosbatella*. *Linn. Syst. Nat.* II. 887. 368. *Fn. Sv.* 1379.

*de Geer. Inf.* I. tab. 34. fig. 4. 5.

Habitat in rosae gemmis.

*resinana*. 55. P. alis fuscis, argenteo-subfasciatis.

*Phalaena resinella*. *Linn. Syst. Nat.* II. 892. 406. *Fn. Sv.* 1423.

*Frisch. Inf.* 10. tab. 9.

*de Geer. Inf.* I. tab. 33. fig. 12. 13.

*Roel. Inf.* I. *phal.* 4. tab. 16.

Habitat

Habitat intra resinac glomerem exsudantem e vulnere  
ramorum pini.

Larva 16 poda, nuda, lutea, capite brunneo.

Puppa folliculata, fusca.

56. P. alis depresso, griseis: anticis subtus fuscis.

Phalaena Heracleana elinguis, recurvicornis, alis gri-  
feis, puncto fusco, thorace flavo. *Linn. Syst. Nat.* II.  
880. 326. *Fn. Sv.* 1334.

*Heraclea-*  
*na.*

*Reaum. Inf.* 2. tab. 6. fig. 1 — 4.

*de Geer. Inf.* 1. tab. 29. fig. 6. 7.

*Scharff. Icon.* tab. 2. fig. 3. 4.

Habitat in umbellis plantarum umbelliferarum, in  
primis Heraclei, contortis destruetisque floribus,  
caules ex alis foliorum penetrans. *Linn.*

57. P. alis depresso, fuscis, capite thoraceque niveis.

*depressa-*  
*na.*

Habitat in Suecia.

Alae fuscae, immaculatae.

147. TINEA. *Palpi* quatuor inaequales:

*antici* porrecti, cylindrici;  
*postici* breviores.

*Antennae* setaceae.

1. T. alis griseis, postice emarginatis: dorso canalicu-  
lato, fusco.

*cerella.*

Phalaena cereana alis griseis: arcu dorsali complanato  
exasperato carinatis, scutello apice albo. *Linn. Syst.*  
*Nat.* II. 874. 282.

*Reaum. Inf.* 3. tab. 19. fig. 14. 15.

*Blom. A&E. Holm.* 1764. tab. 2.

Habitat in apum alvearibus, ceram depascens.

Major statura T. colonellae, at brevior, crassior.

Caput cinereum, antennis filiformibus. Thorax  
cinereus, macula dorsali oblonga, fusca. Alae  
obscure griseae, dorso communi valde depresso,  
fusco. Alarum apex emarginatus, fuscus.

2. T. alis oblongis, cinereis: punctis duobus atris ante  
strigam curvam, undulatam, obsoletam.

Phalaena colonella. *Linn. Syst. Nat.* II. 883. 346. *Fn.*  
*Sv.* 1358.

*Clerk.*

*Clerk. phal.* tab. 3. fig. 8.

Habitat in Europa.

Puncta duo atra ad marginem crassiores.

*sociella.* 3. *T.* alis oblongis, cinereis, antice albidis, postice pallidis: striga undata, nigra.

*Phalaena sociella* alis oblongis, cinereis, antice albidis; postice striga pallida. *Linn. Syst. Nat.* II. 883. 345.  
*Fn. Sv.* 1349.

*Clerk. phal.* tab. 3. fig. 11.

Habitat in favis alpis lapidariae.

*evonymella.* 4. alis anticis niveis: punctis 50 nigris.

*Phalaena evonymella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 885. 350.

*Fn. Sv.* 1363.

*Tinea* alis superioribus albis, punctis nigris, inferioribus fuscis. *Geoff. Inf.* 2. 183. 4.

*Frisch. Inf.* 3. tab. 16.

*Merian. Europ.* 2. tab. 2.

*Alb. Inf.* tab. 60. fig. A. C.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 13. fig. 12. 13.

*Roeß. Inf.* 1. *phal.* 4. tab. 8.

*Wilks pap.* 4. tab. 1. a. C.

*Sultz. Inf.* tab. 16. fig. 99.

Habitat in evonymo, pado, sorbo.

Larva gregaria, nuda, flava, nigro punctata, subtentorio communi.

Pupa folliculata, brunnea.

*padella.* 5. *T.* alis anticis, plumbeis: punctis 20 nigris.

*Phalaena padella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 885. 351. *Fn. Sv.* 1364.

*Reaum. Inf.* 2. tab. 12. fig. 5 — 9.

*Roeß. Inf.* 1. *phal.* 4. tab. 7.

*Harr. Inf.* 7. tab. 3. fig. k. m.

Habitat in Pomonae arboribus.

Larva gregaria, nuda, grisea: segmentis utrinque puncto atro, subtentorio communi.

Pupa folliculata, flavicans.

*pusiella.* 6. *T.* alis anticis albis: punctis lineaque communi dentata, atra, posticis nigris.

*Phalaena pusiella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 884. 347.

Habitat

Habitat in Germaniae arvis.

Statura praecedentium.

7. T. alis anticis albis: linea communi sinuato - repanda maculisque lateralibus nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 885. 352. *Fn. Sv.* 1365.  
*Clerk. phal.* tab. 10. fig. 14.

Habitat in Europa.

8. T. alis niveis: fascia punctisque numerosis fuscis. *cornella.*

Habitat in Saxoniae corno.

Statura T. padellae, at minor. Antennae albo nigro-que variegatae. Alae anticae niveae, fascia in me-dio punctisque plurimis in primis ad marginem crassiorem et posticum fusco - purpureis. Posticae fuscae, immaculatae.

9. T. alis luteis: anticis punctis nigris, trifariis. *irrorella.*

*Phalaena irrorella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 885. 354. *Fn. Sv.* 1361.

*Clerk. phal.* tab. 4. fig. 5.

Habitat in Europa boreali.

10. T. alis supra luteis, immaculatis, subtus fuscis. *lutarella.*

*Phalaena lutarella* alis corporeque luteis, immacula-tis. *Linn. Syst. Nat.* II. 886. 355. *Fn. Sv.* 1360.

*Clerk. phal.* tab. 4. fig. 9.

Habitat in Europa.

11. T. alis supra albis, subtus luteis, interne fuscis. *mesomella.*

*Phalaena mesomella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 886. 356. *Fn. Sv.* 1362.

*Clerk. phal.* tab. 4. fig. 14.

Habitat in Europae gramine.

12. T. alis fusco - nebulosis: striga albida margineque po-stico albo. *Oxyacan-thella.*

*Phalaena oxyacanthella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 886. 357.

Habitat in crataego oxyacantha.

Striga undulata, albida in medio fere alae.

13. T. alis anticis flavis: maculis duabus albissimis; an-teriore oblonga, posteriore ovata. *Pinetella.*

*Phalaena pinetella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 886. 358. *Fn.*

*Sv.* 1368.

*Clerk. phal.* tab. 4. fig. 15.

Habitat in Europae pinetis

*pratella.* 14. T. alis anticis cinereis: linea albissima, postice ramosa, apice striis obliquis.

*Phalaena pratella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 886. 360. *Fn. Sv.* 1369.

*Clerk. phal.* tab. 3. fig. 14.

Habitat in pratis graminosis.

*pascuella.* 15. T. alis cinereis: linea albissima, margine postico nigro punctato.

*Phalaena pascuella* alis superioribus pallidis: linea maculisque duabus oblongis albissimis. *Linn. Syst. Nat.* II. 886. 359. *Fn. Sv.* 1367.

Habitat in pascuis.

*culmella.* 16. T. alis cinereis: linea unica albissima, abbreviata.

*Phalaena culmella* alis superioribus albidis, excavato-striatis: punctis nigris septem alisque nitentibus.

*Linn. Syst. Nat.* II. 886. 361. *Fn. Sv.* 1370.

*Phalaena minor* pascuorum. *Raj. Ins.* 229. 82.

*Reaum. Ins.* I. tab. 17. fig. 13. 14.

Habitat in Europae graminosis.

*argentella.* 17. T. argentea, antennis fusco-annulatis.

*la.* *Phalaena argentella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 895. 421. *Fn. Sv.* 1432.

Habitat in abiete.

*carnella.* 18. T. alis anticis flavis: lateribus sanguineis.

*Phalaena carnella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 887. 363.

Habitat in Germaniae pratis.

*nigrella.* 19. T. nigra, alis fuscis, abdomine rufo.

Habitat in Daniae nemoribus.

Corpus nigrum, abdominis lateribus apiceque rufis. Alae abdomine longiores; fuscae, immaculatae.

*cryptella.* 20. T. alis griseis: linea dimidiata albissima strigaque postica undata, argentea.

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Statura et magnitudo T. culmellae. Alae anticae griseae, argento parum nitentes. Linea albissima in medio

medio alae, quae tamen basin haud attingit. Margo exterior itidem albicat. Postice striga valde undata, argentea. Alae posticae, uti oinnes, subtus niveae, immaculatae.

21. *T. alis coerulescenti - cinereis: latere dorsali punctis salicella*,  
albis; thorace cristato.

*Phalaena Salicella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 887. 367. *Fn.*  
*Sv.* 1378.

*Roef. Inf.* I. *phal.* 4. *tab.* 9.

*Witts pap.* 5. *tab.* I. a. 10.

Habitat in falice.

Larva nuda, 16 poda, fusca, albo punctata.

Puppa antice nigra, postice brunnea.

22. *T. alis fuscis: maculis albissimis; anteriore falcata, foenella*,  
posteriore reniformi.

*Phalaena foenella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 888. 369. *Fn.*  
*Sv.* 1375.

*Clerk. phal.* *tab.* 2. *fig.* 13.

Habitat in Europa.

23. *T. alis nigris, postice albis, capite niveo.* *tapezella*.

*Tinea nigra, capite niveo, alis pone albis.* *Geoff. Inf.* 2.  
187. 13.

*Phalaena tapezella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 888. 371. *Fn.*  
*Sv.* 1414.

*Tinea vesivora maior.* *Raj. Inf.* 204. 98.

*Reaum. Inf.* 3. *tab.* 20. *fig.* 2. 4.

*Clerk. phal.* *tab.* 11. *fig.* 12.

23. *Tinea fusca, capite fusco, alis pone albidis.* *Geoff.*  
*Inf.* 2. 188. 14.

Habitat in tapetibus, pellibus, intra cylindros meatus  
rodens.

24. *T. alis canis: medio punto nigro, capite griseo.* *pellionella*.

*Phalaena pellionella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 888. 372. *Fn.*  
*Sv.* 1415.

*Phalaena plumbea, nitida, punto nigro in medio ala-*  
rum. *Geoff. Inf.* 2. 184. 6.

*Roef. Inf.* I. *phal.* 4. *tab.* 17.

*Reaum. Inf.* 3. *tab.* 6. *fig.* 12 - 16.

Habitat in vestimentis pilosis.

*Larva albicans, linea dorsali rubra, intra cucullum latitans.*

*Puppa flavescentia.*

*vestianella.* 25. *T. alis cinereis, costa albis: apicibus adscendentibus, plumosis.*

*Phalaena vestianella. Linn. Syst. Nat. II. 888. 370. Fn.*

*Sv. 1417.*

*Scopol. carn. 669.*

*Habitat in vestimentis, quae misere destruit.*

*sarcitella.* 26. *T. talis cinereis, thorace utrinque puncto albo.*

*Phalaena sarcitella. Linn. Syst. Nat. II. 888. 373. Fn.*

*Sv. 1416.*

*Roeßl. Inf. I. phal. 4. tab. 17.*

*Reaum. Inf. 3. tab. 6. fig. 9. 10.*

*Habitat in vestimentis, pellibus, intra folliculum occultata.*

*Parva: tota cinerea, nitida.*

*limbella.* 27. *T. alis ciliatis, exalbidis: limbo maculisque fuscis.*

*Habitat in Germaniae nemoribus.*

*Parva. Caput et thorax grisea. Alae valde ciliatae, anticae exalbidae, limbo fusco et punctis aliquot oblongis, nigris in disco. Posticae fuscae, immaculatae.*

*mellonella.* 28. *T. alis canis, postice purpurascens: striga alba, scutello nigro, apice candido.*

*Phalaena mellonella. Linn. Syst. Nat. II. 888. 375. Fn.*

*Sv. 1383.*

*Swamm. bibl. I. tab. 26. fig. 2.*

*Roeßl. Inf. 3. tab. 41.*

*Reaum. Inf. 3. tab. 19. fig. 7—9.*

*Habitat in apum alvearibus, angiportus favos penetrantes fruens.*

*Larva nuda, 16 poda, grisea, capite brunneo.*

*Puppa folliculata, brunnea.*

*cucullatella.* 29. *T. alis argenteis: arcu dorsali fusco.*

*la.* *Phalaena cucullatella alis albido-cinereis: antice striga nigra recurvata. Linn. Syst. Nat. II. 889. 376. Fn.*

*Sv. 1384.*

*Roeßl. Inf. I. phal. 4. tab. II.*

*Habitat*

Habitat in sorbo intra folliculum conicum, pilosum.  
 Larva pilosa, 14 poda, fusca: dorso albo maculato.  
 Puppa folliculata, obtusa, fusca.

30. T. alis rufis: strigis argenteis; intermediis bifidis. *arbutella.*

Phalaena Arbutella alis sanguineis: fasciis argenteis,  
 tenuissimis. *Linn. Syst. Nat. II. 889. 380. Fn. Sv. 1385.*  
 Habitat in Europae borealis uva ursi.

31. T. alis nigris: fasciis duabus albis, remotissimis, tessellatis. *tessella.*

Phalaena tessela. *Linn. Syst. Nat. II. 889. 381. Fn. Sv. 1430.*  
 Habitat in Europa.

Magna, fusca, fasciis duabus albis, atomis fuscis, irroratis.

32. T. alis cinereis: linea longitudinali fusca, palpis *bicostella.*  
 porrectis.

Phalaena bicostella alis lanceolatis, cinereo-albidis,  
 costa longitudinali, fusca, margine niveo. *Linn. Syst. Nat. II. 890. 387. Fn. Sv. 1438.*

*Clerk. phal. tab. 3. fig. 15.*

*Scopol. carn. 642.*

Habitat in Europa.

Palpi porrecti, fusi, longitudine fere antennarum.

Caput et thorax fusca, immaculata. Alae convolutae,  
 cinereae, in medio linea lata longitudinali, fusca.  
 Margo exterior albidiior.

33. T. alis anticis testaceis: linea longitudinali alba. *parenthe-*

Phalaena parenthesella. *Linn. Syst. Nat. II. 890. 384. sella.*  
*Fn. Sv. 1435.*

Habitat in Europa.

34. T. alis anticis linearibus, testaceis: punctis 4. fuscis. *punctella.*

Phalaena punctella. *Linn. Syst. Nat. II. 890. 386. Fn. Sv. 1337.*

Habitat in pomariis; sedens apicibus alarum inniti-  
 tur. *Linn.*

35. T. alis fusco-cinereis: lineola media fasciaque po-  
 sticae undatis, albis. *undella.*

Habitat in Germania.

Statura T. bicostellae. Alae obscure griseae, in medio  
 linea alba undata et postice fascia undata, alba.

*cinctella.* 36. T. alis nigris, anticis striga argentea.

Phalaena cinctella alis nigris, superioribus fascia linearis argentea, transversa. *Linn. Syst. Nat.* II. 891. 390. *Fn. Sv.* 1380.

Phalaena verticella. *Scop. Inf.* 651.

Habitat in Europa.

Sedens sese circumgyrat saepius circa idem punctum.

*leucatella.* 37. T. alis nigricantibus: fasciis duabus; posteriore obsoletiore capiteque albis.

Phalaena leucatella. *Linn. Syst. Nat.* II. 891. 391. *Fn. Sv.* 1444.

Habitat in Europa.

*strobilella.* 38. T. alis fusco argenteoque undatis: posticis fuscis; margine albo.

Phalaena strobilella. *Linn. Syst. Nat.* II. 892. 402. *Fn. Sv.* 1419.

*Clerk. phal. tab. 12. fig. 10.*

Habitat in abietis strobilis.

*fuscella.* 39. T. alis fusco - cinereis: punctis duobus dorsalibus nigris.

Phalaena fuscella. *Linn. Syst. Nat.* II. 893. 409. *Fn. Sv.* 1349.

Habitat in Europa.

Punctum marginale ad basin alarum et alterum ad medium marginis exterioris.

*cinerella.* 40. T. alis fusco - cinereis, nitidulis, immaculatis.

Phalaena cinerella alis fusco - cinereis, immaculatis, nitidulis, palpis corniformibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 891. 392. *Fn. Sv.* 1445.

Habitat in Europa.

*bractella.* 41. T. alis nigris: macula baseos fasciaque media interrupta sulphureis.

Phalaena bractella alis nigris, macula marginali anticeque luteo - aureis. *Linn. Syst. Nat.* II. 894. 415. *Fn. Sv.* 1426.

*Clerk. phal. tab. 12. fig. 4.*

Habitat in Europa.

Antennae nigrae, ante apicem albae.

42. T. alis fuscis: macula communis dorsali duplice alba, *trigonella*.  
trigona.  
Phalaena trigonella. *Linn. Syst. Nat.* II. 891. 393. *Fn.*  
*Sv.* 1373.  
Habitat in Europa.  
Macula communis trigona, quasi e maculis duabus conflata.
43. T. alis fuscis: macula rhombea, nigra. *rhomboi-*  
Phalaena rhomboidella. *Linn. Syst. Nat.* II. 891. 394. *della.*  
*Fn. Sv.* 1372.  
Habitat in Europae sylvis.
44. T. alis nigro, albo argenteoque nebulosis, capite albo. *gemma-*  
Phalaena gemmella. *Linn. Syst. Nat.* II. 894. 414. *Fn.*  
*Sv.* 1388.  
*Clerk. phal. tab.* 10. *fig.* 10.  
Habitat intra quercus folia subcutanea.
45. T. alis fuscis: maculis tribus flavescentibus, capite *capitella*.  
ferrugineo.  
Phalaena capitella. *Linn. Syst. Nat.* II. 894. 418. *Fn.*  
*Sv.* 1374.  
Phalaena nasuta, alis aureo-fuscis: fasciis argenteis;  
media interrupta. *Vdm. diff.* 79?  
Habitat in Anglia: capt. d. VI Mai.
46. T. alis fuscis: macula communis dorsali argentea, *composi-*  
e strigis quatuor composita.  
*tella.*  
Habitat in Angliae nemoribus.  
Parva. Frons alba, antennis nigris. Alae fuscae, ni-  
tentes, macula magna dorsali argentea, quae e stri-  
gis quatuor approximatis abbreviatis composita.  
Margo exterior argenteo-striatus.
47. T. atra, alis anticis totis aureis, capite ferrugineo. *Calthella*.  
Phalaena Calthella. *Linn. Syst. Nat.* II. 895. 422. *Fn.*  
*Sv.* 1432.  
Habitat in Calthae palustris floribus.
48. T. antennis mediocribus, apice albis, alis fusco-auratis. *Frischella*.  
Phalaena Frischella. *Linn. Syst. N.* II. 896. 433. *Fn. Sv.* 1396.  
Habitat in Europa frequens.

*Petiverel-* 49. *T. alis* subgriseis: litura dorsali flava apiceque punctis tribus nigris.

Phalaena *Petiverella*. *Linn. Syst. Nat.* II. 895. 423.  
*Fn. Sv.* 1381.

*Clerk. phal. tab.* 12. fig. 11.

Habitat in Europa.

*Geoffrella.* 50. *T. alis* flavescensibus, argenteo-striatis; maculis duabus sulphureis, marginalibus, antennis mediocribus.

Phalaena *Geoffrella*. *Linn. Syst. Nat.* II. 896. 430.  
Habitat in Europa australiori.

*Mouffetel-* 51. *T. antennis brevibus, albo-annulatis, alis lividis:*  
*la.* atomis oblongis, fuscis.

Phalaena *Mouffetella*. *Linn. Syst. Nat.* II. 896. 431. *Fn.*  
*Sv.* 1397.

Habitat in Europa.  
Alae acuminatae.

*Albinella.* 52. *T. alis fuscis: linea unica aurea, antrorsum arcuata.*  
Phalaena *Albinella*. *Linn. Syst. Nat.* II. 897. 435. *Fn.*  
*Sv.* 1398.

Habitat in Europae arboreis.

*Goedartel-* 53. *T. alis auratis: fasciis duabus punctisque tribus ar-*  
*la.* genteis.

Phalaena *Goedartella* alis auratis, fasciis duabus argenteis: priore antrorsum, posteriore retrorsum arcuata. *Linn. Syst. Nat.* II. 897. 436. *Fn. Sv.* 1401.

*Clerk. phal. tab.* 12. fig. 14.  
Habitat in alnetis, in betulae gemmis.

*Merianel-* 54. *T. alis nigris: fasciis tribus argenteis, transverse di-*  
*la.* varicatis.

Phalaena *Merianella*. *Linn. Syst. Nat.* II. 897. 438. *Fn.*  
*Sv.* 1402.

*Tinea nigro-aurata*, lineis argenteis transversis tribus, antennis extremo albis. *Geoff. Ins.* 2. 198. 43.

*Reaum. Ins.* 1. tab. 17. fig. 12.  
Habitat in Europae pruno, pado.

*Wilkella.* 55. *T. alis nigris: fasciis quatuor argenteis, arcuatis;*  
secunda recta.

Phalaena *Wilkella*. *Linn. Syst. Nat.* II. 897. 439. *Fn.*  
*Sv.* 1403.

*Tinea*

Tinea nigro-aurata, lineis argenteis transversis qua-  
tuor, antennis nigris. *Geoff. Inf.* 2. 199. 43. 8.

*Reaum. Inf.* 3. tab. 4. fig. 8.

Habitat in Europa ulmo.

56. T. alis flavis: fasciis quatuor argenteis; tertia su-  
perne bifida. *Phalaena Lyonnetella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 897. 440.  
*Fn. Sv.* 1404.
- Habitat in Europae nemoribus.
- Fascia ultima marginalis.
57. T. alis albis: lineolis duabus argenteis posticeque  
undatis. *Phalaena Bonnetella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 897. 441.  
*Fn. Sv.* 1399.
- Habitat in Europa.
58. T. alis nigris: disco flavo; strigis lineis duabus pun-  
ctisque tribus argenteis. *Phalaena Schaefferella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 898. 443.  
*Fn. Sv.* 1409.
- Phalaena Fagi.* *Linn. It. Scan.* II. 2.
- Habitat in fagi foliis, subcutanea.
59. T. alis nigris, apice fulvis: strigis interruptis, ar-  
genteis. *Phalaena Rhediella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 898. 444.  
*Fn. Sv.* 1405.
- Clerk. phal.* tab. 12. fig. 12.
- Habitat in Europa.
- Alae posticae nigrae, margine albo.
60. T. alis nigro-auratis: punctis novem argenteis,  
convexis, submarginalibus. *Phalaena Roesella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 898. 445.  
*Fn. Sv.* 1406.
- Frisch. Inf.* 3. 31. tab. 4.
- Clerk. phal.* tab. 12. fig. 13.
- de Geer Inf.* tab. 30. fig. 10—12.
- Habitat in mali foliis, subcutanea, nitidissima.

*Linneella.* 61. T. alis fusco - auratis: punctis quatuor argenteis, elevatis.

*Tinea flavo - aurata*, punctis quatuor argenteis antenarumque apice albo. *Geoff. Inf.* 2. 200. 45.

*Phalaena Linneella* alis fuscis: punctis tribus argenteis, elevatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 898. 446. *Fn. Sv.* 1408.

*Clerk. phal.* tab. 12. fig. 8.

Habitat in Pomonae arboribus.

Antennae apice albae.

*Rajella.* 62. T. alis auratis: maculis septem argenteis secunda tertiaque connatis.

*Phalaena Rajella.* *Linn. Syst. N.* II. 898. 447. *Fn. Sv.* 1407. *de Geer Inf.* 1. tab. 31. fig. 11. 12.

Habitat in alni foliis, subcutanea.

*Harrisella.* 63. T. alis aureo - argenteis: apice obtuso, ustulato, subocellato.

*Phalaena Harrisella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 899. 449. *Fn. Sv.* 1412.

Habitat in Europa, Anglia.

*Drurella.* 64. T. alis fusco - argenteis: fascia postica aurea.

Habitat Hafniae.

Magnitudo T. Roesellae. Antennae elongatae, longitudine corporis, nigrae, apice albae. Caput, thorax basisque alarum fusco - argentea. Postice fascia lata, aurea, quae utrinque striga argentea vivaciore terminatur.

*aurella.* 65. T. alis auratis, postice atris: fascia argentea.

Habitat Lipsiae in Pomonae arboribus.

Minima facile omnium. Caput album, fronte ferruginea. Antennae breves, nigrae. Alae auratae, nitidissimae, postice atrae, qui colores striga argentea vivacissima distinguuntur.

*Clerkella.* 66. T. alis argenteis: postice subcaudatis, fusco - striatis punctoque atro.

*Phalaena Clerkella* alis argenteis, postice fusco - auratis, caudatis: ocello terminali atro. *Linn. Syst. Nat.* II. 899. 450. *Fn. Sv.* 1411.

Habitat in Europa.

Minima: argentea, nitida, abdomine fusco. Alae antennae argenteae, postice strigis quinque s. sex terminalibus fuscis punctoque parvo nigro ad marginem tenuiorem. Subtus fuscescentes. Alae posticae valde villosae, argenteae.

148. ALVCITA. *Palpi* duo subnudi, ad medium bifidi: lacinia interiore acutissima.  
*Antennae* setaceae.

1. A. alis cinereo-fuscis: vitta dorsali communi sinuata, alba.  
Phalaena Xylostella. *Linn. Syst. Nat.* II. 890. 389. *Fu. Sv.* 1390.  
Tinaea cinerea dorso vitta longitudinali alba. *Geoff. Inf.* 2. 195.  
*Roef. Inf.* I. tab. 10.  
Habitat in lonicera xylosteo, cheiranthi floribus.
2. A. alis fuscis, apice adscendentibus: vitta dorsali communi unidentata, alba.  
Habitat in Sueciae nemoribus.  
Similis praecedenti, at duplo major. Caput et thorax nivea, lateribus ferrugineis.
3. A. alis flavo-auratis: fasciis duabus fuscis, obliquis.  
Phalaena sylvella. *Linn. Syst. Nat.* II. 893. 413.  
Habitat Upsaliae.
4. A. alis flavis, immaculatis, capite thoraceque niveis.  
Habitat in Suecia.  
Statura et magnitudo omnino praecedentis. Caput, antennae et thorax nivea. Alae immaculatae.
5. A. alis fuscis: vitta communi dorsali abbreviata maculaque flavis.  
Habitat in Suecia.  
Statura praecedentium. Alae fuscae, vitta dorsali abbreviata et macula magna ad marginem crassiorum flavis.
6. A.

- vittella.* 6. A. alis cinereis: vitta dorsali margineque postico nigris.  
*Phalaena vittella* alis cinereis: vitta dorsali communis nigra, margine postico atro punctato. *Linn. Syst. Nat.* II. 890. 382. *Fn. Sv.* 1366.  
*Clerk. phal.* tab. 3. fig. 10.  
*Habitat Lipsiae.*  
*Statura A. lucellae.* Vitta fusca interrupta in dorso, et margo posticus niger.
- hipunctella.* 7. A. alis fuscis: vitta communis dentata, alba, thorace niveo: punctis duobus atris.  
*Habitat in lichene prunastri Saxoniae.*  
*Praecedenti duplo major.* Caput et thorax nivea. Punctum atrum utrinque in thorace. Abdomen flavum. Alae anticae fuscae s. plumbeae, vitta communis dentata, alba. Ad apicem alae striga e punctis nigris. Posticae albae.
- granella.* 8. A. alis albo nigroque variegatis, capite albo.  
*Phalaena granella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 889. 377. *Fn. Sv.* 1413.  
*Tinaea tota fusco-nebulosa, capite albo.* *Geoff. Ins.* 2. 186. II.  
*Leuvenh. Epist.* 1692. mart. 7.  
*Reaum. Ins.* 3. tab. 20. fig. 14. 16.  
*Roes. Ins.* 1. *phal.* 4. tab. 12.  
*Baker. microsc.* tab. 13. fig. 13.  
*de Geer Act. Holms.* 1746. 48.  
*Habitat in frumentorum granariis, semina rodens glos-*  
*meransque, hyeme parietes adscendens.*  
*Larva 16 poda, nuda, alba, capite brunneo.*  
*Puppa folliculata, attenuata, brunnea.*
- lappella.* 9. A. alis pallidis: puncto nigro, apice adscendentibus.  
*Phalaena Lappella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 889. 378. *Fn. Sv.* 1425.  
*Clerk. phal.* tab. 11. fig. 15.  
*Act. Holmens.* 1752. 66.  
*Habitat in Arctii capitulis intra semina.*
- costella.* 10. A. nivea, alis rufo-auratis: macula costalis baseos alba, fusco punctata.  
*Habitat in Anglia.* *Drury.*

Caput et thorax nivea. Alae anticae nitidae, rufo-auratae, ad basin macula magna, oblonga, costali, alba, in qua puncta aliquot fusca. Ad angulum anilitura alba. Alae posticae cinereae, immaculatae.

11. A. albida, alis linea argentea. *aristella.*

Phalaena aristella. *Linn. Syst. Nat.* II. 894. 416.

Habitat in Europa.

Corpus teres, lineare.

12. A. alis subcaudatis, testaceis: linea postica fusca. *caudella.*

Phalaena caudella alis testaceis, caudali linea fusca, palpis porrectis. *Linn. Syst. Nat.* II. 894. 417.

Habitat in Europa australi.

Magnitudo A. sylvellae.

13. A. alis pallidis, immaculatis, antennis longissimis. *Swammer-*

Phalaena Swammerdammella. *Linn. Syst. Nat.* II. 895. *dammella.*  
424. *Fn. Sv.* 1391.

*Clerk. phal. tab. 12. fig. 1.*

Habitat in Europa frequens.

14. A. antennis longissimis, albis, alis fuscis: angulo *Robertella.*  
ani fusco.

Phalaena Robertella. *Linn. Syst. Nat.* II. 896. 429.

*Fn. Sv.* 1394.

Habitat in Europae Pomona.

Minor A. Swammerdammellae.

15. A. alis atro-aureis: fascia flava, antennis longis. *De Geer.*

Phalaena Degeerella. *Linn. Syst. Nat.* II. 895. 426. *Fn. la.*

*Sv.* 1393.

Tinaea nigra, alis superioribus lineis longitudinalibus  
fascia lata transversa inferneque radiis plurimis  
aureis, antennis corpore longioribus. *Geoff. Inf.* 2.  
193. *tab. 12. fig. 5.*

*de Geer Inf.* 1. *tab. 32. fig. 13.*

16. Phalaena Sulzella antennis mediocribus, alis nigris:  
superioribus fascia aurea. *Linn. Syst. Nat.* II. 896. 427.

Habitat in Europa.

Variat antennis longitudine corporis et triplo lon-  
gioribus.

- Podaella.* 16. A. antennis mediocribus, alis nigris: fascia alba.  
*Phalaena Podaella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 896. 428.  
*Tinaea nigra, fascia transversa alba.* *Geoff. Inf.* 2. 194. 32.  
 Habitat in America boreali.  
 Praecedenti minor.
- Reaumur-* 17. A. alis nigris, extrorsum deauratis, antennis longissimis.  
*Phalaena Reaumurella.* *Linn. Syst. Nat.* II. 895. 425.  
*Fn. Sv.* 1392.  
*Tinaea nigra.* *Geoff. Inf.* 2. 193. 28.  
 Habitat in salice.  
 Antennae corpore triplo longiores, albae, basi nigrae.
- fasciella.* 18. A. alis auratis: fascia fusca, antennis apice albis.  
 Habitat in Anglia. *Mus. Monson.*  
 Statura et magnitudo praecedentis. Alae auratae, nitidae, fascia in medio late fusca: posticae fusco-auratae.  
 Variat antennis longissimis, capite thoraceque nigris et antennis mediocribus, capite ferrugineo, thorace aureo.
- sulphurella.* 19. A. alis anticis auratis: maculis duabus sulphureis oppositis, posticis flavis.  
 Habitat in Anglia. *Mus. Monson.*  
 Statura et magnitudo praecedentis. Antennae mediores, nigrae. Thorax fuscus. Alae fusco-auratae, macula majori triangulari flava ad marginem tenuiorem et altera minori opposita ad marginem crassiorem. Alae posticae flavae.
- oppositella.* 20. A. alis fuscis: maculis duabus oppositis flavis, posticis fuscis.  
 Habitat in Anglia.  
 Praecedenti affinis, distincta tamen. Alae planae, incumbentes, obscure fuscae, minime nitidae, maculis duabus aequalibus, flavis, altera ad marginem tenuiorem, altera ad crassiorem opposita. Posticae, uti caput et thorax, fuscae, immaculatae.

## 149. PTEROPHORVS.

*Palpi* lineares.*Lingua* exserta, membranacea.*Antennae* setaceae.

1. *P. alis patentibus, linearibus, indivisis.* *monodactylus.*  
*Phalaena monodactyla.* *Linn. Syst. Nat. II. 899. 453.* *Hylus.*  
*Fn. Sv. 1452.*  
*Reaum. Inf. I. tab. 20. fig. 12—16.*  
*Habitat in hortis.*
2. *P. alis fissis, fuscis: strigis albis; anticis bifidis, posticis tripartitis.* *didactylus.*  
*Pterophorus fuscus, alis superioribus apice bipartitis, inferioribus tripartitis.* *Geoff. Inf. 2. 92. Z.*  
*Phalaena didactyla.* *Linn. Syst. Nat. II. 899. 454.*  
*Fn. Sv. 1453.*  
*Raj. Inf. 205. 101.*  
*Periv. Gazoph. tab. 66. fig. 10.*  
*Schaeff. Elem. tab. 104.*  
*Habitat in convolvulo, geo rivali.*
3. *P. alis fissis, pallidis, lineis albis: anticis bifidis, posticis tripartitis.* *tridactylus.*  
*Phalaena tridactyla.* *Linn. Syst. Nat. II. 899. 455.*  
*Habitat in Europa.*
4. *P. alis patentibus, fissis, cinereo-nebulosis: posticis fuscis.* *tesseradactylus.*  
*Phalaena tesseradactyla.* *Linn. Syst. Nat. II. 900. 456.*  
*Fn. Sv. 1454.*  
*Habitat in Europae pratis.*
5. *P. alis patentibus, fissis, testaceis: puncto fusco.* *pterodactylus.*  
*Phalaena pterodactyla.* *Linn. Syst. Nat. II. 900. 458.*  
*Fn. Sv. 1456.*  
*Scop. carn. 674.*  
*Habitat in Europa.*

*pentada-* 6. P. alis niveis: anticis bifidis, posticis tripartitis.  
*Etylus.* *Geoff. Inf.* 2. 91. 1.

Phalaena pentadactyla alis patentibus, fissis, quinque partitis, niveis, digito quinto distincto. *Linn. Syst. Nat.* II. 900. 459. *Fn. Sv.* 1257.

*Roef. Inf.* I. *phal.* 4. tab. 5.

*Reaum. Inf.* I. tab. 20. fig. I. 2.

*Petiv. Gazoph.* tab. 67. fig. 6.

*Ammiral. Inf.* tab. 23.

*Sultz. Inf.* tab. 16. fig. 10.

Habitat in Europa.

Larva 16 poda, pilosa, viridis, nigro punctata linea- que dorsali alba.

Puppa pilosa, viridis, nigro punctata.

*hexada-* 7. P. alis fissis, cinereis: singulis sex partitis.

*Etylus.* Pterophorus cinereus, fusco maculatus, alis superiorebus octo partitis, inferioribus tripartitis. *Geoff. Inf.* 2. 92. 3.


Phalaena hexadactyla. *Linn. Syst. Nat.* II. 900. 460. *Fn. Sv.* 1458.

*Reaum. Inf.* I. tab. 19. fig. 19—21.

*Frisch. Inf.* 7. tab. 73.

*Petiv. Gazoph.* tab. 67. fig. 7.

Habitat in Ionicera xylosteo.



## VII. R Y N G O T A.

*Os rostro: vagina articulata.*

150. FVLGORA. *Os rostro inflexo, elongato.*

*Vagina cornea, quinque articulata.**Antennae breves, capitatae.*

1. F. fronte rostrata, recta, alis lividis: posticis ocellatis. *laternaria.*  
Linn. Syst. Nat. II. 703. 1.

*Laternaria phosphorea. Linn. Mus. Lud. Ulr. 152.**Cucujus peruvianus. Grew. Mus. 158. tab. 13.**Laternaria. Merian. Sur. tab. 49.**Reaum. Inf. 5. tab. 20. fig. 6. 7.**Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 28. 29.**Seb. Mus. 4. tab. 77. fig. 3. 4.**Habitat in America meridionali.**Prominente fronte, noctu lucem vivacissimam spargit.*

2. F. fronte rostrata, muricata: apice trifido, alis nigris, *Diadema.*  
rubro maculatis. *Linn. Syst. Nat. II. 703. 2.*

*Seb. Mus. 4. tab. 77. fig. 7.**Habitat in India.*

3. F. fronte rostrata, adscendente, elytris viridibus, luteo *candela-*  
maculatis, alis flavis, apice nigris. *Linn. Syst. Nat. III. 703. 3.* *ria.*

*Laternaria candelaria. Mus. Lud. Ulr. 153.**Aet. Holm. 1746. 63. tab. 1. fig. 5. 6.**Edw. Av. tab. 120.**Roef. Inf. 2. Gryll. 189. tab. 30.**Sultz. Inf. tab. 10. fig. 62.**Habitat in China.*

- phosphorea.* 4. F. fronte rostrata, subulata, adscendente, corpore griseo-glauco. *Linn. Syst. Nat.* II. 704. 4.  
Habitat in America.
- noctivida.* 5. F. fronte rostrata, acuminata, adscendente, corpore viridi, alis hyalinis. *Linn. Syst. Nat.* II. 704. 5.  
Habitat in America meridionali.
- lucerna-ria.* 6. F. fronte rostrata, prominente, corpore supra viridescente, subtus flavo. *Linn. Syst. Nat.* II. 704. 6.  
Habitat in America meridionali.
- flammea.* 7. F. fronte rostrata, adscendente, tereti, truncata. *Linn. Syst. Nat.* II. 704. 7. *Amoen. acad.* 6. 399. 39.  
Habitat in America.
- tenebrosa.* 8. F. fronte rostrata, recta, truncata, elytris griseis, scabris.  
Habitat in Guinea. *Mus. Banks.*  
Magnitudo fere F. laternariae. Caput fuscum, fronte rostrata, recta, tereti, rufa, apice truncata. Thorax et elytra grisea, punctis elevatis fuscis scabra. Alae obscurae.
- obscurata.* 9. F. fronte rostrata, recta, truncata, elytris cinereis, nigro maculatis.  
Habitat in nova Hollandia.  
Parva. Rostrum longitudine corporis nigrum, basi album, punctis fasciisque duabus albis. Frons rostrata, recta, teres, grisea, apice oblique truncata. Thorax fuscus. Elytra cinerea, maculis nigris pluriuinis sparsis. Alae albae. Pedes albo nigro-que varii.
- truncata.* 10. F. fronte obtusiuscula, alis truncatis, viridibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 704. 8.  
*Cicada truncata* viridi-albicans, alis deflexis, compressis, postice truncatis. *Linn. Am. acad.* 6. 399. 40.  
Habitat in India.
- Europaea.* 11. F. fronte conica, corpore viridi, alis hyalinis, reticulatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 704. 9.  
Habitat in Galloprovincia. In Sierra Leon Africæ. *Mus. Banks.*

151. MEMBRACIS. *Os rostro inflexo.*

*Labium cornuum, elongatum, apice membranaceum, subulatum.*

*Antennae subulatae, fronti insertae.*

1. M. foliacea, folio rhombeo, postice latiore.

○ Cicada rhombea. *Linn. Syst. Nat. II. 704. 1.*

*Azt. angl. 1765. 55. tab. 6.*

Habitat in America.

Thoracis folium brunnescens, maculis duabus obsoletis, subdiaphanis disci.

2. M. thorace foliaceo, rotundato, atro: arcubus albis.

○ Cicada foliata. *Linn. Syst. Nat. II. 705. 2. Gronov.*

*Zooph. 677.*

*Merian. Sur. tab. 5. fig. ult.*

Habitat in India.

In meo specimine fasciae tres flavae in thorace.

3. M. thorace foliaceo, antice posticeque acuto, griseo.

○ *Linn. Syst. Nat. II. 705. 4.*

Habitat in America.

Corpus totum griseuni.

4. M. thorace tricorni: postice producto, longitudine alarum.

Habitat in Indiis.

Statura M. bicornis, at duplo major. Thorax utrinque spina obtusa et in medio longiori erecta, acuta armatus; postice ad longitudinem alarum productus.

Color testaceus, lineis tribus sanguineis, quae omnes cornu thoracis intermedium percurrunt.

5. M. thorace tricorni, cornu intermedio longiori, compresso.

Habitat in Pennsylvania. *Mus. Banks.*

Caput virescens, immaculatum. Thorax virescens, antice obtusus, cornubus tribus lateralibus brevibus,

acutis, intermedio longiori, erecto, compresso, apice rotundato. Thorax postice porrectus longitudine alarum, striatus. Alae albidae, apice fuscae.

✓ *aurita*. 6. M. thorace biaurito, capitis clypeo antrorsum dilatato, rotundato.

✓ Cicada aurita. *Linn. Syst. Nat.* II. 706. 7.

Cicada thorace obtuse bicorni. *Geoff. Ins.* I. 422. 17.

Cicada cristata thorace bicorni, corniculis subrotundis.

*Schreb. Ins.* 8. fig. 1. 2.

*Schaeff. Icon.* tab. 96. fig. 3.

Habitat in quercu, corylo.

○ *punctata*. 7. M. thorace bicorni, albo punctato, postice producto, abdomine longiore.

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

Magna in hoc genere. Caput ferrugineum, albo punctatum, clypeo acuto, apice nigro. Thorax punctatus, ferrugineus, albo irroratus, cornubus duobus erectis, compressis, triangularibus, obtusis et fere truncatis, ferrugineis, albo punctatis: angulis nigris. Thorax postice productus, abdomine fere duplo longior, carinatus: carina atra. Alae ferrugineo-fuscae. Pedes fusti, tibiis ferrugineis.

○ *cornuta*. 8. M. thorace bicorni, nigro, postice subulato, longitudine abdominis, alis fuscis.

○ Cicada cornuta. *Linn. Syst. Nat.* II. 705. 6. *Fn. Sv.* 879. *Scop. carn.* 435.

✓ Cicada thorace acute bicorni, pone producto. *Geoff. Ins.* I. 423. 18.

✓ Cicada cornuta. *Schreb. Ins.* 4. fig. 3. 4.

✓ Ranatra cornuta. *Petiv. Gazoph.* tab. 47. fig. 2. 3. *Sulz. Ins.* tab. 10. fig. 63.

*Schaeff. Icon.* tab. 96. fig. 2.

Habitat in carduis, salicibus.

○ *Taurus*. 9. M. thorace bicorni, fusco: postice producto, filiformi, longitudine abdominis, cornubus arcuatis.

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Statura omnino praecedentis, at paulo minor. Caput fuscum, oculis castaneis punctoque ante oculos albo.

Thorax fuscus, cornubus duobus validis, parum arcua-

arcuatis, postice productus, filiformis. Pectus lateribus niveis. Alae obscurae. Corpus fuscum.

10. M. thorace bicorni, viridi, postice subulato, longitudine abdominis, alis albis. *Vitulus.*

Habitat in America. *Drury.*

Statura omnino M. cornutae. Caput flavescens, oculis fuscis. Thorax bicornis, viridis, atomis albis irroratus cornubusque flavis; postice subulatus, carinatus, acutissimus. Alae albae, margine postico flavescente. Corpus flavescens.

11. M. thorace subinermi, postice producto, abdomine ~~2~~ punctata. breviore, testaceo, elytris macula baseos nigra.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Parva. Corpus testaceum, macula oblonga nigra ad basin elytrorum.

12. M. thorace bicorni, postice producto; margine albo, alis puncto baseos albo. *Bonasia.*

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Minor M. cornuta. Thorax cornubus duobus porrectis, validis, acutis, ater, antice punctis duobus obsoletis, rufis, postice productus, margine albo. Alae fuscae, puncto baseos albo.

13. M. thorace inermi, virescente: postice subulato, longitude abdominis. *inermis.*

Habitat in America.

Statura M. bicornis. Caput deflexum, fulvum, labio acuminato. Thorax omnino inermis, obtusus, virescens, postice productus, carinatus, acutissimus. Alae albae. Abdomen fulvum.

14. M. thorace inermi, fuso: postice producto, abdomen dimidio breviore. *Genistae.*

Cicada thorace inermi, pone producto. *Geoff. Inf. 2.*  
424. 19.

Habitat in Genista tinctoria Angliae. *Lee.*

M. cornuta triplo minor. Caput deflexum, acuminatum. Thorax inermis, obtusus, fuscus, immaculatus, acutus, postice productus ~~ad~~ dimidiam abdominis longitudinem. Alae albae. Abdomen nigrum, incisuris albicantibus.

○ 152. TETTIGONIA. *Os rostro inflexo.*

*Vagina biarticulata,*  
*gulae inserta.*

*Antennae setaceae.*

- *griffa.* 1. *T. thorace viridi, nigro-sublineato, alis albis: posticis macula baseos flava.*

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

Gigas in hoc genere. Rostrum griseo-fuscum, apice nigrum. Frons transverse sulcata. Thorax obscure virescens, lineolis aliquot nigris. Scutellum emarginatum. Elytra alba, venis costaque nigris. Margo interior etiam basi niger. Alae posticae albae, macula magna baseos flava. Abdomen fuscum, segmentorum marginibus ciliatis, ano acuminato. Pedes grisei, apice nigri.

- *grisea.* 2. *T. grisea, elytris aqueis: margine postico nigro punctato, costa antice alba.*

Habitat in America. *Mus. Tottianum.*

Corpus totum griseum, vel cinereo fuscoque variegatum. Elytra omnino aqua, costa basi alba, macula media apiceque fuscis. Ad marginem posticum terminantur nervi puncto fuso, unde margo punctis sex fuscis notatus. Femora antica annulo fuso. Tibiae basi apiceque fuscae.

- *limbata.* 3. *T. thoracis margine dilatato, acuto, alis atris: margine albo.*

Habitat in America. *Mus. Banks.*

Magna. Caput virescens, fronte sulcata. Thorax rotundatus, viridis, margine dilatato, acuto. Scutellum obtusum. Abdomen supra fuscum. Elytra virescentia, apice hyalina, maculis fuscis, albae innatis. Alae atrae, margine postico albo.

- *dilatata.* 4. *T. thoracis margine dilatato, atra, alis albidis.*

Habitat in Iamaica. *Mus. Banks.*

Praecedente minor. Corpus totum atrum, immaculatum. Thoracis margo dilatatus. Elytra cinerea, costa maculisque paucis fuscis. Alae albidae.

5. T.

5. T. scutello emarginato, alarum costa virescente. *Tibicen.*  
 Cicada Tibicen elytris anastomosis ferrugineis, scutelli apice emarginato. *Linn. Syst. Nat. II. 707. 19.*  
*Mus. Lud. Ulr. 160.*
- \* Tibicen. *Merian. Sur. tab. 49.*
- ✓ Panorpa. *Brown. Iam. 436. tab. 43. fig. 15.*
- ✓ Guerucu Erementi. *Margr. bras. 256.*
- Habitat in America.  
 Variat thorace nigro et nigro brunneoque variegato.
6. T. nigra, elytris albis: costa flava. *Septendecim cim.*  
 Cicada septendecim nigro - virescens, elytris margine flavescente, capite utrinque octo - striato. *Linn. Syst. Nat. II. 708. 20.*  
 Cicada maxilla utraque lineis octo transversis, concavis, alarum margine inferiore lutescente. *Kalm. Act. Holm. 1756. 101.*  
*Collinf. Act. Angl. 1765. 65. tab. 8.*
- Habitat in America.  
 Corpus nigrum. Lamellae abdominis breves ovatae.
7. T. thorace variegato, elytris hyalinis: antice nervis punctatis, postice strigis duabus undatis, fuscis. *Catena.*  
 Habitat in Capite B. Sp. *Mus. Banks.*  
 Caput atrum, puncto utrinque oculari et unico verticale flavis. Thorax ater, lineis quinque obliquis margineque postico flavis. Scutellum magnum atrum, postice punctis duobus margineque flavis. Abdomen album, maculis dorsalibus atris. Elytra hyalina, nervis testaceis, ultra medium nigro punctatis; postice strigae duae valde undulatae, fuscae. Alae concolores, at nervis inimaculatis. Pedes nigri, femoribus anticis utrinque linea rubra.
8. T. villosa, elytris griseis, alis flavis: omnibus margine hyalino. *Stridula.*  
 Cicada stridula elytris margine dilatato, punctis septem albis. *Linn. Syst. Nat. II. 706. 12. Mus. Lud. Ulr. 157.*
- Cicada catenata. *Drury Ins. 2. tab. 37. fig. 2.*  
 Habitat in Capite B. Sp.

Corpus totum villosum, obscurum. Thorax et scutellum virescentia, nigro-variegata. Elytra grisea, margine postico hyalino, et ante marginem maculae septem oblongae, hyalinae, annulo fusco cinctae. Alae flavae, postice fuscescentes, maculis obsoletis margineque hyalino.

- *tingulata*. 9. T. thorace maculato, elytris hyalinis: costa maculaque fuscis, abdomine atro: fasciis flavis.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Banks.*

Caput et thorax variegata. Thoracis margo emarginatus. Scutellum magnum nigrum, lineis duabus dorsalibus flavescens. Margo flavescens, puncto magno nigro. Abdomen atrum, supra segmentorum marginibus flavis, in medio interruptis, subtus lineis quatuor punctorum flavorum. Anus acuminatus, ater. Laminae abdominalis pallidae. Pedes flavo nigroque variegati.

- *cruentata*. 10. T. thorace variegato, elytris hyalinis: costa flavescente, abdomine atro: fasciis sanguineis.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Banks.*

Parva. Caput flavescens, puncto frontali nigro. Vertex niger, puncto baseos flavo. Thorax ferrugineus, linea dorsali flava, lineis quatuor obliquis punctisque duobus baseos nigris. Abdomen supra atrum, segmentorum marginibus sanguineis, segmento primo et secundo immaculatis; subtus sanguineum, tomento argenteo splendens. Elytra hyalina, immaculata, costa sola basi flava, apice sanguinea. Lamellae abdominalis ovatae, flavae.

- *haemato-des*. 11. T. nigra, immaculata, abdominalis incisuris sanguineis.

○ Cicada haematodes. *Linn. Syst. Nat. II. 707. 14.*

*Scop. carn. 347.*

*Petiv. Gazoph. tab. 15. fig. 7.*

*Gronov. Zooph. 675.*

Habitat in Europa australi.

- *Orni*. 12. T. nigra flavo maculata, alis albis: basi flavis; maculis duabus nigris.

○ Cicada Orni elytris intra marginem punctis sex concatenatis anastomosisque interioribus fuscis. *Linn. Syst. Nat. II. 707. 16. Scop. carn. 346.*

*Roeſ.*

*Roef.* *Ins.* 2. *Gryll.* tab. 25.

*Reaum.* *Ins.* 5. tab. 5. fig. 16. 17. 18. 19.

*Sultz.* *Ins.* tab. 10. fig. 65.

*Schaeff.* *Icon.* tab. 4. fig. 14.

Habitat in Europa australi.

Caput nigrum, maculis tribus flavis inter oculos.

Vertex stemmatibus tribus rufis. Thorax niger, fascia media maculisque aliquot anticis flavis. Scutellum utrinque retusum, apice emarginatum, flavum; linea media nigra. Abdomen nigrum, subtus flavum. Alae albae, basi flavae, macula duplice nigra.

13. *T. grisea*, thoracis linea alba, elytris albo-reticulatis. *reticulata.* ○

○*Cicada reticulata.* *Linn. Syst. Nat.* II. 707. 18.

Habitat in America meridionali.

14. *T. atra*, alis albis, basi nigris; venis testaceis. *attrata.* ○

Habitat in China. *Gannerus.*

Magnitudo praecedentium: tota atra, abdominis margine, imprimis ultimi segmenti, testaceo. Alae omnes albidae, basi nigrae, venis testaceis.

15. *T. nigra*, ore, thoracis maculis duabus abdomine- *sanguino-* ○  
que sanguineis. *lenta.*

Habitat in China. *Drury.*

Caput nigrum, ore rufo, linea longitudinali rostroque nigris. Thorax glaber, niger, macula utrinque orbiculata, rufa. Abdomen rubrum. Alae omnes obscure fuscae, immaculatae. Pedes nigri.

16. *T. elytris fusco-aureis*, tibiis anticis incrassato- *splendidu-* ○  
dentatis, rufis. *la.*

Habitat in China. *Drury.*

Parva. Caput nigrum, oculis pallidis. Thorax pallidus, maculis duabus magnis, orbiculatis, nigris. Scutellum nigrum, margine pallido. Abdomen rubrum. Elytra fusca, colore aureo vivacissimo splendentia. Pedes antici femoribus nigris, tibiis crassissimis, dentatis, rufis. Pedes postici nigri, femoribus rufis.

17. *T. elytris hyalinis*: costa sanguinea, abdomine linea *muta.* ○  
dorsali sanguinea.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Banks.*

Parva. Corpus pallide mox virescens, mox rufescens.  
 Antennae nigrae. Thorax linea dorsali flavescente.  
 Scutellum postice punctis duobus nigris impressis.  
 Abdomen linea dorsali argentea. Elytra hyalina,  
 costa marginisque tenuioris basi sanguineis. Alae  
 hyalinae. Lamellae abdominalis brevissimae, spina  
 acuta baseos.

○ *violacea*. 18. T. *violacea*, alis apice fuscis.

○ Cicada *violacea*. *Linn. Syst. Nat.* II. 708. 21. *Mus. Lud. Ulv.* 162.

Habitat in terris australioribus.

Minor, corpus violaceum. Elytra basi ferruginea,  
 apice fusca. Alae pallidae, apice fuscae.

### ○ 153. CICADA. Os rostro infexo.

*Labium rotundatum*, apice  
 setaceum.

*Antennae sub oculis insertae.*

○ *ocellata*. 1. C. elytris compressis, adscendentibus, viridibus: pun-  
 ctis ocellaribus ferrugineis.

Habitat Tranquebariae. *Koenig.*

Major, viridis. Elytra valde compressa postice in  
 angulum acutum adscendunt, viridia, punctis ocel-  
 laribus numerosis sparsis. Pedes pallidi.

○ *marginalia*. 2. C. flava, elytris deflexis, nigris: linea laterali alba:  
*Linn. Syst. Nat.* II. 710. 39.

Habitat in America.

Alae pallidae.

○ *Phalaenoides*. 3. C. exalbida, alis deflexis, patulis: elytris antice fusco  
 des. punctatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 710. 40.

Habitat in America.

Alae niveae.

○ *bipunctata*. 4. C. exalbida, elytris deflexis, thoracis margine antico  
 punctis duobus impressis. *Linn. Syst. Nat.* II. 710. 41.

Habitat in America.

5. C.

5. *C. grisea*, elytris deflexis, capite apice puncto nigro. *grisea.* F  
Habitat in America. v. *Robr.*
- Statura omnino C. bipunctatae, at color totus griseus f. cinereo fuscoque mixtus. Caput apice terminatur puncto nigro. Puncta duo capite et duo alia thoracis margine antico impressa.*
6. *C. viridis*, elytris deflexis, alis albis, fronte conica. *vivida.* A  
Habitat in America. v. *Robr.* In nova Hollandia. *Banks.*
- Statura praecedentis, at tota viridis, alis solis albis.*
7. *C. elytris deflexis*, viridibus: dorso scabro, capite, margine postico thoraceque linea dorsali sanguineis. *minuta.* F  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*
- Parva. Caput pallidum, fronte carinata marginaque postico elevato, sanguineo. Thorax viridis, linea dorsali sanguinea, quae tamen marginem anticum haud attingit. Elytra viridia, punctis elevatis nigris, in primis dorsalibus, scabra. Margo tenuissime sanguineus. Pedes pallidi, tibiis anticis sanguineis.*
8. *C. alis deflexis*, hyalinis: striga, fascia punctisque fuscis, ano lanato. *Linn. Syst. Nat. II. 711. 44.* *cunicularia.* V  
Habitat in India.  
*Frons ovata, ferruginea.*
9. *C. alis nigris*: punctis coeruleis, fronte lateribusque rubris, ano lanato. *Linn. Syst. Nat. II. 711. 42. Mus. Lud. Utr. 163.* *lanata.* F  
Cicada lanata. *Drury Ins. 2. tab. 37. fig. 3.*  
Habitat in India.  
*Elytra apice fusca. Oculi spinosi.*
10. *C. elytris deflexis*, viridibus, fulvo - subfasciatis, alis *tomentosa.* O  
albis: fasciis duabus atris.  
Habitat in India orientali. *Mus. Tottianum.*  
*Caput viride, fronte plana, laevi rostroque fusco. Antennae fuscae, setigerae, sub oculis insertae. Thorax fuscus. Elytra viridia, fasciis duabus interrupitis, ferruginea, apice grisea, punctis aliquot atris. Alae niveae, fasciis duabus posticis atris, anteriore ad marginem tenuiorem dilutiore. Abdomen fuscum, ano lana densissima, nivea. Pedes ferruginei, tibiis anticis compresso-membranaceis, posticis dentatis, nigris.*

- barbata.* 11. C. fusca, abdomen virescente: ano lanato, niveo.  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
Magna. Caput fuscum, fronte plana, laevi. Thorax  
fuscus, scutello acuto. Abdomen virescens, ano  
lana multa nivea tecto. Elytra fusca, punctis ali-  
quot nigris in medio et albis obsoletis ad apicem.  
Alae fuscae, nitidae. Pedes nigri, femoribus qua-  
tuor anticis basi sanguineis.
- villosa.* 12. C. viridis, clytris deflexis, exalbidis, ano lanato.  
Habitat in America. *v. Robr.*  
Parva: statura omnino Chermes. Anus lana densa  
alba obvolutus.
- vittata.* 13. C. flava: vitta ferruginea, longitudinali, duplice repan-  
do-dentata. *Linn. Syst. Nat. II. 710. 36. Fn. Sv. 889.*  
Habitat in Europa.
- lateralis.* 14. C. nigra, elytris latere albis. *Linn. Syst. Nat. II. 709.*  
*29. Fn. Sv. 886. Geoff. Inf. I. 416. 3.*  
Locusta pulex fusca, utrinque in lateribus alarum arcu  
albicante. *Raj. Inf. 68. 2.*  
Habitat in Europae plantis.
- variegata.* 15. C. supra nigra, scutello, elytris maculis duabus dor-  
salibus margineque exteriori flavescientibus.  
Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*  
Statura praecedentium. Antennae sub oculis insertae.  
Caput nigrum, subtus flavum, immaculatum. Tho-  
rax niger, linea dorsali postica flava. Elytra nigra,  
rubro-substriata, puncto parvo flavo ad apicem  
scutelli, in medio dorsi macula oblonga flava, com-  
munis. Margo exterior hyalinus, in medio inter-  
ruptus. Subtus tota flavescens.
- fenestrata.* 16. C. supra nigra, capite scutelloque flavis, elytrorum  
margine hyalino.  
Habitat in insula Otaheiti oceani pacifici. *Mus. Banks.*  
Parva, supra fusca, capite flavo, margine postico te-  
nuissime fuso. Thorax fuscus, immaculatus, scu-  
tello flavo. Elytra fusca, margine exteriori hyalino,  
in medio interrupto. Subtus tota flava.

17. C. nigra, oculis albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 709. 26. *leucophthalmus.*  
*Fn. Sv.* 883.  
 Habitat in Europa boreali.
18. C. nigra, capite thoracisque basi flavescentibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 709. 28. *leucocephala.*  
*Geoff. Ins.* I. 421. 13.  
 Habitat in Europa boreali.
19. C. elytris flavis: linea nigra dupli interrupta longitudinali. *Linn. Syst. Nat.* II. 710. 35. *Fn. Sv.* 889. *interrupta.*  
*Geoff. Ins.* I. 419. 9.  
 Ranatra bicolor ex fusco et pallido striata. *Petiv. Gazoph.* 61. fig. 10.  
 Habitat in Europa.
20. C. nigra, capitis margine postico thoraceque flavis. *flavicollis.* *Cicada flavicollis fusca, capite thoraceque flavis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 709. 33. *Fn. Sv.* 891.  
 Habitat in Europae graminosis.  
 Caput atrum, nitidum: margine postico flavo; punctis duobus minutissimis nigris. Thorax flatus, immaculatus. Scutellum et basis elytrorum flavescentia. Elytra nigra. Alae albae, nervis nigris. Corpus et pedes nigra.
21. C. elytris viridibus, capite flavo; punctis nigris. *Linn. viridis.*  
*Syst. Nat.* II. 711. 46. *Fn. Sv.* 896. *Geoff. Ins.* I. 417. 5.  
 Locusta pulex paulo minor. *Raj. Ins.* 68. 3.  
 Ranatra viridescens. *Petiv. Gazoph.* 73. tab. 76. fig. 6.  
 Habitat in Europae plantis.
22. C. viridis, capite thoraceque carneis. *Linn. Syst. Nat.* *Lanio.*  
 II. 710. 37.  
 Habitat in Europa.
23. C. atra, abdomine flavo, alis apice fuscis: lunula hyalina. *Turca.*  
 Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*  
 Gigas in hoc genere. Caput atrum, antennis crassis, ferrugineis. Thorax ater, scutello carinato, acuto. Abdomen flavescentis, supra basi atra. Elytra coriacea, nervosa, atra, apice fusca, punctis aliquot minutissimis albis. Alae atrae, basi maculis tribus sanguineis, apice fuscae, lunula magna hyalina. Pedes nigri, feinoribus posticis flavis.

*Maura.* 24. *C. nigra*, pectore abdomineque sanguineis.  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
Media. Caput atrum, fronte plana, laevi. Thorax  
ater, scutello acuto. Pectus et abdomen sanguinea.  
Elytra et alae atra, immaculata. Pedes atri, femori-  
bus posticis sanguineis.

*pellucida.* 25. *C. grisea*, elytris fascia media hyalina.  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
Caput griseum, apice dilatatum, rotundatum, fronte  
plana, laevi. Thorax griseus, lineis duabus dor-  
salibus nigris. Scutellum acutum. Elytra grisea,  
fascia in medio lata, hyalina. Alae fuscae. Abdo-  
minis latera subtus dilatata, deflexa, fornicata.

*Cynosba-*  
*tis.* 26. *C. fusca*, alis albis: margine fuscō punctato.  
Habitat in Daniae rosis.  
Maior *C. Rosae*. Caput fuscum, pedibus flavescensibus.  
Alae magnae, albae, margine fuscō punctato.

*Serratu-*  
*iae.* 27. *C. flava*, elytris albis: puncto fasciisque duabus  
nigris.  
Habitat in Angliae carduis. *Mus. Banks.*  
Parva. Caput flavum, puncto verticali nigro. Scu-  
tellum margine nigro. Elytra albida, puncto ba-  
seos fasciisque duabus apicis nigris.

*nervosa.* 28. *C. alis fuscis*: nervis albo nigroque punctatis.  
Cicada nervosa fusca, alis hyalinis, fuscō maculatis:  
nervis punctatis. *Linn. Syst. Nat. II. 709. 25. Fn.*  
*Sv. 882. Geoff. Inf. I. 415. I.*  
*Scop. carn. 341.*  
Habitat in Europa.  
Variat elytris fascia media fusca. *de Hattorff.*

*variega-*  
*ta.* 29. *C. atra*, viridi-variegata, alis hyalinis: punctis tri-  
bus costalibus nigris.  
Habitat in Germania. *de Hattorff.*  
Statura praecedentis. Caput et thorax fuscō viridique  
variegata. Abdomen atrum. Alae hyalinæ, ner-  
vose, nervis punctis aliquot albis et ad costam pun-  
cta tria, parva, distincta, nigra.

30. C. fronte thoraceque glaucis: punctis quatuor ocellaribus nigris, elytris hyalinis: margine flavescente. *lyncea.*

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Parva. Os flavescentis, signaturis nigris. Frons glauca, utrinque puncto atro, annulo flavescente cincto. Lineola in medio frontis. Thorax itidem glaucus, antice punctis duobus ocellaribus, atris. Alae hyalinae, margine exteriori flavescente.

31. C. flava, elytris fusco-auratis.

*fulgida.*

Habitat in Anglia. *Mus. Banks.*

Parva, flava. Thorax fuscus: elytra fusco-aurata, margine flavescente. Macula communis dorsalis albida in medio.

32. C. elytris flavescentibus, fusco punctatis.

*punctata.*

Cicada fusco-pallida, elytris membranaceis, virescentibus, scutello macula duplice triangulari. *Geoff. Ins. I.* 417. 4.

Habitat in Europae nemoribus.

Parva, flavescentis. Puncta duo nigra ad basin thoracis, duo alia in scutello. Elytra exalbida, punctis aliquot nigris sparsis. Abdomen nigrum.

33. C. flava, alis albis, apice fusco striatis. *Linn. Syst.* *Rosae.*

*Nat. II. 712. 50. Fn. Sv. 902. Geoff. Ins. II. 428. 28.*

*Reaum. Ins. 5. tab. 20. fig. 10 — 14.*

*Frisch. Ins. II. 13. tab. 20.*

Habitat in rosae foliis.

34. C. flava, elytris fulvo pictis: maculis quatuor nigris posticeque auratis. *Linn. Syst. Nat. II. 711. 48. Fn.*

*Sv. 899.*

Habitat in Europa boreali, Suecia.

35. C. grisea, capite depresso, plano: apice fusco.

Habitat Bristol in Anglia. *Mus. Banks.*

Parva: tota grisea. Caput magnum cuspidatum, apice fuscum.

154. CERCOPIS. *Os rostro inflexo.*

*Labium abbreviatum, truncatum, emarginatum.*

*Antennae sub oculis insertae.*

○ *feneſtrata.* 1. C. fusca, elytris fascia media maculisque duabus marginalibus fenestratis.

Habitat in America. *Mus. Tottianum.*

Frons laevis, margine elevato. Antennae breves, sub oculis insertae. Elytra fusca, in medio fascia abbreviata maculisque duabus marginalibus fenestratis. Inter fasciam et marginem adhuc puncta duo minutissima, fenestrata. Corpus fuscum.

○ *sanguino-lenta.* 2. C. atra, elytris maculis duabus fasciisque sanguineis.

✓ Cicada sanguinolenta. *Linn. Syst. Nat. II. 708. 22.*  
Cicada nigra, elytris maculis sex rubris. *Geoff. Inf. I.* 418. tab. 8. fig. 5.

*Scop. carn.* 330.

Habitat in Europae salicibus.

○ *cruentata.* 3. C. rufa, elytris nigris: fasciis duabus flavis.

Habitat Surinami. *Drury.*

Statura et magnitudo praecedentis. Caput et thorax laevis, rufa, immaculata. Scutellum triangulare, nigrum, apice flavum. Elytra rotundata, nigra, fasciis duabus latis, flavis.

○ *Carnifex.* 4. C. sanguinea, thorace macula, elytris fasciis duabus nigris.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Statura omnino praecedentium. Caput gibbum, sanguineum, antennis nigris. Thorax sanguineus, macula magna dorsali nigra. Elytra glabra, sanguinea, fasciis duabus latis, nigris, altera ad basin, altera ad apicem. Scutellum sanguineum. Pedes plantis fuscis.

○ *Spumaria.* 5. C. fusca, elytris maculis binis albis, lateralibus.

✓ Cicada spumaria. *Linn. Syst. Nat. II. 708. 24.* *Fn. Sv. 881.*

Cicada fusca, fascia duplice albida, interrupta, transversa. *Geoff. Inf. I.* 415. 2.

Locusta-

Locusta-pulex Swammerdamii, nobis Cicadula. *Raj. Inf.* 67.  
Ranatra bicolor, capite nigricante. *Pet. Gaz.* tab. 61. fig. 9.  
Cicada fusca, alis superioribus maculis albis, in spuma  
quadam vivens. *de Geer. act. Holm.* 1741. 221.

Vermis spumans. *Frisch. Inf.* 8. 26. tab. 12.

Locusta germanica. *Roef. Inf.* 2. *Gryll.* tab. 23.

*Sultz. Inf.* tab. 10. fig. 64.

*Schaeff. elem.* tab. 42.

Habitat in Europae plantis variis, latitans intra spumam.

6. C. grisea, immaculata, alis albis. rufica.  
Habitat in Europa.  
Statura praecedentis; at minor.
7. C. nigra, elytris albo maculatis. gibba.  
Habitat in Daniae nemoribus.  
Thorax postice emarginatus. Scutellum acutum.
8. C. flavescens, elytris fuscis: fasciis duabus albis. bifascia.  
Cicada bifasciata fusca, fasciis alarum binis albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 706. 10. *Fn. Sv.* 898.  
Habitat in Suecia.
9. C. nebulosa, vertice punctis duobus abdome ineque Populi.  
basi atris.  
Cicada Populi subtus flavescens, fronte punctis duobus  
nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 709. 32. *Fn. Sv.* 891.  
Habitat in Europa.  
Pedes flavi terminantur puncto atro.

### 155. NOTONECTA. Os rostro arcuato.

*Labium* corneum, co-  
nicum, apice mem-  
branaceum, acutum.

*Antennae* triarticulatae,  
cylindricae, sub ocu-  
lis insertae.

1. N. elytris griseis: margine fusco punctato, apice bi-  
fidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 712. 1. *Fn. Sv.* 903. glauca.

Notonecta capite luteo, elytris fusco croceo que varie-  
gatis, scutello atro. *Geoff. Inf.* I. 476. 1. tab. 9. fig. 6.

Cicada aquatica. *Mouffeti. Raj. Inf.* 58.

Notonecta vulgaris, nigro pallidoque mixta. *Petiv. Gazoph. tab. 72. fig. 6.*

Cimex aquaticus angustior. *Frisch. Inf.* 6. 28. tab. 13.

Cimex aquaticus. *Roef. Inf.* 3. tab. 27.

*Bradl. nat. tab. 26. fig. 2. E.*

*Hoeffn. Inf. tab. 12. fig. 19.*

*Sultz. Inf. tab. 10. fig. 67.*

*Schaeff. elem. tab. 90.*

— — *Ikon. tab. 33. fig. 5. 6.*

Habitat in Europae aquis.

*America-* *na.* 2. N. grisea, postice nigra, scutello atro: utrinque pun-  
cto baseos flavo.

Habitat in Americae aquis. *Muf. Tottianum.*

Praecedente minor. Caput griseum, rostro basi vire-  
scente. Thorax griseus, postice niger. Scutellum  
atrum, puncto utrinque flavo ad basin. Elytra grisea,  
margin'e apice alisque nigris. Pedes grisei, antici  
acuti, postici natatorii.

*nivea.* 3. N. elytris albis, immaculatis, apice rotundatis.  
Habitat in India. *Koenig.*

Statura N. glaucae, at quadruplo minor. Corpus cine-  
reum, oculis glaucis. Abdomen atrum, fascia dor-  
sali sanguinea, quae per elytra appetet. Alae omnes  
aqueae, apice rotundatae.

*minutissi-  
ma.* 4. N. grisea, capite fusco, elytris truncatis.  
Notonecta minutissima elytris cinereis: maculis fuscis  
longitudinalibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 713. 3. *Fn.*  
*Sv.* 905.

Notonecta cinerea, anelytra. *Geoff. Inf.* I. 477. 2.

Habitat in aquis Europae.

Larvam N. glaucae similat, at perfecta.

156. SIGARA. *Os rostro brevissimo.*

*Vagina conica, transversim  
striata, lateribus spinosa,  
os obtegens.*

*Antennae brevissimae.*

1. Sigara.

*striata.*

Notonecta striata elytris pallidis, lineolis transversis,  
undulatis, striatis. *Linn. Syst. Nat. II. 712. 2. Fn.  
Sv. 904.*

Corixa. *Geoff. Inf. I. 478. I. tab. 9. fig. 7.*

Notonecta vulgaris, compressa, fusca. *Petiv. Gazoph.  
tab. 72. fig. 7.*

*Roef. Inf. 3. 177. tab. 29.*

*Joblot. micr. I. I. tab. 7. fig. 2. 3.*

*Schaeff. elem. tab. 50.*

Habitat in Europae aquis frequens.

157. N E P A. *Os rostro arcuato.*

*Labium nullum.*

*Antennae palmato - divisae,  
sub oculis insertae.*

1. N. ecaudata, testacea, flavo maculata.

*grandis.*

Nepa grandis testacea, scutello laevi, alis albis, ma-  
culis venisque flavis. *Linn. Syst. Nat. II. 713. I. Mus.  
Lud. VI. 164.*

Insectum magnitudine brusci. *Margr. bras. 258. fig. 259.*

*Merian. Sur. tab. 56.*

*Roef. Inf. 3. tab. 26.*

*Gronov. Zooph. 685.*

Habitat in America.

Antennae palmato - quadrifidae, laciiniis arcuatis.

2. N. ecaudata, corpore fusco, immaculato.

*rufica.*

Habitat in Americae aquis frequens.

Simillima praecedenti, at triplo minor. Corpus totum  
fuscum, immaculatum, laeve, femoribus solis parum  
flavescens.

*fusca.* 3. *N. ecaudata*, scutello rugoso, alis niveis. *Linn. Syst. Nat.* II. 713. 3. *Mus. Lud. Vlr.* 166.  
Habitat in America.  
Duplo maior *N. cinerea*: tota fusca, folis alis albis.

*cinerea.* 4. *N. cauda bifeta*, corpore ovato.  
Nepa cinerea thorace inaequali, corpore oblongo, ovato. *Linn. Syst. Nat.* II. 714. 5. *Fn. Sv.* 906.  
Hepa corpore ovato. *Geoff. Inf.* I. 481. 2.  
Scorpio palustris ad Cimices referenda. *Raj. Inf.* 58.  
Scorpio palustris. *Mouff. Inf.* 321.  
Scorpiones aquatici. *Zonft. Inf.* tab. 25. fig. 1. 2.  
*Scorpius vulgaris aquaticus.* *Petiv. Gazoph.* tab. 74. fig. 4.  
*Cimex aquaticus.* *Roef. Inf.* 3. 136. tab. 22. fig. 6. 7. 8.  
*Bradl. nat.* tab. 26. fig. 2. 6.  
*Swammerd. bibl.* I. tab. 3. fig. 4.  
*Hoeffnag. Pičt.* tab. II. fig. 2.  
*Frisch. Inf.* 6. tab. 15.  
*Sulz. Inf.* tab. 10. fig. 68.  
*Schaeff. elem.* tab. 69.  
— — *Icon.* tab. 33. fig. 7. 9.  
Habitat in Europae aquis.  
Antennae palmato - bifidae. Abdomen supra rubrum.

*maculata.* 5. *N. nigra*, thorace scutelloque ferrugineo maculatis, alis fuscis.  
Habitat in Indiae orientalis aquis. *Koenig.*  
Statura praecedentis, at duplo fere minor. Caput nigrum, macula magna verticis obscure rufa. Thorax inaequalis, fuscus, maculis rufis. Scutellum macula media rufa, in qua lineola ferruginea. Alae pallide fuscae. Subtus atra.

*linearis.* 6. *N. cauda bifeta*, corpore linearis.  
Nepa linearis, manibus spina laterali pollicatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 714. 7. *Fn. Sv.* 908.  
Hepa corpore linearis. *Geoff. Inf.* I. 480. tab. 10. fig. 1.  
*Locusta aquatica Moufferi.* *Raj. Inf.* 59.  
*Swammerd. bibl.* I. 233. tab. 3. fig. 9.  
*Roef. Inf.* 3. 141. tab. 23.

*Frisch.*

*Frisch. Inf.* 7. 24. tab. 16.

*Gronov. Zooph.* 683.

*Schaeff. Icon.* tab. 5. fig. 5. 6.

Habitat in Europae aquis.

Antennae mihi haud visae.

158. NAVCORIS. *Os rostro subinflexo.*

*Setae tres inaequales.*

*Labium porrectum, ro-*  
*tundatum.*

*Antennae brevissimae, sub*  
*oculis insertae.*

1. N. abdominis margine ferrato. *Geoff. Inf.* 1. 474. 1. *Cimicoi-*  
tab. 9. fig. 5. *des.*

*Nepa cimicoides. Linn. Syst. Nat.* II. 714. 6. *Fn. Sv.* 907.

*Cimex aquaticus latior. Frisch. Inf.* 6. 31. tab. 14.

*Roes. Inf.* 3. 176. tab. 28.

*Gronov. Zooph.* 686.

*Schaeff. elem.* tab. 87.

— — *Icon.* tab. 33. fig. 3. 4.

Habitat in Europae aquis.

2. N. abdominis margine integro.

Habitat in Antigua Insula. *Drury.*

*nepaefor-*  
*mis.*

Statura praecedentis, at triplo minor. Caput et tho-  
rax obscure flavescens. Scutellum fuscum. Elytra  
obscure flavescens, alis fuscis. Subtus nigra, pe-  
dibus flavis.

159. ACANTHIA. *Rostrum inflexum, sub*

*capitis apice insertum.*

*Labium nullum.*

*Antennae ante oculos*  
*insertae.*

1. A. aptera.

*lectularia.*

*Cimex lectularius. Linn. Syst. Nat.* II. 715. 1. *Fn.*

*Sv.* 909.

*Geoff. Inf.* 1. 434. 1.

*Cimex. Raj. Inf. 7.*

*Cimex domesticus. Mouff. Inf. 259.*

*Bonaun. micr. tab. 65.*

*Ledermüll. microsc. tab. 52. 63.*

*Sultz. tab. 10. fig. 69.*

Hospitatur in Europae domibus.

Animal foetidum, nocturnum, sanguisugum: pellitur  
nidore carbonum, oleo terebinthinae accenso,  
mentha arvensi, oleo vitrioli, tabaci, thlaspi, sam-  
buco, cannabi.

*clavicor-* 2. A. elytris reticulato-punctatis, antennis clavatis.  
*nis.*

*Cimex clavicornis coleoptratus, elytris nervoso-car-  
natis, reticulato punctatis, antennis clavatis. Linn.  
Syst. Nat. II. 717. 16. Fn. Sv. 911.*

*Cimex ex albo fuscoque cinereus, elytrorum thoracis-  
que margine punctato, antennis subclavatis. Geoff.  
Inf. I. 461. 56.*

*Reaum. Inf. 3. tab. 34. fig. 1—4.*

Habitat in Europae hortis.

*Serratu-* 3. A. nigra, elytris pallescentibus, alis apice fuscis.  
*lae.*

Habitat in Angliae serratulis. *Muf. Banks.*

Parva. Antennae triarticulatae, filiformes. Caput et  
thorax atra, immaculata. Elytra pallida, punctis duo-  
bus nigris. Alae albae, apice fuscae. Pedes rufescentes.

*littoralis.* 4. A. elytris folidis, albo punctatis, corpore nigro.  
*Cimex littoralis. Linn. Syst. Nat. II. 717. 14. Fn. Sv. 914.*  
Habitat in Europae littoribus.

*rugosa.* 5. A. elytris pallidis, corpore oblongo, femoribus anti-  
cis crassissimis.

*Cimex rugosus. Linn. Syst. Nat. II. 717. 15. Fn. Sv. 916.*

Habitat in Europa boreali.

Femora antica crassiora, transverse striata.

*lunata.* 6. A. thorace lunato; margine prominente, abdomine  
ferrato.

Habitat in Indiis.

Statura A. corticalis, depressa, at paulo maior; ob-  
scure ferruginea. Thorax tenuis lateribus promi-  
nulis, lunatis. Abdomen utrinque dentibus quin-  
que serratum, elytris latius.

7. A. membranacea, abdominis margine imbricatim secto, *corticalis*.  
corpore nigro.  
Cimex corticalis. *Linn. Syst. Nat. II. 718. 17. Fn. Sv. 917.*  
*Schaeff. Icon. tab. 51. fig. 6. 7.*  
Habitat in Europae arboribus sylvaticis.
8. A. nigra, abdome laevi, brunneo, alis pallidis. *laevis.*  
Habitat in Anglia. *Banks.*
- Statura preecedentis, at duplo minor. Caput et thorax  
nigra, immaculata. Abdomen brunneum, margine  
integro. Alae angustae, pallidiores.
9. A. membranacea, thorace denticulato, capite spinoso.  
elytris antice dilatatis. *Betulae.*  
Cimex Betulae. *Linn. Syst. Nat. II. 718. 18. Fn. Sv. 918.*  
Habitat in betula alba.  
Tota valde depresso et nigra.
10. A. abdome marginato, fusco: apice flavescente, ti- *crassipes.*  
biis anticis incrassatis.  
Habitat Dresdae Saxonum.  
Affinis videtur cimici eroso *Limnaei*. Antennae flavae,  
clavatae. Caput fuscum, apice fissum. Thorax niger,  
scaber. Elytra fusca, alis pallidis. Abdomen postice  
dilatatum, marginatum, acutum, basi nigrum, mar-  
gine albo, apice flavescentes. Pedes flavi, tibiis anti-  
cis incrassatis.
11. A. ferruginea, thorace marginato: margine antice *umbra-  
lata.*  
scutelloque apice albis.  
Habitat Hafniae. *Torstenson.*  
Magnitudo praecedentis. Caput marginatum, ferrugi-  
neum, ore flavescente. Thorax marginatus, fer-  
ruginosus, puncto marginali albo. Scutellum ferru-  
gineum, apice album. Elytra immaculata. Margo  
abdominis albo nigroque varius. Abdomen subtus  
flavescentes, maculis baseos utrinque duabus et anali  
solitaria atris.
12. A. thoracis marginē ferrato, corpore griseo, alis *serrata.*  
albis, fusco maculatis.  
Habitat . . . *Mus. Tottianum.*  
Caput griseum, spina ante oculos. Thorax margine  
ferrato, dentibus approximatis brevibus. Elytra  
grisea,

grisea, margine albo, nigro punctato. Alae albae, punctis fuscis irroratae. Subtus grisea, femoribus posticis apice dentatis.

*Cardui.* 13. A. scutello lineis tribus elevatis, antennis apice nigris.

*Cimex cardui.* *Linn. Syst. Nat.* II. 718. 21. *Fn. Sv.* 920.  
Habitat in cardui capitulis.

*Pyri.* 14. A. thorace trialato, scutello foliato, elytris reticulatis, basi gibbis.

Habitat in foliorum pyri pagina inferiori, ea maculans. Prof. *Herrmann.*

Caput parvum, albidum. Thorax alis tribus magnis, elevatis, albis, fusco-reticulatis: lateralibus compressis, carinatis, acutis: intermedia globosa, breviora. Scutellum elevatum, foliaceum, acutum, album, macula fusa baseos. Elytra reticulata, alba, fusco-maculata, basi gibba. Pedes albi.

*rhombea.* 15. A. thorace acutangulo, abdomine dilatato, rhombeo, postice sexdentato. *Linn. Syst. Nat.* II. 718. 22.

Habitat in Africa.

Corpus supra griseum, subtus flavescens. Antennae purpureae.

## 160. C I M E X. Os rostro inflexo.

*Labium elongatum, subulatum, annulatum.*

*Antennae ante oculos insertae.*

\* *Scutellati, scutello longitudine abdominis.*

*Stokerus.* 1. C. scutellaris, corpore viridi: maculis fuscis, obsoletis. *Cimex Stokerus scutellaris, corpore viridi, maculis nigris,* *Linn. Syst. Nat.* II. 715. 2.

*Stokerus benghalensis viridis, nigro maculatus.* *Petiv. Gazoph.* 34. tab. 21. fig. 12.

Habitat in China.

2. C. scutellaris, coeruleo - auratus, nigro maculatus. *nobilis.*

*Linn. Syst. Nat. II. 716. 3. Amoen. acad. 6. 400. 46.*

Habitat in Asia.

Subtus rufus, lateribus coeruleo auroque nitentibus.

3. C. scutellaris, thorace scutelloque aureis, thorace punctis duobus, scutello maculis duabus coerulescentibus. *regalis.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Corpus magnum, nitidum. Antennae nigrae. Caput viridi nitens, linea longitudinali cyanea. Thorax laevis, glaber, rufo - aureus, antice punctis duabus cyaneis et inter haec macula obsoleta, rufa. Margo thoracis posticus parum cyaneus. Scutellum rufo - aureum, nitidum, maculis duabus cyaneis, altera ad basin, altera ad apicem. Alae omnes fuscae, costa anteriorum usque ad medium cyanea. Pectus cyaneum, rufo maculatum. Abdomen rufum, utrinque linea e punctis cyaneis, impressis. Anus cyaneus. Pedes cyanei, femoribus basi rufis.

4. C. scutellaris, thorace scutelloque rufis, abdōmine cyaneo: margine sanguineo. *imperialis.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Affinis praecedenti. Antennae nigrae. Caput viride, ore coeruleo rostroque atro. Thorax glaber, nitens, rufus, immaculatus. Scutellum nitidum, rufum, apice aureum. Alae omnes nigrae, anticis margine exteriore usque ad medium cyaneis, costa sanguinea. Corpus subtus cyaneum, nitidum: margine sanguineo. Linea rubra, abbreviata ad basin abdominis. Anus totus viridis.

5. C. scutellaris, virescens: maculis annularibus nigris. *annulus.*

Habitat in Senegal. *Mauduit.*

Thorax rotundatus, virescens, strigis duabus nigris, posteriori undata. Scutellum magnum, maculis undecim annularibus nigris, 5. 4. 2.

6. C. scutellaris, supra rufus: maculis difformibus nigris. *Druraei.*

Cimex Druraei scutellaris, sanguineus, punctis maculisque nigris, subtus atro - coerulescens. *Linn.*  
*Manu. 534.*

*Drury. Ins. 1. tab. 42. fig. 1. 5.*

Habitat in America.

- Fabricii.** 7. *C. scutellaris, subpurpurascens, fulvo punctatus.*  
*Cimex Fabricii scutellaris, purpureus, punctis sanguineis, subtus atro-coerulescens. Linn. Mant. 534.*  
Habitat in Cajenna.  
Alter sexus supra rufescens, alter obscure coerulescens.
- paganus.** 8. *C. scutellaris, cyaneus, scutello abdomineque rufis, cyaneo maculatis.*  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
**Medius.** Antennae nigrae. Caput et thorax cyanea, nitida, immaculata. Scutellum glabrum, rufum, macula magna cyanea baseos et in hac utrinque punctum minutissimum rubrum. In medio maculae duae approximatae, fasciam fere constituentes, cyaneae. Pectus cyaneum, canali pro rostri receptione sanguineo. Abdomen rufum, maculis lateribus anoque cyaneis. Pedes cyanei.  
Variat thorace macula rufa et abdomine punctis quatuor cyaneis in medio.
- lineatus.** 9. *C. scutellaris, niger, thorace lineis quinque, scutello tribus luteis, abdomine flavo: punctis nigris.*  
*Linn. Syst. Nat. 11. 716. 6.*  
*Cimex rotundatus, ruber, supra fasciis longitudinalibus, infra punctis nigris, scutello ampio totum fere abdomen obtegente. Geoff. 1. 468. 68.*  
*Scop. carn. 352.*  
*Mouff. Ins. 174. fig. 5.*  
*Gronov. Zooph. 689.*  
*Schaeff. Elem. tab. 44. fig. 1.*  
*— Icon. tab. 2. fig. 3.*  
Habitat in Europa australi.
- semipunctatus.** 10. *C. scutellaris, flavus, thorace punctis decem, scutello lineis quatuor nigris.*  
Habitat in America.  
Statura et summa affinitas praecedentis. Caput acuminatum, flavum, lineis duabus marginalibus nigris, quae tamen apicem haud attingunt. Thorax rotundatus, flavus, punctis decem nigris. 4. 4. 2.  
Lineola

Lineola parva nigra utrinque ad basin. Scutellum magnum flavum, lineis quatuor nigris: lateralibus abbreviatis. Subtus flavus, nigro punctatus. An praecedentis varietas?

11. *C. scutellaris*, cyaneus, scutello basi apiceque flavescente, abdominis margine flavo, nigro punctato. *Anchorago.*  
Habitat in America. *Dr. Solander.*

Caput depresso, obscure cyaneum, apice emarginatum. Thorax subspinosis, punctatus, cyaneus, dente antico lunulaque utrinque laterali flavescentibus. Scutellum longitudine fere abdominis cyaneum, basi, apice lineaque dorsali connectente flavis. Elytra cyanea. Alae nigrae. Subtus cyaneus, sterno porrecto, flavo. Abdominis margo flatus, punctis utrinque quatuor nigris. Pedes cyanei, femoribus basi apiceque lunula minutissima alba.

Variat sexu. Mas rufus, ubi foemina flava.

12. *C. scutellaris*, corpore flavescente: supra lituris longitudinalibus nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 716. 7.* *grammicus.*  
Habitat in Africa.

Supra liturae duae longitudinales, fuscae.

13. *C. scutellaris*, griseus, scutello basi punctis duobus albis. *Linn. Syst. Nat. II. 716. 5.* *Fn. Sv. 913.* *Maurus.*

Cimex fuscus, scutello totum abdomen obtegente, amplissimo. *Geoff. Inf. I. 435. 3.*  
*Schaeff. Icon. tab. 43. fig. 3. 4. 15. 16.*  
*Scop. carn. 352.*

Habitat in Oriente, apud nos quadruplo minor.

14. *C. scutellaris*, ferrugineus, immaculatus. *Hottentotta.*  
Habitat in Arabia. *Forstkaeb.* *ta.*

Maior *C. Mauro* et latior: distinguitur facilime colore toto obscure ferrugineo, minime nitido.

15. *C. scutellaris*, virescens, fusco-irroratus. *irroratus.*  
Habitat in America. *v. Rohr.*

*C. Mauro minor.* Corpus totum virescens, punctis fuscis numerosissimis irroratum. Antennae et pedes pallidi. Subtus flavescentia, immaculatus.

- Scarabaeoides.* 16. *C. scutellaris*, corpore atro-aeneo. *Linn. Syst. Nat.* II. 716. 4. *Fn. Sv.* 912.  
*Cimex hemisphaericus*, nigro-aeneus, scutello totum abdomen obtegente, amplissimo. *Geoff. Inf.* I. 435. 4.  
*Sultz. Inf.* 26. tab. II. fig. 70.  
Habitat in ranunculi floribus.
- flavipes.* 17. *C. scutellaris*, nigro-aeneus: margine omni pedibusque flavis.  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
Parvus. Caput flavescens, margine postico nigro.  
Thorax nigro-aeneus, nitens, margine antico et laterali flavescentibus. Scutellum nigro-aeneum, punctis duobus parvis baseos margineque flavis. Abdomen nigro-aeneum, margine flavo. Pedes flavi.
- fuliginosus.* 18. *C. scutellaris*, scutello fuliginoso, lituris quinque nigris: postica alba. *Linn. Syst. Nat.* II. 2. 716. 8. *Fn. Sv.* 914.  
*Schaeff. Icon.* tab. II. fig. 10 — 12.  
Habitat in Europa, in Oriente. *Forstkähl.*
- Litura.* 19. *C. scutellaris*, niger, scutello lituris tribus albis.  
Habitat in Arabia. *Forstkähl.*  
Statura et summa affinitas *C. fuliginosi*, at scutellum lineolis s. lituris tribus albis, quarum posterior solitaria, brevior.
- inunctus.* 20. *C. scutellaris*, ater, scutello basi pedibusque griseis.  
Habitat in Anglia.  
Corpus medium, oleo quasi inunctum. Caput gibbum, subcarinatum, atrum, immaculatum. Thorax ater, antice utrinque spina brevissima, subcapiata pone oculos. Scutellum obscurum, basi griseum, punctatum. Pedes pallidi.
- Arabs.* 21. *C. scutellaris*, thorace spinoso, corpore ovato, lido, ano bidentato. *Linn. Syst. Nat.* II. 716. 9. *Mus. L. Ulr.* 168.

*Cimex sylvestris*, foetens, viridis, triangularis.

*Sloan. Iam.* 2. tab. 237. fig. 15. 16.

Habitat in America.

Corpus flavescens, spinarum thoracis apicibus nigris.

22. *C. scutellaris*, thorace subangulato, corpore supra *stolidus*.  
viridi, subtus flavo, ano bidentato. *Linn. Syst. Nat.*  
11. 717. 11. *Mus. Lud. Uhr.* 170.

Habitat in Indiis.

Abdomen supra coerulescens, lateribus viridibus, subtus  
flavum.

\* \* *Spinosi*: thorace spina utrinque armato.

23. *C. thorace acute spinoso*, griseus, antennis rufis. *bidens*.  
*Linn. Syst. Nat.* 11. 718. 23. *Fn. Sv.* 921.  
*Sultz. Ins.* tab. 11. fig. 72.

Habitat in Europa.

Puncta aliquot rufa in pectore.

24. *C. thorace obtuse spinoso*, griseus, pedibus rubris. *rufipes*.  
*Linn. Syst. Nat.* 11. 719. 24. *Fn. Sv.* 922.  
*Schaeff. Icon.* tab. 57. fig. 6. 7.

Habitat in Europa.

Scutellum apice rufum.

25. *C. thorace obtuse spinoso*, subvirescente, elytris *luridus*.  
griseis: macula fusca, clypeo emarginato.

Habitat in Anglia. *Mus. Banks.*

Maior *C. Baccarum*. Antennae fuscae, articulo  
penultimo apice albo. Caput virens, apice late  
emarginatum. Thorax obtuse spinosus, virescens,  
dorso griseo. Scutellum basi virescens, apice gri-  
seum. Elytra grisea, macula fusca posticeque ter-  
minantur puncto albo. Abdominis margo nigro  
rufoque varius. Subtus flavescens, nigro pun-  
ctatus.

26. *C. thorace obtuse spinoso*, subferrugineus, spinis *nigricor-*  
*nis*. antennisque nigris.

Habitat in Saxoniam.

Antennae nigrae. Corpus mox ferrugineum, mox  
griseum, spinis thoracis tamen semper nigris.

Pedes pallidi.

- ictericus.* 27. C. thorace spinoso, oblongus, supra rufescens, subtus flavus. *Linn. Syst. Nat.* II. 719. 25. *Amoen. acad.* 6. 399. 41.

Habitat in America.

Antennae et pedes rufi.

- dentatus.* 28. C. thorace acute spinoso, serrulato, corpore cinerreo nigroque vario.

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Magnitudo et statura C. rufipedis. Caput porrectum, utrinque unidentatum. Thorax acute spinosus denticulisque quatuor minoribus ferratus. Abdomen subtus canaliculatum.

- floridanus.* 29. C. thorace spinoso, niger, rubro-varius, scutello maculis tribus rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 719. 26.

Habitat in America.

Thorax linea media lateralibusque rubris. Abdomen rubrum, lateribus nigris.

- armatus.* 30. C. thorace acute spinoso, scutello nigro: punctis duobus apiceque testaceis, antennis pedibusque rubris.

Habitat in nova Hollandia.

Antennae longitudine corporis rufae, ultimo articulo dilutiore. Caput nigrum, lineis quatuor flavescentibus, intermediis abbreviatis. Thorax niger, punctis flavescentibus, inprimis ad latera irroratus. Margo tenuissime flavus, postice spina acuta, recurva. Scutellum nigricans, punctis duabus magnis baseos apiceque testaceis. Elytra subferruginea, flavo-lineata. Alae nigrae. Abdomen ferratum, ferrugineum, margine lineisque tribus flavis, media abbreviata. Pedes rufi, femoribus posticis basi ferrugineis.

- haemorrhous.* 31. C. thorace spinoso, niger, abdomine rufo, elytris punctis linearibus quinque nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 719. 27. *Amoen. acad.* 6. 400. 45.

Habitat in America.

Elytra testacea, maculis linearibus quinque.

32. C. thorace spinoso, niger, elytris lividis, capite 2. *pustula-*  
*punctis duobus coccineis.* *tus.*  
 Cimex 2. *pustulatus oblongiusculus*, niger, thorace  
 spinoso, punctis verticis duobus coccineis. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 719. 29.  
 Habitat in America.  
 Caput, thorax, pectus, alae nigra. Vertex punctis  
 duobus globosis, elevatis, rufis. Elytra livida.  
 Abdomen rufum.
33. C. thorace spinoso, niger, scutello lunula apiceque *punicus.*  
*rubris.* *Linn. Syst. Nat.* II. 719. 31.  
 Habitat in Africa.  
 Thorax litura spinarumque basi rufis. Subtus va-  
 riegatus.
34. C. thorace spinoso, lividus, scutello y flavo in- *Ypsilon.*  
*scripto.* *Linn. Syst. Nat.* II. 720. 32.  
 Habitat in America.  
 Antennae nigrae, annulis duobus albis. Elytra pun-  
 cto albo.
35. C. thorace spinoso, viridis: fascia flavicante, ca- *clypearus:*  
*pite clypeato.* *Linn. Syst. Nat.* II. 720. 33.  
 Cimex ovatus, thorace utrinque aculeato, fascia  
 transversali flavicante, scutello gibbosio, capite cly-  
 peato, ano ferrato. *Gronoph. Zooph.* 691.  
 Habitat in China.
36. C. thorace obtuse spinoso, subvirescens, antennis *harmo-*  
*nigris, sterno porrecto.* *Linn. Syst. Nat.* II. 720. *rhoidalis.*  
 35. *Fn. Sv.* 925.  
 Cimex subovatus, viridis, angulis thoracis acutis ru-  
 bris apice nigris, abdome subtus acuto. *Geoff.*  
*Inf.* I. 465. 63.  
*Schueff. Icon. tab.* 57. fig. 8?  
 Habitat in Europa.
37. C. thorace spinoso, griseus, scutello punctis duo- *oculatus.*  
 bus flavis, tarsis anticis apice compresso-membra-  
 naceis.  
 Habitat in China. *Drury.*  
 Magnitudo praecedentis. Antennae longitudine fere  
 corporis fuscae, annulis duobus albis. Caput su-  
 fum,

scum, immaculatum. Thorax griseus, sive e fuso et testaceo mixtus, postice spina parva obtusa arinatus. Scutellum apice pallidius, basi utrinque puncto glaberrimo flavo. Elytra concolora, alis nigris. Color subtus flavus, linea laterali fusca abdominalisque marginibus fusco ferrugineoque variegatis. Femora scabra, pallida, apice nigra. Tibiae nigrae. Tarsi pallidi, apice nigri, dilatato-membranacei. Pedes quatuor postici pallidi, geniculis nigris.

*annulatus.* 38. C. thorace spinoso, griseus, tibiis albo-annulatis.  
Habitat in Virginia. *Drury.*

Magnus. Capitis clypeus oblongus, emarginatus. Corpus cinereo fuscoque variegatum, punctatum. Thorax postice obtusissime spinosus. Scutellum elongatum, in medio parum coarctatum. Pedes grisei, femoribus omnibus subtus fascia alba, tibiis anticis annulo, posticis quatuor duobus albis.

*4. pustula-* 39. C. thorace crenato, obtuse spinoso scutelloque punctis duobus rufis.  
Habitat in America. *Drury.*

Praecedente paulo minor. Clypeus fissus. Thorax lateribus crenatis, postice obtuse spinosis, scaber, fuscus, punctis duobus parvis ferrugineis, dorsalibus. Scutellum concolor, punctis duobus paulo maioribus ferrugineis ad basin. Elytra et alae fusca. Subtus cinereus.

*maculatus.* 40. C. thorace obtuse spinoso, virescens, thorace maculis quatuor, scutello elytrisque apice fuscis.  
Habitat in America. *v. Rohr.*

Antennae virides, apice rufescentes. Caput stemmatibus duobus pallidis. Thorax maculis duabus dorsalibus et minori solitaria utrinque ad basin spineae. Apex scutelli et elytrorum fuscescens. Alae pallidae.

Variat interdum elytrorum apice concolore.

*pugnax.* 41. C. oblongus, thorace acute spinoso, virescens, antennis rufis.  
Habitat in America. *Drury.*

C. hae-

C. haemorrhoidalii triplo minor. Caput planum, virescens, antennis rufis. Thorax ovatus, postice utrinque spina acutissima, antrorsum versa armatus. Scutellum pallidius. Elytra concolora, immaculata. Subtus pallidior, linea media abdominis e punctis nigris. Pedes pallidi.

42. C. thorace acute spinoso, virescens, abdomine lineis *emeritus*. duabus albis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Corpus parvum, virescens. Thorax postice utrinque spina parva, acuta, rufa. Scutellum apice albi. Abdomen virescens, lineis duabus subelevatis albis. Antennae et pedes virescentes.

43. C. thorace acute spinoso, scutelloque flavescentibus, nigro punctatis, elytris punctis albis scabris. *gladiator.*

Habitat in America. *v. Rohr.*

Antennae flavo fuscoque variae. Caput flavum, apice valde emarginatum, subspinosum, postice stemmatibus duobus rubris. Thorax et scutellum flavescentia, punctis numerosis nigris. Elytra pallidiora, punctis elevatis albis, scabra. Alae albidae. Subtus flavescentis.

44. C. thorace acute spinoso, ferrato, fuscus, clypeo *furcatus*. acuminato, bifido.

Habitat in Patagonia. *Mus. Banks.*

Caput fuscum, antice bifidum, laciiniis acutis. Thorax fuscus, margine ferrulato posticeque acute spinoso. Scutellum fuscum. Elytra obscure grisea. Alae albidae. Abdomen fuscum, margine subserrato. Pedes grisei.

Variat colore toto griseo.

45. C. thorace acute spinoso, fuscus, scutello apice rufo, pedibus pallidis, nigro punctatis. *Victor.*

Habitat in America *v. Rohr.* In Brasilia. *Banks.*

Antennae nigro pallidoque variegatae. Caput fuscum, apice acuminato-spinosum. Thorax, scutellum, elytra fuscum, punctis minutissimis albis adspersa. Scutellum apice rufum. Abdomen ferratum,

tum, fuscum, punctis paucis elevatis, albis scabrum. Anus dentibus duobus validis, acutis, atris. Pedes pallidi, valde nigro punctati.

- ciliatus.* 46. C. thorace ciliato, obtuse spinoso, nigro: margine fasciaque postica flavis, femoribus posticis ferratis. Habitat in America. v. Robr.

Antennae filiformes, nigrae. Caput nigrum, stemmate rufo. Thorax lateribus spinis brevissimis ciliatus, niger, lateribus fasciaque flavis. Elytra nigra. Abdomen supra cyaneum, lateribus rubro maculatis. Subtus fuscum, rubro maculatum.

- scorbuticus.* 47. C. thorace obtuse spinoso, fuscus, pedibus pallidis, nigro punctatis.

Habitat in America.

Affinis praecedenti. Antennae filiformes, pallidae, spina acuta valida ad basin armatae. Caput, thorax, elytra, alae obscure fusca. Abdomen supra rubrum, margine nigro, pallido maculato: subtus fuscum, lineis tribus rufescensibus, obsolete nigro punctatis. Pedes pallidi, punctis numerosissimis nigris.

- Aggressor.* 48. C. thorace acute spinoso, ano quadridentato, corpore flavescente: spinis subconcoloribus.

Habitat in nova Hollandia. Mus. Banks.

Caput flavescens, sulcis duobus apicis impressum. Thorax flavescens, spina utrinque valida, acuta, subferruginea. Scutellum flavescens, in medio virescens. Elytra viridia, flavo - sublineata. Alae albidae. Abdomen flavescens, viridi - lineatum: ano dentibus quatuor validis, viridibus, apice nigris. Pedes flavi.

- Defensor.* 49. C. thorace acute spinoso, ano quadridentato, corpore viridi: spinis nigris.

Habitat in nova Hollandia. Mus. Banks.

Medius. Caput viride, immaculatum, apice sulcis duabus impressum. Thorax viridis, spina utrinque valida, porrecta, acuta, nigra. Scutellum nigrum, immaculatum. Elytra alaeque fusca. Abdomen viride, ano; dentibus quatuor validis, nigris, lateralibus maioribus. Pedes pallidi, femoribus nigro punctatis.

50. C. thorace obtuse spinoso, abdomine marginato, *marginalis*.  
acuto, antennis rufis.

Cimex marginatus oblongo-ovatus, griseus, thorace  
obtuse spinoso, antennis medio rubris. *Linn. Syst.*

*Nat. 11. 719. 28. Fn. Sv. 923.*

Cimex oblongus, fuscus, immaculatus, thorace utrinque  
obtuse angulato, capite prope antennas externe  
denticulato. *Geoff Inf. 1. 446. 20.*

*Scopol. carn. 363.*

Habitat in Europae plantis.

51. C. thorace obtuse spinoso, supra fuscus, subtus flavescentes, abdomine quadrato. *quadratus.*

Habitat in Germania.

Antennae basi cinereae, medio rufae, apice fuscae.

Thorax obtuse spinosus, scaber, fuscus, margine  
albicante. Abdomen depresso, planum, fuscum,  
utrinque angulatum: subtus flavescentes.

52. C. thorace acute spinoso, bipunctato, elytris puncto baseos strigaque flavis. *velox.*

Habitat in America. *Drury.*

Magnitudo C. bidentis, supra cinereus, subtus rufescens. Thorax antice angustatus, postice utrinque acute spinosus, margine punctisque duobus dorsilibus flavis. Elytra ferruginea, puncto parvo baseos et striga tenuissima apicis flavis. Femora ferrata.

53. C. thorace subspinoso, elytris fuscis, albo reticulatis, abdominis basi spinoso. *Meriani.*

*Merian. Sur. tab. 51.*

Habitat Surinami. *Drury.*

Caput nigrum, albo maculatum. Thorax postice subspinosis, ater, linea marginali alba. Scutellum triangulare, acutum, nigrum. Elytra picea sive obscure fusca, lineis variis longitudinalibus transversalibusque reticulata. Alae fuscae. Abdomen supra coerulescens, utrinque in singulis segmentis punctis duobus marginalibus rufis, excepto primo, quod unicum gerit et ultimo immaculato, margine utrinque quadridentato. Anus corniculis duobus prominet. Pectus nigro flavoque variat. Abdomen subtus flavum, nigro maculatum pun-

Etatumque, basi dente valido armatum. Pedes nigri, femoribus anticis subtus unidentatis tibiisque posticis basi tuberculo notatis.

*valgus.*

54. C. thorace spinoso, femoribus posticis incurvis tibiisque posticis unidentatis. *Linn. Syst. Nat. II. 720. 36. Mus. Lud. Ulv. 171.*

Habitat ad Cap. B. S.

Abdomen basi subtus utrinque spinis duabus validis armatum.

*femora-  
tus.*

55. C. thorace subspinoso, femoribus posticis incurvis, dentatis tibiisque posticis compressis.

Habitat in India. *Mus. Banks.*

Affinis praecedenti. Antennae ferrugineae. Frons inter antennas compressus, acuminatus. Thorax scaber, niger, immaculatus. Femora quatuor antica serrata, postica incurva, crassiora, dentata. Tibiae anticae rufae, posticae compressae, marginatae, inermes.

- Phyllopus.* 56. C. thorace spinoso, nigricans, elytris fascia albicans, tibiis posticis membranaceis, dentatis. *Linn. Syst. Nat. II. 731. 113.*

Habitat in America australiore.

- Gonagra.* 57. C. thorace subspinoso: fascia alba, elytris fuscis: puncto cinereo.

Habitat in Insula St. Thomas Americae. *Mus. Totianum.*

Summa affinitas praecedentis. Antennae nigro ferrugineoque variegatae. Caput angustum, nigrum, lineis tribus fulvis. Thorax subspiniferus, antice fascia arcuata, albida. Elytra obscure fusca, puncto parvo, cinereo, Subtus rufus, pectore cinereo punctato abdomeque nigro-lineato. Pedes exakte praecedentis, cuius forte varietas.

- australis.* 58. C. thorace subspinoso, oblongus, niger, thorace fascia antica rubra, tibiis posticis basi membranaceis.

Habitat in Insula Otaheiti maris pacifici. *Mus. Banks.*

Praecedentibus maior. Antennae nigrae, articulo tertio annulo rufo. Thorax niger, fascia antica rufa margineque postico elevata, subspinoso. Scutellum

tellum et elytra nigra, immaculata. Corpus sub-tus nigrum, maculis rufis striatum. Pedes nigri, femoribus scabris ferratis tibiisque basi membranaceis.

59. C. thorace acute spinoso, oblongus, supra niger, *eruciger*.  
thorace lineis, elytris cruce ferrugineis.

Habitat in Brasilia.

Corpus valde oblongum. Antennae nigrae. Caput ferrugineum, margine postico nigro oculisque testaceis. Thorax scaber, niger, lineis quatuor ferrugineis. Scutellum nigrum, margine ferrugineo. Elytra nigra, margine interiore ferrugineo, ita ut alis complicatis crux Andreae appareat. Alae atrae. Pectus flavum, strigis nigris. Abdomen pedesque ferruginea, tibiis nigris; femoribusque posticis dentatis.

60. C. thorace acute spinoso, oblongus, rufus, elytris *sanctus*.  
nigris: cruce ferruginea.

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

Praecedente minor. Antennae rufae, articulo ultimo subclavato, fusco. Caput et thorax rufa, rostro apice nigro. Scutellum rufum. Elytra nigra, linea lata ferruginea ab angulo humerali ad medium marginis tenuioris et inde ad apicem elytri ducta. Alae fuscae. Abdomen sanguineum, punctis aliquot nigris. Pedes rufi, femoribus posticis ferratis punctisque elevatis, nigris, scabris.

Variat scutello elytrisque rufis, immaculatis. An distinctus?

61. C. thorace acute spinoso, oblongus, rufus, femori- *serripes*.  
bus posticis dentatis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Statura oblonga praecedentium, at minor. Antennae rufae, articulo ultimo pallido. Caput rufum, sub-tus utrinque linea laterali flava. Thorax rufus, immaculatus, postice spina parva, acuta, nigra armatus. Scutellum rufum, puncto parvo apicis flavo. Elytra rufa, immaculata. Pectus et abdomen rufa, linea laterali late flava. Pedes rufi, femoribus posticis elongatis, ferratis tibiisque incurvis.

*linearis.* 62. C. thorace acute spinoso, elongatus, fuscus, femoribus posticis elongatis, denticulatis.

Habitat in China. *Drury.*

Statura valde elongata, tenuis et fere linearis. Antennae filiformes, longitudine corporis. Thorax postice utrinque spina parva acuta armatus elytraque fusca, immaculata. Subtus fuscus, utrinque linea laterali lata, flava, et in abdomine lineola parva baseos alba. Femora postica valde elongata, intus dentata, tibiae incurvae.

*spinosus.* 63. C. elongatus, ruber, thorace quadrispinoso. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 720, 37.

Habitat in America.

Affinis praecedenti. Corpus rubrum. Antennae longissimae, filiformes. Pedes longi, nigri.

\* \* \* *Ovati, thorace mixto.*

*nigripes.* 64. C. ovatus, supra sanguineus, scutello basi, elytris macula nigra.

Cimex incarnatus. *Drury. Inf.* 2. tab. 36. fig. 5?

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Magnus. Caput nigrum, glabrum. Thorax sanguineus, apice margineque nigricantibus. Scutellum magnum, rufum, basi atrum, quae tamen nigredo latera haud attingit. Elytra laevia, sanguinea, macula magna reniformi, nigra. Alae atrae. Subtus flavus, puncto pectoris coerulecente. Abdomen basi punctoque utrinque in singulis segmentis coerulecentibus. Rostrum et pedes nigra.

*torquatus.* 65. C. ovatus, viridis, capite thoraceque antice rufescientibus.

Habitat in India.

Magnitudo C. iuniperini. Supra viridis, capitis thoracisque margine antico rufis. Antennae fusco viridiique variegatae.

*viridulus.* 66. C. ovatus, supra flavus, punctis viridibus, subtus viridis. *Linn. Syst. Nat.* II. 721. 39. *Mus. L. U.* 172.

Habitat in Indiis.

67. C. ovatus, viridis, immaculatus, antennis apice albo *prasinus*.  
fuscoque annulatis.  
Cimex prasinus subrotundus, totus viridis, scutello  
concolore. *Linn. Syst. Nat.* II. 722. 49. *Fn. Sv.* 931.  
Habitat in Europae sylvis.
68. C. subrotundus, viridis, margine undique scutello- *juniperi-*  
que apice flavo. *Linn. Syst. Nat.* II. 722. 48. *Fn.* *nus.*  
*Sv.* 930.  
Cimex subrotundus, viridis. *Geoff. Inf.* I. 464. 61.  
Cimex sylvestris, viridis. *Raj. Inf.* 53. I.  
*Schaeff. Icon. tab.* 46. fig. I. 2.  
Habitat in Europae juniperis.
69. C. ovatus, viridis, scutello punctis tribus baseos *samaragdus-*  
flavis.  
Habitat in insula Madera. *Mus. Banks.*  
Antennarum articulus primus viridis, apice fuscus, se-  
cundus fuscus, basi viridis, tertius totus fuscus.  
Caput rotundatum, integrum, oculis testaceis. Tho-  
racis margo flavescens. Scutellum viride, punctis  
tribus minutissimis baseos flavis. Abdomen viride,  
linea ventrali flavescente. Pedes virescentes.
70. C. ovatus, fusco-griseus, scutello punctis tribus api- *coelebs.*  
ceque flavescientibus.  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
Medius. Antennae fuscae, basi rufescentes. Caput,  
thorax et elytra obscure grisea. Scutellum conco-  
lor, punctis tribus distinctis ad basin albis. Apex  
etiam albicat. Abdomen supra atrum, margine al-  
bido, subtus album, utrinque linea lata, atra, quae  
ante artum coeunt. Pectus atrum, medio album.  
Femora et tibiae pallida, apice nigra.
71. C. subrotundus, griseus, margine undique sangui- *dumosus.*  
neo. *Linn. Syst. Nat.* II. 721. 46. *Fn. Sv.* 929.  
Habitat in Europa, Suecia.  
Statura C. juniperini. Linea rubra a capite ad apicem  
scutelli ducta. Tibiae annulo rubro.
72. C. rotundatus, flavescens, capite lineis, scutello *tripuncta-*  
punctis tribus nigris.  
tus.  
Habitat in America. *Mauduit.*

Magnitudo fere C. juniperini. Antennae fuscae. Caput flavescens, lineis tribus nigris, intermedia bifida. Thorax angulo parum prominet flavescens, antice punctis quatuor nigris, quae cum capitatis lineis coincidunt. Scutellum magnum flavescens, maculis tribus nigris baseos. Elytra flavescentia, immaculata. Margo abdominis flavo nigroque varius.

*atomarius.* 73. C. ovatus, griseo fuscoque varius, alis albis, fuso punctatis.

Habitat in insula Terre neuve. *Mus. Banks.*

Antennarum articuli basi pallidi, apice nigri. Caput, thorax, elytra grisea, punctis numerosissimis fuscis irrorata. Alae albantes, punctis fuscis distinctis, sparsis. Abdomen flavescens, nigro punctatum.

*nubilis.* 74. C. ovatus, griseo nigroque varius, alis albis nigro striatis.

Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Parvus. Antennae totae nigrae. Caput griseum, lineis quatuor nigris. Thorax griseus, nigro irroratus, linea dorsali immaculata. Scutellum basi nigrum, linea media apiceque griseum. Elytra variegata, litura media rufescente. Alae albidae, lineis nigris. Subtus glaucus, nigro punctatus, abdominis margine rufescente.

*6 puncta-* 75. C. rotundatus, luteo nigroque varius, thorace luteo: tus. punctis sex nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 721. 42.*

*Mus. Lud. Utr. 175.*

Habitat in Indiis.

Elytra alaeque nigra, fascia transversa, lutea.

*signatus.* 76. C. ovatus, griseus, scutello vitta nigra.

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Banks.*

Magnus et reliquis longior. Caput, thorax, elytra, alae, abdomen obscure grisea, immaculata. Scutellum magnum griseum, vitta media atra.

*cinctus.* 77. C. ovatus, viridis, thoracis abdominalisque margine sanguineo.

Habitat in Oriente. *Forskahl.*

Minor C. interstincto. Scutelli apex flavescens.

78. *C. ovatus, viridis, thoracis abdominisque marginibus, antennis pedibusque sanguineis.* *eruentus.*

Habitat Surinami. *Drury.*

*Supra viridis, thoracis abdominisque marginibus sanguineis. Subtus flavus, strigis nigris, alternis abbreviatis. Antennae et pedes rufi.*

79. *C. ovatus, griseus, abdominis margine nigro maculato.* *Linn. Syst. Nat. II. 721. 44. Fn. Sv. 927.* *interflavetus.*

Habitat in Europae cultis.

80. *C. ovatus, fuscus, antennis nigris, sterno gibbo, comppresso.* *papillofus.*

*Cimex papillofus.* *Drury Inf. I. tab. 43. fig. 2.*

Habitat in Sierra Leon Africae.

*Magnus. Antennae nigrae. Thorax fuscus, margine tenuissime nigro. Abdomen supra coeruleum, subtus fuscum, utrinque linea punctorum elevatorum. Pedes grisei, plantis fuscis.*

81. *C. ovatus, ater, antennis, alis pedibusque concoloribus.* *funebris.*

Habitat in Sierra Leon Africae.

*Corpus magnum, ovatum. Antennae atrae, articulo ultimo magis fuso. Corpus totum atrum.*

82. *C. rotundatus, ater, antennis rufis.*

Habitat in India.

*Distincta a praecedente. Margo thoracis subciliatus.*

83. *C. ovatus, subfulvus, antennis nigris, abdominis margine fusco maculato.* *Linn. Syst. Nat. II. 721. 45. Fn. Sv. 928.* *Baccarum.*

*Cimex fuscus antennis abdominisque margine nigro croceoque variegatis.* *Geoff. Inf. I. 456. 64.*

*Cimex scapulis magis exstantibus, macula e flavo rubente in centro crucis dorsalis.* *Raj. Inf. 54. 2. Lst. Scarab. 396. 36.*

*Cimex ex luteo-virescenti infuseatus, ad alvi margines nigris maculis.* *Lst. lequ. 396. mut. tab. 31. fig. 19. Ionst. Inf. tab. 17. fig. 9.*  
*Schaeff. Icon. tab. 57. fig. 1. 2.*

Habitat in Europae baccis.

*Thorax subspinosus.*

- glaucus.* 84. *C. ovatus, glaucus, elytris apice puncto nigro.*  
*Habitat in nova Hollandia. Mus. Banks.*  
*Caput rotundatum, glaucum. Thorax glaucus, fascia media maculari flava. Scutellum glaucum. Elytra glauca, puncto parvo apicis versus marginem inferiorem nigro. Subtus pallidior.*
- lanus.* 85. *C. rotundatus, ater, thoracis elytrorumque basi, scutelli apice abdominisque margine sanguineis.*  
*Habitat in America. Mus. Banks.*  
*Triplo major C. ornato. Caput atrum, immaculatum. Thorax rufus, segmento antico nigro, margine tamen elevato, rufo. Scutellum nigrum, apice rufum. Elytra rufa, apice nigra. Alae nigrae. Abdomen nigrum, margine elevato, rufo. Pedes nigri.*
- ornatus.* 86. *C. ovatus, nigro rubroque varius, capite alisque nigris. Linn. Syst. Nat. II. 723. 56. Fn. Sv. 937.*  
*Geoff. Inf. I. 469. 69.*  
*Scop. carn. 361.*  
*Sultz. Inf. tab. II. fig. 73.*  
*Schaeff. Icon. tab. 60. fig. 10.*  
*Habitat in Europa, in Oriente. Forstkahl.*
- sefliivus.* 87. *C. ovatus, nigro rubroque varius, thorace punctis sex nigris, alis fuscis: margine albido. Linn. Syst. Nat. II. 723. 57.*  
*Cimex Dominulus. Scop. carn. 362.*  
*Habitat in America boreali.*
- rutilus.* 88. *C. ovatus, thorace abdomeque rufis, thorace maculis quatuor, abdome fasciis nigris.*  
*Habitat in nova Hollandia.*  
*Affinis praecedentibus. Caput atrum, lineis tribus sanguineis. Thorax sanguineus, maculis quatuor atris. Scutellum sanguineum, macula baseos puncto utrinque marginali versus apicem. Elytra et alae atra, elytrorum margine ad basin sanguineo. Pectus rufum, maculis utrinque tribus atris. Abdomen sanguineum, fasciis quinque atris. Pedes atri.*
- cruciatus.* 89. *C. subrotundus, nigro pallidoque varius, scutello nigro: cruce alba.*  
*Habitat in India orientali. Koenig.*

Statura et magnitudo C. ornati. Antennae fuscae. Caput pallidum, lineis duabus flexuosis nigris lateribusque brunneis. Thorax pallidus, maculis antece quatuor, postice sex magnis nigris. Scutellum nigrum, lateribus ad basin, cruce in medio et apice pallidis. Elytra pallida, ferrugineo-tincta, maculis tribus nigris. Alae fuscae. Subtus flavescens, lateribus nigro punctatis.

90. C. rotundatus, supra niger, thorace rufo: punctis bioculatus. duobus nigris, scutello margine rufo.

Habitat in America. Drury.

Parvus. Statura C. ornati. Caput obtusum, atrum, immaculatum. Thorax ovatus, rufus, punctis duobus magnis dorsalibus nigris. Scutellum nigrum, linea marginali rufa. Elytra nigra, immaculata. Caput subtus rufum. Pectus nigrum, punctis duobus elevatis, rufis. Abdomen rufum, lineis quatuor e punctis nigris. Pedes nigri.

91. C. subrotundus, niger, elytris nigro alboque variis, alis albis. Linn. Syst. Nat. II. 722. 55. Fn. Sv. 936. Scop. carn. 357.

Cimex ovatus, niger, thoracis lateribus elytrorumque maculis quatuor albis. Geoff. Inf. I. 470. 73.

Cimex colore nigro splendente, maculis albis picto. Raj. Inf. 54. 5.

Cimex niger maculis candidis notatus. List. Scar. 396. 38.

Cimex niger albo maculatus. Periv. Gaz. tab. 14. fig. 7.

Habitat in Europae hortis.

92. C. ovatus, coeruleo-aeneus, thorace lineola, scutello apice clytrisque puncto albo rubroue. Linn. Syst. Nat. II. 722. 53. Fn. Sv. 934. Geoff. Inf. I. 471. 74.

Cimex sylvestris coerulescens. Raj. Inf. 54. 6. 7.

Schaeff. Icon. tab. 46. fig. 4. 5.

Habitat in Europae Tetrady namis.

93. C. subrotundus, supra ater, thorace lineis tribus, scutello linea punctisque quatuor, elytris margine ferrugineis. pictus.

Habitat in India orientali. Koenig.

Statura praecedentis. Antennae nigrae. Caput nigrum, linea laterali punctisque duobus minutissimis verticis

ticis rufescentibus. Thorax ater, nitidus, margine antico lineisque lateralibus et media pallide ferruginea. Scutellum atrum, linea longitudinali pallide ferruginea maculisque duabus parvis utrinque. Elytra laevia, margine pallido, macula magna ferruginea terminato. Alae fuscae, immaculatae. Subtus flavescens, linea laterali maculisque nigris. Pedes pallidi, nigro-lineati.

- bigutta-* 94. *C. ovatus*, niger, margine undique albo, elytris puncto albo. *Linn. Syst. Nat.* II. 722. 54. *Fn. Sv.* 935. *Scop. carn.* 356.

Habitat in Europa.

- coeruleus.* 95. *C. ovatus*, coeruleus, immaculatus. *Linn. Syst. Nat.* II. 722. 50. *Geoff. Inf.* I. 472. 75. *Fn. Sv.* 933. *Schaeff. Icon. tab.* 51. fig. 4.

Habitat in Thesio.

- Morio.* 96. *C. ovatus*, ater, plantis rufis. *Linn. Syst. Nat.* II. 722. 51. *Fn. Sv.* 932. *Schaeff. Icon. tab.* 57. fig. 11. — — — tab. 82. fig. 6.

Habitat in Europae plantis oleraceis.

- trifilis.* 97. *C. ovatus*, ater, clypeo orbiculato, thorace retuso, elytris postice emarginatis.

Habitat in Oriente. *Forstkähl.*

Magnitudo *C. ornati*, ater, immaculatus, alis albis.

- Iugens.* 98. *C. ovatus*, fuscus, thoracis lineola, scutello abdomeque margine albis.

Habitat in America. *Drury.*

Parvus. Caput obtusum, glabrum, nitidum. Thorax fuscus, nitidus, margine antico et lateral i lineola que transversa, margines haud attingente, albis. Scutellum concolor, margine omni albo. Abdomen nigrum, margine albo. Pedes pallidi.

- melanocephalus.* 99. *C. subrotundus*, griseus, capite scutellique basi nigro-aeneis.

Habitat in Anglia.

Parvus, subtus obscure aeneus, nitens, abdominis margine albo nigroque variegato. Supra griseus, aeneo tiuctus

tinctus capite, macula utrinque ad apicem thoracis scutellique basi nigro-aeneis. Pedes pallidi, femoribus puncto nigro.

100. *C. ovalis*, antice attenuatus, exalbidus, fuscostriatus, antennis apice rufis. *Linn. Syst. Nat.* II. 723. 59. *acuminatus.*

*Fn. Sv.* 939.

*Geoff. Inf.* I. 472. 77.

*Musca cimiciformis. Raj. Inf.* 56. 6.

*List. mut.* tab. 31. fig. 20.

*Schaeff. Icon.* tab. 52. fig. 11.

Habitat in Europa.

\* \* \* \* *Oblongi.*

101. *C. oblongus*, niger, subtus rubro punctatus, femoribus dentatis. *Harpagon.*

Habitat in America. *Drury.*

Caput deest. Thorax canaliculatus, laevis, inermis, ater, punctis duobus apicis rubris. Scutellum acutum, triangulare, atrum. Elytra striata, atra. Corpus subtus atrum, punctis plurimis elevatis, nudis, sparsis, rufis. Femora omnia dentata, nigra. Tibiae posticae foliaceo-membranaceae, dilatatae, dentibus tribus sinuatae, nigrae intus puncto parvo, rubro.

102. *C. oblongus*, abdomine rubro, bidentato, elytris fuscis, pallido striatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 726. 74. *Indus.*  
*Mus. Lud. Ulv.* 176.

Habitat in Indiis.

103. *C. oblongus*, rufus, nigro maculatus, alis exalbidis: striga baseos atra. *militaris.*

Habitat in Oriente. *Forstkähl.*

Simillimus *C. equestris*, at duplo fere major. Caput rubrum. Thorax ruber, lineis duabus dorsalibus flexuosis, nigris. Scutellum nigrum. Elytra rubra, macula transversa et puncto parvo utrinque ad apicem scutelli nigris. Alae exalbidae, fascia baseos nigra, quae terminatur lineola nivea. Pectus nigrum, maculis utrinque tribus sanguineis. Abdomen rubrum, utrinque nigro punctatum.

- equestris.* 104. *C. oblongus*, rubro nigroque varius, alis atris, albo maculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 726. 77. *Fn. Sv.* 948. *Mus. Lud. Ulr.* 177. *Geoff. Inf.* I. 442. 14.

*Cimex spinosus.* *Scop. carn.* 369.

*Schaeff. Elem.* tab. 44. fig. 2.

— — *Icon.* tab. 48. fig. 8.

Habitat in Asclepiade vincetoxicó.

Thorax antice posticeque niger. Pectus nigrum, punctis atris.

- Hyoscyami.* 105. *C. oblongus*, rubro nigroque varius, alis fuscis, immaculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 726. 76. *Fn. Sv.* 945.

*Cimex oblongus*, rubro nigroque variegatus, scutelli nigri apice rubro. *Geoff. Inf.* I. 441. 12.

*Cimex minutulus*, nigris maculis notatus. *List. Scar. Angl.* 397. 39.

*Cimex sylvestris minor*, corpore oblongo angusto. *Raj. Inf.* 55.

*Cimex hyoscymoides ruber*, maculis nigris. *Petiv. Gaz. zoph.* tab. 62. fig. 2.

*Sultz. Inf.* tab. II. fig. 75.

*Schaeff. Icon.* tab. 13. fig. 1.

Habitat in Europae hyoscyamo.

- Malabari-* 106. *C. oblongus*, rufescens, thorace scutelloque punctis duobus nigris.

Habitat ad littora Malabarica. *Koenig.*

Statura praecedentis. Caput rufescens, antennis nigris.

Thorax rufus, cincereo-variegatus, antice punctis duobus nigris. Scutellum magnum, rufum, basi punctis duobus majoribus nigris. Alae nigrae. Abdomen pallidum, utrinque maculis magnis, cyaneis.

- aulicus.* 107. *C. oblongus*, rubro nigroque varius, elytris fascia atra, alis atris: lineola baseos alba.

Habitat in America.

Antennae nigrae, corpore breviores. Caput rufum, sutura elevata nigra. Thorax ater, margine laterali et antico rubris. Scutellum nigrum, apice rufum. Elytra rufa, fascia media, lata, atra. Alae nigrae, lineola transversa baseos alba. Margo etiam parum

parum albicat. Subtus sanguineus, maculis utrinque tribus in pectore, uno in abdome anoque atris. Pedes nigri.

108. *C. oblongus*, thorace testaceo, antice nigro: margine albo, elytris puncto nigro. *cingulatus.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

*Magnus*, *oblongus*. Caput rufum, antennis nigris.

Rostrum rufum, apice nigrum. Thorax testaceus, segmento antico atro, margine albo. Elytra testacea, puncto medio magno, atro. Alae atrae. Subtus rufus, lateribus nigris, cingulis pluriinis albis. Pedes nigri.

109. *C. oblongus*, rufus, antennis, thoracis basi, fascia elytrorum aliquae nigris. *superficiatus.*

Habitat in America. *Mus. Banks.*

*Affinis praecedenti*. Caput rubrum, antennis fusciis.

Thorax ovatus, basi fascia nigra apiceque striga tenuissima flava. Scutellum rufum. Alae atrae, immaculatae. Pedes fuscii. Subtus rufus, albo nigro-que maculatus.

110. *C. oblongus*, glaucus, capite atro, thorace antice rufo. *ruficollis.*

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

*Medius*. Caput atrum. Antennae atrae, articulo ultimo basi albo. Thorax glaucus, antice rufus, margine albo. Elytra glauca, immaculata. Alae nigrae. Subtus glaucus, pectore utrinque maculis tribus rufescensibus. Pedes nigri, femoribus rufis.

111. *C. oblongus*, niger, thoracis margine elytrorumque *scabrosus.* fasciis duabus rufescensibus.

Habitat in America. *Drury.*

Thorax niger, scaber, margine rufo. Elytra nigra, basi et fascia apicis rufescensibus. Abdomen nigrum, margine albo-variegato.

112. *C. oblongus*, thorace nigro: basi margine punctisque duobus rubris, elytris atris, immaculatis. *leprosus.*

Habitat in America. *Drury.*

Antennae nigrae. Caput nigrum, linea rubra. Elytra obscure nigra, immaculata. Alae hyalinae. Abdomen supra cyaneum, margine rubro-variegato, subtus fuscum, rubro punctatum.

*Koenigii.* 113. *C. oblongus, testaceus, elytris puncto nigro, alis atris.*  
Habitat Tranquebariae. *Koenig.*

*C. Aegyptiaco duplo major. Caput sanguineum, antennis nigris. Thorax cum scutello testaceus, immaculatus. Elytra testacea, puncto medio nigro. Alae atrae. Subtus testaceus, lineis abdominis utrinque flavis. Pedes testacei, tibiis nigris.*

*Aegyptius.* 114. *C. oblongus, rubro nigroque varius, elytris rubris: puncto nigro. Linn. Syst. Nat. II. 727. 79. Mus. Lud. Ulr. 178.*  
Habitat in Aegypto.

*Mendicus.* 115. *C. oblongus, rubro fuscoque varius, alis atris: apice lineolaque baseos albis.*

Habitat in India. *Koenig.*

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae nigrae.  
Caput nigrum, lateribus rufis. Thorax rufus, maculis duabus dorsalibus, longitudinalibus, in medio angustatis, fuscis. Scutellum fuscum, apice rufum, punctis duobus nigris. Elytra fusca, margine et sutura versus basin rufis. Alae atrae, lineola baseos transversa apiceque albis. Subtus rufo nigroque varius, ano nigro.

*4 gutta-tus.* 116. *C. oblongus, elytris rufis: fascia nigra, alis punctis duobus albis.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Statura praecedentium. Antennae nigrae. Caput rufum, lineis duabus rostroque atris. Thorax rufus, basi apiceque niger. Scutellum carinatum, rufum, basi nigrum. Elytra rufa, fascia media nigra. Alae nigrae, puncto baseos et altero in medio majori albis. Abdomen rufum, medio nigrum. Pedes nigri.

*bigutta-tus.* 117. *C. oblongus, elytris rufis: striga undata, nigra, alis nigris: puncto medio albo.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Parvus. Caput rufum, rostro antennisque nigris. Thorax et scutellum nigra, immaculata. Elytra rufa, in medio striga angulata, nigra. Alae nigrae, puncto magno, medio, albo. Abdomen rufum, ano nigro. Pedes nigri.

118. *C. oblongus, sanguineus, antennis, clytris pedibusque fuscis.* *sanguinolentus.*  
 Habitat in America.  
*Antennae nigrae, longitudine corporis. Caput et thorax sanguinea, immaculata. Elytra obscure fusca. Subtus ruber, pedibus fuscis.*
119. *C. oblongus, rufus, antennis alisque nigris, suturis omnibus albis.* *futuralis.*  
 Habitat in America. *Mus. Tottianum.*  
*Caput rufum, oculis antennisque nigris. Thorax ruber, sutura anteriore et posteriore albis. Elytra rufa, suturis albis et postice puncto nigro. Alae atrae, margine tenuissime albo. Pedes nigri, femoribus sanguineis.*
120. *C. oblongus, rufus, antennis tibiisque fuscis.* *Carnifex.*  
 Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*  
*Statura praecedentium. Corpus rufum, antennis rostroque nigris. Thorax et elytra rufa, immaculata. Alae fuscescentes. Pectus rufum, fasciis flavis. Pedes fusi, femoribus rufis, apice nigris.*
121. *C. oblongus, rubro nigroque varius, elytris rubris: punctis duobus nigris, alis nullis.* *Linn. Syst. Nat.*  
*ii. 727. 78. Geoff. Ins. i. 440. ii. Scop. carn. 370.*  
*Raj. Ins. 55. 3.*  
 Habitat in malva sylvestri.
122. *C. oblongus, flavescens: scutello, elytris alisque striatulus.*  
*fuscis: elytris apice cinereis.*  
 Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*  
*Medius. Caput flavescens, stemmatibus duobus in fronte puncto que utrinque pone oculos nigris. Thorax flavescens, angulis posticis subelevatis. Margo posticus fuscus, lineolis tribus flavis. Scutellum nigrum, margine omni lineaque dorsali flavis. Elytra nigra, flavo-striata, apice cinerea. Alae nigrae. Corpus flavescens. Pedes pallidi, punctis nigris.*
123. *C. fuscus, abdome supra sanguineo, femoribus posticis sexdentatis.* *calcaratus.*  
*Cimex calcaratus oblongus, niger, capite linea rubra, femoribus posticis subtus sexdentatis.* *Linn. Syst. Nat.*  
*ii. 732. 114. Fn. Sv. 968.*

Habitat in Europa.

**A**ntennae rufae, articulorum apicibus fuscis. Caput in nostro immaculatum. Thorax ovatus, fuscus, immaculatus. Elytra fusca. Abdomen atrum, supra punctisque quatuor marginalibus sanguineis. Pedes nigri, tibiis piceis. Femora postica elongata, sexdentata.

**Pini.**

124. **C.** oblongus, ater, elytris fuscis: macula rhombea, atra. *Linn. Syst. Nat.* II. 729. 96. *Fn. Sv.* 956.

**Cimex oblongus niger**, thorace postice cinereo, elytris cinereis, macula nigra alisque nigris. *Geoff. Inf.* I. 449. 28.

*Schaeff. Icon.* tab. 42. fig. 12.

Habitat in Europae pinetis.

**sylvaticus.** 125. **C.** oblongus, ater, elytris fuscis.

Habitat in Sueciae nemoribus.

Statura omnino **C. Pini**, at duplo minor. Caput et thorax atra, immaculata. Elytra fusca.

**Rolandri.** 126. **C.** oblongus, ater, alis macula rhombea flava. *Linn. Syst. Nat.* II. 729. 98. *Fn. Sv.* 957.

**Cimex oblongus**, atro-fuscus, alarum macula flava. *Geoff. Inf.* I. 459. 51.

*Sultz. Inf.* tab. II. fig. 76.

*Schaeff. Icon.* tab. 87. 7.

Habitat in Europa.

**pustula-** 127. **C.** oblongus, niger, thorace elytrisque maculis duabus rufis.

Habitat in Jamaica. *Drury.*

Corpus magnitudine praecedentis. Caput fronte rufa antennisque nigris. Thorax ovatus, niger, maculis duabus magnis dorsalibus, rufescens. Elytra nigra, macula altera ad basin, altera ad apicem rufis. Alae atrae. Abdomen nigrum, lateribus rufis. Pedes nigri.

**lyncest.** 128. **C.** oblongus, niger, elytris griseis: apice macula nigra; puncto albo.

Habitat in Anglia.

Statura **C. Pini**. Caput et antennae nigra. Thorax niger, margine exteriori pallido, postico griseo sive pallido, densissime nigro punctato. Scutellum trian-

triangulum nigrum, lineolis duabus apicis pallidis. Elytra grisea, macula magna apicis atra, puncto niveo. Alae cinereae, punctis aliquot obsoletis, albis. Subtus niger, punctis tribus pectoralibus fulvis.

129. *C. oblongus*, niger, elytris griseis, alis albis: puncto nigro.

*Urticariae*

Habitat in urtica Angliae.

Statura et magnitudo *C. Pini*. Antennae quadriarticulatae, fuscae. Caput et thorax nigro-aenea, obscura, immaculata. Elytra punctata, grisea, ad basin pallidiora. Alae albae, puncto parvo centrali, nigro. Abdomen nigrum, margine albo-variegato et subtus macula media alba. Femora nigra, basi pallida. Tibiae pallidae, cingulis tribus nigris.

130. *C. oblongus*, elytris fuscis: basi punctisque duobus albis, femoribus anticis crassissimis, bidentatis.

*podagrica-*  
*cus.*

*Cimex Abietis oblongiusculus*, maculato-fulvus, pedibus rufis: femoribus anticis crassioribus, dentatis.

*Linn. Syst. Nat. II. 732. 115. Fn. Sv. 969.*

Habitat in Anglia. *Mus. Banks.*

Statura *C. Pini*, at paulo minor. Corpus nigrum. Thorax antice fuscus, margine parum albicante. Elytra fusca, basi albida. Puncta duo alba, altero in medio, altero in apice magis distincto. Alae fuscae, albo-striatae. Abdomen nigrum. Femora antica crassissima, bidentata, atra. Pedes reliqui picei.

131. *C. oblongus*, griseus, rubro punctatus, antennis clavatis. *Linn. Syst. Nat. II. 729. 92. Fn. Sv. 952.*

*crassicornis.*

*Schaeff. Icon. tab. 13. fig. 10.*

Habitat in Europa.

132. *C. niger*, elytris cinereis, alis albis. *Linn. Syst. Nat. II. arenarius.*  
729. 95. *Fn. Sv. 955.*

Habitat in Europa.

133. *C. oblongus*, thoracis elytrorumque marginē femorūrumque basi rufis. *Linn. Syst. Nat. II. 727. 82.*

Habitat in Pennsylvania.

Thoracis margo lateralis et posticus rufus. Abdominis margo elevatus, rufus. Femora ultra dimidium rufa.

*pubicornis.* 134. C. oblongus, rufus, antennis, pectore, elytris tibiisque nigris.

Habitat in America. *Drury.*

Statura et magnitudo C. succineti. Caput parvum, rufum, puncto verticali, elevato, nigro. Oculi nigri. Antennae pubescentes, filiformes, nigrae. Thorax ovatus, glaber, rufus, macula parva, dorsali, nigra. Pectus nigrum. Alae nigrae, basi subrufescentes. Abdomen subtus rufum, punctis lateribus anoque nigris. Pedes nigri, femoribus basi pallidis.

*Coryli.* 135. C. oblongus, niger, pedibus antennisque flavis.  
*Linn. Syst. Nat.* II. 733. 121. *Fn. Sv.* 974.

Habitat in Europae corylo.

*campestris.* 136. C. oblongus, flavescens, elytris macula ferruginea.  
*Linn. Syst. Nat.* II. 728. 87. *Fn. Sv.* 950.  
*Geoff. Inf.* I. 452. 34.

Habitat in Europa.

*pratensis.* 137. C. oblongus, flavescens, elytris viridibus.

Cimex pratensis oblongus, griseus, scutello macula cordata, flava, elytris apice puncto fusco. *Linn. Syst. Nat.* II. 728. 86. *Fn. Sv.* 949.

*Geoff. Inf.* I. 451. 33.

*Scop. carn.* 386.

Habitat in Europa.

*leucocephalus.* 138. C. oblongus, niger, capite pedibusque fulvis. *Linn. Syst. Nat.* II. 723. 60. *Fn. Sv.* 940.

Cimex rotundato-ovatus, capite genubusque ferrugineis, pedibus saltatoriis. *Geoff. Inf.* I. 472. 76.

Habitat in Europa.

*triguttatus.* 139. C. oblongus, niger, elytris aliquo apice puncto albo.

Cimex triguttatus oblongus, niger, elytris testaceis, punctis tribus niveis: interiore minore. *Linn. Syst. Nat.* II. 729. 94.

Habitat in Germania.

Punctum niveum in elytris et in alis ita, ut complicatis aliis puncta tria nivea appareant.

140. C.

140. *C. oblongus*, niger, elytris striatis, alis postice flavo maculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 729. 93. *Fn. Sv.* 954. *saltatorius.*  
Habitat in Europa ad littora maris.
141. *C. oblongus*, ater, antennis apice capillaribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 725. 72. *Fn. Sv.* 944. *ater.*  
*Cimex oblongus*, ater, antennis seta terminatis. *Geoff. Ins.* 460. 54.  
Habitat in Europa.
142. *C. oblongus*, fuscus, elytris fasciis duabus albis, antennis apice capillaribus. *bifasciatus.*  
*Cimex clavatus oblongus*, niger, elytris fuscis: fasciis duabus nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 729. 97?  
Habitat Lipsiae.  
Elytra strigis duabus albis, quarum anterior marginem interiore vix attingit.
143. *C. oblongus*, niger, capite, thorace pedibusque *flavicollis.* rufis, antennis apice capillaribus.  
Habitat in Anglia. *Mus. Banks.*  
Statura *C. atri*. Antennae nigrae, seta rufa. Caput rufum, ore oculisque nigris. Thorax rufus, immaculatus. Pedes rufi, femoribus annulo nigro.
144. *C. oblongus*, antennis apice capillaribus, niger, *trifasciatus.* elytris fasciis tribus rufis.  
*Cimex trifasciatus* antennis apice capillaribus, corpore oblongi sculo, nigro rubroque vario. *Linn. Syst. Nat.* II. 725. 67.  
*Schaeff. Icon. tab.* 13. fig. 8.  
Habitat in Europa.  
Antennae rufae, apice nigrae.
145. *C. ater*, elytris fuscis, basi pallidis apice que puncto *seticornis.* coccineo, antennis apice capillaribus.  
Habitat Lipsiae.  
Affinis videtur *C. Gothicus*. Caput thorax et antennae atra, immaculata. Elytra basi pallida, apice puncto coccineo. Subtus ater.
146. *C. oblongus*, flavescens, elytris apice coccineis, antennis nigris, apice capillaribus. *capillaris*  
Habitat in Lipsiae hortis.

Statura et magnitudo C. campestris. Corpus flavescentia, elytris apice macula laete coccinea, quae terminatur puncto nigro. Abdomen carinatum, atrum, marginibus flavescentibus.

- Gothicus.* 147. C. oblongus, niger, scutello elytrorumque apicibus coccineis, antennis apice capillaribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 726. 73. *Fn. Sv.* 966.

Cimex oblongus, niger, thoracis lateribus scutelloque flavis: elytris, antennis pedibusque flavo-variegatis. *Geoff. Inf.* I. 445. 19.

*Schaeff. Icon. tab.* 13. fig. 5.

Habitat in Europa.

\*\*\*\* *Antennis setaceis.*

- laevigatus.* 148. C. oblongus, exalbidus: lateribus albidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 730. 101. *Fn. Sv.* 958.

Cimex oblongus, albidus, oculis nigris. *Geoff. Inf.* I. 452. 26.

Habitat in Europa.

- dolabratus.* 149. C. oblongus, elytris ferrugineis, latere albidis; antennis nigris, linea thoracis alba. *Linn. Syst. Nat.* II. 730. 103. *Fn. Sv.* 959.

Habitat in Europae festuca natante.

- calens.* 150. C. oblongus, capite, thorace elytrisque nigris, scutello fulvo. *Linn. Syst. Nat.* II. 730. 104. *Gronov. Zooph.* 712.

Habitat in India.

- Gronovii.* 151. C. oblongus, thorace elytrisque atris: linea flava, fasciam elytrorum formante. *Linn. Syst. Nat.* II. 730. 106.

*Gronov. Zooph.* 711.

Habitat in India.

Corpus flavescentia. Thoracis margines et linea media flava; haec excurrentes, ad media elytra utrinque brachio, fasciam efformat.

- ferns.* 152. C. oblongus, griseus, immaculatus. *Linn. Syst. Nat.* II. 731. 108. *Fn. Sv.* 962.

Habitat in Europae sylvis.

153. C. oblongus, niger, elytris flavo fuscoque striatis, *striatus*.  
apice pedibusque rufis. *Linn. Syst. Nat.* II. 730. 105.  
*Fn. Sv.* 960.
- Cimex oblongus, niger, thorace fasciis tribus flavis,  
scutello nigro, elytris lineis flavis: apice fulvo.  
*Geoff. Ins.* I. 454. 38.  
*Petiv. Guzoph.* tab. 26. fig. 1.  
*Schaeff. Icon.* tab. 13. fig. 14.  
Habitat in ulmi campestris foliis.
154. C. oblongus, albo fuscoque nebulosus. *Linn. Syst.* *Populi*.  
*Nat.* II. 731. 109. *Fn. Sv.* 963.  
Habitat in populo tremula.
155. C. oblongus, supra rubiginosus, elytris striis sanguineis, alis postice albo fuscoque variis. *Linn. Syst.* *Ulmi*.  
*Nat.* II. 731. 110. *Fn. Sv.* 964.  
Habitat in Europae ulmo.  
Caput et thorax supra rufa.
156. C. corpore elongato, fusco flavoque vario, femoribus posticis elongatis, dentatis.  
Habitat in India orientali. *Koenig*.  
Caput mihi deest. Thorax obscure rufescens, linea laterali flavescente. Elytra fusca, immaculata. Subtus fusco flavoque varius. Femora quatuor antica inermia, postica valde elongata, dentata.
157. C. antennis setaceis, ferrugineis, corpore linearis *filiformis*.  
pallide virescenti.  
Habitat in America.  
Statura C. laevigati, at triplo maior et angustior.
- \*\*\*\*\* *Lineares. Corpore angusto.*
158. C. linearis, supra fuscus, thorace scutelloque marginibus lineaque dorsali flavis. *fossarum*.  
Habitat in India orientali. *Koenig*.  
Statura et magnitudo C. lacustris. Subtus albo nitens.  
Antennae nigrae. Caput nigrum, lineis duabus orbitaque oculorum flavis. Thorax niger, margine lineaque dorsali flavis. Linea dorsalis ante apicem terminatur punctis duobus flavis. Elytra nigra, immaculata. Pedes antici breves, reliqui elongati.

- lacustris.* 159. *C. linearis*, niger, pedibus anticis brevissimis. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 732. 117. *Fn. Sv.* 170. *Geoff. Inf.* I. 463. 59.  
*Scop. carn.* 394.  
*Cimex aquaticus* figurae longioris. *Raj. Inf.* 57. 1.  
*Insectum Tipula dictum.* *Bauh. Ball.* 213. fig. 1.  
*List. mut.* tab. 5. fig. 4.  
*Bradl. nat.* tab. 26. fig. 2. D.  
*Frisch. Inf.* 7. tab. 20.  
*Sultz. Inf.* tab. 11. fig. 78.  
*Habitat in Europae rivulis, aquis.*
- stagnorum.* 160. *C. linearis*, teretiusculus, niger, thorace medio punctis duobus globosis. *Linn. Syst. Nat.* II. 732. 118.  
*Fn. Sv.* 971. *Scop. carn.* 395.  
*Tipula londinensis* angustissima. *Pet. Gaz.* tab. 9. fig. 12.  
*Habitat in Angliae lacubus frequens.*
- rivulorum.* 161. *C. linearis*, niger, albo punctatus, abdomine fulvo.  
*Habitat in rivulis montosis Alsaciae.* Cl. *Herrmann*  
*Prof. Argentorat.*  
*Statura C. lacustris*, at paulo minor. Caput nigrum,  
antennis quadriarticulatis. Thorax niger, antice parvum rufescens, utrinque puncto parvo fere obsoletum, albo. Elytra nigra, punctis albis, e quibus alis complicatis sex apparent, quatuor scutellum cingentibus, anterioribus duobus longioribus, reliquis duobus in medio dorsi uno post alterum. Femora nigra, postica incurva, bidentata.
- culiciflorum.* 162. *C. thorace multispinoso*, griseus, elytris lituris nigris, corpore elongato.  
*Habitat in America.* v. *Robr.*  
*Corpus hispidum*, elongatum, griseum. Thorax ovatus, antice spinis quatuor caput cingentibus, et postice spinis quatuor erectis, brevibus. Scutelli margo et liturae aliquot dorsales elytrorum atrae. Pedes pallidi.
- longipes.* 163. *C. linearis*, ater, thoracis margine elytrorumque fascia sanguinea.  
*Habitat in America.* v. *Robr.*  
*Statura praecedentis.* Thorax inaequalis, ater, margine omni sanguineo. Elytra atra, fascia linearis sanguinea. Pedes elongati, nigri, femoribus posticis cingulo rubro.

164. *C. linearis*, supra fuscus, subtus cinerascens, pedibus longissimis, ano bidentato. *curvitans.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Nostratis maior. Rostrum breve, cinerascens, apice nigrum. Antennae nigrae. Thorax fuscus, linea dorsali atra margineque omni pallescente. Elytra striata, fusca. Corpus subtus holosericeo - cinereum. Anus spinis duabus validis, ferrugineis, apice nigris. Pedes antici corporis longitudine, postici quatuor quadruplo longiores, fusci.

165. *C. linearis*, exalbidus, pedibus omnibus longissimis, femoribus clavatis, antennis biclavatis. *tipularius.* *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 733. 120. *Fn. Sv.* 973.

*Cimex arboreus*, culiciformis. *Frisch. Inf.* 7. 28. tab. 20.  
Habitat in Europa.

166. *C. linearis*, griseus, pedibus pallidis.

*Cimex vagabundus linearis*, variegatus, pedibus anticis brevissimis, crassis, inflexis. *Linn. Syst. Nat.* II. 732. 119. *Geoff. Inf.* I. 462. 58.

*vagabundus.*

*Cimex arborum oblongus*, alarum signatura alba. *Frisch. Inf.* 7. II. tab. 6.

Habitat in Europa.

167. *C. linearis*, cinereus, femoribus clavatis, antennis biclavatis. *clavipes.*

Habitat in Suecia.

Similis *C. tipulario*, at triplo minor et pedes haud elongati.

## 161. REDUVIUS. *Os* rostro arcuato.

*Antennae supra oculos*  
*insertae.*

- I. *R. niger*, thoracis margine elytrorumque fascia obsoleta flexuosa, rufis.

*Gigas.*

Habitat in India orientali.

Maior *R. personato*, niger. Caput nigrum, postice stemmatibus duobus globosis, elevatis. Thorax niger, antice spinula parva acuta armatus, margine

rufescente. Elytra nigra, lineola baseos fasciaque media abbreviata rufescentibus. Pedes nigri. Abdomen nigrum, marginibus rufo-variegatis.

*personatus.* 2. R. antennis apice capillaribus, corpore subvilloso, fuscō.

Cimex personatus. *Linn. Syst. Nat.* II. 724. 64. *Fn. Sv.* 492. *Geoff. Inf.* I. 436. 4.

Musca cimiciformis tertia graviter olens. *Raj. Inf.* 56.

Cimex maximus pullus, alis nudis, ex toto membranaceis. *Lift. Scar. Angl.* 397. 38.

Cimex stercorarius maior oblongus. *Frisch. Inf.* IO. tab. IO. *Sultz. Inf.* tab. II. fig. 74?

*Schaeff. Icon.* tab. 13. fig. 6. 7.

— — tab. 67. fig. 9.

Habitat in Europa.

Larva horrida, personata, consumit A. lectulariam.

*barbicornis.* 3. R. niger, thorace abdominisque basi olivaceis.

Habitat in Sierra Leon. *Drury.*

Statura praeecedentis. Caput nigrum, rostro brevi, medio interiori gibbo. Antennae quadriarticulatae, nigrae, in altero sexu pilis nigris barbatae. Thorax olivaceus, cruce in medio impressus. Scutellum nigrum, margine elevato. Alae nigrae. Abdomen obtusum, nigrum, basi olivaceum. Pedes nigri, plantis fuscis. Femora quatuor antica obsolete dentata.

*longipes.* 4. R. ruber, elytris nigris: basi fasciaque rubris.

Cimex longipes. *Linn. Syst. Nat.* II. 724. 65.

*Gronov. Zooph.* 709.

Habitat in insula St. Thomae Americes.

Caput angustum; rufum, antennis, oculis rostrique apice nigris. Lineolae duae fuscae in nucha. Thorax rufus, macula dorsali magna, nigra. Pectus nigro maculatum. Pedes corpore duplo longiores, nigri. Abdomen piceum.

*annulatus.* 5. R. antennis apice capillaribus, corpore nigro: subtus sanguineo maculato.

Cimex annulatus. *Linn. Syst. Nat.* II. 725. 71. *Fn. Sv.* 943. *Geoff. Inf.* I. 437. 5.

Habitat in Europae corylo.

6. R. testaceo nigroque varius, thorace antice testaceo: *Attelaboides-*  
*dis.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Rostrum pallidum, linea dorsali nigra. Caput nigrum, postice attenuatum. Thorax testaceus, antice dentibus duobus prominulis nigris. In medio fascia lata nigra. Margo posticus subemarginatus. Scutellum nigrum, apice rufescens. Elytra testacea, margine anteriore nigro. Alae nigrae. Subtus testaceus, immaculatus. Femora testacea, nigro-anulata. Tibiae nigrae, spicè rufescentes.

7. R. rufo nigroque varius, abdominis margine dente *variis.*  
medio erecto, obtuso.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Magnus. Caput postice attenuatum, medio impressum, atrum, subtus rostroque sanguineis. Antennae corpore longiores, ferrugineae. Thorax antice niger, postice rufus, margine subelevato. Scutellum albidum. Elytra rufescens, basi nigra. Pectus nigrum. Abdomen rufum, margine in medio dente elevato, obtuso, erecto, nigro. Anus niger. Pedes rufi, geniculis nigris. Tibiae anticae compressae, ciliatae.

8. R. niger, thorace abdominalisque marginibus rubro *iracundus.*  
maculatis, elytris rufis.

*Cimex iracundus. Scop. Ins. 378.*

Habitat Idriae. *Scopoli.*

Antennae filiformes, nigrae, longitudine corporis. Rostrum nigrum, basi rubrum. Caput angustum, nigrum, margine postico elevato. Thorax niger, maculis tribus rufis, intermedio multo maiore. Abdomen subtus atrum, marginibus rubro-variis anque toto rufo. Pedes variegati.

9. R. thorace scutelloque acute spinosis, elytris puncto *biguttatus.*  
albo.

*Cimex biguttatus. Linn. Syl. Nat. II. 725. 70.*

Habitat in Guinea. *Mus. Dr. Schlosser.*

*ferratus.* 10. R. niger, elytris ferrugineis, rostro antennis tibiisque flavis, scutello cristato, serrato.

*Cimex cristatus* rostro arcuato, antennis setaceis, corpore fusco, ferrugineo, scutello cristato. *Linn. Syst. Nat. II. 723. 62. Amoen. acad. 6. 399. 42?*

Habitat in America.

Scutellum maximum, marginatum, margine dentato. Crista erecta, 12 dentata. Thorax parvus, antice utrinque spinosus.

*Aegyptius.* 11. R. corpore villoso, griseo, abdominis margine nigro-variegato.

Habitat in Aegypto. *Forstkähl.*

Parvus, totus obscure griseus, villosus. Margo abdominalis solus nigro-variegatus.

*Maurus.* 12. R. ferrugineus, abdominis margine nigro maculato, thorace antice subspinoso.

Habitat in Mauritania.

Statura R. annulati. Caput et antennae rufae, oculis nigris. Thorax rufus, antice utrinque spinulis duabus lateralibus brevissimis armatus. Elytra rufa. Abdomen rufum, margine nigro-variegato. Femora nigra.

*Acantha-* 13. R. thorace spinoso, abdomine spinis ciliato. *Linn. ris.* *Syst. Nat. II. 720. 38.*

*Acantharis.* *Brown. Jam. 434. tab. 44. fig. 11.*

Habitat in Jamaica.

Rostrum arcuatum. Thorax antice spinis duabus, postice quatuor. Femora albo-annulata.

## 162. P V L E X. *Os* rostro inflexo.

*Vagina* quinque articulata, seta unica.

*Laminae* duae ovatae, basin rostri tegentes.

*irritans.* 1. P. rostro corpore breviore. *Linn. Syst. Nat. II. 1021. 1.*

*Fn. Sv. 1695. Scopol. carn. 1055.*

*Pulex.* *Geoff. Inf. 2. 616. 1.*

*Pulex vulgaris.* *Raj. Inf. 7.*

*Alb.*

*Alb. mant.* tab. 41.

*Bonann. Microgr.* fig. 56.

*Joblot. microgr.* 1. p. 1. tab. 3.

*Frisch. Inf.* II. p. 8.

*Vallisi. op.* 1. tab. 25. fig. 1.

*Leuwenh. epist.* 76. fig. 1 — 20.

*Roef. Inf.* 2. *Mus.* tab. 2. 3. 4.

*Baker. micr.* tab. 13. fig. 6.

*Lederm. micr.* 4. tab. 20.

*Sultz. Inf.* tab. 22. fig. 146.

*Schaeff. elem.* tab. 105.

Habitat ubique in Europa, America, sanguisugus.

Leporibus valde molestus, ideoque ramento vestimenti

leporini capitur et avertitur a Dalekarlis. Pellitur  
fatureya, pulegio, persicaria, cotula, alno.

Mas minor sub foemina jungitur.

2. *P. proboscide corporis longitudine.* *Linn. Syst. Nat.* II. *penetrans.*  
1021. 2.

*Pulex cutem penetrans.* *Catesb. car.* 3. p. 10. tab. 10.  
fig. 3.

*Acarus fuscus* sub cute nidulans, proboscide acutiori.  
*Brown. Jam.* 418.

*Tunga. Margr. bras.* 249.

*Sloan. jam.* 2. p. 191. *Introd.* 125.

Habitat in America.

*Pedes hominum intrans, ova deponens, cacoethem et  
saepè mortem causat.*

163. A P H I S. *Os rostro inflexo.*

*Vagina quinque articulata,  
feta unica.*

*Labium fornicatum.*

*Antennae setaceae.*

1. *A. Lychnidis dioicae.* *Linn. Syst. Nat.* II. 734. 7. *Fn. Lychnidis*  
*Sv.* 980.

Habitat frequens in lychnidis dioicae caulisbus.

Corpus atrum, margine abdominalis plicato; postice  
obtusissimum, bicornis. Pedes pallidiores geniculis  
nigris.

2. *A.*

*Caprae.* 2. *A. Salicis capreae.*

Habitat in salice.

Minor, viridis, lateribus pallidioribus. Oculi, antennae pedesque apice nigri. Abdomen acuminatum.

*Sambuci.* 3. *A. Sambuci nigræ.* *Linn. Syst. Nat.* II. 734. 4. *Fn. Sv.* 978.

*Aphis sambuci* tota coerulea, atra. *Geoff. Inf.* I. 495. 3.

*Cimex exiguus*, nunc niger, nunc viridis, cui aliae ex toto membranaceæ, prægrandis. *Lifl. Angl.* 397. 40.

*Frisch. Inf.* II. 14. tab. 18.

*Reaum. Inf.* 3. tab. fig. 5—15.

Habitat in ramis sambuci nigræ.

Major, postice obtusa et fere retusa, corniculis elongatis. Nigra, margine utrinque strigis tribus albis. Punctum parvum utrinque ad basin abdominis et solitarium supra anum.

*Cerasi.* 4. *A. Pruni cerasi.*

Habitat in pruni cerasi foliis.

Minor, atra, nitens, antennarum medio tibiisque pallidis. Anus inter cornicula terminatur stylo acuto, corniculis dimidio breviore. Antennæ corpore paulo breviores.

*Ribis.* 5. *A. Ribis rubri.* *Linn. Syst. Nat.* II. 733. 1. *Fn. Sv.* 977.

*Leuwenh. arc. epist.* 90. 545. tab. 548.

*Blank. Inf.* 164. tab. 14. fig. D. 2.

*Frisch. Inf.* II. 9. tab. 14.

*Reaum. Inf.* 3. tab. 22. fig. 7—10.

Habitat frequens sub foliis monstrosis pustulatis ribis rubri.

Corpus glabrum, viride, oculis atris. Antennæ longitudine corporis pedesque fuscis. Anus obtusus corniculis linearibus.

*Arundi-* 6. *A. Arundinis epigeios.*

*nis.* Habitat in crundinis epigeios foliis.

Corpus medium, viride, capite thoraceque fuscis, lanugine alba adspersis. Antennæ et pedes picei. Abdomen obtusum, inerme.

7. A. Populi nigrae. *Linn. Syst. Nat. II. 736. 29. Fn. Sv. 998. bursaria.*  
*Aphis Populi nigrae lunata. Geoff. Inf. I. 497. II.*  
*Seb. Mus. I. tab. 38. fig. 8.*  
*Swammerd. bibl. 45. fig. 22 — 25.*  
*Reaum. Inf. 3. tab. 26. fig. 7 — 11.*  
*Habitat in fasculis ovatis populi nigrae.*  
*Corpus totum obscure fuscum, thoracis lateribus gib-*  
*bis, subpellucidis. Antennae breves.*
8. A. Gallii aparines. *Aparines.*  
*Habitat in gallii aparines caulibus.*  
*Corpus atrum, opacum, antennarum basi tibiisque*  
*pallidis. Thorax rugis tribus transversis, profun-*  
*dis, imbricatis. Abdominis margo punctatus. Anus*  
*terminatur stylo cylindrico, corniculis breviore.*
9. A. Aceris campestris. *Linn. Syst. Nat. II. 736. 31. Fn. Aceris.*  
*Sv. 999.*  
*Aphis Aceris viridis, maculis nigris. Geoff. Inf. I.*  
*495. 5.*  
*Reaum. Inf. 3. tab. 22. fig. 6 — 10.*  
*Habitat in aceris campestris foliis.*  
*Corpus fuscum, antennis tibiisque pallidis. Thorax*  
*cylindricus, abdome multo angustior, carinatus,*  
*lateribus incrassatis. Abdomen carinatum, lateri-*  
*bis plicatis. Anus obtusus corniculis brevissimis.*
10. A. Rumicis lapathi. *Linn. Syst. Nat. II. 734. 5. Fn. Rumicis.*  
*Sv. 979.*  
*Habitat in rumice acuto.*  
*Corpus nigrum, opacum. Antennae et tibiae pallidae.*  
*Abdominis margo elevatus, plicatus. Anus termi-*  
*natur stylo cylindrico, corniculis breviore.*
11. A. Pruni domesticae. *Geoff. Inf. I. 497. 10. Pruni.*  
*Habitat in pruni domesticae foliis.*  
*Corpus virescens, antennis pedibusque concoloribus.*  
*Abdominis margo plicatus. Linea abdominis dor-*  
*salis punctumque utrinque baseos obscuriora. Anus*  
*acuminatus, corniculis filiformibus.*
12. A. Cardui acanthoidis. *Linn. Syst. Nat. II. 735. 17. Cardui.*  
*Fn. Sv. 988.*  
*Habitat in cardui acanthoidis caulibus.*  
*Corpus*

*Corpus aeneo-nigrum, nitidum, antennis pedibusque basi pallidis. Thorax plicatus. Abdominis margo elevatus, punctato-plicatus. Anus terminatur stylo cylindrico, corniculis breviore.*

*Corni.* 13. A. *Corni sanguineae.*

*Habitat in corni sanguineae foliis.*

*Corpus nigrum, abdomine basi et subtus virescente.*

*Pedes nigri. Anus absque stylo et corniculis.*

*Iuniores pallidae, macula magna dorsali nigra.*

*Evonymi.* 14. A. *Evonymi europaei.*

*Habitat in evonymi europaei petiolis.*

*Corpus nigrum, abdomine fusco, margine elevate,*

*punctato. Corniculi breves, cylindrici, nigri.*

*Anus terminatur stylo longitudine corniculorum.*

*Pedes pallidi, geniculis nigris. Alae hyalinae, puncto marginali fusco.*

*Iuniores fuscae, antennarum basi alba.*

*Avenae.* 15. A. *Avenae sativae.*

*Habitat in avena sativa.*

*Caput obscure testaceum, antennis nigris. Thorax*

*testaceus, antice viridis. Abdomen viride, lituris*

*marginalibus nigris. Corniculi cylindrici, nigri.*

*Anus terminatur stylo parvo, albo. Pedes nigri,*

*femoribus basi albis.*

*Betulae.* 16. A. *Betulae albae.* *Linn. Syst. Nat. II. 735. 21. Fn. Sv. 992.*

*Aphis Betulae marginibus incisurarum abdominis*

*punctis nigris. Geoff. Inf. I. 496. 7.*

*Reaum. Inf. 3. tab. 22. fig. 2.*

*Habitat in betulae albae foliis.*

*Caput et thorax nigra, glabra. Abdomen viride, ano*

*fusco.*

*Pedes nigri, tibiis pallidis. Corniculi breves, virides.*

*Alae magnae, fasciis tribus nigris, ultima ramum*

*apice bifidum exserente.*

*Populi.* 17. A. *Populi tremulae.* *Linn. Syst. Nat. II. 736. 27. Fn. Sv. 997.*

*Habitat sub populi tremulae foliis convolutis et pu-*

*culatis.*

*Caput*

**Caput et thorax nigra.** Abdomen virescens absque corniculis. Alae albae, margine exteriori nigro. Iuniores virescentes.

18. A. *Viburni opuli.**Viburni.*

Habitat in foliis et caulis viburni opuli.

Corpus atrum, opacum, antennis basi tibiisque pallidis. Thorax plicatus. Anus terminatur stylo cylindrico, corniculis breviore.

Iuniores obscure fuscae.

19. A. *Pyri, mali.**Mali.*

Habitat sub pyri mali foliis.

Corpus viride, antennis pedibusque fuscis. Abdomen nec marginatum, nec plicatum. Anus terminatur stylo nigro. Corniculi cylindrici, nigri.

Variat corpore toto rufescente, pedibus fuscis et interdum pedibus lividis, geniculis fuscis.

20. A. *Rosae.* Linn. *Syst. Nat.* II. 734. 9. *Fn. Sv.* 982.*Rosae.*

*Reaum. Inf.* 3. tab. 21. fig. 1—4.

*Lederm. microgr.* 53. tab. 25.

*Sultz. Inf.* tab. 12. fig. 79.

Habitat in rosae pedunculis.

Corpus viride, antennis, apice corniculisque nigris.

Anus acuminatus absque stylo.

21. A. *Atriplicis hortensis.**Atriplicis.*

Habitat in atriplicis hortensis summitatibus.

Corpus nigrum, nitidum, tibiis pallidis. Thorax inaequalis et fere lobatus. Abdomen crassum, marginibus plicatis. Corniculi breves. Anus obtusus.

22. A. *Picridis hieracioides.**Picridis.*

Habitat in picridis hieracioidis caulis.

Maior, nigra, abdomine postice pieo. Thorax ovatur, sulcis duobus. Corniculi elongati. Anus terminatur stylo virescente. Pedes nigri, femoribus basi virescentibus.

23. A. *Dauci carotae.**Dauci.*

Habitat in dauci carotae umbella.

Antennae nigrae, basi pallidae. Caput et thorax fusca. Abdomen viride, litura ani nigra. Corniculi brevissimi, nigri. Pedes nigri.

*Urticæ.* 24. A. *Urticæ dioicae.*

Habitat in *urticæ dioicae* caulis, foliis.

*Corpus nigrum*, abdomen obscure aeneo. Appendiculi breves. Anus terminatur stylo brevissimo, truncato. Alae albae, venis parallelis nigris marginaque crassiori, fusco. Pedes nigri.

*Tanaceti.* 25. A. *Tanaceti vulgaris.* *Linn. Syst. Nat.* II. 735. 18.  
*Fn. Sv.* 989.

*Aphis Tanaceti fusca*, abdomen nigro-coeruleo, ante viridi. *Geoff. Inf.* I. 496. 8.

Habitat in *tanaceti vulgaris* caulis.

Antennæ nigrae. Thorax glaber, niger, strigis duabus pallidioribus. Abdomen nigrum, margine ferrugineo. Corniculi nigri. Anus stylatus.

Juniores magis ferrugineae.

*Ulmi.* 26. A. *Ulmi campestris.* *Linn. Syst. Nat.* II. 733. 2. *Fn.*  
*Sv.* 976. *Iter. Scan.* 203.

*Aphis Ulmi.* *Geoff. Inf.* I. 494. I. tab. 10. fig. 3.

*Reaum. Inf.* 3. tab. 25. fig. 4—7.

Habitat in *ulmo campestri*.

*Corpus subcylindricum*, ferrugineum, lanugine albatectum. Corniculi obsoleti.

*Tiliae.* 27. A. *Tiliae Europæae.* *Linn. Syst. Nat.* II. 734. II. *Fn.*  
*Sv.* 984.

*Pediculus arboreus Tiliae.* *Frisch. Inf.* II. I. 3. tab. 17.

*Aphis Tiliae alis*, antennis pedibusque nigro punctatis. *Geoff. Inf.* I. 495. 6.

*Reaum. Inf.* 3. tab. 23. fig. 1—8.

Habitat in *Europæ tilia*.

*Corpus virescens.* Antennæ et pedes albo nigroque variegati. Thorax utrinque linea laterali nigra. Abdomen obtusum, lineis quatuor e punctis nigris.

*Brassicæ.* 28. A. *Brassicæ oleraceæ.* *Linn. Syst. Nat.* II. 734. 12.  
*Fn. Sv.* 985.

*Pediculus Brassicæ.* *Frisch. Inf.* II. 10. tab. 3. fig. 15.

Habitat in *Brassicæ oleraceæ* foliorum inversa pagina, unde folia tabescunt.

*Corpus viride*, albido-farinaceum.

29. A. *Quercus Roboris.**Roboris.*

*Aphis quercus roboris nigra, corniculis obsoletis atris medii abdominis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 735. 22. *Fn. Sv.* 993.

Habitat in quercu robore.

Corpus subglobosum, nigrum. Antennae lividae, apice nigrae. In medio abdominis corniculi brevissimi, obsoleti. Femora rufa.

30. A. *Quercus Roboris.**Quercus.*

*Aphis Quercus proboscide longissima.* *Linn. Syst. Nat.* II. 735. 24.

*Aphis fusca proboscide corpore triplo longiore.* *Geoff. Inf.* I. 498. 14.

*Reaum. Inf.* 3. tab. 28. fig. 5 — 14.

Habitat in Galliae quercu.

Corpus magnum, atrum. Antennarum pedumque articuli basi ferruginei. Abdomen muticum. Rostrum longissimum.

31. A. *Salicis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 736. 26. *Fn. Sv.* 995.*Salicis.*

*Reaum. Inf.* 3. tab. 22. fig. 2.

Habitat in salicibus variis.

Corpus magnum, nigrum. Abdomen albo punctatum, punctis dorsalibus quatuor majoribus, lateralibus, transversalibus, linearibus. Corniculi fulvi.

32. A. *Pistaciae lentisci.**Pistaciae.*

*Aphis Pistaciae nigra, alis albidis, tibiis longissimis, thorace verrucoso.* *Linn. Syst. Nat.* II. 737. 33.

Habitat in pistacia lentisco, in folliculo foliorum incarnato, ventricoso, utrinque attenuato, spithameo, pollice crassiori.

Corpus magnum, flavescens, oculis nigris. Abdomen muticum.

33. A. *Rumicis acetosae.* *Linn. Syst. Nat.* II. 734. 6.*acetosae.*

*Aphis Acetosae atra, fascia transversa, viridi.* *Geoff. Inf.* I. 496. 9.

*Reaum. Inf.* 3. 286.

Habitat in rumice acetosa.

Parva: tota nigra, fascia viridi.

34. A. *Pruni padi.* *Linn. Syst. Nat.* II. 734. 8. *Fn. Sv.* 981.*padi.*

*Reaum. Inf.* 3. tab. 23. fig. 9. 10.

Habitat in pruno pado.

*Lactucae.* 35. A. *Lactucae oleraceae.* *Linn. Syst. Nat.* II. 735. 14.  
*Reaum. Inf.* 3. tab. 22. fig. 3. 4. 5.  
 Habitat in lactuca oleracea.

*Sonchi.* 36. A. *Sonchi oleracei.* *Linn. Syst. Nat.* II. 735. 15.  
*Geoff. Inf.* I. 497. 13.  
*Reaum. Inf.* 3. tab. 22. fig. 3 — 5.  
 Habitat in soncho oleraceo.  
 Corpus majus, nigrum. Anus stylatus inter corniculos.

*Vitis.* 37. A. *Vitis viniferae.*  
*Aphis Vitis.* *Scop. carn.* 398.  
 Habitat in vite vinifera.  
 Corpus medium, virens, abdominis dorso fusco et  
 puncto fusco pone antennas.

164. CHERMES. *Os setis tribus inflexis.*  
*Vagina membranacea,*  
*inter femora antica*  
*inserta.*  
*Antennae cylindricae.*

*Graminis.* 1. C. *Airae flexuosa.* *Linn. Syst. Nat.* II. 737. 1. *Fn.*  
*Sv.* 1001.  
 Habitat in Europae graminibus.  
 Statura et magnitudo Cicadae.

*Ulni.* 2. C. *Ulmi campestris.* *Linn. Syst. Nat.* II. 737. 2. *Fn.*  
*Sv.* 1002.  
 Habitat intra folia ulmi revoluta.

*Cerastii.* 3. C. *Cerastii viscosi.* *Linn. Syst. Nat.* II. 737. 3. *Fn. Sv.*  
*1003.*  
 Habitat in foliis cerastii viscosi conniventibus in capitulum.

*Buxi.* 4. C. *Buxi.* *Linn. Syst. Nat.* 738. 7.  
*Reaum. Inf.* 3. tab. 19. fig. 1 — 14.  
*Psylla viridis,* antennis setaceis, alis fusco flavescens-  
 tibus. *Geoff. Inf.* I. 485. 2.  
 Habitat intra buxi folia summa conniventia Europae  
 australioris.

5. C.

5. C. Fagi sylvaticae. *Linn. Syst. Nat.* II. 738. 12. *Fn. Sv.* *Fagi.*  
1010. *Iter. Scan.* 65.  
*Reaum. Inf.* 3. tab. 26. fig. 1—6.  
Habitat in fagi sylvaticae foliis.
6. C. Sorbi aucupariae. *Linn. Syst. Nat.* II. 738. 5. *Sorbi.*  
Habitat in sorbo aucuparia.  
Corpus nigro viridique variegatum.
7. C. Calthae palustris. *Linn. Syst. Nat.* II. 738. 6. *Fn.* *Calthae.*  
*Sv.* 1005.  
Habitat in calthae palustris floribus.  
Antennae apice nigrae. Thorax rufus, arcubus tribus nigris. Alae albae, venis flavescentibus punctoque fusco.
8. C. Urticae dioicae. *Linn. Syst. Nat.* II. 738. 8. *Fn.* *Urticae.*  
*Sv.* 1006.  
Habitat in urticae dioicae foliis.  
Corpus fuscum. Antennae nigrae, basi albae. Abdominis litura et pedes albi.
9. C. Betulae albae. *Linn. Syst. Nat.* II. 738. 9. *Betulae.*  
Habitat in betulae albae ramis.  
Caput et pectus pallida. Antennae setaceae. Abdomen rufescens, lineis transversis latis nigris quinque in tergo, tribus in ventre.
10. C. Betulae Alni. *Linn. Syst. Nat.* II. 738. 10. *Fn. Sv.* *Alni.*  
1008.  
Vermis suctorius Alni. *Frisch. Inf.* 8. 28. tab. 13.  
*Schaeff. Elem.* tab. 39.  
*Sultz. Inf.* tab. 12. fig. 80.  
Psylla viridis, antennis setaceis, alis aqueis. *Geoff. Inf.* I. 486. 3.  
Habitat in betulae alni ramulis.  
Antennae albo nigroque variegatae. Rostrum album, apice nigrum. Corpus albidum. Alae albae, venis fuscis.
- II. C. Pini Abietis. *Linn. Syst. Nat.* II. 738. 13. *Fn. Sv.* *Abietis.*  
1011.  
Psylla pallide flavescentis, oculis fuscis, alis aqueis. *Geoff. Inf.* I. 487. 5.

Insectum tuberculi muricati arboris Taxi. *Frisch. Inf.*  
12. 10. tab. 2. fig. 3.

*Picea pumila Clus. panon.* 20. 21.

Habitat frequens in gallis strobiliformibus, squama-  
tis, imbricatis turionum abietis.

*Salicis.* 12. C. *Salicis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 739. 14. *Fn. Sv.* 1012.  
Habitat in salicibus.  
Corpus album, abdominis dorso maculis obsoletis fu-  
scis. Antennae basi albae, apice nigrae.

*Fraxini.* 13. C. *Fraxini excelsioris.* *Linn. Syst. Nat.* II. 739. 15. *Fn.*  
*Sv.* 1013.  
Psylla nigro luteoque variegata, alarum ore in api-  
ce fuscis. *Geoff. Inf.* I. 486. 4.  
Habitat in fraxino.

*Aceris.* 14. C. *Aceris platanoidis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 739. 16.  
*Fn. Sv.* 1014.  
Habitat in ramin aceris platanoidis.  
Corpus flavescentia, subtus viride, ano subulato, fu-  
scescente.

*Ficus.* 15. C. *Ficus caricae.* *Linn. Syst. Nat.* II. 739. 17.  
Psylla fusca, antennis crassis, pilosis, alarum nervis  
fuscis. *Geoff. Inf.* I. 484. 1.  
*Reaum. Inf.* 3. tab. 29. fig. 17 — 24.  
Habitat in fici Europae australioris.

## 165. COCCUS. Os setis vaginaque pecto- ralibus.

*Antennae filiformes.*

*Hesperi-* 1. C. *hybernaculorum.* *Linn. Syst. Nat.* II. 739. 1. *Fn. Sv.*  
*dum.* 1015.

Chermes hesperidum. *Geoff. Inf.* I. 505. 2.

*Schaeff. Elem.* tab. 48.

*Act. par.* 1692. p. 14. tab. 14.

*Reaum. Inf.* 4. tab. 1.

*Sulz. Inf.* tab. 12. fig. 81.

*Frisch. Inf.* 12. p. 12.

Habitat in arboribus semper virentibus hybernaculo-  
rum, frequentissimus.

## 2. C. adonidum.

Coccus adonidum rufa, farinaceo-pilosa. *Linn. Syst. Nat. II. 740. 4.*

Coccus adonidum corpore roseo farinaceo, alis setis-que niveis. *Geoff. Inf. 2. 511. 1.*

Habitat in arboribus Americae, Africæ, Europæ australioris.

3. C. Quercus roboris. *Linn. Syst. Nat. II. 740. 5. Fn. Quercus. Sv. 1016.*

Chermes Quercus reniformis. *Geoff. Inf. I. 508. 13.*  
*Reaum. Inf. 4. tab. 6. fig. 1—4.*

Habitat in quercu robore.

4. C. Quercus cocciferae. *Linn. Syst. Nat. II. 740. 6. Ilicis.*  
*Gard. aixens. 250. tab. 53.*

*Reaum. Inf. 4. tab. 5.*

*Lederm. microsc. 72. tab. 36.*

Habitat in quercu coccifera Galliae.

5. C. Ulmi campestris. *Linn. Syst. Nat. II. 740. 9. Fn. Sv. 1019. Ulmi.*

Chermes Ulmi rotundus. *Geoff. Inf. I. 507. 8.*

Habitat in ulmo campestri.

Clypeus rufescens, margine villoso, albido.

6. C. Coryli avellanae. *Linn. Nat. Nat. 741. 10. Fn. Sv. 1020. Coryli.*

Chermes Coryli hemisphaericus. *Geoff. Inf. I. 507. 10.*

*Reaum. Inf. 4. tab. 3. fig. 4—10.*

Habitat in corylo, avellana.

7. C. Tiliae Europaea. *Linn. Syst. Nat. II. 741. 11. Fn. Tiliae.*  
*Sv. 1021.*

Chermes Tiliae hemisphaericus. *Geoff. Inf. I. 507. 9.*

*Reaum. Inf. 4. tab. 3. fig. 1—3.*

Habitat in tilia Europaea.

## 8. C. Rusci.

Coccus Rusci testa octo clypeolis cincta. *Linn. Syst.*

*Nat. II. 741. 12.*

Lepas nova s. Myrti morbus. *Column. purp. 16. tab. 17.*

Balanus terrestris compositus e multis testis. *Ginan.*

*Adr. I. p. 60. tab. 3. fig. 27.*

*Bocc. Mus. tab. 107. fig. 33. h. h.*

Habitat in Italiae myrto, rusco.

Rusci.

- Pilosellae.* 9. *C. radicis Hieracii pilosellae.* *Linn. Syst. Nat.* II. 742.  
     18. *Fn. Sv.* 1024.  
     *Aet. Upsal.* 1742. p. 54. tab. 2  
     Habitat in hieracii pilosellae radicibus.
- Arbuti.* 10. *C. radicis Uvae ursi.* *Linn. Syst. Nat.* II. 742. 19.  
     Habitat in radicibus arbuti uvae ursi.
- Phalaridis.* 11. *C. radicum Phalaridis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 742. 20.  
     *Coccus graminis corpore roseo.* *Geoff. Inf.* I. 512. 2.  
     tab. 10. fig. 5.  
     Habitat ad graminum radices.
- Crataegi.* 12. *C. Crataegi oxyacanthae.* *Linn. Syst. Nat.* II. 742. 21.  
     *Reaum. Inf.* 4. tab. 6. fig. 11. 12.  
     Habitat in crataego oxyacantha.
- Serratu-  
lae.* 13. *C. Serratulae arvensis.*  
     Habitat in serratula arvensi Angliae.  
     Magnitudo Pisi. Clypeus fuscus, margine pallidiore.
- Vitis.* 14. *C. Vitis viniferae.* *Linn. Syst. Nat.* II. 741. 16.  
     *Aet. Bonon.* 2. 279. tab. 284.  
     *Chermes Vitis oblongus.* *Geoff. Inf.* I. 506. 6.  
     *Reaum. Inf.* 4. tab. 6. fig. 5—7.  
     Habitat in rami vitis viniferae.
- Polonicus.* 15. *C. radicis Scleranthi perennis.* *Linn. Syst. Nat.* II.  
     741. 17. *Fn. Sv.* 1023.  
     *Chermes radicum purpureus.* *Geoff. Inf.* I. 504. 1.  
     *Coccus tinctorius radicum.* *Breyn. Act. Phys. med. N.* 6.  
     vol. 3. *App.* 5. tab. 1.  
     *Cochinella germanica.* *Frisch. Inf.* 5. p. 6. tab. 2.  
     *Reaum. Inf.* 4. I. n. 143.  
     Habitat in scleranthi perennis radicibus.
- Cacti.* 16. *C. Cacti coccinelliferi.* *Linn. Syst. Nat.* II. 742. 22.  
     *Coccinella alis destituta, corpore rugoso.* *Brown.*  
     *Iam.* 435.  
     *Sloan. Iam.* 2. p. 153. *praeſ.* tab. 9.  
     *Petiv. Gazoph.* 3. tab. 1. fig. 5.  
     *Reaum. Inf.* 4. tab. 7. fig. 11. 12.  
     Habitat in cactis opuntiis Americes.  
     *Corpus totum rugosum.*

166. T H R I P S. *Rostrum obsoletum, intra  
os absconditum.*  
*Antennae filiformes.*

1. T. elytris glaucis, corpore atro. *Linn. Syst. Nat. II.* *Physapus.*  
743. 2. *Fn. Sv. 1027. Geoff. Inf. I. 385. 2.*  
*Physapus ater, alis albis. de Geer. Act. Holm. 1744. p. 3.*  
tab. 4. fig. 4.  
*Schaeff. Elem. tab. 127.*  
Habitat frequens in floribus compositis, agilis, cur-  
ritans.  
*Loti corniculatae flores clausos tumidosque reddit,*  
*spicas secalis inanit. Linn.*
2. T. elytris niveis, corpore fusco. *Linn. Syst. Nat. II.* *iuniperi-  
na.*  
743. 4. *Fn. Sv. 1029.*  
*Physapus fuscus, alis albicantibus. de Geer. Act. Holm.*  
1744. p. 6. tab. 1. fig. 2.  
*Thrips elytris albidis, corpore nigro, abdominali seta.*  
*Geoff. Inf. I. 384. 1. tab. 7. fig. 6.*  
Habitat in iuniperis.
3. T. elytris albo nigroque fasciatis, corpore fusco. *fasciata.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 743. 5. Fn. Sv. 1030.*  
*Thrips elytris albis nigrisque fasciis. Geoff. Inf. I. 385. 3.*  
*Sultz. Inf. tab. 7. fig. 48. b.*  
Habitat in floribus compositis.



---

## VIII. A N T L I A T A.

*Os haustello: vagina inarticulata.*

---

167. OESTRVS. *Haustellum retractum, intra labia connata, poro pertusa.*

*Antennae setariae.*

*Bovis.* 1. *O. thorace flavo: fascia nigra, alis albis, fuscō-fasciatis.*  
Oestrus Bovis alis maculatis, thorace flavo, fascia fusca,  
abdomine flavo, apice nigro. *Linn. Syst. Nat. II. 969. 1.* *Fn. Sv. 1730. It. Wgoth. 202.*

Oestrus thorace flavo, angulo nigro, alis nigra fascia,  
pedibus pallidis. *Geoff. Inf. 2. 456. 3.*  
*Derham. theol. 1. 8. C. 6. n. 11.*

*Vallisi. nat. 1. tab. 28.*

*Reaum. Inf. 4. tab. 36—38.*

*Frisch. Inf. 5. 25. tab. 7.*

*Sultz. Inf. tab. 20. fig. 127.*

*Schaeff. Elem. tab. 91.*

*Raj. Inf. 271.*

Habitat intra boum dorsum, ulcera cacoethica caussans.

*Tavandi.* 2. *O. alis immaculatis, thorace flavo: fascia nigra; abdomine fulvo, apice nigro.* *Linn. Syst. Nat. II. 969.*  
2. *Fn. Sv. 1731.*

*Linn. Flor. Lapp. 360. 517.*

— *Aet. Holm. 1739. tab. 3. fig. 5. 6.*

Habitat intra cervi tarandi dorsum, saepe ipsis lethalis.

*nasalis.* 3. *O. alis immaculatis, thorace ferrugineo, abdomine nigro: pilis flavis.* *Linn. Syst. Nat. II. 969. 3.*  
*Fn. Sv. 1722.*

Habitat in equorum fauce, per nares intrans.

4. *O. alis immaculatis, corpore hirsuto, fulvo, abdome basi albo.*  
*Oestrus haemorrhoidalis alis immaculatis, thorace nigro: scutello pallido, abdomine nigro, basi albo apiceque fulvo.* Linn. Syst. Nat. II. 970. 4. Fn. Sv. 1733.  
*Oestrus villosus, pallide flavescens, abdominis medio cingulo nigro, apice fulvo.* Geoff. Inf. 2. 455. I.  
*Reaum. Inf. 4. tab. 35. fig. 3—5.*  
*Habitat in equorum intestino recto, per anum intrans.*
5. *O. alis subpunctatis, abdomine albo nigroque versicolo.* Linn. Syst. Nat. II. 970. 5. Fn. Sv. 1734. *Ovis.*  
*Oestrus cinereus nigro maculatus et punctatus.* Geoff. Inf. 2. 456. 2. tab. 17. fig. 1.  
*Schreb. Inf. 15. 12.*  
*Vallifn. nat. I. 224. tab. 27.*  
*Reaum. Inf. 4. tab. 35. fig. 21—24.*  
*Habitat in ovium sinu frontis.*

168. TIPVLA. *Os proboscide atque haustello absque vagina.*  
*Palpi duo porrecti, incurvi, filiformes ad latera proboscidis.*  
*Antennae filiformes.*

\* *Alis patentibus.*

- I. *T. antennis pectinatis, alis macula nigra, abdomine pectinicornis basi rufo, medio flavo, fasciato, apice atro.* *nisi.*  
*Tipula pectinicornis antennis pectinatis, alis macula nigra, thorace flavescente.* Linn. Syst. Nat. II. 970. I.  
*Fn. Sv. 1735.*  
*Schaeff. Elem. tab. 13. fig. 8.*  
*— — — tab. 129. fig. 3.*  
*Raj. Inf. 73. 12.*  
*Scop. carn. 839.*

*Habitat in Europae humidis.*

*Caput nigrum, collari flavo. Thorax ater, lateribus punctisque dorsalibus flavis. Primum segmentum abdominis rufum, linea dorsali nigra.*

2. T.

- rivosa.* 2. *T. alis hyalinis:* rivulis maculaque nivea. *Linn. Syst. Nat.* II. 971. 2. *Fn. Sv.* 1738.  
*Tipula alis albis fusco-variegatis.* *Geoff. Inf.* 2. 554. 2.  
*Tipula maxima,* alis majoribus fusco et albo variegatis. *Raj. Inf.* 72. 2.  
*Tipula rivosa.* *Scop. carn.* 846.  
*Aet. Holm.* 1739. tab. 9. fig. 8.  
*Sultz. Inf.* tab. 20. fig. 128.  
Habitat in Europa.  
Halterum apices flavi.
- sinuata.* 3. *T. alis albis:* margine sinuato maculisque fuscis, corpore cinereo, pedibus ferrugineis.  
Habitat Havniae.  
Corpus magnum, cinereum. Thorax margine antico usque ad alas ferrugineo. Alae albae, margine crassiori late ferrugineo, sinibus duobus magnis albis. Maculae duae obscurae practerea ad marginem tenuiorem. Pedes ferruginei, geniculis nigris.
- maculata.* 4. *T. alis fusco-venosis:* margine maculisque quatuor fuscis, abdomine supra flavescente. *Linn. Syst. Nat.* II. 971. 3. *Fn. Sv.* 1736.  
Habitat in Europae pratis.
- crocata.* 5. *T. alis macula fusca, abdomine atro:* fasciis fulvis. *Linn. Syst. Nat.* II. 971. 4. *Fn. Sv.* 1739.  
*Tipula corpore nigro,* fulvo flavoque variegato. *Geoff. Inf.* 2. 553. 7. tab. 19. fig. 1.  
*Tipula elegans,* dorso et scapulis nigris, ventre croceo, alis macula fusca notatis, laevis et splendens. *Raj. Inf.* 72. 4.  
*Scop. carn.* 845.  
*Reaum. Inf.* 5. tab. 1. fig. 14 — 16.  
Habitat in Europa.
- Hortorum.* 6. *T. alis hyalinis:* maculis albis sparsis, obsoletis. *Linn. Syst. Nat.* II. 971. 6. *Fn. Sv.* 1725.  
*Raj. Inf.* 72. 6.  
*Alb. Inf.* tab. 61.  
Habitat in Europae plantis oleraceis.

7. T. alis hyalinis: costa marginali fusca. *Linn. Syst. oleracea.*  
*Nat. II. 971. 5. Fn. Sv. 1740.*

Tipula alis exalbidis, linea marginali fusca. *Geoff.*

*Ins. 2. 555. 3.*

*Scop. carn. 854.*

*Goed. Ins. 2. tab. 44.*

*Bradl. nat. tab. 25. fig. 3.*

*Frisch. Ins. 4. tab. 12.*

*Leuvenh. nat. 1693. fig. 5.*

— — — 1704. fig. 4.

Habitat ad radices plantarum, oleribus infesta.

8. T. alis albidis: margine exteriori nervo que apice bifido fuscis. *tricolor.*

Habitat in America boreali. *Lewin.*

Statura praecedentis. Thorax obscure cinereus, basi pallidior. Abdomen fuscum, cinereo-lineatum, et ad basin singuli segmenti puncta duo parva, nigra. Alae costa fusca, in medio albantes, nervo valido, apice bifido, nigro.

9. T. alis dimidiato - fuscis: macula triangulari alba. *triangu-*

Habitat in Scotia. *Walker.* *laris.*

Corpus magnitudine T. oleraceae, fuscum, linea abdominalis laterali cinerea. Alae albae, dimidia parte costam adjacente fusca, macula magna triangulari alba. Pedes elongati, fusci, geniculis nigris.

10. T. nigra, abdominis basi lateribusque rubris, flavo variegata. maculatis.

Tipula variegata alis hyalinis: macula pallida, obsoleta, corpore nigro luteoque variegato. *Linn. Syst. Nat. II. 971. 7. Fn. Sv. 1742.*

Tipula alis lutescentibus cum macula fusca, corpore et pedibus bicoloribus, ex nigro croceo. *Raj. Ins. 72. 5.*

Habitat in Europae hortis.

Latera abdominis rubra et in singulo segmento punctum flavum. Scutellum rubrum, macula nigra. Pedes rubri.

11. T. atra, alis albis: fasciis duabus punctoque nigris.

Tipula contaminata alis nigro maculatis, corpore nigro. *Linn. Syst. Nat. II. 972. 8. Fn. Sv. 1743.*

Tipu-

*contami-*  
*nata.*

*Tipula nigra*, pedibus abdominisque maculis utrinque lividis, alis nigro maculatis. *Geoff. Inf.* 2. 558. 6.

Habitat in Europae humidis.

Alae fasciis duabus nigris, quarum postica abbreviata. Ante fascias punctum nigrum.

*lunata*. 12. *T.* alis cinerascentibus: lunula marginali alba. *Linn. Syst. Nat.* 11. 972. 9. *Fn. Sv.* 1744.

*Tipula alis cinerascentibus*, lunula alba marginali. *Geoff. Inf.* 2. 555. 4.

*Tipula septimae* similis, paulo tamen major, oculis viridescentibus. *Raj. Inf.* 73. 10.

*Reaum. Inf.* 5. tab. 2. fig. 11.

Habitat in Europae pratis.

*pratensis*. 13. *T.* thorace variegato, abdomine fusco: lateribus flavo maculatis, fronte fulva.

*Tipula pratensis* alis subcinereis: vasis fuscis puncto-que marginali obscuro, fronte fulva. *Linn. Syst. Nat.* 11. 972. 10. *Fn. Sv.* 1745.

*Frisch. Inf.* 4. tab. 12.

Habitat in Europae pratis, graminum radices defruens.

*cornicina*. 14. *T.* alis hyalinis: puncto marginali fusco, abdomine flavo: lineis tribus fuscis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 972. 12. *Fn. Sv.* 1747.

*Tipula alis subfuscis*, thorace flavo, characteribus nigris, abdomine luteo, punctorum nigrorum lineis tribus longitudinalibus. *Geoff. Inf.* 2. 556. 5.

*Raj. Inf.* 73. 7.

*Roe. Inf.* 2. *Mus. et culic.* tab. 1.

Habitat in Europa, plantarum radices exedens.

Affinis *T. pratensi*.

*atrata*. 15. *T.* alis glaucis: puncto marginali corporeaque atro, abdominis segmento primo pedibusque rufis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 972. 14. *Fn. Sv.* 1749.

Habitat in Europa.

Foemina abdomine recurvo, subulato, acutissimo.

*nigra*. 16. *T.* alis fuscis, corpore atro. *Linn. Syst. Nat.* 11. 972. 13. *Fn. Sv.* 1748. *Geoff. Inf.* 2. 559.

Habitat in Europa.

17. T. alis hyalinis: maculis duabus fuscis, abdominis *bimaculata*.  
medio maculato, ferrugineo, antennis plumosis. *sa.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 972. 15. Fn. Sv. 1750.*  
Habitat in Europa.  
Mas abdomenne immaculato.
18. T. alis fusco - variegatis, femoribus annulo albo. *annulata.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 973. 16. Fn. Sv. 1752.*  
*Reaum. Inf. 5. tab. 4. fig. 1. 2.*  
Habitat in Europa.
19. T. alis albidis: maculis ocellaribus, plurimis nigri- *ocellaris.*  
cantibus. *Linn. Syst. Nat. II. 973. 17. Fn. Sv. 1751.*  
Habitat in Europa.
20. T. alis albidis: fasciis quatuor fuscis, flexuosis, ab- *fasciata.*  
domine flavescente. *Linn. Syst. Nat. II. 973. 18.*  
Habitat in Sueciae paludosis.  
Alarum fasciae inaequales.
21. T. alis immaculatis, corpore flavo. *Linn. Syst. Nat. II. flavescens.*  
973. 19. *Fn. Sv. 1753.*  
Tipula flava, oculis nigris. *Geoff. Inf. 2. 557. 7.*  
Habitat in Europa.
22. T. alis hyalinis, nitentibus, corpore cinereo, fuscō. *regelatio-*  
*nis.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 973. 21. Fn. Sv. 1754.*  
Habitat in Europae terrestribus.
23. T. nigra, pedibus palpisque pallidis. *Linn. Syst. Nat. monoppe-*  
II. 973. 23. *Fn. Sv. 1756.*  
*ra.*  
Habitat in Europa.  
Culice minor, alis incumbentibus.
- \* \* *Alis incumbentibus.*
24. T. thorace virescente, alis albis: puncto fuscō. *plumosa.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 974. 26. Fn. Sv. 1758.*  
Tipula fusca, thorace virescente, alis pellucidis: pun-  
cto nigro. *Geoff. Inf. 2. 560. 16.*  
*Goed. Inf. 3. tab. 10.*  
*Reaum. Inf. 5. tab. 5. fig. 10.*  
— — 4. tab. 14. fig. 12.  
*Frisch. Inf. tab. 11. fig. 12.*  
Habitat in Europae paludosis.

- motita-* 25. *T.* pedibus anticis maximis, motatoriis: annulo albo.  
*trix.* *Linn. Syst. Nat.* II. 974. 29. *Fn. Sv.* 1700.  
*Tipula* pedibus anticis maximis, antenniformibus,  
 motatoribus, annulo albo. *Geoff. Inf.* 2. 562. 18.  
*Culex luteo-viridis*, pedibus antenniformibus. *Frisch.*  
*Inf.* II. 7. tab. 13.  
 Habitat in Europa frequens.
- tendens.* 26. *T. ferruginea*, alis albis, immaculatis, pedibus an-  
 ticip longissimis, pallidis.  
 Habitat in Daniae paludosis.  
 Statura *T. littoralis*. Corpus ferrugineum. Alae im-  
 maculatae et pedes omnes pallidi.
- tremula.* 27. *T. pedibus anticis longissimis*, metatoriis, nigris:  
 annulis albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 975. 31. *Fn.*  
*Sv.* 1762.  
 Habitat in Suecia.
- flexilis.* 28. *T. pedibus anticis motatoriis*, omnibus pallidis, alis  
 fascia fuscescente. *Linn. Syst. Nat.* II. 975. 32.  
 Habitat in Europa.  
 Corpus culice minus.
- vibrato-* 29. *T. pedibus anticis maximis*, motatoriis, apice albis.  
*ria.* *Linn. Syst. Nat.* II. 975. 30. *Fn. Sv.* 1761.  
 Habitat in Europae paludosis.
- cincta.* 30. *T. livida*, alis maculis tribus marginalibus nigris,  
 abdome nigro, albo-annulato. *Linn. Syst. Nat.*  
 II. 974. 28.  
 Habitat in Suecia.
- Arundi-* 31. *T. albida*, antennis villosis, oculis atris. *Linn. Syst.*  
*neti.* *Nat.* II. 974. 24. *Fn. Sv.* 1757.  
 Habitat in arundinetis, choreas agens.  
 Parva, alis albis.
- littoralis.* 32. *T. virescens*, alis immaculatis, pedibus anticis lon-  
 gissimis. *Linn. Syst. Nat.* II. 974. 27. *Fn. Sv.* 1759.  
*Tipula viridis*, alis albis, immaculatis. *Geoff. Inf.* 2.  
 564. 21.  
*Reaum. Inf.* 5. tab. 6. fig. 12. 13. 14.  
 Habitat in Europae maritimis.

33. *T. pedibus albis: annulis novem nigris, alis albo cinereoque variis.* *Linn. Syst. Nat. II. 975. 33. Fn. Sv. 1762.* *monilis.*  
*Tipula pedibus albis, annulis nigris, alis albis, cinereo maculatis.* *Geoff. Ins. 2. 564. 20.*
- Habitat in Europae hortis.
34. *T. pallida, alis fasciis duabus punctisque tribus fuscis, femoribus angulo fusco.* *zonata.*  
Habitat Oxoniae.  
Magnitudo culicis. Antennae breves, pilosae. Caput et thorax pallida, oculis nigris. Abdomen pallidum, striis tribus dorsalibus punctorum fuscorum. Alae albidae, fasciis duabus mediis fuscis, quarum posterior postice dentem obtusum emittit. Puncta tria fusca, marginalia versus apicem. Pedes longiores, pallidi, femoribus annulo apicis nigro.
35. *T. virescens, oculis thoracisque tergo nigris.* *Linn. Syst. Nat. II. 975. 36. Fn. Sv. 1764.* *macrocephala.*  
Habitat ad paludes et littora humida.  
Corpus minutum, pedibus elongatis, articulorum apicibus nigris.
36. *T. viridis, thoracis tergo maculis tribus nigris, antennis maris plumosis.* *Linn. Syst. Nat. II. 975. 37.* *pusilla.*  
Habitat ad Europae fossulas, choreas agens.  
Pectus inter pedes gibbum.
37. *T. nigra, glabra, alis margine nigricantibus, abdome fuscō.* *brevicornis.*  
*Tipula brevicornis nigra, glabra, alis margine nigricantibus, tibiis anticis spina terminatis.* *Linn. Syst. Nat. II. 976. 42. Fn. Sv. 1766.*
38. *T. ferruginata atra, glabra, alis fuscis, abdome fuscō, ferrugineo.* *Linn. Syst. Nat. II. 976. 40.*  
Habitat in Europae hortis, umbrosis.  
Quiescit alis expansis abdomineque extenso.
39. *T. alis hyalinis: margine exteriore nigro.* *hortulana.*  
*Tipula hortulana alis albis, margine exteriore nigro, thorace abdomineque rubro.* *Linn. Syst. Nat. II. 977. 45.*

*Bibio alis albis, margine exteriori nigro, thorace abdomeque rubris.* *Geoff. Inf.* 2. 571. 3.

*Reaum. Inf.* 5. tab. 7. fig. 7 — 10.

Habitat in asparagi et Pomonae floribus.

Variat thorace abdomineque rubris et nigris, quas saepius copula iunctas vidimus.

*Iohannis.* 39. *T. nigra, glabra, alis albis: puncto nigro, antennis brevibus, pedibus nigris.*

*Tipula Iohannis atra, glabra, alis puncto nigro, tibiis pallidis: posticis clavatis.* *Linn. Syst. Nat.* 11. 976. 41.

Habitat in Europae umbrosis.

Pedes postici maris clavati.

*Pomonae.* 40. *T. nigra, glabra, alis hyalinis: puncto nigro, femoribus ferrugineis.*

Habitat in Pomonae floribus Angliae: Capta d. 13. Maj.

Statura praecedentis. Corpus atrum, glabrum, immaculatum. Alae albo hyalinae, puncto marginali nigro. Pedes nigri, femoribus ferrugineis.

*Thomae.* 41. *T. atra, glabra, alis nigris, abdominis lateribus linea crocea.* *Linn. Syst. Nat.* 11. 976. 39.

Habitat Upsaliae.

*febrilis.* 42. *T. atra, oblonga, hirta, alis costa nigricante.* *Linn. Syst. Nat.* 11. 976. 44. *Fn. Sv.* 1768.

*Bibio ater, hirsutus, alis albis, margine exteriore nigro.* *Geoff. Inf.* 2. 576. 2.

*Goed. Inf.* 1. tab. 6.

*Petiv. Gazoph. tab. 14. fig. 4.*

Habitat in Europae locis suffocatis.

*lineata.* 43. *T. thorace lineato, abdomine nigro, alis hyalinis: macula apiceque fuscis.*

Habitat in Anglia: capt. in *Mus. Brit.* d. 21. Iun.

Sequenti duplo major. Caput parvum, nigrum, antennis filatis, subulatis, incurvis. Thorax elevatus, gibbus, pallidus, lineis tribus fuscis, quarum intermedia marginem anticum, laterales posticum attingunt. Abdomen elongatum, cylindricum, nigrum, supra immaculatum, subtus maculis tribus flavescientibus. Alae abdomine subbreviores, hyalinae, macula media apicibusque fuscis. Pedes nigri, femoribus pallidis.

44. *T. thorace lineato, abdomine fusco, alis macula fuscata. marginali nigra: puncto cinereo.*  
*Musca fuscata nigricans, alis antice albo nigroque variis.* *Linn. Fn. Sv. 2310.*  
*Habitat in Suecia.*
45. *T. abdomine cylindrico, atro, alis fusco - hyalinis, forcipata: ano appendiculata.*  
*Habitat in Anglia: capt. d. 13. Maj.*  
*Parva. Antennae subulatae, multo articulatae. Corpus glabrum, nigrum, immaculatum. Alae hyalinae, costa obscuriore. Anus appendiculis duobus clavatis.*
46. *T. cinerea, thorace nigro-lineato, alis albis, fusco vernans: maculatis.*  
*Habitat primo vere in Daniae pratis.*  
*Thorax cinereus, lineis nigris. Abdomen obscurum. Alae albae, fusco maculatae, in primis ad marginem crassiores.*
47. *T. cinerea, alis albis: margine villoso.* *iuniperina.*  
*Tipula Juniperina alis incumbentibus, glaucis; margine tenuiore, villoso.* *Linn. Syst. Nat. II. 977. 51.*  
*Fn. Sv. 1774.*  
*Habitat in iuniperi triglochide, quam caussat.*
48. *T. hirsuta, alis deflexis, ovatis, ciliatis, albo nigroque tessellatis.* *Linn. Syst. Nat. II. 977. 48.* *Fn. Sv. 1772.* *birta.*  
*Bibio alis deflexis cinereis, ovato-lanceolatis, nebuloso maculatis.* *Geoff. Inf. 2. 572. 15.*  
*Habitat in arctio lappa.*
49. *T. alis deflexis, cinereis, ovato-lanceolatis, ciliatis.* *phalaenoides.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 977. 47.* *Fn. Sv. 1771.*  
*Bibio alis deflexis, cinereis, ovato-lanceolatis, ciliatis, immaculatis.* *Geoff. Inf. 2. 572. 4.*  
*Leuvenh. epist. 1692. Jan. 24. fig. 2. 3.*  
*Frish. Inf. II. tab. II.*  
*Habitat ad Europae sterquilinia.*
50. *T. atra, alis incumbentibus, subciliatis.* *Linn. Syst. Persicariae.*  
*Nat. II. 977. 49.*  
*Habitat sub persicariae foliis revolutis, rubris.*  
*Corpus vix pulice maius, atrum.*

*culicifor-* 51. *T.* *cinerea*, *pedibus pallidis*, *alis maculis duabus nimis*.  
griantibus.

Habitat Upsaliae.

Culice minor. Pedes ferruginei.

*palustris.* 52. *T. pallida*, *capite atro*, *abdomine rufescente*.

*Tipula palustris atra*, *abdomine rufescente*. *Linn. Syst.*

*Nat. II. 978. 54. Fn. Sv. 1775.*

Habitat in Europae paludosis.

Pedes pallidi.

*longicor-* 53. *T. antennis corpore incarnato longioribus*. *Linn.*  
*nis.* *Syst. Nat. 978. 55. Fn. Sv. 1775.*

Habitat in Europae humidis.

*sericea.* 54. *T. nigra*, *dorso atro*, *thoracis lateribus calvis*, *halteribus flavis*. *Linn. Syst. Nat. II. 978. 58.*

Habitat in Suecia, choreas agens in aere: volatu flexuoso rapidoque.

*pulicaris.* 55. *T. nigra*, *thoracis lateribus scutello abdomineque flavis*. *Linn. Syst. Nat. II. 979. 60.*

Habitat ad Europae fossas.

Culice triplo minor.

*pennicor-* 56. *T. antennis bipectinatis*, *corpore atro*, *halteribus albis*. *Linn. Syst. Nat. II. 979. 61. Fn. Sv. 1777.*

Habitat in aristolochiae clematitidis floribus, foecundationem promovens.

Antennae maris bipectinatae, foeminae moniliformes.

### 169. B I B I O. *Os proboscide atque haustello.*

*Haustellum setis tribus vaginaque univalvi.*

*Palpi brevissimi.*

*Antennae filatae.*

*illucens.* 1. *B. antennis subclavatis*, *nigra*, *abdominis segmento secundo lateribus pellucido*, *femoribus posticis serratis*.

Musca illucens antennis filatis, clavatis, *alis coeruleis*, *abdomine segmento secunda lateribus pellucido*.

*Linn. Syst. Nat. II. 979. 2.*

Habi.

Habitat in America australi.

Antennae porrectae, clavatae. Alae obscure coeruleae.  
Femora postica subtus ferrata.

2. B. abdominis nigri segmento secundo lateribus pellucido, plantis albis. *filata.*

Habitat in America. *Mus. Tottianum.*

Statura praecedentis. Antennae filatae, clavatae, nigræ.

Thorax ater, glaber, laevis. Abdomen cylindricum, segmento secundo utrinque macula magna pelliculosa, reliqua segmenta apice cinerascunt. Pedes nigri, plantis omnibus tibiisque posticis basi niveis.

3. B. atra, thorace lineis duabus albis, tibiis basi ferrugineis. *bilineata.*

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Banks.*

Caput nigrum, antennis approximatis, filatis. Thorax hirtus, ater, lineis duabus dorsalibus albis. Abdomen subconicum, elongatum, atrum. Alae albae, margine exteriori atro. Pedes atri, tibiis basi ferrugineis.

4. B. cinereo-hirta, abdome conico: segmentis margine albis. *plebeja.*

Musca plebeja antennis filatis, subulatis, corpore cinereo, hirto, abdominis incisuris margine albis. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 979. 1. *Fn. Sv.* 1779.

Habitat in Europa.

Pedes postici parum longiores tibiis ferrugineis.

5. B. ferrugineo-hirta, abdome conico, fulvo: ano atro. *nobilitata.*

Habitat in Daniae memoribus.

Praecedenti nimis affinis.

6. B. villosa, albo-canescens, alis hyalinis. *anilis.*

Musca anilis antennis filatis, hirtis, muticis, corpore villoso, albo-canescente. *Linn. Syst. Nat.* II. 982. 20.  
*Fn. Sv.* 1791.

Habitat in Europa.

Pedes postici elongati, pallidi.

7. B. fusca, alis nigris, albo-variegatis, scutello piceo. *Nigrita.*

Habitat in America. *Mus. Banks.*

Maior sequente. Corpus fuscum, scutello piceo. Abdomen apice utrinque macula alba. Pedes nigri. Alae totae albo nigroque variegatae.

- Morio.** 8. B. hirta, atra, alis nigris, apice hyalinis.  
*Musca Morio* antennis filatis, subulatis, corpore hirto,  
 atro, alis dimidiato - nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 981. 9.  
*Fn. Sv.* 1784.  
*Musca atra*, hirsuta, margine alarum tenuiore, sinuato-  
 albicante. *Graeff. Inf.* 2. 493. 2.
- Anthrax Morio.** *Scop. carn.* 971.  
*Reum. Inf.* 6. tab. 27. fig. 13.  
*Aldr. Inf.* tab. 2. fig. 13.  
 Habitat in Europa.
- Maura.** 9. B. hirta, atra, albo-fasciata, alis nigris: margine te-  
 nuiore, sinuato-hyalino.  
*Musca Maura* antennis filatis, subulatis, corpore hirto,  
 atro, albo-fasciato, alis nigro variis. *Linn. Syst.*  
*Nat.* II. 981. II. *Fn. Sv.* 1785.  
*Schaeff. Icon.* tab. 76. fig. 9.  
 Habitat in Europa.
- Satyrus.** 10. B. fusca, abdomine atro: segmento primo basi, ulti-  
 mis lateribus albis.  
 Habitat in nova Hollandia. *Mys. Banks.*  
**Major B. Hottentotta.** Caput fuscum, antennis filatis,  
 nigris. Thorax fuscus, antice pilis ferrugineis  
 hirtus. Abdomen atrum, primo segmento basi to-  
 mentoso, albo, 2. 3. immaculatis, 4. 5. 6. lateribus  
 albis. Alae albidae, margine exteriore ferrugineo.  
 Pedes atri.
- Hotten-  
totta.** 11. B. hirta, flavescens, alis hyalinis: costa fusca.  
*Musca Hottentotta* antennis filatis, subulatis, corpore  
 hirto, lutescente, alis costa fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II.  
 981. 13. *Fn. Sv.* 1787.  
*Schaeff. Icon.* tab. 76. fig. 6.  
 Habitat in Europa.
- Sylvanus.** 12. E. fusca, abdominalis basi lateribus ferruginea, alis  
 fuscō punctatis.  
 Habitat in nova Hollandia. *Mys. Banks.*  
**Corpus fuscum, scutello abdominalisque primo et secun-**  
**do segmento lateribus ferrugineis. Alae albidae,**  
**punctis aliquot fuscis margineque exteriore subfer-**  
**rugineo. Pedes picei.**

13. *B. hirta*, flavescens, alis fuscis, basi ferrugineis. *Lucifer.*  
 Habitat in America.  
 Statura et summa affinitas praecedentis.
14. *B. hirta*, fusca, alis hyalinis: macula marginali baseos argentea. *Troglodyta.*  
 Habitat in India. *Koenig.*  
 Statura praecedentium. Tota fusca, hirta. Alae hyalinae, macula magna argentea baseos.

170. STRATIOOMYS. *Os proboscide atque haustello.*

*Haustellum seta unica absque vagina.*

*Palpi* duo breves,  
subcapitati.

*Antennae* filatae.

1. *S. scutello bidentato*, luteo, abdome nigro: fasciis lateralibus luteis. *Chamaeleon.*

*Stratiomys fusca*, thorace subhirsuto, ferrugineo, abdome glabro, plano, ovato, lunulis sex luteis.

*Geoff. Inf.* 2. 479. tab. 7. fig. 4.

*Musca chamaeleon.* *Linn. Syst. Nat.* II. 979. 3. *Fn.*

*Sv.* 1780.

*Chamaeleo.* *Goed. Inf.* I. tab. 70.

*Tabanus aquaticus.* *Frisch. Inf.* 5. 28. tab. 10.

*Musca sellata.* *Sultz Inf.* tab. 20. fig. 130.

*Swammerd. Bibl. Nat.* tab. 42. fig. 2.

*Roef. Inf.* 2. *Musc.* tab. 5.

*Reaum. Inf.* 4. tab. 25. fig. 7.

*Schaeff. Elem.* tab. 121.

— — *Icon.* tab. 14. fig. 16.

Habitat larva in Europa aquis dulcibus.

2. *S. scutello bidentato*, thorace rufo, utrinque spinoso. *Ephippium.*  
*Stratiomys nigra* thorace sericeo, rubro, utrinque spinoso. *Geoff. Inf.* 2. 480. 3.

*Musca ephippium.* *Schaeff. monogr.* 1753. tab. 1.

Habitat in Europa.

Corpus nigrum, thorace supra rufo. Alae nigricantes.

- microleon.* 3. S. scutello bidentato, abdomine atro: strigis lateribus albis.  
*Musca microleon.* Linn. Syst. Nat. II. 980. 4. Fn. Sv. 1781.  
 Habitat in Europa.
- tigrina.* 4. S. scutello bidentato, atra, abdomine subtus rufo.  
 Habitat in Daniae aquosis.  
 Magnitudo praecedentis. Corpus atrum. Dentes scutelli halteresque flavi. Abdomen subtus rufum, margine omni nigro. Alae albae, costa fusca.
- hydroleon.* 5. S. scutello bidentato, nigro, abdomine viridi: medio nigro angulato.  
*Stratiomys fusca*, abdomine viridi: fascia longitudinali nigra. Geoff. Inf. 2. 481. 4.  
*Musca hydroleon.* Linn. Syst. Nat. II. 980. 5. Fn. Sv. 1782.  
 Schaeff. Icon tab. 14. tig. 14.  
 Habitat in Europae aquis.
- viridula.* 6. S. scutello bidentato, viridis, abdomine flavescente: macula apicis atra.  
 Habitat Havniae.  
 Statura praecedentis, at triplo minor. Corpus totum virescens, abdomine pallidiore, linea dorsali tenuissima maculaque magna apicis atris. Alae hyalinae, costa flavicante.
- trilineata.* 7. S. scutello bidentato, corpore viridi, thorace lineis abdomineque fasciis nigris.  
*Stratiomys luteo-virescens*, thorace lineis tribus longitudinalibus, abdomine tribus transversis, arcuatis, nigris. Geoff. Inf. 2. 482. 7.  
*Musca trilineata.* Linn. Syst. Nat. II. 980. 6.  
 Habitat in Europae aquosis.
- hypoleon.* 8. S. scutello bidentato, flavo, corpore nigro, flavo variegato.  
*Stratiomys atra*, thorace abdomineque maculis flavis. Geoff. Inf. 2. 481. 6.  
*Musca hypoleon antennis filatis*, acuminato-setaceis, thorace bidentato, margine striisque duabus flavis. Linn. Syst. Nat. II. 980. 7.  
*Musca rara.* Sop. carn. 912.  
 Habitat in Europa australiori.  
 Antennae apice setariae. Alae flavescentes.

9. S. scutello sexdentato, atra, abdomine ferrugineo. *clavipes.*  
*Stratiomys nigra alis nigris, femoribus abdomineque luteis.* *Geoff. Inf. 2. 483. 8.*

*Musca clavipes antennis filatis, subulatis, corpore laevi, atro, abdomine testaceo, plantis posticis clavatis.* *Linn. Syst. Nat. II. 981. 12.*

Habitat in Suecia.

Alae fuscae. Pedes rufi, plantis nigris.

10. S. scutello inermi, nigra, abdominis margine tibiisque albidis. *margina-*  
*sa.*

Habitat in Anglia. *Mus. Banks.*

*Caput nigrum, antennis filatis, basi connatis. Thorax nigro-aeneus, immaculatus. Abdomen depresso-*  
*sum, atrum, margine maculisque aliquot dorsalibus obsoletis, albidis. Femora nigra, tibiae pallidae,*  
*alae albæ.*

### 171. RHAGIO. *Os proboscide atque hau-* *stello.*

*Haustellum setis tribus abs-*  
*que vagina.*

*Palpi duo pilosi, porrecti*  
*ad basin proboscidis.*

*Antennæ cylindricæ, se-*  
*tariae.*

1. R. cinereus, abdomine flavescente, trifariam nigro  
 punctato, alis nebulosis. *scolopace-*  
*ceus.*

*Musca scolopacea. Linn. Syst. Nat. II. 982. 16. Fn.*  
*Sv. 1788.*

*Reaum. Inf. 4. tab. 10. fig. 5. 6.*

Habitat in Europa.

2. R. cinereus, abdomine flavescente, trifariam nigro  
 punctato, alis immaculatis, thorace unicolo. *tringa-*  
*rius.*

*Musca tringaria. Linn. Syst. Nat. II. 982. 18. Fn.*  
*Sv. 1789.*

Habitat in Europæ nemoribus.

*Vermileo.* 3. R. cinereus, abdomine trifariam nigro punctato, alis immaculatis, thorace immaculato.

Musca Vermileo. *Linn. Syst. Nat.* II. 982. 17.  
*de Geer Act. Holm.* 1752. 180. 260. tab. 5.

Habitat in Galliae arena mobili.

Nimis praecedentibus affinis.

*Diadema.* 4. R. cinereus, alis albis: macula marginali alba.

Musca diadema antennis filatis, apice setigeris, cinerea,  
alis immaculatis, pedibus subferrugineis. *Linn. Syst.*  
*Nat.* II. 982. 19?

Habitat in Lipsiae hortis.

Praecedentibus duplo minor. Pedes elongati, testacei.

## 172. SYRPHVS. Os proboscide atque hau- stello.

*Haustellum* setis quatuor  
absque vagina.

*Palpi* duo basi setarum  
exteriorum inserti.

*Antennae* setariae.

\* *Antennis seta plumata.*

*bombylans.* 1. S. antennis plumatis, tomentosus, niger, abdomine  
postice rufo.

Musca bombylans. *Linn. Syst. Nat.* II. 983. 25. *Fn.*  
*Sv.* 1792.

Habitat in Europae nemoribus.

*mystaceus.* 2. S. antennis plumatis, tomentosus, niger, thorace ab-  
dominisque apice flavis.

Musca mystacea. *Linn. Syst. Nat.* II. 983. 26. *Fn.*  
*Sv.* 1793.

Musca bombylium referens, humeris rufis, cauda al-  
bicante. *Rij. Inf.* 266.

*Sultz. Inf.* tab. 20. fig. 131.

*Schaeff. Elem.* tab. 131.

— — *Icon.* tab. 10. fig. 9.

Habitat in Europae nemoribus.

3. S. antennis plumatis, nudus, abdomine ferrugineo, *inanis*.  
pellucido.

Habitat in America. *v. Robr.*

Statura et magnitudo praecedentis. Labium superius porrectum, emarginatum. Antennae seta plumosa. Thorax niger, scutello subferrugineo, pellucido. Abdomen rotundatum, obscure ferrugineum, pellucidum. Alae albae, margine crassiori basi nigro. Pedes nigri, tibiis subferrugineis.

4. S. antennis plumatis, nudus, thorace flavo-lineato, *vacans*.  
abdomine flavo, pellucido: cingulis nigris.

Habitat in America. *v. Robr.*

Praecedente triplo minor. Labium potrectum, emarginatum. Frons flava, linea media atra. Thorax aeneo-ater, linea laterali punctisque duobus ante alas flavis. Scutellum flavum, pellucidum. Abdomen ovatum, pellucidum, flavum, cingulis tribus lineaque dorsali nigris. Alae albo fuscoque variae.

5. S. antennis plumatis, nudus, alis maculis duabus fuscis, corpore aeneo. *obesus.*

Habitat in America.

Corpus totum aeneum, nitens. Abdomen breve, obtusum. Pedes nigri.

\* \* *Antennis seta nuda.*

6. S. antennis setariis, nudus, thorace nigro, albo *pinguis*.  
maculato, abdomine testaceo: fascia alba.

Habitat in America. *Drury.*

Statura praecedentis. Caput nigrum. Thorax niger,  
punctis duobus apicis, unico utrinque ante alas et  
lineola ante scutellum albis. Scutellum testaceum.  
Abdomen testaceum, fascia alba anoque nigro-aeneo. Alae fuscae.

7. S. antennis setariis, tomentosus, thorace lineis qua- *pendulus*.  
tuor, abdomine fasciis tribus interruptis flavis.

*Musca pendula. Linn. Syst. Nat. II. 984. 28. Fn. Sv. 1795.*

*Geoff. Inf. 2. 513.*

*Frisch. Inf. 4. tab. 13.*

*Reaum. Inf. 4. tab. 31. fig. 9—II.*

Habitat in Europae aquis stagnantibus.

Larya tubo filiformi? respiratorio suspendenda.

*floreus.*

8. S. antennis setariis, tomentosus, thorace nigro-fasciato, abdomine flavo: segmentorum marginibus lineaque dorsali atris.

*Musca florea* antennis setariis, tomentosa, thorace fasciis duabus inaequalibus, nigris, abdomine quatuor luteis, subabruptis. *Linn. Syst. Nat.* II. 984.  
29. *Fn. Sv.* 1796.

*Conops floreus.* *Scopol. carn.* 959.

*Alb. Inf. tab. 17. fig. 1.*

Habitat in Europae floribus.

*subcoleo-  
ptatus.*

9. S. Antennis setariis, tomentosus, abdomine ferrugineo: dorso nigro, alis crassioribus.

*Conops subcoleoptrata* antennis setariis, abdomine subferrugineo, alis praemorsis, externe crassioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 1006. 13?

Habitat in Angliae nemoribus. *Lewin.*

Praecedente duplo minor. Antennae clavatae, fuscae, seta unica recta, nigra. Os vesiculosum, argenteum. Thorax supra niger, laevis, subtus pilis fulvis tectus. Abdomen ferrugineum, nitidum, dorso longitudinaliter nigro. Alae breves, vix abdomine longiores, incrassatae et fere coriacae, albo fuscoque variae. Pedes . . . , femoribus posticis basi digitisque omnibus flavesceribus.

*Nemorum.* 10. S. antennis setariis, tomentosus, abdomine atro: cingulis tribus albis, primo segmento lateribus luteo.

*Musca nemorum.* *Linn. Syst. Nat.* II. 984. 30. *Fn. Sv.* 1797.

*Musca thorace cinereo*, abdominis basi fascia lutea interrupta, marginibus incisurarum albis. *Geoff. Inf.* 2. 511. 36.

*Reaum. Inf.* 3. tab. 31. fig. 8.

*Mer. Europ.* tab. 2.

*Alb. Inf.* tab. 3. fig. M. L.

Habitat in Europae floribus.

*Hortorum.* 11. S. antennis setariis, tomentosus, thorace subfasciato, abdomine fasciis tribus albis, pedibus posticis incrassatis, ferrugincis.

Habitat in America.

Magni-

Magnitudo praecedentis. Caput flavum. Thorax fuscus, antice fasciis duabus conniventibus, pallidis, Abdominis primum segmentum lateribus ferrugineum, reliqua margine alba. Alae macula magna, nigra. Pedes ferruginei.

12. S. antennis setariis, tomentosus, abdomine nigro: segmento primo secundoque latere ferrugineis. *Arbusto-rum.*

*Musca arbustorum. Linn. Syst. Nat. II. 984. 31. Fn. Sv.*

1798.

Habitat in Europae arbustis.

13. S. antennis setariis, tomentosus, niger, thorace fasciis punctisque duobus, abdomine maculis utrinque tribus flavis. *Pratorum.*

Habitat in America. v. Rohr.

Statura praecedentis. Antennae ferrugineae. Frons flava vertice nigro. Thorax tomentosus, niger, fasciis duabus punctisque duobus anticis laete flavis. Abdomen nigrum, ferrugineo-nitens, utrinque ad basin singuli segmenti macula magna flava. Alae albidae, margine crassiori, ferrugineo. Pedes ferruginei.

14. S. antennis setariis, tomentosus, thorace lineis duabus flavis, abdomine ferrugineo: linea dorsali interrupta, nigra. *Fruteto-rum.*

Habitat in Anglia.

*Paulo minor S. pendulo.* Antennae ferrugineae, seta fusca. Thorax niger, ferrugineo-tomentosus, lineis duabus dorsalibus flavescentibus. Abdomen ovatum, primo segmento ferrugineo, arcu baseos apicisque linea dorsali connexis, nigris: secundo nigro, lateribus punctisque tribus dorsalibus ferrugineis: tertio ferrugineo, puncto dorsali nigro. Pedes ferruginei, femoribus basi nigris.

15. S. antennis setariis, tomentosus, thorace griseo, ab domine fusco, tibiis posticis compresso-gibbis. *tenax.*

*Musca tenax. Linn. Syst. Nat. II. 984. 32. Fn. Sv. 1799.*

*Musca fusca, segmentis abdominalibus tribus margine albidis: primo latere flavo, thorace vix maculato.*

*Geoff. Ins. 2. 520. 52.*

Musca

*Musca apiformis tota fusca, cæuda obtusa, ex eruca caudata in latrinis degente orta.* *Raj. Inf.* 272.

*Swamm. bibl.* tab. 38. fig. 9.

*Reaum. Inf.* 4. tab. 20. fig. 7.

*Blanc. Inf.* tab. 10. fig. F.

*Goed. Inf.* 1. tab. 2.

*Alb. Inf.* tab. 63. fig. e. f. g.

Habitat in fimetis, cloacis, aquis putrescentibus.

Larva tenacissima, vix prelo destruenda.

- trilineatus.* 16. S. antennis setariis, tomentosus, thorace pallido: lineis nigris, abdomine atro: fascia baseos interrupta, ferruginea.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Banks.*

Magnitudo praecedentis. Caput flavum, labii margine, antennis verticeque nigris. Thorax tomentosus, pallidus, lineis tribus latis, nigris. Abdomen atrum, fascia baseos interrupta, ferruginea. Pedes ferruginei, femoribus quatuor anticis basi nigris, posticis unidentatis totis nigris. Tibiae posticae incurvae, ferrugineae, basi nigrae.

- intricarius.* 17. S. antennis setariis, tomentosus, abdome nigro: apice genubusque albis.

*Musca intricaria.* *Linn. Syst. Nat.* II. 985. 33. *Fn. Sv.* 1800.

Habitat in Europa.

- oestraceus.* 18. S. antennis setariis, nigra, abdominalis apice lutescente, femoribus posticis incrassatis.

*Musca oestracea* antennis setariis, tomentosa, nigra, scutello albido, abdominalis apice lutescente. *Linn. Syst. Nat.* II. 985. 34. *Fn. Sv.* 1801.

*Schaeff. Icon.* tab. 10. fig. 6.

Habitat in Europa.

*Labium emarginatum*, flavum. *Plantæ piceæ.*

- Lucorum.* 19. S. antennis setariis, tomentosus, thorace griseo, abdome atro: segmento primo toto albo.

*Musca lucorum.* *Linn. Syst. Nat.* II. 985. 36. *Fn. Sv.* 1803.

Habitat in Europæ lucis.

20. S. antennis setariis, tomentosus, niger, abdominis *Sylvatum.*  
ultimo segmento tomentoso, flavo.  
Musca sylvarum. *Linn. Syst. Nat.* II. 985. 37. *Fn. Sv.*  
1804.  
Habitat in Europa.
21. S. antennis setariis, elongatis, niger, thorace lateri- *bicinctus.*  
bus punctis abdomineque cingulis duobus flavis.  
Musca bicincta. *Linn. Syst. Nat.* II. 985. 38. *Fn. Sv.* 1805.  
Habitat in Europae floribus.  
Alae margine exteriori fuscō.
22. S. antennis setariis, elongatis, niger, thorace ma- *arcuatus.*  
culis lateralibus, abdomine cingulis quatuor arcua-  
tis, flavis.  
Musca arcuata. *Linn. Syst. Nat.* II. 985. 39. *Fn. Sv.* 1806.  
Musca nigra, flavo - variegata, alis fuscis, antennis  
capite longioribus. *Geoff. Inf.* 2. 506. 28.  
Habitat in Europa.
23. S. antennis setariis, tomentosus, abdomine atro: *cingula-*  
segmento primo basi, reliquis punctis albis. *tus.*  
Habitat in nova Zelandia. *Mus. Banks.*  
Statura S. mutabilis. Caput ferrugineum, fasciis dua-  
bus verticalibus atris. Thorax ater, tomento fer-  
rugineo tectus. Abdomen atrum: segmento primo  
fascia baseos in medio interrupta alba, 2. 3. punctis  
quatuor et 4. punctis duobus albis. Pedes atri,  
plantis ferrugineis. Femora postica incrassata, ti-  
biae incurvae.
24. S. antennis setariis, elongatis, tomentosus, thorace *mutabilis.*  
immaculato, abdomine nigro griseoque mutabili.  
Musca mutabilis. *Linn. Syst. Nat.* II. 985. 40. *Fn. Sv.*  
1807.  
Habitat in Europa.
25. S. antennis setariis, elongatis, tomentosus, thora- *devius.*  
ce coerulescente, abdomine obscure violaceo.  
Musca devia. *Linn. Syst. Nat.* II. 985. 41. *Fn. Sv.* 1808.  
Habitat in Europa, Anglia.  
Os argenteum. Alae immaculatae. Pedes nigri, fe-  
moribus posticis basi digitisque omnibus flavis.

*conopseus.* 26. S. antennis setariis, nudus, niger, thorace lineis lateralibus, abdomine fasciis tribus flavis.

Musca conopsoides antennis clavatis, mucronatis, basi coadunatis, abdomine cingulis tribus flavis. *Linn.*

*Syst. Nat.* II. 982. 21. *Fn. Sv.* 1790.

*Reaum. Ins.* 4. tab. 33. fig. 12. 13.

Habitat in Europa.

Alae albae, margine crassiori, nigro.

*ichneumoneo-* 27. S. antennis setariis, elongatis, cylindricis: niger, neus.

Musea ichneumonea antennis setariis, elongatis, cylindricis, thorace pedibusque longiusculis ferrugineis, abdomine cinereo. *Linn. Syst. Nat.* II. 986. 42. *Fn. Sv.* 1809.

Habitat in Europa.

Statura elongata. Abdomen nigrum. Alae albae.

*sphegeus.* 28. S. antennis setariis, elongatis, niger, pedibus rufis.

Habitat in Anglia. *Mus. Banks.*

Praecedente paulo major. Antennae capite longiores, acuminatae, nigrae. Caput, thorax et abdomen oblongum nigra, immaculata. Alae obscurae. Pedes omnes rufi, palmis nigris.

*elongatus.* 29. S. antennis setariis, nudus, thorace aeneo, abdome clavato, nigro: fasciis duabus flavis.

Habitat in Daniae floribus.

Longus, angustus. Thorax aeneus, immaculatus. Alae albae, puncto parvo marginali fusco. Pedes tenues, flavi.

*podagrica-* 30. S. antennis setariis, nudus, thorace aeneo, abdome bifasciato femoribusque posticis clavatis.

Habitat in Daniae floribus.

Praecedente duplo minor. Thorax aeneus, immaculatus. Abdomen clavatum, fasciis duabus flavis. Alae albae, fusco maculatae. Pedes flavi, femoribus posticis clavatis, atris.

*crabroniformis.* 31. S. antennis setariis, tomentosus, thorace variegato, abdomine flavo: segmento primo secundoque apice fuscis.

Habitat in Madera Insula. *Mus. Banks.*

Major

Major S. diophthalmo. Caput flavum, antennis ferrugineis. Thorax antice flavus, linea dorsali maculaque laterali fuscis, posicce fuscus, margine flavo. Scutellum ferrugineum. Abdominis segmenta 1. 2. basi flava, linea media fusca, apice fusca. Segmentum 3. flavum, linea media fusca, 4. flavum, immaculatum. Pedes flavi, femoribus ferrugineis, posticis unidentatis.

32. S. antennis setariis, nudus, thorace maculato, ab diophthal-  
domine cingulis sex flavis, femoribus posticis mus.  
dentatis.

Musca diophthalma. *Linn. Syst. Nat.* II. 986. 43. Fn.  
Sv. 1810.

Habitat in Europa.

Oculi glauci, fusco punctati. Os flavum, linea nigra.  
Pedes ferruginei, femoribus posticis acute dentatis.

33. S. antennis setariis, nudus, thorace maculato, ab vespiformis.  
domine cingulis sex flavis.

Musca vespiformis. *Linn. Syst. Nat.* II. 986. 44. Fn.  
Sv. 1811.

Habitat in Europa.

Thorax lineolis duabus dorsalibus glaucis. Abdomi-  
nis fasciae per paria coeunt.

34. S. antennis setariis, nudus, thorace lineis laterali- festivus.  
bus, abdomine cingulis quatuor flavis, interrupitis.

Musca festiva. *Linn. Syst. Nat.* II. 986. 45. Fn. Sv. 1812.

Musca nigra, flavo-variegata, alis fuscis, antennis  
capite brevioribus. *Geoff. Ins.* 2. 505. 27.

Conops festiva. *Scop. carn.* 964.

Habitat in Europa.

35. S. antennis setariis, tomentosus, thorace lineato, ruficornis.  
abdomine aeneo.

Habitat in Daniae floribus.

Antennae rufae. Thorax fuscus, cinereo-lineatus.  
Scutellum glaucum. Abdomen aeneum. Alae ma-  
culis duabus fuscis. Pedes testacei.

- lugubris.* 36. S. antennis setariis, niger, immaculatus, alis albis: macula fusca.  
**Habitat** in Dania.  
 Statura praecedentis, at paulo minor, totus niger, alis solis albis, macula magna fusca.
- glaucus.* 37. S. antennis setariis, subtomentosus, niger, abdomine basi pellucido cingulisque duobus albidis, interruptis.  
*Musca glaucia.* *Linn. Syst. Nat.* II. 986. 47. *Fn. Sv.* 1813.  
*Conops glaucius.* *Scop. carn.* 966.  
**Habitat** in Europa.  
 Os albidum, antennis verticeque nigris. Thorax immaculatus. Scutellum apice glaucum. Pedes nigri, anticis quatuor geniculis ferrugineis.
- noctilucus.* 38. S. antennis setariis, subtomentosus, ater, abdominis primo segmento maculis duabus pellucidis.  
*Musca noctiluca.* *Linn. Syst. Nat.* II. 986. 48. *Fn. Sv.* 1814.  
**Habitat** in Europa.
- gibbosus.* 39. S. antennis setariis, subtomentosus, fuscus, abdome subgloboso, atro: cingulis quatuor albis, squamis halterum buccatis.  
*Musca gibbosa.* *Linn. Syst. Nat.* II. 987. 49. *Fn. Sv.* 1815.  
**Habitat** in Europa.  
 Caput parvum. Thorax gibbus, fuscus. Alae magnae, albae. Tibiae ferrugineae.
- globosus.* 40. S. antennis setariis, subtomentosus, thorace antice ferrugineo, abdome subgloboso, pallido, apice nigro.  
**Habitat** in Anglia.  
 Statura praecedentis, at triplo minor. Os album. Frons ferruginea, linea longitudinali nigra. Thorax antice ferrugineus, postice ater. Abdomen subpellucidum, pallidum, ultimo segmento nigro. Pedes nigri. Alae albidae.
- Ribesii.* 41. S. antennis setariis, nudiusculus, thorace immaculato, abdome cingulis quatuor flavis: primo interrupto.

Musca

Musca Ribesii. *Linn. Syst. Nat.* II. 987. 50. *Fn. Sv.*  
1816.

Musca abdomine ovato, nigro, lunularum pari cingulisque tribus flavescentibus. *Geoff. Inf.* 2. 511.  
*Goed. Inf.* I. tab. 41.

Habitat inter aphides ribeos.

42. *S. antennis setariis, niger, nudiusculus, thorace Pyrastris. immaculato, abdomine bis tribus lunulis albis, recurvatis.*

Musca Pyrastris. *Linn. Syst. Nat.* II. 987. 51. *Fn. Sv.* 1817.

Musca thorace nigro-viridi, abdomine atro, ovato, tribus paribus lunularum albicantium. *Geoff. Inf.*  
2. 516. 46.

*Scop. carn.* 931.

*Frisch. Inf.* II. tab. 22. fig. 1.

*Reaum. Inf.* 3. tab. 31. fig. 9.

*Alb. Inf.* tab. 66.

*Goed. Inf.* I. tab. 47.

*Blank. Inf.* tab. 10. fig. P.

*Sultz. Inf.* tab. 20. fig. 132.

Habitat inter aphides pyri.

43. *S. antennis setariis, nudus, niger, thorace maculato, abdomine cingulis quatuor scutelloque flavis. *Menthastris.**

Musca Menthastris. *Linn. Syst. Nat.* II. 987. 53. *Fn. Sv.*

1819.

Musca thorace nigro, viridi, apice flavo, abdomine nigro, fasciis luteis, transversis, aequalibus. *Geoff. Inf.*  
2. 514. 41.

Habitat inter aphides larva, at Syrphus in floribus mellifugus.

44. *S. antennis setariis, nudus, thorace subaeneo, immaculato, abdomine maculis octo lutescentibus. *mellinus.**

Musca mellina. *Linn. Syst. Nat.* II. 988. 55. *Fn. Sv.* 1821.

Musca thorace nigro-viridi, apice flavo, abdomine oblongo, paribus tribus trigonorum lutescentium. *Geoff. Inf.* 2. 515. 42.

Musca mellina. *Scop. carn.* 934.

Habitat inter aphides.

*scriptus.* 45. S. antennis setariis, nudus, thorace lineis abdomine neque linearie fasciis flavis.

*Musca scripta.* Linn. *Syst. Nat.* II. 987. 54. *Fn. Sv.* 1820.

*Reaum. Inf.* 4. tab. 10. fig. 2. 3.

*Roef. Inf.* 2. *Musc.* tab. 6.

Habitat inter aphides larva, Syrphus in floribus.

*pipiens.* 46. S. antennis setariis, nudus, abdomine utrinque albo maculato, femoribus posticis clavatis, dentatis.

*Musca pipiens.* Linn. *Syst. Nat.* II. 988. 56. *Fn. Sv.* 1822.

*Musca oblonga,* femoribus posticis majoribus. Geoff. *Inf.* 2. 519. 49.

*Conops pipiens.* Scop. *carn.* 969.

Habitat in Europae floribus.

*segnis.* 47. S. antennis setariis, nudus, thorace aeneo, abdome ferrugineo: apice nigro.

*Musca segnis.* Linn. *Syst. Nat.* II. 988. 57. *Fn. Sv.* 1823.

*Musca oblonga,* thorace aeneo, abdomine anterius flavo, posterius nigro. Geoff. *Inf.* 2. 526. 62.

Habitat in Europa.

Variat thorace pedibusque nigris.

*femoratus.* 48. S. antennis setariis, tomentosus, thorace subaeneo, femoribus posticis clavatis, basi rubris.

*Musca femorata* antennis setariis, glabra, atra, oblonga, femoribus posticis clavatis pedibusque anticus rubris. Linn. *Syst. Nat.* II. 988. 58. *Fn. Sv.* 1824.

Habitat in Europa.

Alae lunula nigra.

*sepulcralis.* 49. S. antennis setariis, tomentosus, niger, abdomine atro, nitidulo.

*Musca sepulcralis.* Linn. *Syst. Nat.* II. 991. 73. *Fn. Sv.* 1835.

Habitat in Suecia.

Oculi maculati.

173. MUSCA. *Os proboscide atque hau-*  
*stello.*

*Haustellum feta unica abs-*  
*que vagina.*

*Palpi duo porrecti, ex-*  
*trorsum crassiores.*

*Antennae setariae.*

\* *Antennis seta plumata.*

1. M. antennis plumatis, fusca, abdomine pellucido: cin- *inanis.*  
gulis tribus nigris.

Musca inanis antennis plumatis, pilosa, flavescens,  
abdomine pellucido: cingulis duobus nigris. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 989. 61. *Fn. Sv.* 1825.

*Nemotelus niger*, abdomine niveo, fasciis duabus ni-  
gris. *Geoff. Inf.* 2. 543. I. tab. 18. fig. 4.

Habitat in Europae nemoribus.

Scutellum flavescens. Alae macula fusca.

2. M. antennis plumatis, nigra, abdominalis segmento *pellucens.*  
primo albo, pellucido. *Linn. Syst. Nat.* II. 989. 62.  
*Fn. Sv.* 1826.

*Voluccella* abdomine antice albo, postice nigro, alis  
albis, nigra macula. *Geoff. Inf.* 2. 540. I. tab. 18.  
fig. 3.

*Raj. Inf.* 271. I.

*Sultz. Inf.* tab. 20. fig. 133.

Habitat in Europae umbrosis.

Scutellum ferrugineum. Alae subfasciatae.

3. M. antennis plumatis, pilosa, nigra, fronte aurea, *meridiana*-  
alis basi ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 989. 63. na.  
*Fn. Sv.* 1827.

Musca meridiana. *Scop. carn.* 867.

Habitat in Europae nemoribus.

4. M. antennis plumatis, pilosa, nigra, thorace lineis *carnaria*-  
pallidioribus, abdomine nitido, tessellato. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 990. 68. *Fn. Sv.* 1832.

*Musca nigra*, abdomen nitido, tessellato, thorace lineolis pallidioribus, longitudinalibus, ano fulvo.  
*Geoff. Inf.* 2. 527. 65.

*Musca carnaria*, vulgaris. *Raj. Inf.* 270. 1.

*Musca subvariegata*. *Scop. carn.* 869.

*Aldr. Inf.* 348. tab. 2. fig. 16.

*Frisch. Inf.* 7. tab. 14.

*Reaum. Inf.* 4. tab. 29. fig. 4—6.

*Roef. Inf.* 2. *Musc.* tab. 10. fig. 10.

Habitat in Europae, Americae cadaveribus.

*domestica*. 5. M. antennis plumatis, thorace lineato, abdomen tessellato: subtus basi pallido.

*Musca domestica* antennis plumatis, pilosa, nigra, thorace lineis quinque obsoletis, abdomen nitidulo, tessellato, oculis fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 990. 69. *Fn. Sv.* 1833.

*Musca nigra*, abdomen nitidulo, tessellato, thorace lineolis pallidioribus, longitudinalibus, ano concolore. *Geoff. Inf.* 2. 528. 66.

*Musca bipennis major*, thorace glabro, striato, abdomen supino nigro, toto maculis albis punctato. *Raj. Inf.* 270. 2.

*Scop. carn.* 872.

*Aldr. Inf.* tab. 2. fig. 23.

*Ioblot. micr.* 1. pp. tab. 5.

Habitat larva in stercore equino, *Musca* in domibus,

*Americana*. 6. M. antennis plumatis, atra, thoracis lateribus canis, nigro punctatis.

Habitat in America.

Statura magna et crassa Oestri. Antennae parvae, canaliculo frontis insertae, seta plumosa. Caput atrum, glabrum, laeve. Thorax ater, glaber, linea media transversa, impressa, lateribus cano-pubescentibus, punctis tribus nigris. Scutellum magnum, rotundatum, substriatum, nigrum. Abdomen crassum, atrum, immaculatum. Alae atrae, squama halterum prominente, fornicata. Pedes atri.

7. M. antennis plumatis, pilosa, thorace cinereo-aeneo, *retusa*.  
abdomine subaureo: ano retuso.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Magna. Caput albidum, linea frontali nigra. Thorax pilosus, cinereus, aeneo - nitens. Scutellum acuminatum. Abdominis segmenta aurea, nitida, marginibus nigris. Anus valde retusus. Alae albae, macula baseos fusca. Pedes nigri.

8. M. antennis plumatis, viridi-nitens, pedibus nigris. *Caesar.*

*Linn. Syst. Nat. II. 989. 64. Fn. Sv. 1828.*

Musca thorace abdomeque viridi, nitente, pedibus nigris. *Geoff. Inf. 2. 522. 53.*

Musca bipennis, thorace et abdome superne coeruleo colore pulcro nitente, capite nigro.

*Raj. Inf. 272. 1.*

*Scop. carn. 871.*

*Mouff. Inf. tab. 49.*

*Merian. Europ. I. tab. 49.*

*Reaum. Inf. 4. tab. 8. fig. 1.*

— — tab. 19. fig. 8.

Habitat in Europae cadaveribus.

9. M. antennis plumatis, nitens, thorace coeruleo, ab- *cadaveri-*  
domine viridi. *Linn. Syst. Nat. II. 989. 65. Fn. Sv. 1829. na.*

Musca thorace coeruleo-nitente, abdome viridi, ni-  
tente. *Geoff. Inf. 2. 524. 57.*

*Goed. Inf. I. tab. 54.*

Habitat in Europae cadaveribus.

Praecedenti valde affinis.

10. M. antennis plumatis, viridi-nitens, abdome *putrida*.  
globoso, cyaneo.

Habitat in America. *Mus. Tottianum.*

Statura et summa affinitas M. Caesaris, at abdomen to-  
tum cyaneum. Pedes nigri.

11. M. antennis plumatis, thorace nigro, abdome vi- *mortuo-*  
ridi-aeneo. *Linn. Syst. Nat. II. 989. 66. Fn. Sv. 1830. rum.*

Habitat in Europae cadaveribus.

Praecedentibus duplo major. Thorax sublineatus.  
Pedes nigri.

- leonina*. 12. M. antennis plumatis, thorace aeneo, albo punctato; abdomine coeruleo: ano bipunctato.  
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
Os vesiculosum, ferrugineum, oculis nigris. Thorax pilosus, aeneus, punctis utrinque tribus lineolisque duabus apicis albis. Pectus punctis utrinque tribus albis: posteriore sub alis majore. Abdomen coeruleum, nitidum, segmento secundo puncto parvo lateraliter albo, quarto s. ultimo punctis duobus majoribus albis. Pedes nigri.
- vomitoria*. 13. M. antennis plumatis, thorace nigro, abdomine coeruleo-nitente, fronte fulva. *Linn. Syst. Nat. II. 989. 67. Fn. Sv. 1831.*  
*Musca thorace nigro, abdomine coeruleo. Geoff. Inf. 2. 524. 59.*  
*Musca carnaria. Scopol. carn. 868.*  
*Goed. Inf. I. tab. 53.*  
*R. J. Inf. 27.*  
*Reaumur. Inf. 4. tab. 24. fig. 13—15.*  
Habitat in Europae cadaveribus.  
Affinis *M. cadaverinae*, at frons fulva et thorax niger, vix lineatus.
- macella-via*. 14. M. antennis plumatis, thorace cupreо, nigro-lineato, abdomine aeneo, pedibus nigris.  
Habitat in America.  
Statura *M. Caesaris*. Thorax cupreus, obscure nitens lineis tribus nigris. Alae albae.
- vulpina*. 15. M. antennis plumatis, thorace lineato, abdomine ferrugineo, nigro maculato.  
Musca maculata antennis plumatis, pilosa, nigra, thorace nigro lineato, abdomine atro maculato, ano bipunctato. *Linn. Syst. Nat. II. 990. 70?*  
Habitat in Europa.  
Frons nigra, oculorum orbita argentea. Thorax pilosus, ater, lineis quatuor longitudinalibus cinereis. Scutellum nigrum, margine ferrugineo. Abdomen ferrugineum, maculis plurimis nigris sparsis anque cinereo punctis duobus nigris: subtus nigrum, lateribus ferrugineis. Alae subfuscæ. Pedes nigri.

16. M. antennis plumatis, cinerea, abdomine coeruleo. *Augur.*  
scente : lateribus testaceo - diaphanis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Statura praecedentium. Caput ferrugineum, vertice  
fusco. Thorax pilosus, cinereus, immaculatus.  
Abdomen dorso coerulescente, lateribus testaceo-  
diaphanis, ano griseo fuscoque mutabili. Alae  
aqueae. Pedes ferruginei, plantis rufis.

17. M. antennis plumatis, grisea, femoribus rufis. *rufica.*  
Habitat Havniae.  
Magna, tota grisea, pilosa, femoribus solis rufis.

\* \* *Antennis seta nuda.*

18. M. antennis setariis, nigra, abdominis lateribus te-  
staceo - diaphanis. *Linn. Syst. Nat. II. 991. 74. Fn.* *f. fera.*  
*Sv. 1836.*

Musca nigra, abdomine hemisphaerico, luteo, fa-  
scia longitudinali nigra. *Geoff. Inf. 2. 509. 33.*

Habitat in Europa.

19. M. antennis setariis, nigra, abdomine fasciis dua- *bifascia-*  
bus aureis. *ta.*

Habitat in America. *v. Rohr.*

Magna. Statura M. grossae. Os album, antennis ni-  
gris. Thorax et abdomen atra, valde pilosa. Ver-  
sus anum fasciae duae aureae. Pedes nigri, ungu-  
lis ferrugineis.

20. M. antennis setariis, nigra, alis basi ferrugineis. *grossa.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 991. 75. Fn. Sv. 1837.*

Musca atra, basi alarum ferruginea. *Geoff. Inf. 2. 495.*  
*Reaum. Inf. 4. tab. 26. fig. 10.*

Habitat in stercore bovino Europae.

21. M. antennis setariis, pilosissima, atra, ore albicante. *Hystrix.*  
Musca pilosa. *Drury. Inf. I. tab. 45. fig. 7.*

Habitat in America.

Statura M. ferae, at triplo minor. Tota atra, ni-  
gens, immaculata, pilis densissimis, elongatis, ri-  
gidis tecta.

*rotunda-* 22. M. antennis setariis, thorace sublineato, abdomine subrotundo, ferrugineo: linea longitudinali punctorum nigrorum.

Musca rotundata antennis setariis, pilosa, thorace sublineato, abdomine subrotundo, flavo: maculis longitudinalibus fuscis, confertis. *Linn. Syst. Nat. II. 991. 76. Fn. Sv. 1838.*

Musca nigra, abdomine hemisphaerico, rufo, punctorum nigrorum ordine longitudinali. *Geoff. Inf. 2. 509. 32.*

*Scopol. carn. 883.*

Habitat in Europa.

Puncta dorsalia in altero sexu connata.

*Larva-* 23. M. antennis setariis, nigricans, scutelli apice subtestaceo, abdomine tessellato. *Linn. Syst. Nat. II. 992. 78. Fn. Sv. 1839.*

*Scop. carn. 888.*

*Ammir. Inf. tab. 6.*

*de Geer Inf. I. tab. II. fig. 23.*

Habitat in lepidopterorum larvis, in radicibus brassicae oleraceae, unde radix strumosa et capita laxa. *Linn.* Abdomen albidius, tessellatum.

*Radicum.* 24. M. antennis setariis, nigra, abdomine cinereo, nigro fasciato.

Musca radicum antennis setariis, pilosa, abdomine cinereo, linea dorsali cingulisque quatuor nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 992. 79. Fn. Sv. 1839.*

Habitat in raphani radicibus.

*brassica-* 25. M. antennis setariis, nigra, abdomine cylindrico: segmento secundo tertioque rufis.

Habitat in brassicae radicibus.

Statura oblonga M. cuprariae. Caput album, linea frontalii nigra. Thorax sublineatus. Abdomen cylindricum, incurvum, basi rufum, apice nigrum. Alae hyalinae, costa obscura. Squama halterum fornicata, nivea. Pedes atri.

*lateralis.* 26. M. antennis setariis, nigra, abdominalis lateribus basi sanguineis.

Habitat in Germania.

Magnitudo M. domesticae, at abdomen basi sanguineum,  
linea dorsali nigra. Os album.

27. M. antennis setariis, nigricans, abdominis segmento secundo tertioque lateribus diaphanis. *Linn. Syst. Nat.* II. 992. 80. *Fn. Sv.* 1841. *canicula-*  
*ris.*

Habitat in Europa, sub canicula vesperi et meridie sub arborum coma choreas agens.

Magnitudo M. domesticae. Frons argentea.

28. M. antennis setariis, nigra, abdomine supra glabro, subviolaceo. *Linn. Syst. Nat.* II. 992. 82. *Fn. Sv.* 1842. *Coenite-*  
*riorum.*

Habitat in Europa.

29. M. antennis setariis, cinerea, thorace maculis quinque nigris, abdomine maculis obsoletis. *Linn. Syst. Nat.* II. 992. 83. *Fn. Sv.* 1844. *pluvialis.*

Musca cinerea, thorace maculis quinque nigris, abdomine maculis tridentatis. *Geoff. Ins.* 2. 529.  
*Scop. carn.* 891.

Habitat in Europa, ante pluviam choreas agens.

30. M. antennis setariis, tota atra, alis hyalinis, femoribus posticis saltatoriis. *Linn. Syst. Nat.* II. 993. 84. *subsaltans.*

Habitat in Europa boreali, saliendo volitans.

Magnitudo vix culicis; tota nigra, immaculata.

31. M. antennis setariis, cinerea, thorace nigro punctato, femoribus apice tibiisque ferrugineis. *tigrina.*

Habitat in Anglia, viciitans rapina congenerum.

Magnitudo M. domesticae: pilosa, tota cinerea. Thorax nigro punctatus. Alae albae, Anus stylatus.

32. M. antennis setariis, aterrima, alis apice subalbanticibus. *roralis.*

Musca roralis antennis setariis, pilosa, aterrima. *Linn. Syst. Nat.* II. 993. 85. *Fn. Sv.* 1846.

Musca roralis. *Scop. carn.* 890.

Habitat in Europa.

Parva, tota atra. Antennae brevissimae, incumbentes, ut vix appareant. Abdomen cylindricum, pilosum. Alae nigrae, apicibus minus obscuris. Halteres atri.

- feneſtralis.* 33. M. antennis setariis, glabra, atra, abdomine ſupra rugoſo, alis fulcra. *Musca fenestrata* antennis filatis, glabra, atra, abdo-mine ſupra rugoſo: strigis albis, pedibus ferrugi-neis. *Linn. Syst. Nat.* II. 981. 14. *Fn. Sv.* 1845.  
Habitat in Europa.  
Parva, noſtra tota atra.
- ferrata.* 34. M. antennis setariis, cinerea, alarum costa pilis bre-viſſimis ferrata, abdo-mine pedibusque ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 993. 86. *Fn. Sv.* 1847.  
Habitat in Europa.
- cellaris.* 35. M. antennis setariis, nigra, abdo-mine pallidiore, oculis ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 992. 87. *Fn. Sv.* 1848.  
*Musca ferrugineo-fusca*, ſubpilosa, oculis ferrugineis, alis trinerviis. *Geoff. Inf.* 2. 537. 85.  
*Musca oenopota*. *Scop. carn.* 905.  
*Raj. Inf.* 261.  
*Reaum. Inf.* 5. tab. 8. fig. 7. II. 12.  
Habitat in cellis vinariis.
- meteorica.* 36. M. antennis setariis, atra, abdo-mine cinerascente, alis basi subflavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 993. 88. *Fn. Sv.* 1849.  
Habitat in Europa, ingruente pluvia choreas agens.  
Duplo minor *M. domes-tica*. Pedes atri.
- Frit.* 37. M. antennis setariis, nigra, halteribus, plantis poſti-cis abdo-mineque virescenti-pallidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 994. 90. *Fn. Sv.* 1851.  
Habitat in hordei glumis, grana deſtruens.  
Magnitudo pulicis.
- putris.* 38. M. antennis setariis, atra, alarum costa nigra, alis ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 993. 89. *Fn. Sv.* 1850.  
*Scop. carn.* 904.  
*Goed. Inf.* 1. tab. 73.  
*Merian. Eur.* tab. 43. fig. 83.  
*Frisch. Inf.* 1. tab. 7.  
Habitat in ſimetis, caſeo pinguedineque alia.

39. M. antennis setariis, glauca, aenea, thorace viridi, *cupraria*.  
abdomine oblongo cupreo, halteribus nudis. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 994. 92. *Fn. Sv.* 1853.  
Musca oblonga, capite viridi, thorace aeneo, abdo-  
domine cupreo, alis macula fusca. *Geoff. Inf.* 2. 525. 61.  
*Scop. carn.* 911.  
*Reaum. Inf.* 4. tab. 22. fig. 7. 8.  
Habitat in Europa.
40. M. antennis setariis, nitida, thorace coeruleo, ab-  
domine aeneo, halteribus nudis. *polita*.  
Musca polita antennis setariis, glabra, aenea, capite  
viridi, thorace abdomineque coeruleis, halteribus  
nudis. *Linn. Syst. Nat.* II. 894. 93. *Fn. Sv.* 1854.  
Habitat in Europa.  
Halteres et pedes flavi.
41. M. antennis setariis, nigro-aenea, abdomine aeneo, *viduata*.  
squamis halterum ciliatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 994.  
94. *Fn. Sv.* 1852.  
Habitat in Europa.
42. M. antennis setariis, nigra, abdominis ultimo segmen-  
to incurvato: pube utrinque reflexa. *Linn. Syst.*  
*Nat.* II. 994. 95. *Fn. Sv.* 1855. *pubera*.  
Habitat in Europa.  
Caput pilosum, atrum, ore albicante. Thorax ater,  
subtessellatus. Abdomen elongatum, tenue, cylin-  
dricum, apice incrassatum, nigrum, ultimo segmen-  
to incurvato.
43. M. antennis setariis, testacea, abdomine nigro, alis *fasciata*.  
apice fuscis: fascia alba, pedibus elongatis.  
Habitat in America. *Mus. Tottianum*.  
Statura angustata M. Petronellae. Caput et thorax  
obscure testacea. Abdomen cylindricum, nigrum,  
infelixum. Alae basi albae, apice late nigrae, fascia  
alba. Pedes postici longissimi, nigri, femoribus  
apice cingulo pallido, tarfis basi cingulo niveo.
44. M. antennis setariis, livida, fronte rubra, pedibus  
elongatis, testaceis: geniculis nigris. *Petronel-  
la*.  
Musca Petronella antennis setariis, pilosa, glabra, li-  
vida, fronte rubra, cauda incurvata, pedibus elon-  
gatis,

gatis, testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 994. 96. *Fn. Sv.*  
1856. *Linn. It. Wgoth.* 55.

Habitat in Europa, supra aquas quietas cursitans.

*crißata.* 45. M. antennis setariis, atra, tibiis pallidis, vertice prominulo.

Habitat in Anglia: capt. d. 20. Maj.

Statura et magnitudo M. Petronellae. Antennae breves, truncatae, apice setigerae. Vertex puncto magno, elevato, nigro. Thorax ater, immaculatus. Alae hyalinae, macula marginali nigra. Pedes nigri, tibiis pallidis.

*corrigo-* *lata.* 46. M. antennis setariis, nigra, pedibus elongatis, luteis: femoribus nigro annulo. *Linn. Syst. Nat.* II. 995. 100.

Habitat frequens Havniae ad fossas paludosas.

Corpus totum nigrum. Pedes elongati, lutei, femoribus annulo nigro.

*cursitans.* 47. M. antennis setariis, atra, pedibus elongatis, pallidis, alis incumbentibus, albis.

Habitat in Angliae arboribus, muris, facie cimicis celerrime cursitans, vix volitans, capta d. 13. Maj.

Magnitudo dupla pulicis. Statura M. ungulatae. Antennae cylindricae, pallidae, seta elongata nigra. Corpus atrum, ano stylato, acutissimo. Alae incumbentibus vix apparent. Pedes elongati, pallidi.

*ungulata.* 48. M. antennis setariis, aeneo-viridis, cauda uncinata, pedibus elongatis, lividis. *Linn. Syst. Nat.* II. 995. 97. *Fn. Sv.* 1858.

Musca thorace abdomineque viridi-nitente, pedibus ferrugineis, alis trinerviis. *Geoff. Ins.* 2. 523. 56.

Habitat ad Europae aquas.

*nobilitata.* 49. M. antennis setariis, aeneo-viridis, cauda uncinata; alis macula nigra, apice alba. *Linn. Syst. Nat.* II. 995. 98.

Musca thorace abdomineque viridi-sericeo, pedibus pallidis, alarum medio fusco. *Geoff. Ins.* 2. 523. 55.

Habitat in Europa.

*equestris.* 50. M. antennis setariis, aeneo-viridis, abdomine nigro fasciato, cauda uncinata, alis maculatis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

Statura et summa affinitas praecedentis. Caput et thorax viridi-aenea, nitida, immaculata. Abdomen cylindricum, aeneum, fasciis quinque atris. Cauda intlexa, uncinata. Alae albae, versus apicem macula magna fusca. Pedes nigri.

51. M. antennis setariis, nigra, alis fuscis: fasciis tribus *arrogans*. albis. *Linn. Syst. Nat. II. 995. 99. Fn. Sv. 1857.*

Habitat in Europa.

52. M. antennis setariis, pilosis, aeneo-nitens, pedibus *longicornis*. nigris.

Habitat in America.

Parva. Statura M. angulatae. Antennae nigrae, pilosae setaque unica longitudine fere corporis. Corpus viridi-aeneum, nitidum, pedibus solis nigris. Alae hyalinae. Cauda uncinata.

53. M. antennis setariis, aenea, abdomine nigro fasciato, *rostrata*. ore corneo, prominulo atro.

Habitat Havniae.

Statura et summa affinitas M. ungulatae. Caput triangulare, viridi-aeneum, ore porrecto, corneo, atro. Thorax sublineatus. Abdomen in altero sexu ungulatum. Pedes elongati, testacei.

54. M. antennis setariis, thorace aeneo, abdomine *diaphana* cinereo: primo secundoque segmento lateribus diaphanis.

Habitat Lipsiae.

Statura M. ungulatae. Caput nigrum. Thorax aeneus, nitens. Abdomen conicum, cinereum, lateribus baseos testaceo-diaphanis. Alae hyalinae. Pedes nigri, tibiis testaceis.

55. M. antennis subsetariis, thorace griseo, abdomine *cucularia* ferrugineo, alis punctis tribus.

Musca cucularia antennis setariis, pilosa, thorace plumbbeo, oculis abdomineque ferrugineis, pedibus pallidis. *Linn. Syst. Nat. II. 995. 103.*

Habitat in Europa.

Variat antennis plumatis et linea dorsali abdominis nigro punctata.

- scybala-* 56. M. antennis setariis, rufo-ferruginea, alis puncto ob-  
scurore. *Linn. Syst. Nat.* II. 996. 104. *Fn. Sv.* 1860.  
*Musca scybalaria.* *Scop. carn.* 896.  
Habitat in Europae stercore.
- stercora-* 57. M. antennis setariis, grisea, hirta, alis puncto ob-  
scuro. *Linn. Syst. Nat.* II. 996. 105. *Fn. Sv.* 1861.  
*Musca hirsuta,* cinerea, alis puncto obscurore. *Geoff.*  
*Ins.* 2. 530. 69.  
*Reaum. Ins.* 4. tab. 27. fig. 1—3.  
Habitat in stercore.  
Pedes rufi.
- fimetaria.* 58. M. antennis subplumatis, livens, glabra, alis puncto  
obscurore. *Linn. Syst. Nat.* II. 996. 106. *Fn. Sv.* 1862.  
*Musca rufa.* *Scop. carn.* 897.  
Habitat in Europa.
- margina-* 59. M. antennis setariis, obscure plumbea, alis reticula-  
ta. costa atra.  
Habitat in Saxonia.  
Statura et magnitudo praecedentis. Os vesiculosum,  
album. Antennae fuscae, seta elongata, alba. Tho-  
rax et abdomen plumbea. Pedes nigri. Alae punctis  
albis reticulatae margineque crassiori atro.
- parietina.* 60. M. antennis setariis, cinerea, alis fuscis, albo pun-  
ctatis maculatisque, fronte testacea. *Linn. Syst. Nat.*  
II. 996. 107. *Fn. Sv.* 1863.  
Habitat in Europa.
- Umbra-* 61. M. antennis setariis, cinerea, abdome nigro fascia-  
to, alis fuscis, albo maculatis.  
*Musca umbrarum* antennis setariis, alis fuscis, albo  
maculatis, fronte nivea. *Linn. Syst. Nat.* II. 996. 108.  
*Fn. Sv.* 1864.  
Habitat in Europa.  
Praecedenti nimis affinis. Pedes pallidi.
- vibrans.* 62. M. antennis setariis, alis hyalinis, apice nigris, capite  
rubro. *Linn. Syst. Nat.* II. 996. 112. *Fn. Sv.* 1867.  
*Musca alis albis,* apice nigris. *Geoff. Ins.* 2. 494. 4.  
*Scop. carn.* 939.  
Habitat in Europae arboretis, alas vibrans.

63. M. antennis setariis, alis apice puncto lateral i nigro, *cynipsea*.  
abdomine cylindrico.  
Musca cynipsea antennis setariis, alis apice puncto nigro, abdominis primo articulo obovato. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 997. 113. *Fn. Sv.* 1868.  
*Scop. carn.* 947.  
Habitat in Europa.
64. M. antennis setariis, atra, alis nigris, apice albis. *Grossificationis.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 996. 109. *Fn. Sv.* 1865.  
Musca nigra, alis nigris, apice macula rotunda, alba.  
*Geoff. Inf.* 2. 493. 1.  
Habitat in Europae frutetis.
65. M. antennis setariis, flavescentes, abdomine atro, alis punctis duobus nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 997. 114. *combinationis.*  
Habitat in Europa.  
Alae albae, puncto in margine tenuiore et apice.
66. M. antennis setariis, cinerea, abdomine atro, alis *stylata*.  
albis: punctis duobus arcuque apicis fuscis.  
Habitat in Angliae nemoribus: capt. d. 28. Iun.  
Antennae ferrugineae. Frons flava, vertice cinereo.  
Thorax pilosus, cinereus, linea laterali, scutello halteribusque flavis. Abdomen oblongum, atrum, immaculatum, stylo ani abdomine longiore. Alae albae, punctis duobus approximatis, exteriori in medio marginis crassioris majori. Pedes ferruginei.
67. M. antennis setariis, cinerea, ano pedibusque ferrugineis, alis maculatis. *umbellatarum.*  
Habitat in Angliae floribus umbellatis.  
Affinis praecedenti. Caput albicans, antennis rufis.  
Thorax et abdomen cinerea. Anus rufescens, stylo atro. Alae albae, maculis duabus transversis apicque fuscis.
68. M. antennis setariis, cinerea, alis fuscis: maculis albis, obsoletis. *Graminum.*  
Habitat in pratis graminosis Lipsiae.  
Magnitudo M. domesticae. Corpus cinereum, fronte rubra pedibusque nigris.

- dorsalis.* 69. M. antennis setariis, alis punctatis, thorace cinereo, abdomine rufo: linea dorsali nigra.  
Habitat in Bohemiae pratis.  
Os album. Antennae rufae. Thorax cinereus, linea laterali alba. Alae albae, punctis aliquot vagis, nigris. Abdomen rufum, linea dorsali punctata nigra. Pedes rufi, plantis nigris.
- Seminationis.* 70. M. antennis setariis, alis atris, cinereo punctatis, abdomine basi subtus flavo.  
Habitat in pratis Lipsiensibus.  
Magnitudo M. domesticae. Color totius corporis griseus vel fuscus, punctis minutissimis cinereis irroratus. Pedes atri.
- flava.* 71. M. antennis setariis, flava, antennis apice puncto nigro.  
Musca flava antennis setariis, flava, nuda, oculis viridissimis. *Linn. Syst. Nat.* II. 997. 115. *Fn. Sv.* 1869.  
Musca flava oculis nigris. *Geoff. Inf.* 2. 496. 8.  
Habitat in Europa.
- 4 punctata.* 72. M. antennis setariis, flava, abdomine punctis nigris quatuor. *Linn. Syst. Nat.* II. 997. 116.  
Habitat in Europa.  
Statura praecedentis. Puncta abdominis remota.
- aestuans.* 73. M. antennis setariis, alis unguiculatis, albis: puncto centrali nigricante. *Linn. Syst. Nat.* II. 997. 117.  
*Fn. Sv.* 1870.  
Habitat in Europa.
- Serrata.* 74. M. antennis setariis, alis albis, thorace virescente, abdomine cinereo: lineis quatuor punctorum nigrorum. *Linn. Syst. Nat.* II. 997. 118. *Fn. Sv.* 1871.  
Habitat in Europae carduis.
- Germinationis.* 75. M. antennis setariis, alis albis: margine maculisque nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 998. 122. *Fn. Sv.* 1874.  
*Scop. carn.* 940.  
Habitat primo vere sub arborum foliis.  
Thorax cinereus. Abdomen stylatum, nigrum.

76. M. antennis setariis, alis albis: puncto terminali fasciisque tribus distinctis, fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 998. 123. *Fn. Sv.* 1875.  
 Habitat in urtica.  
 Corpus atrum, fronte rufa.
77. M. antennis setariis, alis albis: fasciis fuscis, inaequalibus; posticis exterius connexis. *Linn. Syst. Nat.* II. 998. 124. *Fn. Sv.* 1878.  
*Blank. Inf.* tab. 16. fig. L.  
*Red. vivent.* 264.  
*Reum. Inf.* 2. tab. 38. fig. 22. 23.  
 Habitat in cerasorum nucleis.  
 Minor M. urticae. Corpus nigrum, fronte testacea.
78. M. antennis setariis, flava, alis albis: fasciis quatuor fuscis. *Tussilaginis.*  
 Habitat in Daniae floribus.  
 Corpus flavum, stylo ferrugineo, apice nigro.
79. M. antennis setariis, alis albis: fasciis quatuor conexis nigris, scutello flavo. *Linn. Syst. Nat.* II. 999. 127. *Fn. Sv.* 1879.  
 Habitat in cardui floribus.  
 Parva. Caput brunneum. Thorax cinereus, linea laterali scutelloque flavis. Abdomen nigrum, immaculatum. Alae albae, fasciis quatuor margine cohaerentibus, fuscis. Pedes flavi, femoribus nigris.
80. M. antennis setariis, ferruginea, scutello flavo, alis variegatis. *Onopordinis.*  
 Habitat in Daniae carduis.  
 Parva: statura M. solstitialis. Caput albicans. Thorax et abdomen ferruginea. Scutellum elevatum, flavidum, Pedes pallidi. Alae fusco alboque variae.
81. M. antennis setariis, alis fuscis, albo-variis: margine crassiori maculis tribus nigris; pupilla alba. *Hieracii.*  
 Habitat in Angliae floribus compositis.  
 Caput griseum, punctis aliquot parvis, fuscis. Thorax griseus, punctis duobus humeralibus, quatuor in medio et duobus posticis fuscis. Abdomen cinereum, fasciis quatuor nigris, primoribus duabus interruptis. Pedes flavi.

174. TABANVS. *Os proboscide atque haustello:*

*Haustellum vagina univalvi setisque quinque.*

*Palpi duo clavato-acuminati.*

*bovinus.* 1. T. oculis virescentibus, abdominis dorso maculis albis, trigonis, longitudinalibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 1000. 4. *Fn. Sv.* 1882.

Tabanus thorace cinereo, abdomine flavescente, segmentis singulis triangulo albo. *Geoff. Inf.* 2. 459. 1. *Scop. carn.* 1006.

*Reaum. Inf.* 4. tab. 17. fig. 8.

*Schaeff. Elem.* tab. 122.

Habitat in Europa, pecoribus infestus.

*autumnalis.* 2. T. alis hyalinis, abdomine fusco: ordine triplici albidio-maculoso. *Linn. Syst. Nat.* II. 1000. 5. *Fn. Sv.* 1883. *Scop. carn.* 1007.

Habitat in Europa.

*fasciatus.* 3. T. oculis viridibus, corpore brunneo, alis fascia fusca. Habitat in Sierra Leon Africæ. *Drury.*

Statura et magnitudo T. bovini. Caput brunneum, ore pallidiore. Corpus supra brunneum, subtus pallidius. Alae albae, basi fasciaque media fuscis. Pedes nigri, femoribus pallidis.

*calens.* 4. T. oculis viridibus, abdominis dorso linea alba, antennis rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 1000. 6.

Habitat in America.

Antennæ obscure rufæ, apice fuscae. Thorax fuscus, cinereo sublineatus. Abdomen fuscum, basi cinerascens, linea dorsali alba. Pedes fusci, tibiis basi albis.

*Tarandinus.* 5. T. oculis viridibus, abdominis segmentis margine luteis, pedibus rufis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1000. 7. *Fn. Sv.* 1884.

Habitat in Europa boreali, tarandorum cornua tenella pungens, vulnerans, deformans.

6. T.

6. T. oculis viridibus, abdomine antennisque luteis, capite thoraceque fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1000. 9. *fervens.*  
Habitat in America.
7. T. oculis viridibus, abdominis segmentis margine albis, tibiis candidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1000. 8. *exaestuans.*  
Habitat in America.
8. T. oculis - - -, alis albis: costa fusca, antennis rufis. *ruficornis.*  
Habitat in America. *Drury.*  
Corpus magnitudine T. bovini. Caput vellere cinereo tectum. Thorax niger, immaculatus. Abdomen nigrum, segmentorum marginibus subtus albis. Alae hyalinae, costa exteriori fusca. Antennae rufae. Pedes fusti.
9. T. ab domine coerulecente, alis atris. *atratus.*  
Habitat in America.  
Statura praecedentis, at minor. Corpus cum alis obscurae nigrum, minimie nitidum. Abdomen coerulescens, ano tamen nigro. Antennae et pedes nigri.
10. T. oculis fascia purpurea, corpore cinereo. *Linn. Bromius.*  
*Syst. Nat.* II. 1001. 12. *Fn. Sv.* 1885.  
*Scop. carn.* 1011.  
*Schaeff. Icon.* tab. 8. fig. 4—6.  
Habitat in Europa.  
Oculorum colores cum vita pereunt, aqua calida iterum reviviscunt.
11. T. oculis glaucis, cinereus, fronte punctis duobus atris. *rusticus.*  
Tabanus rusticus oculis glaucis, corpore cinereo praecente. *Linn. Syst. Nat.* II. 1000. II.  
Tabanus cinereus, tibiis fulvis. *Geoff. Ins.* 2. 462. 7.  
Habitat in Europa.
12. T. oculis antice viridibus: fasciis tribus fulvis, ab domine utrinque ferrugineo maculato. *paganus.*  
Habitat in Anglia: capt. d. 28. Iun. prope Henly.  
Statura et magnitudo T. tropici. Os cinereo-hirtum.  
Oculi glauci, nitentes, antice virides, fasciis tribus fulvis, quarum inferior oculum terminat. Margo posticus fuscus. Thorax cinereo-villosus, striis qua-

quatuor fuscis, obsoletis. Abdomen fuscum, subtus cinereum, singulo segmento utrinque macula ferruginea adiacenteque nigra. Alae aqueae, immaculatae. Pedes cinerei, plantis nigris.

- occidentalis.* 13. T. oculis fasciis binis fuscis, corpore fuso, abdome lineis tribus fulvis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1001. 13.  
Habitat in America meridionali.

- tropicus.* 14. T. oculis fasciis ternis fuscis, abdomine lateribus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1001. 14. *Fn. Sv.* 1886.  
*Scop. carn.* 1008.  
Habitat in Europa, pecoribus molestus.

- antarcticus.* 15. T. oculis fasciis quaternis fuscis, tibiis albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1001. 15.  
Habitat in America calidiore.  
Alae albae, costa fusca.

- pluvialis.* 16. T. oculis fasciis quaternis undatis, alis fuso punctatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1001. 16. *Fn. Sv.* 1887.  
Tabanus fuscus, alis cinereis, punctis numerosissimis albis. *Geoff. Inf.* 2. 461. 5.  
*Scop. carn.* 1012.  
*Reaum. Inf.* 4. tab. 18. fig. 1.  
*Schaeff. Icon.* tab. 85. fig. 8. 9.  
Habitat in Europa.

- longicornis.* 17. T. oculis maculatis, alis dimidiato-fuscis: macula alba, antennis longioribus.  
Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*  
Reliquis minor. Antennae cylindricae, elongatae, longitudine thoracis, in medio unidentatae, fuscae, basi pallescentes. Oculi basi fuscae, apice pallidiores, arcu maculaque fuscis. Thorax fuscus, lineis dorsalibus flavis, quae tamen basin haud attingunt. Scutellum flavescens. Abdomen cylindricum, fuscum, segmento primo et secundo basi striga flava. Alae ad marginem crassiorem fuscae, macula magna media triangulari alba.

- excutiens.* 18. T. oculis viridibus, nigro punctatis, alis maculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1001. 17. *Fn. Sv.* 1888.  
Tabanus fuscus, abdominis lateribus pedibusque flavis, alis maculis fuscis. *Geoff. Inf.* 2. 463. 8.

VIII. ANTLIATA. Rhingia. Asilus. 791

Musca bipennis pulcra, alis maculis amplis albis pictis.

Raj. Inf. 272.

Scop. carn. 1014.

Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 1.

Habitat in Europa.

149. T. oculis corporeque nigris, alis fuscis: macula alba. lugubris.  
Linn. Syst. Nat. II. 1001. 18. Fn. Sv. 1889.

Habitat in Europa.

175. RHINGIA. *Os* haustello atque proboscide.

*Haustellum* vagina univalvi os obtegente setisque quatuor.

*Palpi* filiformes.

*Antennae* compressae, setigerae.

I. Rhingia. Scop. carn. 972.

Conops rostrata antennis setariis, nigra, abdomine ovato, flavo, laevi, rostro conico. Linn. Syst. Nat. II. 1004. I.

Habitat in Europa.

rostrata.

176. ASILVS. *Os* haustello absque proboscide.

*Haustellum* rectum, bivave, basi gibbum.

*Antennae* filiformes.

I. A. hirsutus, niger, thorace abdominisque basi cinereis. Grossus.

Habitat in America. Mus. Banks.

Gigas in hoc genere. Caput nigrum, fronte lateribusque hirsutie longiore cinerea testis. Rostrum crassum, nigrum, compressum. Thorax niger, superne hirsutie densa, cinerea testus. Alae cinereae,

venis fuscis. Sub scutello puncta duo flava. Abdomen breve, ovatum, primo segmento nudo, nigro, secundo tertioque cinereis, hirtis, reliquis nigris. Pedes nigri, inermes.

**Maurus.** 2. A. subferrugineus, pectoris lateribus punctis thoracisque dorso lineis tribus nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 1006. 1.

Habitat in Africa.

Magnitudo A. crabroniformis.

**Algirus.** 3. A. corpore toto ferrugineo. *Linn. Syst. Nat.* II. 1006. 2.

Habitat in Africa.

Corpus totum ferrugineum, pilis pallidis hirtum.

**Barbarus.** 4. A. fronte, thorace pedibusque ferrugineis, alis flavis: apice margineque tenuiori nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 1007. 3.

Habitat in Africa.

**crabroniformis.** 5. A. abdomine tomentoso: antice segmentis tribus nigris, postice flavo, inflexo. *Linn. Syst. Nat.* II. 1007. 4. *Fn. Sv.* 1908.

Asilus ferrugineus, abdominalis articulis tribus prioribus atris, posterioribus quatuor flavis. *Geoff. Inf.* 2. 468. 3. tab. 17. fig. 3.

*Musca maxima crabroniformis.* *Raj. Inf.* 267.

*Erax crabroniformis.* *Scop. carn.* 974.

*Frisch. Inf.* 3. tab. 8.

*Reaum. Inf.* 4. tab. 8. fig. 3.

*Schaeff. Elem.* tab. 13.

— — *Icon. tab. 8. fig. 15.*

Habitat in Europa.

Thorax ferrugineus, antice lineis duabus approximatis, atris.

**gibbosus.** 6. A. hirsutus, niger, abdomine postice albo. *Linn. Syst. Nat.* II. 1007. 6. *Fn. Sv.* 1909.

*It. Scan.* 414.

*Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 11.*

Habitat in Europa.

Caput hirsutie densa, alba.

7. A. hirtus, niger, abdomine basi fasciis duabus niveis. *fasciatus.*  
 Habitat ad Sierra Leon Africæ. *Drury.*  
 Magnitudo A. crabroniformis. Caput nigrum, ferrugineo-pilosum. Thorax niger, lateribus scutelloque subferrugineis. Abdomen nigrum, basi fasciis duabus approximatis, e pilis niveis. Alae fuscescentes. Pedes nigri, pilis ferrugineis.
8. A. cinereus, abdominis ultinis tribus segmentis albis. *nestuans.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 1007. 5. Amoen. acad. 6. 413. 95.*  
 Habitat in America boreali.
9. A. hirsutus, ater, barba albida. *Linn. Syst. Nat. II. 1007. 7. Fn. Sv. 1910.* *ater.*  
 Asilus totus niger, subhirsutus, alis atris. *Geoff. Inf. 2. 469. 5.*  
*Erax prostratus. Scop. carn. 973.*  
 Habitat in Europa.
10. A. ater, hirsutus, abdomine supra fulvo. *flavus.*  
 Asilus flavus niger, hirsutus, thorace postice flavo, abdomine supra fulvo, plantis ferrugineis. *Linn. Syst. Nat. II. 1007. 8. Fn. Sv. 1911.*  
*Iter. Gotl. 327.*  
*Schaeff. Icon. tab. 51. fig. 2.*  
 Habitat in Europa.  
 In nostro specimine thorax unicolor.
11. A. niger, abdomine supra pubescente, rufo. *gilvus.*  
 Asilus gilvus abdomine pubescente, nigro: supra rufo.  
*Linn. Syst. Nat. II. 1007. 9. Fn. Sv. 1912.*  
 Asilus niger, abdominis segmentis tribus a tergo rufis. *Geoff. Inf. 2. 468. 4.*  
*Schaeff. Icon. tab. 78. fig. 6.*  
 Habitat in Europa.
12. A. halteribus abdominalisque incisuris flavis, femoribus nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 1008. 10. Fn. Sv. 1913.* *marginalis.*  
 Habitat in Europa boreali.
13. A. corpore cinereo, immaculato. *plumbeus.*  
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*  
 Minor A. forcipato, cinereus, immaculatus. Rostrum breve, atrum. Halteres apice flavi.

*forcipatus.* 14. A. hirtus, cinereus, ano pedibusque nigris.  
Asilus forcipatus hirtus, subcinereus, lateribus flavis.

*Linn. Syst. Nat. II. 1008. 13; Fn. Sv. 1914.*

Asilus cinereus, hirsutus. *Geoff. Inf. 2. 473. 16.*

Erax forcipatus. *Scop. carn. 975.*

*Frisch. Inf. 3. 35. tab. 17.*

Habitat in Europa, in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Vicitat rapina Phalaenaruin.

*Germanicus.* 15. A. hirtus, niger, tibiis rufis, alis fuscis, basi albidis. *Linn. Syst. Nat. II. 1008. 12.*

*Schaeff. Icon. tab. 68. fig. 9. 10.*

Habitat in Germania.

Statura praecedentis, at major. Corpus nigrum, immaculatum. Tibiae omnes rufae. Cauda forcipata.

*rufipes.* 16. A. fuscus, abdomine cinereo: fasciis apiceque nigris, tibiis rufis.

Habitat in America.

Statura A. forcipati, at duplo major. Haustellum porrectum, nigrum. Antennae setariae. Frons pubescens, cinerea. Thorax elevatus, pilosus, fuscus. Abdomen conicum, cinereum, fasciis quatuor apiceque nigris. Alae obscurae. Pedes nigri, tibiis rufis.

*maculatus.* 17. A. cinereus, abdominis segmentis macula quadrata atra, pedibus piceis: plantis nigris.

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Duplo major A. forcipato. Corpus cinereum. Haustellum apice nigrum. Abdomen elongatum, cylindricum, macula magna dorsali quadrata atra in singulo segmento (ultimo excepto). Pedes apice nigri.

*annulatus.* 18. A. cinereus, abdomine apice nigro, femoribus testaceis: annulo nigro.

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Statura et magnitudo A. forcipati. Caput cinereum, haustello nigro. Thorax elevatus, cinereus, linea dorsali

dorsali obscuriore. Abdomen conicum, ano atro. Alae aqueae, apice fuscescentes. Pedes testacei, femoribus annulo nigro.

19. A. hirtus, cinereus, thorace abdomineque nigro *stylatus*. maculatis, tibiis rufis, ano stylato.

Habitat in America.

A. forcipato paulo major. Thorax cinereus, linea lata dorsali maculisque utrinque duabus nigris. Abdomen supra nigrum, stylo exerto, atro, longitudine abdominis dimidii. Pedes atri, tibiis rufis. Alae albae.

20. A. cinereus, nudus, pedibus ferrugineis: plantis *tipuloides*. nigris.

*Afilus tipuloides* cinereus, nudus, thoracis lineis dorsalibus tribus nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 1008. 14. *Fn. Sv.* 1915.

*Afilus lividus*, thoracis lineis dorsalibus tribus nigris. *Geoff. Inf.* 2. 474. 17.

Habitat in Europa.

21. A. niger, thorace fugaci aureo maculato, abdomine utrinque maculis quinque albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1008. II. Teutonus.

Habitat in Germania.

22. A. ater, nudus, pedibus halteribusque ferrugineis. *Oelandicus*. *Linn. Syst. Nat.* II. 1008. 15. *Fn. Sv.* 1916.

*Afilus niger*, glaber, femoribus halteribusque ferrugineis, alis nigris. *Geoff. Inf.* 2. 270. 8.

Habitat in Europa.

Variat alis nigris et hyalinis.

23. A. thorace nigro, flavo maculato, abdomine atro: *conopoides*. fasciis rufis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Parvus. Caput flavum, antennis rostroque atris. Thorax niger, margine maculisque flavis fugaci-bus. Scutellum flavescens. Abdomen cylindricum, segmento secundo tertioque rufis, basi atris, quar-to et quinto atris, apice rufis, sexto rufo, imma-culato. Pedes rufi, plantis fuscis.

*culiciformis.* 24. A. ater, glaber, femoribus posticis longitudine abdominis.

Habitat in Anglia.

Parva, statura Conopis. Rostrum bivalve hujus generis. Antennae breves, seta porrecta. Abdomen subcylindricum, compressum, incurvum. Alae magnae, hyalinae, halteribus flavis. Femora postica porrecta, longitudine abdominis subtus subtilissime serrata.

177. CONOPS. *Os haustello atque proboscide.*

*Proboscis* porrecta, ultra basin geniculata.

*Haustellum* vagina univalvi abbreviata setaque unica.

*Antennae* clava acuminata.

*vesicularis.* 1. C. nigricans, occipite vesiculari, abdomine flavescente, basi nigro.

Conops vesicularis, antennis clavatis, mucronatis, subferrugineis, subconnexis, occipite vesiculari, abdomine glauco-flavescente. *Linn. Syst. Nat.* II. 1005. 4. *Fn. Sv.* 1903.

Afilus antennis capite longioribus, clavatis, acuminatis, nigro rufoque variis, glaber, segmentis abdominalibus omnibus margine flavis, alis fuscis, margine albo. *Geoff. Ins.* 2. 472. 13.

Habitat in Europae nemoribus.

Puncta duo antica thoracis scutellumque ferruginea.

*aculeata.* 2. C. atra, abdominis incisuris thoracisque punctis duobus anticis flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1005. 6. *Fn. Sv.* 1906.

Habitat in Europa.

Scutellum in nostro specimine nigrum, at punctum flavum utrinque sub scutello.

3. C. nigra, abdomine segmentis quatuor margine flavis, antennis pedibusque rufis. *macrocephala.*

*Conops macrocephala* antennis clavatis, mucronatis, luteis, abdomine subcylindrico, glabro: segmentis quatuor margine flavescens. *Linnae. Syst. Nat. 11. 1005. 5. Fn. Sv. 1902.*

*Asilus* antennis capite longioribus, clavatis, acuminatis, nigro rufoque variis, glaber, segmentis abdominalibus secundo et tertio margine flavis, alis fusco-nebulosus. *Geoff. Ins. 2. 471. 12.*

*Udm. diff. 100.*

Habitat in Europae nemoribus.

4. C. nigra, glabra, abdomine cylindrico: segmentis *flavipes.* tribus margine flavis. *Linnae. Syst. Nat. 11. 1005. 7.*

*Fn. Sv. 1904.*

Habitat in Europa.

Simillimus praecedenti. Pedes flavi, fasciis nigris.

## 178. STOMOXYS. *Os* haustello absque proboscide.

*Haustellum* vagina univalvi, convoluta, basi geniculata fetsique duabus vaginantibus.

*Antennae* setariae.

1. S. atra, thorace antice ferrugineo, piloso, alis atris, *Morio.* albo maculatis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

Statura omnino Muscae Morio, at rostrum hujus generis. Caput ferrugineum, rostro antennis stemmatibusque atris. Thorax ater, collari et postice sub alis pilis densis ferrugineis. Abdomen atrum, cyaneo-nitidum. Alae atrae. Punctum in medio, aliud ad marginem tenuiorem et tandem maculae tres, fasciam constituentes, albae. Apex albicat. Pedes atri.

*Siberita*. 2. *S. antennis plumatis, grisea, pilosa, abdominis lateribus pallido-diaphanis.*

Habitat Havniae.

*Caput griseum, orbita oculorum nivea. Thorax et scutellum pilosa, grisea, immaculata. Abdomen conicum, griseum, lateribus diaphanis. Pedes nigri, femoribus pallidis.*

*calcitrans*. 3. *S. antennis subplumatis, grisea, pedibus atris.*

*Stomoxys. Geoff. Inf. 2. 539. 1. tab. 18. fig. 2.*

*Conops calcitrans antennis subplumatis, cinerea, glabra, ovata. Linn. Syst. Nat. II. 1004. 2. Fn. Sv. 1900.*

*Empis calcitrans. Scop. carn. 1001.*

*Sulz. Inf. tab. 21. fig. 138.*

Habitat ad pedes boum, unde eorum continuus calcitratus; ingruente pluvia strenue pungit.

Simillima *M. domesticae*, at rostrum hujus generis.

*irritans*. 4. *S. cinerea, subpilosa, abdome nigro maculato.*

*Conops irritans antennis setariis, cinerea, subpilosa, ovata. Linn. Syst. Nat. II. 1004. 3. Fn. Sv. 1901.*

Habitat in Europa, pecorum dorso copiose infidens.

## 179. MYOPA. *Os haustello absque proboscide.*

*Haustellum basi medioque geniculatum, vagina bivalvi: valvulis inaequalibus.*

*Antennae clavatae, incurvae.*

*ferruginea*. 1. *M. ferruginea, abdome cylindrico, incurvo, fronte lutescente.*

*Conops ferruginea. Linn. Syst. Nat. II. 1005. 8. Fn. Sv. 1907.*

*Sicus ferrugineus. Scop. carn. 1004.*

*Asilus antennis capite brevioribus, clavatis, setosis, nigro rufoque varius, glaber, alis nigris, oris aculeo in medio incurvato. Geoff. Inf. 2. 473. 14.*

Habitat in Europa.

2. *M.*

2. M. abdomine cylindrico, incurvo, corpore atro. *atra.*  
 Habitat Havniae.  
 Praecedente minor. Antennae setariae, nigrae, fascia flavescente. Frons flavescentia, lateribus albis. Pedes nigri, femoribus posticis flavescentibus.
3. M. testacea, abdomine hamoso, albo - fasciato, *cincta.*  
 Habitat in India orientali. *Koenig.*  
 Statura M. ferruginea, sed minor. Antennae ferrugineae, clava acuminata. Frons vesicularis, alba, utrinque puncto parvo, nigro. Thorax obscure testaceus. Abdomen testaceum, cingulis tribus fere obsoletis albis. Pedes testacei, apice nigri. Tibiae argento parum nitentes.
4. M. ferruginea, abdomine hamoso - griseo, facie vesiculari, alba, alis nebulosis. *buccata.*  
*Conops buccata. Linn. Syst. Nat. II. 1006. 12. Fn. Sv. 1905.*  
*Sicus buccatus. Scop. carn. 1005.*  
 Habitat in Europa.

180. C U L E X. Os haustello absque proboscide.

*Vagina exserta, univalvis, flexilis, setis quinque.*

*Palpi duo triarticulati.*  
*Antennae filiformes.*

1. C. cinereus, abdomine annulis fuscis octo. *pipiens.*  
*Linn. Syst. Nat. II. 1002. I. Fn. Sv. 1890.*  
*Geoff. Inf. 2. 579. tab. 19. fig. 4.*  
*Linn. Fl. Lapp. 363. 364.*  
*Blank. Inf. tab. 16. fig. A - D.*  
*Reaum. Inf. 4. tab. 43. 44.*  
*Swammerd. bibl. tab. 31. fig. 4 - 8.*  
*— — — tab. 32. fig. 1 - 5.*  
*Sultz. Inf. tab. 121. fig. a.*  
*Roes. Inf. 3. tab. 15.*

*Ledermy.*

*Lederm. microgr.* tab. 79. 85.

*Fablot. micr.* 1. pp. 2. tab. 13. fig. A—E. H. I. L.  
Habitat in Europae aquosis, paludosis. In australioribus major, magis venenata.

Insectum pipiens continuo sifurro puncturaque molestissimum, aves in primis aquaticas sustentat.  
Mas antennis pectinatis vix pungit.

*bifurca-* 2. *C. fuscus*, thorace sublineato.  
*tus.* *Culex bifurcatus*, *fuscus*, *rostro bifurco*. *Linn. Syst.*

*Nat.* II. 1002. 3. *Fn. Sv.* 1891.

*Raj. Inf.* 74. 4.

*Reaum. Inf.* 4. tab. 40. fig. 1. 2.

*Sultz. Inf.* 21. fig. 136.

Habitat in Europae paludosis.

*lutescens.* 3. *C. flavus*, *alis hyalinis*: *costa flavescente*.  
Habitat Havniae.

*Statura praecedentis*, *totus flavus*. *Punctum fuscum* haustellum terminat.

*pulicaris.* 4. *C. fuscus*, *alis albis*: *maculis tribus obscuris*. *Linn. Syst. Nat.* II. 1003. 4. *Fn. Sv.* 1892.

*Culex alis maculis tribus obscuris*, *antennis apice bifurcis*. *Geoff. Inf.* 2. 579. 2.

*Linn. Fl. Lapp.* 365.

*Derb. physi oth.* I. 1. c. II. fig. 5. 6.

Habitat in Europa, America.

Insectum reptans, mordens, punctum fuscum relinquens.

*reptans.* 5. *C. niger*, *alis hyalinis*, *pedibus nigris*: *annulo albo*. *Linn. Syst. Nat.* II. 1003. 5. *Fn. Sv.* 1893.

Habitat in Europa boreali: tempore sereno vespertino reptatu molestissimus.

*Morio.* 6. *C. ater*, *alis albis*, *femoribus posticis clavatis*, *ferratis*.

Habitat in Anglia: capt. d. 13. Maj.

Major *C. pulicari*: *totus ater*, *nitidus*. *Antennae fasciculatae*. *Femora antica basi pallida*, *postica elongata*, *clavata*, *ferrata*.

7. C. ater, abdomine fusco, fronte alba. *Linn. Syst. equinus.*  
*Nat. II. 1003. 6. Fn. Sv. 1894.*

*Linn. Fl. Lapp. 359.*

Habitat in Europa boreali inter crines equorum curritans.

181. EMPIS. *Os proboscide atque haustello inflexis.*

*Haustellum vagina univalvi cornea setisque tribus.*

*Palpi breves, filiformes.*

*Antennae filiformes.*

1. E. nigra, alis subrotundis, fusco-ferrugineis. *Linn. borealis.*  
*Syst. Nat. II. 1003. 1. Fn. Sv. 1895.*

Habitat in Suecia: tempore vespertino sereno choreas aereas instituens.

Alae maxima. Abdomen cauda bifida.

2. E. nigra, pedibus posticis elongatis, pennatis. *pennipes.*  
*Empis pennipes antennis filatis, nigra, pedibus posticis longis: alterius sexus pennatis. Linn. Syst. Nat. II. 1003. 2. Fn. Sv. 1896.*

*Afilus pennipes. Scop. carn. 994.*  
*Sultz. Inf. tab. 21, fig. 137.*

Habitat in Europa frequens in geranii sylvatici et cardaminis pratensis floribus.

3. E. cinerea, alis oblongis: macula costali nigra, cauda appendiculata. *forcipata,*  
*Empis forcipata antennis filatis, cinerea, alis oblongis, cauda appendiculata. Linn. Syst. Nat. II. 1004.*

4. E. livida, thorace lineato, alis basi pedibusque ferrugineis. *livida,*  
*Empis livida antennis filatis, livida, thorace lineis tribus nigris. Linn. Syst. Nat. II. 1003. 3. Fn. Sv. 1897.*

Habitat in Europa.

*cinerea*. 5. E. *cinerea*, thorace immaculato, pedibus pallidis, aliis apice fuscescentibus.

Habitat in Sueciae floribus umbellatis.

Statura praecedentis, at triplo minor.

*flercorea*. 6. E. *testacea*, linea dorsali nigra, alis reticulatis. *Linn.*  
*Syst. Nat.* II. 1004. 5. *Fn. Sv.* 1899.  
Habitat in Europa: frequens in floribus umbellatis.

### 182. BOMBYLIUS. *Os* haustellum absque proboscide.

*Haustellum* longissimum, rectum, setaceum, bivalve.

*Antennae* filiformes.

*major*. 1. B. alis dimidiato nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 1009. 1.  
*Fn. Sv.* 1918.

*Afilus lanigerus*, alarum basi fusca. *Geoff. Inf.* 2. 466. 1.

*Bombylius major*. *Scopol. carn.* 1018.

*Mouff. Inf.* 64. fig. 5.

*Raj. Inf.* 273.

*Schaeff. Elem.* tab. 27. fig. 1.

*Hoeffnag. Inf.* tab. 8. fig. 1.

Habitat in Europa, mel florum volitando hauriens.

*medius*. 2. B. alis fusco punctatis, corpore flavescente, postice albo. *Linn. Syst. Nat.* II. 1009. 2. *Fn. Sv.* 1919.

*Musca bombyliformis* dense pilosa, nigra, abdomine obtuso ad latera rufa. *Raj. Inf.* 273.

*Scop. carn.* 1019.

*Petiv. Gazoph.* tab. 36. fig. 5.

*Schaeff. Icon.* tab. 79. fig. 5.

Habitat in Europae arvis primo vere.

*capensis*. 3. B. alis nigro maculatis, corpore cinerascente, postice nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 1009. 3. *Mus. L. U.* 423.

Habitat in Africa.

VIII. ANT LIATA. Hippobosca. 803

4. B. alis immaculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1009. 4. *Fn. minor.*  
*Sv.* 1920.

*Scop. carn.* 1020.

*Petiver. Goroph.* tab. 42. fig. 9.

*Reaum. Ins.* 4. tab. 8. fig. 11—13.

*Schaeff. Icon.* tab. 46. fig. 9.

Habitat in Europa.

Praecedentibus duplo minor.

5. B. alis basi seminigris, atra, abdomine albo macula-  
 to. *Linn. Syst. Nat.* II. 1010. 5. *ater.*

*Bombylius ater.* *Scop. carn.* 1021.

Habitat in Germania.

6. B. alis basi nigris, atra, thorace antice abdomineque  
 postice albis. *macula-*  
*tus.*

Habitat ad littora Malabarica. *Koenig.*

Magnitudo et statura B. atri. Frons albicans, rostro  
 et antennis nigris. Thorax ater, antice villis al-  
 bis densis tectus. Abdomen nigrum, postice to-  
 mento albo, sub quo aliquot puncta nivea splen-  
 dent. Pedes nigri.

183. HIPPOBOSCA. Os haustello absque  
 proboscide.

*Haustellum* breve,  
 rectum, cylin-  
 dricum, bivalve,  
 valvulis aequa-  
 libus.

*Antennae* brevissi-  
 mae.

1. H. alis obtusis, thorace albo-variegato, pedibus te-  
 tradactylis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1010. 1. *Fn. Sv.*  
*1921.* *equina.*

Hippobosca pedibus tetradactylis, alis cruciatis. *Geoff.*  
*Ins.* 2. 547. 1.

*Scop. carn.* 1022.

*Sultz.* *Inf.* tab. 21. fig. 141.

*Reaum.* *Inf.* 6. tab. 48.

*Schaeff.* *Icon.* tab. 11. fig. 5. 6.

Habitat in Europa, America: pecoribus molesta, pupipara.

*avicularia.* 2. H. alis obtusis, thorace unicolor. *Linn. Syst. Nat.* II. 1010. 2. *Fn. Sv.* 1922.

Habitat in avibus, hirundinibus.

Praecedenti affinis, at minor et thorax immaculatus.

*Hirundinis.* 3. H. alis subulatis, pedibus hexadactylis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1010. 3. *Fn. Sv.* 1923.

*Hippobosca* pedibus hexadactylis, alis divaricatis. *Geoff.* *Inf.* 2. 547. 2.

*Scop. carn.* 1023.

*Reaum.* *Inf.* 4. tab. 11. fig. 1—5.

*Schaeff.* *Elem.* tab. 70.

— *Icon.* tab. 53. fig. 1. 2.

Habitat in hirundinibus.

*ovina.* 4. H. alis nullis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1011. 4. *Fn. Sv.* *Iter. Wgorth.* 59.

*Frisch.* *Inf.* 5. tab. 18.

Habitat inter ovium lanam,

### 184. PEDICULUS. *Os* haustello absque proboscide.

*Haustellum* retractile,  
recurvum.

*Antennae* subulatae.

*humannus.* 1. P. abdomine lobato, cinereo. *Linn. Syst. Nat.* II. 1016. 1.  
*Fn. Sv.* 1939.

*Red. exp.* tab. 18.

— *oper.* tab. 25.

*Swamm. bibl.* tab. 1. fig. 3—6.

*Alb. Aran.* tab. 42.

*Bonann. micr.* fig. 55.

*Baker. micr.* tab. 13. fig. 4.

*Schaeff.* *Elem.* tab. 95.

*Sultz.*

*Sultz.* *Inf.* tab. 22. fig. 145.

*Lederm.* *microf.* 43. tab. 21.

Habitat in capite et vestimentis humanis. In pueris gulosis frequentissimus.

Varietas capitum durior, coloratior: vestimentorum laxior, magis cinerea.

2. P. abdomine postice emarginato, pedibus cheliformibus. *Pubis.*

*Pediculus pubis.* *Linn.* *Syst. Nat.* II. 1017. *Fn.* *Sv.* 1940.

*Raj.* *Inf.* 8.

*Red. exp.* tab. 19. fig. 1.

Hospitatur in hominis immundi pube, superciliis: pellitur oleo tabaci.

3. P. abdomine orbiculato: linea alba, scutello trilobo, *ricinoides.* rostro albo. *Linn.* *Syst. Nat.* II. 1017. 3.

Habitat in America: pedes obambulantium intrans, sanguinem hauriens, in iis ova deponens, ulcera cacoethica caussans. *Linn.*

4. P. capite porrecto, acuminato, ferrugineus, abdome ovato. *Cameli.*

*Pediculus camelii.* *Linn.* *Syst. Nat.* II. 1017. 6.

*Red. exp.* tab. 22.

— *oper.* tab. 25.

*Alb. avan.* 76. tab. 51.

Habitat in Africæ camelis.

5. P. cervi. *Linn.* *Syst. Nat.* II. 1017. 7. *Fn.* *Sv.* 1944. *Cervi.*

*Frisch.* *Inf.* 12. tab. 5.

*Red. exp.* tab. 5.

Habitat in cervo elapho, dama.

6. P. abdomine lineis transversis octo ferrugineis. *Linn.* *Bovis.*

*Syst. Nat.* II. 1017. 9. *Fn.* *Sv.* 1946.

Habitat in bobus; pellitur decocto ledi et sedi acris.

7. P. abdomine acuminato, plumbeo. *Linn.* *Syst. Nat.* *Vituli.*

II. 1018. 10. *Fn.* *Sv.* 1947.

Habitat in bobus.

*Equi*. 8. P. Equi caballi. *Linn. Syst. Nat.* II. 1018. II. *Fn. Sv.* 1948.

Habitat in equis.

*Afini*. 9. P. capite porrecto, obtuso, abdomine ovato, fuscostriato.

Pediculus Afini. *Linn. Syst. Nat.* II. 1018. 12.

*Alb. Aran.* 76. tab. 51.

*Red. exp.* tab. 22. fig. 1.

— *opera.* tab. 25.

Habitat in asinis.

Pedes sex cheliformes.

*Vulturis*. 10. P. oblongus, abdomine fuscus: lineis duabus flavescentibus.

Habitat in Indiae orientalis vulturibus. *Koenig.*

Magnus in hoc genere. Caput planum, postice utrinque acuminatum, flavescentes, marginibus nigris. Thorax flavescentes, marginibus lineaque dorsali nigris. Abdomen oblongum, nigrum, lineis duabus basi apiceque coeruleis flavis.

*Tinnunculi*. 11. P. capite sagittato: postice utrinque mucronato.

*h.* Pediculus tinnunculi. *Linn. Syst. Nat.* II. 1018. 13. *Fn. Sv.* 1949.

*Alb. aran.* tab. 43.

*Red. exper.* tab. 13.

*Frisch. Inf.* II. 24. tab. 24.

Habitat in falconibus, tinnunculis.

*Strigis*. 12. abdomine ovato albo: margine pedibusque rubris.

Pediculus haematopus. *Scop. carn.* 1035.

Habitat in strigibus, falconibus.

*Corvi*. 13. P. abdomine ovato: margine striato.

Pediculus corvi. *Linn. Syst. Nat.* II. 1018. 14. *Fn. Sv.* 1950.

*Red.*

*Red. exp. tab. 16. fig. 2.*

— *oper. tab. 24.*

Habitat in corvis.

14. P. abdomine ovato, pallido: maculis lateralibus ni- **Cornicis.**  
gris; pupilla alba.

Pediculus ocellatus. *Scop. carn. 1038.*

Habitat in corvo, cornice.

15. P. thorace angustato, abdomine ovato, pallido, dia- **infausti.**  
phano.

Pediculus infausti. *Linn. Syst. Nat. II. 1018. 15. Fn. Sv.  
1951.*

Habitat in corvo infausto.

16. P. capite obtuso, fusco: punctis quatuor nigris. **Picae.**

Pediculus picae. *Linn. Syst. Nat. II. 1018. 16.*

*Alb. Aran. 76. tab. 45.*

*Red. exp. tab. 5.*

Habitat in corvo pica.

17. P. abdomine oblongo, albido, fusco-fasciato. **Cuculi.**

Pediculus fasciatus. *Scop. carn. 1040.*

Habitat in cuculo canoro.

18. P. capite emarginato, abdomine ovato; margine **Cygni.**  
nigro-striato.

Pediculus cygni. *Linn. Syst. Nat. II. 1018. 17.*

*Alb. aran. 76. tab. 58.*

Habitat in cygno.

19. P. filiformis, pallidus: margine nigro punctato. **Anseris.**

Pediculus anatis anseris. *Linn. Syst. Nat. II. 1018. 18.*

*Fn. Sv. 1952.*

*Alb. aran. 76. tab. 58.*

*Red. exper. tab. 10.*

Habitat in anseribus feris mansuetisque. Pellitur  
pipere.

- Procellariæ.* 20. *P. elongatus*, filiformis, fuscus, pedibus pallidis.  
Habitat in Brasiliae procellariis. *Mus. Banks.*  
Corpus valde elongatum, filiforme.
- Diomedæ.* 21. *P. capite obtuso*, albus, abdominis lateribus nigris.  
Habitat in Brasiliae diomedaeis. *Mus. Banks.*  
Caput obtusum, rotundatum, integrum, albidum,  
margine antico nigricante. Abdomen sublobatum,  
album, lateribus late nigris. Pedes albi.
- Sternae.* 22. *P. capite trigono*, abdomine ovato, pallido: dorso  
longitudinaliter nigricante.  
*Pediculus sternae.* *Linn. Syst. Nat. II. 1019.* 21. *Fn. Sv. 1953.*  
*Red. exper. tab. 9. fig. 2.*  
Habitat in sternis, laris.
- Gruis.* 23. *P. abdomine subclavato*, pallido & spiraculis niveis.  
*Pediculus gruis.* *Linn. Syst. Nat. II. 1019.* 24. *Fn. Sv. 1954.*  
*Red. exp. tab. 3. oper. tab. 19.*  
*Frisch. Inf. 5. 15. tab. 4.*  
Habitat in gruibus.
- Ciconiae.* 24. *P. elongatus*, filiformis, abdomine albo: lateribus  
nigro punctatis.  
*Pediculus ciconiae.* *Linn. Syst. Nat. II. -1019.* 25.  
*Fn. Sv. 1955.*  
*Frisch. Inf. 8. 9. tab. 6.*  
Habitat in ciconiis.
- recurvirostræ.* 25. *P. oblongus*, fuscus, capite trigono, canaliculato.  
*Pediculus recurvirostræ.* *Linn. Syst. Nat. II. 1019.*  
28. *Fn. Sv. 1956.*  
Habitat in recurvirostris.

26. P. glaucus, thorace angustissimo, abdomine ovato: *Haemato-*  
*incisuris pallidis.* *pi.*  
*Pediculus haematopi.* *Linn. Syst. Nat.* II. 1019. 29. *Fn.*  
*Sv. 1957.*  
*Habitat in haematopo ostrealega.*
27. P. capite globoso, maximo, corpore pallido fusco-*Pavonis.*  
*que striato.* *Linn. Syst. Nat.* II. 1019. 30.  
*Alb. aran.* 76. tab. 47.  
*Frisch. Inf.* tab. 3. fig. 6.  
*Red. exper.* tab. 15.  
*— oper.* tab. 23.  
*Habitat in pavonibus.*
28. P. capite trigono, obtuso, abdomine ovato, griseo. *Meleagri-*  
*Pediculus meleagridis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 1020. 31. *dis.*  
*Fn. Sv. 1958.*  
*Frisch. Inf.* 8. tab. 4.  
*Habitat in gallopavonibus.*
29. P. thorace capiteque utrinque mucronatis. *Linn. Gallinae.*  
*Syst. Nat.* II. 1020. 32. *Fn. Sv. 1959.*  
*Habitat in gallinis domesticis. Pellitur pipere.*
30. P. abdominalis margine nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. *Caponis.*  
*1020. 33. Fn. Sv. 1960.*  
*Pulex capi.* *Red. exper.* tab. 16. fig. 1.  
*Pediculus galli.* *Frisch. Inf.* II. tab. 24.  
*Habitat in gallina domestica.*
31. P. corpore filiformi, ferrugineo, postice clavato. *Columbae.*  
*Pediculus columbae.* *Linn. Syst. Nat.* II. 1020. 36.  
*Alb. Aran.* tab. 43.  
*Habitat in columbis domesticis.*
32. P. corpore ovato, cauda quadriseta. *Linn. Syst. Nat. Pari.*  
*II. 1020. 37.*  
*Frisch. Inf.* 8. tab. 1. fig. 5.  
*Habitat in paris.*

- Hirundi-* 33. *P.* pallescens, abdomine albo, nigro maculato.  
*nis.* Pediculus hirundinis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1020. 38. *Fn.*  
*Sv.* 1963.  
 Habitat in hirundine apode.  
 Abdominis latera setosa.
- Apis.* 34. *P.* filiformis, ferrugineus.  
 Pediculus apis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1020. 40.  
*Frisch. Inf.* 8. tab. 16.  
 Habitat in apibus.
- Balaena-* 35. *P?* abdomine dilatato, muricato, rostro porrecto,  
*rums.* subulato.  
 Phalangium balaenarum. *Linn. Syst. Nat.* II. 1028. 6.  
 Pediculus ceti. *Mart. Spitz.* 85. tab. Q. fig. d.  
 Pediculus ceti. *Bast. subf.* v. 2. tab. 3. 146. tab. 12.  
 fig. 3.  
 Phalangium littorale. *Stroem. Sundm.* 209. tab. 1. fig. 17.  
 Pycnogonum. *Brünnich. Inf.* tab. 1. fig. 17.  
 Habitat in Oceano Norwegico.  
 Hujus generis videtur mihi haud rite notus.

185. ACARUS. *Os* haustello absque proboscide.  
*Vagina* bivalvis, cylindrica.  
*Palpi* duo longitudine haustelli.

*elephantis-* 1. *A.* orbicularis, depresso, lividus: 'macula baseos nus.' ovata, nigra. *Linn. Syst. Nat.* II. 1022. 1.  
 Habitat in India.

*Ricinus.* 2. *A.* globo-ovatus: 'macula baseos rotunda, antennis clavatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1023. 7. *Fn.* *Sv.* 1967.  
*Acarus* lividus, antennis brevibus, subclavatis, abdome antice macula ovata, fusca, nitente. *Geoff. Inf.* 2. 621. 1.

*Scop.*

*Scop. carn.* 1057.

*Aldr. Inf.* 550.

*Frisch. Inf.* 5. tab. 19.

*Ricinus caninus. Raj. Inf.* 10.

Habitat frequens in bobus, canibus.

3. A. obovatus, niger: margine albo. *Linn. Syst. Nat.* II. *Aegyptius.* 1022. 2. *Mus. Lud. Ulr.* 425.

Habitat in Aegypto.

4. A. orbiculatus, ater: lateribus undato - albis; puncto *undatus.* nigro.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*

Parvus. Caput obscure ferrugineum, rostro flavescente. Corpus supra atrum, macula magna in medio alba. Latera inaequaliter alba, puncto medio nigro. Pedes rufescentes.

5. A. ovatus, fuscus, margine incrassato.

*Lipsiensis.*

Habitat Lipsiae.

- Parvus, statura A. Aegyptii, at totus fuscus.

6. A. ovatus, planus, aureo maculatus, abdominis *Iguanae.* margine striato, subcrenato.

Adhaesit mordax sacco gulari Lacertae Iguanae, ex America in spiritu Vini missae.

Corpus obscure rufum, auro vase maculatum. Abdomen imprimis ad latera valde punctatum, margine striato, obsolete crenato.

7. A. ovatus, ferrugineus: lineis duabus undatis, albis. *lineatus.*

Habitat in America.

Magnitudo praecedentis. Corpus punctatum, obscure ferrugineum, lineis duabus longitudinalibus, valde undatis, albis. Puncta duo parva supra anum. Pedes geniculis albis.

*Indus.* 8. A. ovalis, ferrugineus: macula baseos ovata, atra.  
 Habitat in Indiis.  
 Affinis A. Ricino, at longior et ferrugineus.

*America-* 9. A. obovatus, rubicundus, scutello geniculisque pen-  
 nus. dum albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1022. 5.  
*Kalm. Act. Holm.* 1754.  
 Habitat in Americae bobus.

*crassipes.* 10. A. pedibus secundi paris crassissimis. *Linn. Syst. Nat.*  
 II. 1023. 8. *Fn. Sv.* 1969.  
 Habitat in Europae terra; gregarius, agilis, in hor-  
 tis terra praegnante frequens.

*Vesperti-  
 lionis.* 11. A. thorace angulato, cruciato, pedibus unguicula-  
 tis, corpore longioribus. *Linn. Syst. Nat.* II.  
 1023. 9.  
*Pediculus vespertilionis.* *Linn. Fn. Sv.* 1941.  
*Scop. carn.* 1058.  
*Frisch. Inf.* 7. tab. 7.  
 Habitat in vespertilione murino.  
 In piano incedere haud valet.

*passerinus.* 12. A. femoribus tertiiis crassissimis. *Linn. Syst. Nat.* II.  
 1023. 10. *Fn. Sv.* 1970.  
*Acarus vespertilionis fuscus,* ovatus, pedibus pallidis.  
*Geoff. Inf.* 2. 627. 14.  
*Pediculus vespertilionis.* *Baker. micr.* tab. 15.  
*de Geer Act. Holm.* 1740. 341. tab. 1. fig. 2.  
*Red. viv.* tab. 2. fig. 4.  
 Habitat in passeribus variis.

*motato-  
 riis.* 13. A. flavus, pedibus primis longissimis motatoriis.  
*Linn. Syst. Nat.* II. 1023. 11. *Fn. Sv.* 1971.  
 Habitat in fungis, agilis, pedibus anticis vibrans.

14. A. ruber, pedibus primis longissimis, cursoriis, ab- *Aphidio-*  
domine postice bicorni. *Linn. Syst. Nat.* II. 1023. 12. des.  
*Fn. Sv.* 1972.

*Acarus petrarum ruber*, pedibus anticis longitudine corporis. *Geoff. Inf.* 2. 625. 10.

Habitat in ligno putrescente.

15. A. rubicundo-hyalinus, abdomine utrinque macula *telarius*.  
fuscata. *Linn. Syst. Nat.* II. 1023. 14. *Fn. Sv.* 1974.

*Acarus fuscus autumnalis*. *Geoff. Inf.* 2. 626. 11.

Habitat in Europae plantis inclusis, tela ducens filis parallelis, quibus plantas hybernaculorum suffocat.  
In tiliae foliis autumno frequens.

16. A. pedibus quatuor posticis longissimis, femoribus capiteque ferrugineis, abdomine setoso. *Linn. Syst. Nat.* II. 1024. 15. *Fn. Sv.* 1947. *Siro.*

Farinae

*Blank. Inf.* tab. 14. fig. A. B.

*Lederm. micr.* 68. tab. 33. fig. 2.

*Bonann. micr.* fig. 112.

*Leuwenh. epist.* 77. t. 370. f. 9. 10.

*Rivin. prur.* 18. fig. D—E.

*E. N. C. dec.* 2. *ann.* 10. *app.* 34.

Scabiei

*Schenk. obs.* 676.

*Bonann. micr.* 113.

*Act. angl.* 283.

*Rivin. prur.* 18. fig. A. B.

*Act. Lips.* 1682. p. 319.

*Geoff. Inf.* 2. 622. 2.

Habitat in caseo, farina diutius asservatis, cutem hominis rugas secutus penetrat, vesiculam et titillationem excitat. Caussam, nec symptoma morbi esse, evincunt observata analogia cum Gallis, contagium, cura.

17. A. abdomine ovato, obtuso: postice setis quatuor longitudine corporis declinatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1024. 16. *Lactis.*

Habitat in cremore lactis diu conservato et in lactis vasis immundis.

Corpus hyalinum, rostro pedibusque testaceis.

- Dysenteriae.* 18. A. pedibus setis duabus, abdominis ovati postica setis quatuor longitudine corporis horizontalibus. *Linn. Syst. Nat. II. 1024. 17. Amoen. acad. 5. 97.*  
Habitat in doliis cerevisiae ligneis impuris.
- exulcetans.* 19. A. pedibus longissimis, setaceis: anticis duobus brevibus. *Linn. Syst. Nat. II. 1024. 28. Fn. Sv. 1976.*  
Habitat in scabie ferina.
- geniculatus.* 20. A. niger, femorum geniculis subglobosis. *Linn. Syst. Nat. II. 1025. 19. Fn. Sv. 1977.*  
Habitat in arborum ramis emortuis.
- Baccatum.* 21. A. abdomine distento, rubro: lateribus obscurioribus. *Linn. Syst. Nat. II. 1025. 23. Fn. Sv. 1980.*  
*Schaff. Icon. tab. 27. fig. 1.*  
*Scop. ent. carn. 1074.*  
Habitat in baccis ribis rubri, grossulariae aliisque.  
Thorax utrinque puncto fusco.
- Muscorum.* 22. A. abdomine rufo, pedibus posticis longissimis, filiformibus. *Linn. Syst. Nat. II. 1025. 24. Fn. Sv. 1981.*  
*Geoff. Inf. 2. 624. 6.*  
Habitat in muscis.
- Gymnopterorum.* 23. A. abdomine rubro: utrinque punctis binis coccineis. *Linn. Syst. Nat. II. 1026. 26. Fn. Sv. 1982.*  
*Reaum. Inf. 5. tab. 38. fig. 1—3.*  
Habitat in apibus, vespis, asilis.  
Puncta duo remota, coccinea utrinque in abdome.
- Coleopterorum.* 24. A. ovatus, rufus, ano albicante. *Linn. Syst. Nat. II. 1026. 27. Fn. Sv. 1973.*  
Acarus insectorum rufus, ano albicante. *Geoff. Inf. 2. 623. 4.*  
*Blanc. Inf. tab. 14. fig. H.*  
*Frisch. Inf. 4. tab. 10.*

*Reaum.*

*Reaum. Inf.* 6. tab. 4. fig. 13. 14.

*Roef. Inf.* 4. 20. tab. 1. fig. 10—15.

*Schaeff. Icon.* tab. 27. fig. 2.

Habitat in scarabaeis, in stercorario saepe frequentissimus.

25. A. ovatus, postice acuminatus, pedibus apice fasciculatis. *Phaeton. tis.*

Habitat in Phaetonte erubescente Oceani australis.

Fig. piæt. *Mus. Banks.*

Corpus minutum, ovatum, postice acutum, fuscum.

Pedes octo subulati terminantur fasciculo parvo pilorum albantium; antici quatuor retrorsum flexi.

26. A. fuscus, linea dorsali bicolore. *Linn. Syst. Nat. rupicollis.*  
II. 1026. 28. *Fn. Sv.* 1984.

Habitat sub Europæ lapidibus frequens.

Corpus fuscum, linea dorsali interdum alba, interdum rubra, plerumque vero antice albida, poste rie rubra.

27. A. ruber, antennis bifidis, rostro longioribus. *longicornis.*  
*Linn. Syst. Nat.* II. 1026. 29. *Fn. Sv.* 1985.

Chelifer totus ruber, antennis extremo bifitis. *Geoff.*

*Inf.* 2. 618. 2. tab. 20. fig. 5.

Habitat in Europæ rupibus.

28. A. fusco - rufus, pedibus sanguineis. *Linn. Syst. Nat. littoralis.*  
II. 1026. 30. *Fn. Sv.* 1986.

Habitat ad littora in petris.

29. A. fusco - rufescens, abdomine subgloboso, glabro, Fungo-  
immaculato. *Linn. Syst. Nat.* II. 1026. 31. *Fn. Sv.* rum.  
1987.

Habitat gregarius in fungis.

*Tremel-* 30. A. subglobosus, atro-coerulescens. *Linn. Syst. Nat.*  
*lae.* II. 1026. 32. *Fn. Sv. 1991.*

Habitat in tremella juniperina.

*salicinus.* 31. A. ruber: linea dorsali duplice fusca; antice bifur-  
 ca. *Linn. Syst. Nat. II. 1027. 34. Fn. Sv. 1989.*

Habitat in salicibus; agilissimus.

*croceus.* 32. A. fulvus, thoracis lateribus puncto rufo. *Linn.*  
*Syst. Nat. II. 1027. 35. Fn. Sv. 1990.*

Habitat in salicis rosa monstrosa.

QUANTUM EST, QUOD  
 NESCIMUS.



## APPENDIX.

7-8. LVCANVS viridi-aeneus, maxillis tridentatis. *virescens.*

Habitat in America. *Drury.*

Triplō major L. caraboidi. Maxillae exsertae, capite breviores, tridentatae. Caput virescens, canaliculatum. Thorax et elytra viridia, obscure nitida, laevia, glabra. Corpus subtus obscurius.

17-18. SCARABAEVS scutellatus, thorace bicorni, *coryphatus.*  
corpore ferrugineo.

Habitat in Cap. B. Spei. *Lee.*

Magnitudo et statura S. vernalis. Caput planum, ferrugineum, clypeo apice bicorni; cornubus brevibus, recurvis, apice nigris; postice mucro elevatus, brevissimus, niger. Thorax ferrugineus, ante reetus, cornubus duobus approximatis brevibus, apice nigris; postice gibber obtusum. Elytra substriata, ferruginea. Pedes ferruginei.

39-40. SCARABAEVS scutellatus, thorace inermi, *Hylax.*  
capitis cornu emarginato, tibiis posticis brevissimis,  
apice spinosis.

Habitat in Africa. *Lee.*

Medius. Caput parvum, nigrum, cornu brevi, erecto, comppresso, late emarginato. Thorax elevatus, rotundatus, postice canaliculatus. Elytra laevia, rufa. Corpus subtus hirtum, obscure rufum. Femora incrassata, rufa. Tibiae posticae brevissimae, apice spinosae. Ungues magni, arcuati.

110-111. SCARABAEVS exscutellatus, muticus, cly-*miliaris.*  
peo sexdentato, thorace elytrisque nigris: maculis  
elevatis atris, nitidis.

Habitat in India. *Msf. D. Hunter.*

Parvus. Statura S. Koenigii. Capitis clypeus rotundatus, sexdentatus. Thorax rotundatus, obscurus, maculis majoribus elevatis, atris, nitidulis. Punctum parvum utrinque impressum. Elytra obscura, maculis parvis, elevatis, atris, nitidis.

- horridus.* 2-3. TROX ater, thorace elytrisque spinosis.  
 Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*  
 Statura T. sabulosi. Totus ater. Thorax marginatus, ciliatus spinisque plurimis erectis, brevibus. Elytra striis quinque e spinis erectis, brevibus. Margo elytrorum ciliatus.
- proboscidea.* 31-32. MELOLONTHA clypeo porrecto, subreflexo, nigra, hirta, elytris testaceis: margine nigro.  
 Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*  
 Clypeus valde porrectus, integer. Caput et thorax nigra, villo cinereo hirta. Elytra testacea, margine exteriori nigro.
- crassipes.* 31-32. MELOLONTHA atra, albo maculata, pedibus posticis elongatis, crassissimiis.  
 Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*  
 Caput nigrum, clypeo subemarginato. Thorax rotundatus, ater, margine punctisque aliquot minutissimis, albis. Elytra atra, albo maculata. Abdomen album. Pedes atri, postici elongati, incrassati, digito incurvo intus dentato, ungue arcuato.
- rupicola.* 27-28. MELOLONTHA villosa, virescens, capite nigro.  
 Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Bankianum.*  
 Parva. Caput nigrum. Thorax et elytra pubescentia, virescentia. Corpus subtus cinereum.
- Ursus.* 39-40. MELOLONTHA atra, hirsutissima, pedibus quatuor anticis testaceis.  
 Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*  
 Statura praecedentium, at duplo minor. Clypeus porrectus, apice emarginatus. Corpus atrum, pilis longioribus nigris hirsutissimum. Pedes quatuor antici testacei, femoribus nigris.
- signata.* 14-15. CETONIA thorace nigro: margine albo, elytris testaceis: sutura margineque nigris.  
 Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Bankianum.*  
 Magnitudo C. capensis. Caput atrum, clypeo subemarginato. Thorax glaber, laevis, niger, sutura dorsa-

dorsali basi ferruginea margineque laterali albo. Scutellum atrum. Elytra testacea, sutura, margine exteriori, lineola baseos calloque apicis nigris. Margo posticus parum albicat. Subtus hirta, sterno brevi, obtuso.

- 16-17. CETONIA fusco-viridis, thorace elytrisque *sinuata*.  
margine punctisque duobus flavis.

Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Caput nigrum, antennis piceis clypeoque emarginato.

Thorax obscure viridis, margine late flavo, puncto medio nigro. Puncta duo flava in medio dorsi. Scutellum triangulum utrinque puncto baseos flavo. Elytra obscure viridia, margine sinuato, flavo, puncto apicis nigro. Puncta duo dorsalia flava in singulo elytro. Subtus atra, sterno rotundato.

- 26-27. CETONIA viridi-aenea, hirta, elytris testaceis: vitta media nigra suturaque aenea. *vittata*.

Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Media. Caput viridi-aeneum, cinereo-villosum, clypeo emarginato. Thorax aeneus, villosus. Scutellum breve, aeneum. Elytra glabra, laevia, testacea, vitta media margineque exteriori nigris. Sutura aenea. Subtus aenea, hirta.

- 34-35. CETONIA nigra, elytris viridibus, nitidis, thoracis margine anoque rufis. *haemorrhoidalis*.

Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. D. Hunter.*

Parva. Caput nigrum, clypeo emarginato. Thorax glaber, rufus, linea dorsali lata, nigra. Scutellum parvum, triangulare, nigrum. Elytra substriata, viridia, nitida. Anus rufus prominet. Corpus nigrum. Pedes nigri.

- 37-38. CETONIA glabra, atra, elytris macula lateralii *lugubris*.  
anoque albis.

Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Clypeus rotundatus, integer. Caput et thorax atra, immaculata. Elytra punctata, atra, macula magna lateralii alba. Anus prominet macula alba. Abdomen utrinque macula lineaque punctorum albis.

*viridulus.* 5-6. TRICHIUS viridis, pubescens, ano albo, bimaculato.

Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*

Corpus totum viride, nitens pilisque cinereis pubescens. Puncta alba minutissima in elytris. Ultimum abdominis segmentum prominet maculis duabus majoribus albis. Abdomen subtus utrinque lineola transversa alba.

*lineatus.* 8. TRICHIUS pubescens, thorace fulvo, nigro lineato, elytris testaceis: sutura fulva.

Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Statura T. Deltae. Caput nigrum. Antennae piceae, fasciculo medio pilorum nigrorum. Thorax fulvus, lineis tribus postice fere coeuntibus nigris. Scutellum triangulum nigrum, puncto medio fulvo. Elytra testacea, sutura late fulva. Anus fulvus. Pedes subtestacei.

*bimacula-* 50-51. CHRYSOMELA oblonga, atra, elytris testaceis: macula atra.

Habitat in America. *Drury.*

Statura et magnitudo C. fasciatae. Antennae moniliformes, extrorsum crassiores, nigrae. Caput et thorax atra, immaculata. Scutellum atrum. Elytra laevia, testacea, macula magna media atra. Abdomen atrum, ano testaceo. Pedes atri.

*fasciata.* 50-51. CHRYSOMELA oblonga, atra, elytris fasciis tribus flavis.

Habitat in America. *Drury.*

Magna. Antennae moniliformes, nigrae, basi pallidae. Caput atrum, margine postico pallido. Thorax laevis, ater, immaculatus. Elytra laevia, atra, fascia baseos altera in medio et tertia ante apicem latis, flavis. Abdomen atrum, ano flavo. Pedes atri, femoribus apice tibiisque flavis.

*inficollis.* 51-53. CHRYSOMELA oblonga, viridi-aenea, thorace pedibusque rufis.

Habitat in Anglia. *Lee.*

Statura C. betulae. Antennae rufae, apice fuscae. Caput viride-acneum, ore rufo. Thorax rufus, immaculatus. Elytra viridia, nitida, immaculata. Corpus viride. Pedes rufi.

28-29. CRYPTOCEPHALVS ater, elytris macula bipustulata: apicis rufa.

Habitat in Helvetia. *Lee.*

Nimis affinis C. 4 pustulato: totus ater. Elytra striata, macula magna apicis rufa, margine tamen ipso tenuissime nigro.

-- 1. ALTICA thorace ferrugineo, elytris atris: maculis quatuor flavis. 8 *guttata*.

Habitat in America. *Drury.*

Conjungit Alticas Chrysomelis. Magna. Antennae filiformes, fuscae. Caput atrum, punctis tribus flavis. Thorax ferrugineus, nitidus, immaculatus. Elytra laevia, nitida, atra, maculis quatuor flavis: duabus baseos minoribus. Pedes atri, femoribus posticis incrassatis.

-- 1. ALTICA oblonga, flava, thorace nigro punctato, *thoracia*. elytris violaceis.

Habitat in America. *Lee.*

Magnitudo C. betulae. Caput flavum, oculis nigris. Thorax flavus, punctis sex nigris. Elytra glabra, laevia, violacea, margine in primis baseos flavo. Pedes nigri, femoribus flavis, posticis incrassatis, obscurioribus.

-- 1. ALTICA ferruginea, thorace elytrorumque maculis duabus albis. *biguttata*.

Habitat in America. *Drury.*

Magnitudo A. octoguttatae. Antennae filiformes, nigrae. Caput ferrugineum, fronte alba. Thorax albus, nitidus, immaculatus. Elytra ferruginosa, maculis duabus magnis albis. Pedes ferruginei, femoribus posticis incrassatis.

*marginalis.* -- 1. **ALTICA** *flavescens*, *elytris viridibus: margine pallido.*

Habitat in America. *Drury.*

Maxima in hoc genere. Antennae filiformes, nigrae. Caput et thorax flavescens, interdum maculata, interdum immaculata. Elytra viridia, nitida, margine exteriori pallido. Corpus flavescens, tibiis fuscis, Femora postica incrassata.

*testaceus.* 1-2. **EROTYLVS** *testaceus*, *antennis tibiisque nigris.*

Habitat in America. *Drury.*

Statura E. gigantei, at paulo minor. Corpus gibbum, totum testaceum, oculis, antennis tibiisque nigris.

*longimanus.* 2-3. **CVRCVLIO** *longirostris*, *nigricans, elytris ferrugineis, rostro emarginato, pedibus anticis longioribus.*

Habitat ad Cap. B. Sp. *Lee.*

Magnitudo fere 6 palmarum. Rostrum cylindricum, apice emarginatum. Antennae clava truncata. Thorax in altero sexu niger, in altero rufus, macula nigra, glaber, laevis. Elytra abbreviata, striata, ferruginea. Pedes antici elongati. Tibiae incurvae.

*obesus.* 135-136. **CVRCVLIO** *brevirostris*, *ater, thorace spinoso, inaequali, elytris rubris: punctis nigris, confertis.*

Habitat ad Cap. B. Sp.

Statura omnino C. globosi, at paulo major et elytra rufa, punctis nigris numerosissimis, confertis.

*ruber.* 141-142. **CVRCVLIO** *brevirostris, cinereus, thorace scabro, elytris spinis elevatis, sanguineis.*

Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Affinitas summa sequentis, at thorax magis canaliculatus et elytrorum spinae sanguineae, nitidae.

141-142. CVRCVLIO brevirostris, thorace scabro, *globifer*.  
elytris spinosis, postice acuminatis.

Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Magnitudo C. capensis. Rostrum apice incrassatum, laeve. Thorax rotundatus, punctis plurimis elevatis, obtusis, atris. Elytra atra, spinis plurimiis elevatis, atris. Elytra postice acuminata. Pedes nigri.

12-13. CLERVS niger, fronte cinerascente, elytris maculis tribus albis. *sexguttatus.*

Habitat in America. *Drymy.*

Statura omnino C. formicarii. Frons cinerascens. Thorax rotundatus, caput excipiens, niger, fascia postica obsoleta, cinerea. Elytra laevia, nigra, punctis tribus albis, anteriore baseos minore.

12-13. LAMIA thorace spinoso, nigra, elytris maculis quatuor flavis, subocellaribus, antennis longis. *Ocularior.*

Habitat ad Cap. B. Spei.

Magna. Antennae laeves, corpore duplo longiores. Caput nigrum, immaculatum. Thorax rotundatus, spinosus, niger, antice posticeque strigis duabus flavis, tenuissimis, impressis. Elytra substriata, maculis quatuor flavis, annulo albo cinctis, quarum prima baseos rotundata, major, secunda ad marginem exteriorem orbiculata, tercua in medio transversalis, quarta versus apicem orbiculata.

1-2. STENOCORVS thorace subspinoso, cyaneus, *cyanenus*. elytris basi flavis.

Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*

Statura S. meridiani. Antennae breves, cyaneae, articulis clavatis. Thorax antice angustatus, postice subspinosis. Elytra antice flava, postice cyanea. Corpus cyaneum.

*clavicornis.* 6-7. SAPERDA thorace rotundato, viridis, elytris maculis tribus flavis.

Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Statura et magnitudo S. cylindricae. Caput viride, antennis fuscis, corpore longioribus, extrorsum crassioribus. Thorax rotundatus, viridis, immaculatus. Elytra laevia, viridia, maculis tribus flavis, quarum prima totam basin occupat, reliquae duae marginales.

*longipes.* 6-7. SAPERDA thorace subgloboso, violacea, antennis longioribus, femoribus clavatis.

Habitat in Cap. B. Spei.

Statura S. oculatae. Antennae corpore duplo longiores, apice cinereae. Corpus violaceum, immaculatum. Pedes elongati, femoribus clavatis.

*pectinata.* 5. 6. LAMPYRIS atra, clypei lateribus basi exteriore elytrorum abdominisque apice albis, antennis pectinatis.

Cantharis pectinata atra, clypei lateribus basique exteriori elytrorum luteis, antennis pectinatis. *Linn. Syst. Nat. II. 649. 17?*

Habitat in America.

Certe hujus generis. Antennae pectinatae, longitudine fere corporis.

*flabellicornis.* 8-1. ELATER fuscus, antennarum fasciculo flabelli-formi. *Linn. Syst. Nat. II. 651. 1.*

Habitat in India.

Corpus maximum, totum fuscum. Fasciculus antennarum e lamellis octo magnis, nigris.

*fuscus.* 2-3. ELATER thorace ocellis binis atris, corpore nigro, immaculato.

Habitat in America. *Dury.*

Affinis E. oculato, at duplo fere minor. Ocelli thoracis absque iride et corpus immaculatum.

1-2. **BVPRESTIS** elytris acuminatis, viridi-aeneis, *bicolor*.  
macula flava, pectore abdomineque flavis.

Habitat in America. *Drury*.

Magna. Antennae ferratae, nigrae. Caput viride-aeneum, oculis testaceis. Thorax viridi-aeneus, utrinque macula baseos flava. Elytra viridi-aenea, macula media flava, apice ad suturam acuminata. Pectus, gula et abdomen flava. Pedes aenei.

3-4. **CICINDELA** nigra, elytris macula media flava. *triflisis*.

Habitat - - - - *Drury*.

Magna, tota obscure nigra, elytris in medio macula flava, lunata.

13-14. **CICINDELA** nitida, ore, antennis pedibusque *virginica*.  
testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 657. 5.

Habitat in Carolina.

6-7. **DYTISCVS** elytris flavis: fasciis duabus puncto-  
que apicis nigris. *fasciatus*.

Habitat in Indiae aquis. *Mus. D. Hunter*.

Statura ovata D. sulcati. Caput flavum, immaculatum.  
Thorax flavus, linea dorsali nigra, quae basi apice-  
que extenditur. Puncta duo parva dorsalia rubra.  
Elytra laevia, flava, sutura nigra. Fascia nigra,  
lata in medio, altera angustior, dentata versus  
apicem et punctum distinctum in apice. Corpus  
nigrum.

8-9. **DYTISCVS** ater, laevis, elytris vitta marginali  
flava: macula baseos atra. *vittatus*.

Habitat in Indiae aquis. *Mus. D. Hunter*.

Medius. Caput atrum, ore flavescente. Thorax ater,  
margini flavo. Elytra laevia, atra, vitta marginali  
flava, apicem tamen haud attingens.

36-37. **CARABVS** rufus, elytris nigris: punctis sex  
rubris. *sexpunctulatus*.

Habitat in India orientali. *Edler*.

Magnitudo C. crepitantis. Caput et thorax rufa. Antennae rufae. Elytra striata, nigra, punctis tribus rufis, quorum ultimum in apice lunatum. Abdomen rufum, margine nigro. Pedes rufi.

*nitidula*. 1-2. *LYTTA* viridi-aenea, elytris testaceis.

Habitat in Anglia.

Minor *L. vesicatoria*. Antennae moniliformes, nigrae. Caput, thorax et elytra viridi-aenea, nitida. Elytra testacea, immaculata.

*immaculata*. 2-3. *MYLABRIS* atra, elytris testaceis, immaculatis.

Habitat in India.

Statura *M. Cichorii*: tota atra, elytris solis testaceis, immaculatis.

*monstrofa*. 1-2. *ACHETA* elytris alisque caudato-convolutis.

*Gryllus monstrosus*. *Drury. Ins. 2. tab. 42. fig. 1.*

Habitat in India.

*graminifolia*. 5-6. *LOCVSTA* thorace tetragono, elytris filiformibus, fuscis, ala brevioribus, capite acuminato.

Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Parva. Antennae corpore breviores, setaceae. Caput et thorax fusca, inter antennas acuminata. Elytra et alae filiformia, fusca, immaculata. Abdomen virescens, ense recto, viridi, apice fusco.

*spinulosa*. 26. *LOCVSTA* thorace spinis muricato cinctoque, corpore aptero.

*Gryllus spinulosus*. *Linn. Syst. Nat. 11.703. 59. Amoen. acad. 6. 398. 35.*

*Edw. Av. 2. 161. tab. 285. fig. 3. 4. 5.*

Habitat in Indijs.

Antennae longitudine corporis. Abdomen nigrum, maculis testaceis. Ensis recurvus.

6-7. **GRYLLVS** viridis, elytris maculis duabus albis, abdomine vesiculoso: utrinque maculis tribus albis. *inanis.*

Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

**Magnus.** Antennae breves, virides. Caput scabrum, viride, utrinque sub antennis denticulis duobus brevissimis. Thorax viridis, margine tenuissime albo: antice denticuli duo breves nigri, altero in ipso margine, altero ante medium; in medio ruga maxima; postice porrectus, inflatus, carinatus. Elytra viridia, maculis duabus albis. Abdomen maximum, inflatum, inane, viride, utrinque maculis tribus albis.

6-7. **GRYLLVS** viridis, albo maculatus, scutello carinato, utrinque dentato, abdomine vesiculoso, variegato. *papillosus.*

Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Praecedenti triplo minor. Caput viride, orbita oculorum alba. Stigmata tria rubra inter oculos et supra haec denticuli duo brevissimi. Antennae breves, virides. Thorax scaber, viridis, albo maculatus; antice dente brevi, elevato, obtuso; in medio ruga magna impressa; postice productus, carinatus. Elytra cinerea, viridi-reticulata. Abdomen vesiculosum, inflatum, virescens, maculis albis variegatum.

6-7. **GRYLLVS** viridis, calloso punctatus, abdomine *variolosus.* vesiculoso, albo-variegato.

*Gryllus variolosus* calloso punctatus, thoracis carina subtridentata, antennis brevibus, fronte verrucosa. *Linn. Syst. Nat.* II. 693. 4. *Mus. Lud. Ulr.* 120.

Habitat in Cap. B. Spei.

Antennae breves, rufescentes. Elytra reticulata, punctis albis.

*Pedator.* 44-45. ICHNEVMON luteus, abdominis segmentis utrinque puncto atro, antennis aculeoque nigris.

Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*

Magnitudo I. compunctoris. Caput flavum, antennis verticeque nigris. Thorax flavus, punctis tribus anticis duobusque sub scutello nigris. Abdomen flavum, segmentis utrinque puncto nigro, sexto et ultimo immaculatis. Alae hyalinae. Aculeus ater. Pedes flavi, geniculis posticis puncto nigro.

*villosa.* 40-41. APIS atra, thorace abdomineque cinereo-hirtis, ventre lana atra.

Habitat in India orientali. *D. Edler.*

Statura A. centuncularis. Caput atrum, antennis cylindricis, brevibus. Thorax niger, basi lana cinerea tectus. Abdomen atrum, nitidum, primo segmento cinereo-hirto. Alae fuscae.

*smaragdi.* 1-2. FORMICA viridis, thorace flavo sublineato.  
na.

Habitat in India. *Edler.*

Magna, viridis. Antennae apice subrufescentes. Thorax crassus, elevatus, viridis, flavo sublineatus. Squama petiolaris, brevis, emarginata. Abdomen rotundatum, glabrum, viride. Alae magnae, albae, nervis ferrugineis.

*Gnoma.* 152-53. PAPILIO D. C. alis integris, rotundatis, albis: anticis puncto atro; subtus omnibus puncto argenteo.

Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*

Statura et magnitudo P. Monuste. Alae anticae albae, puncto medio atro maculisque marginalibus fuscis: subtus glaucae, puncto medio argenteo annulo ferrugineo cincto. Posticae supra albae, iminaculatae, subtus glaucae, puncto medio argenteo, annulo ferrugineo.

178-79. PAPILIO D. F. alis integris, subfuscis: subtus striga punctorum alborum. *Griphus.*

Habitat in India. *Mus. Dr. Hunter.*

Statura P. Casiae. Corpus nigrum, palpis ferrugineis, apice nigris. Alae anticae ferrugineo-fuscae, fascia apicis flava: subtus fuscae, apice flavae strigatae e punctis septem albis. Posticae supra obscure fuscae, immaculatae, subtus fuscae, striga e punctis 7 majoribus albis.

202-3. PAPILIO D. F. alis integerrimis, fuscis: anticis utrinque ocello; pupilla gemina, posticis supra ocellis quatuor, subtus sex. *Baldus.*

Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*

Parvus. Alae omnes fuscae, anticis ocello magno, atro, iride ferruginea pupillaque dupli argentea. Subtus fusco cinereoque undatae, ocello vivaciore. Posticae supra fuscae, ocellis quatuor atris, iride ferruginea pupillaque simplici argentea; lateralibus minutissimis; subtus fusco cinereoque undatae, ocellis sex per paria approximatis.

321-22. PAPILIO P. R. alis tricaudatis, coerulescentibus, apice nigris: subtus aureis; atomis nigris. *Aetaeon.*

Habitat - - - - *Drury.*

Magnitudo P. Cupidinis. Alae anticae supra cyaneae, apice maculaque media nigris. Posticae cyaneae, margine nigro. Caudae tres, interiore brevissima, nigrae margine aureo: subtus viridi-aureae, atomis nigris.

327-28. PAPILIO P. R. alis caudatis, fulvis, nigro *Harpax.* maculatis: subtus cinereis, punctis aureis.

Habitat in America.

Medius. Antennae clavatae, nigrae, punctis lateribus fasciaque ante clavam latoire albis. Clava apice ferruginea. Alae supra fulvae, maculis sparsis

sparsis nigris, subtus obscure cinereae, maculis plurimis gibbis aureis. Cauda ferruginea, apice alba.

- afilifor-* 2-3. **SPHINX** alis erofo - dentatis: anticis cinereis: fascia obscuriore; puncto nigro, posticis rubris: margine nigro.

Habitat in India. *Edler.*

Magnitudo Afili. Antennae cinereae, apice albae. Corpus cinereum, thorace antice virescente. Alae anticae erofo - dentatae, cinereae, fascia media lata, obscuriore puncto nigro. Posticae rubrae, margine nigro. Subtus omnes virescentes, fascia alba.

- g macu-* 3-4. **SESSIA** alis atris: maculis duabus anticarum flavis, *lata.* posticarum albis.

Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*

Parva. Antennae nigrae. Caput nigrum, orbita oculorum albida. Thorax niger, punctis duobus anticis habentisque albidis. Abdomen barbatum, nigrum, maculis duabus dorsalibus ante anum albidis. Pedes nigri, tibiis quatuor anticis ferrugineis. Alae anticae atrae, maculis duabus magnis flavis; posticae atrae, maculis duabus magnis albis.

- Androma-* 10-11. **ZYGAENA** atra, alis hyalinis: margine fascia- *cha.* que nigris, ano sanguineo.

Habitat in America. *Drury.*

Magnitudo Z. Cassandrae. Antennae nigrae, subpeccinatae, medio crassiores. Caput atrum, palpis apice subtus albis. Thorax hirtus, ater, antice punctis duobus albis. Abdomen hirtum, atrum, ano sanguineo. Alae omnes hyalinae, margine omni et in anticis fascia media atris.

In altero sexu fascia ad basin abdominis sanguinea.

16-17. ZYGAENA alis oblongis, atris: posticis sub- *flabellicornis*.  
caudatis, basi virescentibus. *niss.*

Habitat in America meridionali. *Dr. Hunter.*

Magna. Antennae pectinatae, cyaneae. Caput sanguineum, ore margineque postico fuscis. Abdomen rufum, lineis quatuor macularum nigrarum. Alae oblongae, nigrae, anticae immaculatae, posticae subcaudatae, basi virescentes.

55-56. BOMBYX alis deflexis, exustis: plaga albida, *dictaea*.  
inferioribus albis.

Phalaena dictaea. *Linn. Syst. Nat. II. 826. 60.*

Habitat in Europae populo nigra, betula alba.

55-56. BOMBYX alis deflexis: anticis nebulosis, dorso *dromedaria*-  
dentatis: litura baseos anique flavescentibus. *ria.*

Phalaena dromedarius. *Linn. Syst. Nat. II. 827. 62.*

*Ammiral. Inf. tab. 14.*

Habitat in alno, betula, corylo.

9-10. PHALAENA pectinicornis, alis angulato-caudatis, *strigaria*.  
albis: strigis undatis, fuscis, supra duabus,  
subtus unica.

Habitat in India orientali. *Dom. Edler.*

Magnitudo et statura P. sambucariae. Antennae pectinatae, breves. Alae supra omnes albae, strigis duabus undatis, obsoletis, fuscis; posteriore latiore. Cauda brevis, obtusa, maculis duabus atris. Subtus omnes albae, striga futuratore nigra.

7-8. TETTIGONIA atra, thorace, elytris aliquo *maculata*.  
flavo maculatis.

Cicada maculata. *Drury. Inf. 2. tab. 37. fig. 1.*

Habitat in China.

*byalina.* 24-25. CICADA fusca: elytris fascia abbreviata marginque postico hyalinis.

Habitat in India orientali. *Edler.*

Parva. Corpus totum ferrugineo-fuscum. Elytra lata, ferrugineo-fusca, in medio fascia lata abbreviata, hyalina. Pone fasciam puncta duo parva hyalina et margo posticus in medio interruptus, hyalinus. Alae fuscae, immaculatae.

*sexguttata-* 7-8. REDUVIUS thorace subspinoso, niger, clytri maculis tribus albis.

Habitat in India orientali. *Edler.*

Magnitudo R. annulati. Caput nigrum. Thorax subspinosis, niger, postice maculis quatuor ferrugineis; lateralibus minoribus. Elytra nigra, maculis tribus albis. Abdomen nigrum, lateribus testaceo maculatis. Pedes nigri, annulatis testaceis.



BL  
C  
I  
ZS  
-19  
e 67  
w  
R

