

5675

165-79

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE

DE PARIS

FONDÉE EN 1788

RECONNUE COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE

SEPTIÈME SÉRIE — TOME SEPTIÈME

1882 — 1883

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

Rue des Grands-Augustins, 7

1883

165793

165742

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE

DE PARIS

FONDÉE EN 1788

RECONNUE COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE

SEPTIÈME SÉRIE — TOME SEPTIÈME

N° 4

1882 — 1883

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

Rue des Grands-Augustins, 7

—
1883

Le Bulletin paraît par livraisons trimestrielles

TABLE DES MATIÈRES

I

L. Petit.	—	<i>Sur deux espèces d'Ankiroderma...</i>	462
A.-T. de Rochebrune.	—	<i>Diagnoses d'oiseaux nouveaux propres à la Sénégambie.....</i>	465
—	—	<i>Diagnoses d'Arthropodes nouveaux propres à la Sénégambie.....</i>	467
—	—	<i>Diagnoses de Mollusques nouveaux propres à la Sénégambie.....</i>	477
—	—	<i>Sur une nouvelle espèce du genre Mylabris.....</i>	482

ciliis sordide albis; regio parotica nigra; collo postico et dorso ardosiaceis, albo variis; flexo nigro; fascia alæ elongata cinereo alba; remigibus pallide castaneis albo marginatis; tectricibus nigris, lateralibus extus albidis; uropygio, collo, pectore, abdomine et crisso albis; hypocondris cinnamomeo tinctis; rostro pedibusque plumbeo nigris.

Longueur totale.....	450 ^{mm}
— de l'aile.....	87
— de la queue.....	53
— du bec.....	44
— du tarse.....	24
— du doigt médian.....	44

Fœmina ubi mas ardosiaceus, cinereo fusca; regio parotica ferruginea; tœnia per collum, pectus, hypocondriisque lata, castanea longitudinaliter disposita.

Assez commun : — Kita, Bakel, Deny Dack, Sebicoutane, Douzar, forêts de Maina et de Bandoube.

Cette espèce tient le milieu entre les *Nilaus Brubru*, Lath. et *Nilaus affinis*, B. du Boc.

Diagnoses d'Arthropodes nouveaux propres à la Sénégambie,
par le D^r A. T. DE ROCHEBRUNE,
Aide-naturaliste au Muséum.

I

CRUSTACÉS

1. MICROPISA ERYOPHORA, Rochbr.

M. — *Testa ovata, lanata; dente preorbitali, crassa, obtusa; marginibus lateralibus mollissime spinosis; rostro bifido; pedes ambulatorii lanati.*

Long. 0,018; Lat. 0,015.

Carapace plus longue que large, couverte ainsi que les pattes de longs poils grisâtres enchevêtrés; les parties

inférieures garnies de poils courts, rigides; front bifide, à cornes courtes et obtuses; bord externe de l'orbite armé d'une dent obtuse, dirigée en dehors; bords latéraux garnis d'épines assez longues, molles; trois tubercules saillants disposés sur une ligne transversale au niveau de la région gastrique; quatre autres épines au centre de la carapace; régions branchiales et hépatiques supportant des épines assez fortes, terminées par un étranglement surmonté d'un bouton de consistance molle; pinces faibles, à doigts écartés, se touchant seulement à leur extrémité; pattes ambulatoires assez fortes, laineuses.

Couleur générale brun rougeâtre, visibles à travers le feutrage des poils; pointe des épines rose, pattes rosées.

Hab. — Embouchure de la Casamence et de la Gambie.

2. NEPTUNUS AMNICOLA, Rochbr.

N. — *Testa lata, subconvexa, granulosissima, lateraliter novem dentata, dente anteriore trapezoidea, ceteribus crassis, abrupte acutis, ultima longissima leviter incurvata; fronte sex dentato, dentibus obtusis, medianibus brevioribus, externis latis, quadratis; brachiis margine anteriore trispinosis, spinis acutis incurvatis margine posteriore; carinatis, denticulatis, antice unispinosis; ulna tricarinata, intus et extus obtuse dentata; manibus angulato quadratis, carinis rugosissimis, desuper unispinosis, lateraliter bituberculatis, inferne dente crassissima armatis.*

Lat. 0,444 ; *long.* 0,076.

Hab. — Sénégal, Falémé, Bakoy, Bafing et tous les Marigots tributaires.

Carapace beaucoup plus large que haute, faiblement bombée, fortement granuleuse, à granulations plus grosses et plus espacées dans la région antérieure; lignes épigastriques et hypogastriques bien marquées, les épibranchiales peu indiquées; bords latéro-antérieurs plus courts que les latéro-postérieurs; première dent de forme trapézoïdale, obtuse au sommet; les suivantes épaisses, brus-

quement terminées en pointe courte et aiguë; la neuvième très longue, étroite, acérée, faiblement incurvée en dehors; front découpé en six dents, les deux médianes petites et obtuses, les moyennes plus longues, subaiguës, les externes très larges courtes arrondies au sommet; apophyse épistomienne grosse, atteignant le niveau du front; pattes antérieures très robustes, celles de droite plus volumineuses que celles de gauche; bras armé à la partie antérieure de trois dents en forme d'épine de Rossier, la première faible, les deux suivantes très fortes; partie postérieure du bras aplatie, carénée, à carène obtusement denticulée et terminée en haut par une épine courte; avant-bras tricaréné en dessous et en côté, chaque carène terminée par une dent obtuse; mains quadrangulaires, à angles fortement granuleux, armées en dessous d'une épine courte, en côté de deux tubercules et à l'articulation de l'avant-bras, d'une dent triangulaire robuste et aiguë.

Teinte générale d'un beau bleu d'outre-mer nuancé de rose, deux taches arrondies, rouges, de chaque côté et à la base de la carapace.

3. NEPTUNUS EDWARDSI, Rochbr.

N. — *Testa subhexagona, lata, depressa, antice vix granulata, lateraliter novem dentata; dente anteriore recta, crassa, ceteribus brevibus, obtusis, circulariter minute crenulatis; ultima acuta, subincurvata; fronte sex dentato, dentibus obtusis, medianibus parvissimis; brachiis margine anteriore trispinosis, antice bispinosis; ulna longitudinaliter semicarinata, extus spinosa, intus tuberculosa; manibus subcompressis, angulatis, subrugosis, superne bispinosis.*

Lat. 0,026; long. 0,014.

Hab. — Rivières Gambie et Casamence.

Carapace plus large que haute, aplatie, subhexagonale, très faiblement granuleuse à la partie antérieure; lignes épigastriques et hypogastriques à peine indiquées, lignes épibranchiales fortement accusées; bords latéro-anté-

rieurs plus longs que les latéro-postérieurs ; première dent droite épaisse, les suivantes très obtuses à bords libres très finement crénelés ; la neuvième aiguë un peu incurvée en haut, relativement courte ; front découpé en six dents, les deux médianes très petites, les mitoyennes et les externes égales et obtuses ; apophyse épistomienne courte, ne dépassant pas le front ; pattes antérieures faibles ; bras armé sur le bord antérieur de trois épines, et de deux autres épines plus faibles à l'extrémité articulaire ; avant-bras portant sur la face externe une crête saillante limitée en dehors par une épine courte et accompagnée en dedans d'un tubercule obtus ; mains anguleuses, à crêtes longitudinales assez saillantes faiblement rugueuses, et armées de deux petites épines en dessus de l'articulation du pouce.

Teinte générale d'un roux canelle marbré de bleuâtre et de blanc.

4. NEPTUNUS PALLIDUS, Rochbr.

N. — *Testa lata, complanata, lævi, lateraliter novem dentata; dente anteriore obtusa, ceteribus brevissimis, apice rotundatis; ultima acutissima, recta tenui; fronte sex dentato, dentibus rotundatis, medianibus minutis, externis brevibus subacutis; brachiis compressis, margine anteriore bispinosis, postice ad medium unispinosis; ulna lævi, extus unituberculata; manibus lævibus, angulatis, antice unituberculatis.*

Lat. 0,015; long. 0,009.

Hab. — Lac de N'Guer, Marigots de M'Bao, Thionk, Leybar.

Carapace plus large que haute, presque aplatie, lisse ; lignes épigastriques et hypogastriques à peine visibles ; bords latéro-antérieurs beaucoup plus courts que les latéro-postérieurs ; première dent obtuse, les autres très courtes, arrondies au sommet ; la neuvième droite aiguë très étroite ; front découpé en six dents, les deux médianes très faibles, les mitoyennes arrondies, les externes courtes sub-aiguës ; apophyse épistomienne dépassant

légèrement le front ; bras comprimés, armés à la partie antérieure de deux épines faibles, à la partie postérieure et au milieu d'une épine courte ; avant-bras lisse, portant un petit tubercule en dehors ; mains faibles, lisses, anguleuses, ayant une petite dent à l'articulation de l'avant-bras.

Couleur générale d'un gris rosé.

Un fait des plus remarquables et qui, croyons-nous, n'a jamais été constaté, est l'habitat exclusivement fluvatile des espèces Africaines du genre *Neptunus*.

Tous, en effet, et nous l'avons observé bien souvent, vivent uniquement dans les cours d'eau de la Sénégambie et ne se rencontrent *jamais* sur les côtes.

Le *Neptunus amnicola*, notamment, commun dans le fleuve Sénégal, disparaît aussitôt que les eaux deviennent salées, pour réapparaître quand les eaux sont complètement douces.

Les Nègres qui le pêchent pour le manger et le vendre aux Européens, connaissent parfaitement cette particularité.

C'est un des Crustacés les plus recherchés du fleuve comme espèce alimentaire et dont l'excellence de la chaire est exceptionnelle.

Les Ouolofs le désignent sous le nom de *Koti*.

5. GELASIMUS CIMATODUS, Rochbr.

G. — *Testa quadrata, intense impressa, regulariter tuberculata, antice lata, postice contracta; chelopoda inæquales; sinistra maxima, complanata; brachium subquadratum, tuberculis conicis vestitum, inferne unidentatum; manus lata, extus plana, tuberculata, intus tricarinata, carinis tuberculiferis; margine superiore denticulato; dactylis longissimis, sub lævibus.*

Long. 0,027; Lat. 0,034.

Carapace plus large que haute, quadrangulaire, couverte de tubercules obtus et de grosseur diverse ; bord antérieur le plus large, ondulé et terminé de chaque côté

par une épine mousse; régions branchiales aplaties, un peu arquées; lobes sous orbitaires, saillants, denticulés sur leur bord libre tranchant, à denticulations de forme polygonale; front étroit; pattes antérieures de force inégale; celle de gauche très grande; bras subtriangulaire, lisse en dedans, bicaréné en dessous, à carènes denticulées; tuberculeux en dessus, à tubercules ovoïdes; une forte touffe de poils roussâtres au-dessus et au niveau de l'articulation de l'avant-bras; celui-ci quadrilatère tuberculeux, à tubercules arrondis et obtus, armé dans sa moitié inférieure d'une épine également obtuse; main très aplatie en dehors, tuberculeuse, à bord supérieur denté; portant en dessous trois carènes se joignant à angle droit également tuberculeuses; doigts très longs, étroits et aplatés, lisses, finement tuberculeux seulement à l'extrémité et sur le bord supérieur. Cuisses des pattes postérieures aplaties, rugueuses, obtusement denticulées en dessus.

Couleur générale rouge violacé à tubercules oranges; pattes antérieures jaunâtres teintées de rose; pattes ambulatoires d'un violet rouge.

Hab. — Côte des Maringouins, pointe des Chameaux; les deux Mamelles.

6. PLAGUSIA DELAUNAYI, Rochbr.

P. — *Testa subquadrata, depressa, lateraliter quadrispinosa, lævi, pilis minutissimis, antice versis induta; fronte sublato, apice quadrispinoso; pedibus anticis, parvulis; manibus leviter squamulosis; pedibus lateralibus margine anteriore, spinis acutis armatis et pilis rigidis nigris, passim obtectis.*

Lat. 0,011; *long* 0,016.

Hab. — Côtes de la Gambie; Ile aux Chiens, Albreda.

Carapace presque quadrilatère, très aplatie, lisse, c'est-à-dire sans aucune trace de tubercules, plus haute que large, armée de chaque côté et dans la moitié supérieure de quatre épines aiguës, couvertes de très petits poils

noirs à pointe dirigée en avant ; front médiocrement large, terminé par quatre épines ; pattes antérieures très faibles ; mains garnies surtout en dessous de petites squamules extrêmement minces et leur donnant un aspect farineux ; pattes des quatre dernières paires armées dans toute leur longueur et au bord supérieur de deux rangées d'épines aiguës ; celles de la seconde rangée tuberculiformes, ornées longitudinalement de trois bandes de poils noirs et courts ; des poils plus longs et rigides garnissent l'angle d'insertion des épines ainsi que le bord postérieur des pattes.

Teinte générale d'un brun rougeâtre ; au centre de la carapace quelques taches tranchant par leur couleur d'un rosé clair ; pattes rosées à épines oranges, fasciées de brun par suite de la présence des bandes de poils ; toutes les régions inférieures d'un gris de perle brillant.

Cette espèce diffère de toutes celles avec lesquelles nous l'avons comparée, et notamment de la *Plagusia squamosa*, dont elle s'éloigne surtout par l'absence de tubercules, *ciliato squamosis*.

7. PALINUSTUS PHOBERUS, Rochbr.

P. — *Testa brevis, spinosissima, spinis acutis, antice longitudinaliter, postice circulariter dispositis; cornubus frontilibus, longis acutis, lateraliter intense complanatis, subrectis; antennæ ad basin spinosæ; abdomen læve, segmentis externe spinosis et minute crenulatis.*

Long. 0,054.

Hab. — Embouchure de la Gambie et de la Casamence.

Carapace courte, très épineuse, à épines élargies à leur base, aiguës au sommet, inclinées en avant, disposées sur huit lignes longitudinales à la partie antérieure ; deux rangées d'épines plus faibles, disposées circulairement, forment une couronne en arrière et au-dessus de l'articulation du premier segment de l'abdomen ; cornes rostrales cultriformes, longues, aiguës, presque droites, très

minces et tranchantes; antennes externes très longues, les deux premiers anneaux épineux, à épines aiguës et droites; antennes internes à flagelleum mince multi-articulé; abdomen lisse, chaque anneau séparé par une ligne de poils très courts, et portant au-dessous de la corne externe de petites denticulations obtuses.

Carapace et les deux premiers articles des antennes externes vert-olivâtre marbré d'orange; abdomen vert clair, maculé d'orange au centre de chaque anneau, ceux-ci séparés par une bande blanche, pattes et antennes d'un jaune sale.

8. ALPHEUS PONTEDERIE, Rochbr.

A. — Testa teguliformis, antice compressa, postice subblata, lævi, sat elongata; rostrum breve acutissimum, carinatum; antennæ extus basi inermes; pedes antici inæquales; manus sinistra crassissima, elongata, compressa, subcontorta; pedes 2 gracillimi bidactyli; 3-4 crassiores, monodactyli.

Long. 0,048 .

Carapace lisse, en forme de tuile, assez large en arrière, étroite et comprimée en avant, où elle se termine en un rostre court, très aigu, caréné en dessus; bord antérieur des voûtes orbitaires large et arrondi; pattes antérieures très inégales; bras mince, lisse, sans épine; main gauche très volumineuse, aplatie, fortement sillonnée sur les faces planes, terminée en dessus et en dessous par un fort tubercule anguleux; pinces comprimées portant à la base un tubercule arrondi et au milieu une dent obtuse, et bordée de soies grisâtres; pouce lenticulaire très grand à soies grises éparses; main droite petite, de forme pyramidale, à pinces étroites allongées couvertes de petits tubercules et de longs poils; pouce triangulaire contourné en dehors; 2^e paire de pattes très longues, grêles, terminées par deux doigts extrêmement petits et courts; les autres pattes plus fortes.

Couleur générale, bleu pâle; une large bande jaune pâle sur le milieu de la carapace, une tache orangée sur

le rostre; abdomen marbré de bleu et de rose; pattes bleuâtre très-pâle, extrémité des mains d'un violet foncé.

Hab. — Marigots de Leybar, Thiank, Dakar-Bango, à l'époque où le fleuve est salé, se tient dans les touffes de *Pontederia natans*, qui surnagent à la surface des marigots.

II

ORTHOPTÈRES

9. FORFICULA MABILLI, Rochbr.

F. — *Antennis articulis 1-2 fulvis, ceteribus castaneis; forcipe castaneo rubro, incurvato, margine interno rugoso, inferne bidentato; apertura ovoidea augustata; abdomine lato, castaneo nigro nitente, articulis minutissime puncticulatis; corpore castaneo; capite et thorace fulvis, elytris nitide cinnamomeis, disco elongato castaneo pedibus, pallide fulvescentibus.* ♂.

Long. 0,015.

Hab. — Kita, Bakel, Dagana, Podor sur les tiges des arbustes.

10. PHYLLODROMIA CASSIPHILA, Rochbr.

P. — *Elongata intense castanea, nitente; vitta utrinque thoracis, in elytris usque medium producta et ibidem sensim evanescente aurea; elytris castaneo rubescentibus, lineis aureis externe minutissime picturatis; pedibus pallide fulvis.* ♂.

Long. 0,009.

Hab. — Kita, Bakel, tout le Gangaran où l'espèce vit sur les feuilles des *Cassia* et des *Indigofera*.

11. OXYHALOA KITENSIS, Rochbr.

O. — *Elleptice elongata; capite magno; thorace antice*

subrecto, postice obtuso, castaneo rufo, pallide marginato; elytris acuminatis, leviter luteo testaceis, abdomine longioribus; pedibus rufo testaceis; abdomine luteo. ♂.

Long. 0,012.

Hab. — Kita, Saldé, Podor, Dagana; se retrouve à M'Bao, Hann, Joalles, Rufisque, etc.

12. GYNA COLINI, Rochbr.

G. — *Ovata, pallide rufa; thorace rhomboidali, sordide luteo, disco castaneo, rugosiusculo irregulariter notato; elytris cinereo castaneis, luteo marginatis, et undique maculis concoloribus picturatis; pedibus nitide rufis.*

Long. 0,024.

Hab. — Kita, Bakel, Podor, Dagana, Saldé, Leybar, Thionk, Sorres.

13. OXYOPHTHALMA SAVATIERI, Rochbr.

O. — *Capite late fisso, oculis obtuse spinosis, pronoto antice subgibboso, in parte coxali vix dilatato, antice attenuato; elytris elongatis, fusco viridibus, campo marginali elongato; alis hyalino fuscis, macula cœrulea, elliptica, marginali, inferne ornatis; vena discoidali indivisa, pedibus gracilibus, viridescentibus!*

Long. 0,028.

Hab. — Diouk, Sorres, Dakar-Bango, etc.

14. MIOGRYLLUS ARGYROPTERUS, Rochbr.

M. — *Nigerrimus, subtus ferrugineus; pronoto quadrato, minutissime punctulato; elytris abbreviatis testaceo pallide castaneis; alis longissime caudatis, albido argentatis nitescentibus; tibiis posticis sex spinosis, apice annulo ferrugineo cinctis. ♂.*

Long. 0,008.

Hab. — Bois et taillis, Kita, Bakel, Dagana, Podor ; bords de la Falémé et du Bafing.

III

HÉMIPTÈRES.

15. CIXIUS PARINARI, Rochbr.

C. — *Fronte, thorace, clypeoque, cinereo fulvescentibus, maculis rotundatis parvulis albido luteis, undique punctatis; elytris pallide cinereo fulvis, nigro minutissime venatis, antice fascia lata, lutea, punctis aurantiacis, rubrisque notata, marginatis; alis sordide hyalinis, basi usque medium intense roseis; abdomine dorso sanguineo.* ♂.

Hab. — Kita, Bakel, Fallémé, Bakoy. Sur les branches du *Parinarium excelsum*.

16. LACCOCORIS NYMPHEARUM, Rochbr.

L. — *Ovato elongatum, fuliginosum, thorace et disco scutelli, minutissime rugatis, angulis posticis thoracis obtusiusculis, hemylitris fusco testaceis.* ♂.

Fœmina a maris differt, coloribus cinereo fulvescentibus. ♀.

Long. 0,014.

Hab. — Marigots de Kita, Bakel, marais du Gangaran.

Long. 0,011; lat. 0,054.

Diagnoses de Mollusques nouveaux propres à la Sénégambie,

par le D^r A.-T. DE ROCHEBRUNE,

Aide-naturaliste au Muséum.

1. PLEUROTOMA SALSIPOTENS, Rochbr.

P. — *Testa fusiformi, abbreviata, apice errosa, epidermide olivacea induta; anfractibus 4, subrotundatis, circulariter*

costulatis, et nodis variciformibus longitudinaliter instructis, sutura filosa sejunctis; anfractu ultimo, costulato, costulis moniliformibus; apertura sub ovata; sinu laterali rotundato; labro paulum incrassato; columella marginata; canali brevi sub recurvo.

Long. 0,019; lat. 0,009.

Hab. — Embouchure de la Gambie, dans les flaques d'eau saumâtre.

2. RINGICULA BOURGUIGNATI Rochbr.

R. — *Testa crassa, subglobosa, lævi, pallide viridula; spira acuta, anfractibus 5 convexis, sutura profunda disjunctis; apertura elongata, margine columellari calloso, tridentato, medianiter angustato; labro crasso, biplicato.*

Long. 0,005; lat. 0,002 1/2.

Hab. — Embouchure de la Casamence, par 150 mètres de profondeur.

3. APORRHAIIS FRANCHETI, Rochbr.

A. — *Testa fusiformi, crassissima, cinereo, cœrulea; spira abbreviata, anfractibus 6, disjunctis, lævibus, medio rotundatis, ad basin oblique nodosis; nodis obliquis; anfractu ultimo tricarinato, carinis duabus anterioribus, nodiferis, nodis rotundatis, intervallis lyratis; in alam bidactylam expenso; dactylo anteriore triangulari, recto acuminato; inferiore brevi, obtuso; apertura obliqua, augustissima; columella sub incrassata, alba; labro externo tumido.*

Long. 0,021; lat. 0,017.

Hab. — Embouchure de la Casamence, par 150 mètres de profondeur.

4. XENOPHORA CAVELIERI, Rochbr.

X. — *Testa conica, elevata, pallide fusca, apice lævi, acuminata; anfractibus 8, intense disjunctis; oblique corrugatis;*

ultimi anfractu peripheria tenui, late crenulata; suturis omnibus, valvis concharum agglutinanti; pagina inferiore sub plana lamellis augustissimis, concentricis, radiantibus et lineis granuliferis, vestita; granis quadratis complanatis; apertura late elliptica, umbilico lato, aperto, profundo; labro tenui, cultrato operculum ellipticum, pellucidum, corneum, circulariter undato sulcatum.

Alt. 0,029; lat. 0,051.

Hab. — Embouchuré de la Casamence, par 150 mètres de profondeur.

Nous dédions cette espèce remarquable, bien distincte des trois *Xenophora* Africains jusqu'ici connus, à M. le capitaine de vaisseau Cavelier de Cuverville, commandant l'Aviso l'*Alceste* auquel nous devons de connaître plusieurs mollusques intéressants.

5. CALYPTRÆA LACTUCACEA, Rochbr.

C. — *Testa suborbiculari, depresso conica, vertice obtusa, subcentrali; læte albido lutea; lamellis latis, contortis, longitudinaliter striatis, imbricatis, vestita; intus nitescente; lamella elongata, subrecta.*

Alt. 0,011; lat. 0,024.

Hab. — Cap Roxo.

6. DISPOTÆA MAMMULA, Rochbr.

D. — *Testa conica, subelevata, crassa, apice recto obtuso; extus albido cærulea, radiatim costata, costis interruptis, incurvatis minutissime foliaceis, imbricatis, interstitiis lævibus; intus cæruleo violacea; lamella interna cucullata.*

Alt. 0,007; lat. 0,017.

Hab. — Joalles, Rufisque.

7. TROCHITA PHLYCTIPHERA, Rochbr.

T. — *Testa subconica, tenui, apice recto, prominulo, extus*

calcareo alba, concentrice striata et mamillis umbilicatis, passim vestita; intus nitida, lamella laterali, unguiformi, striatolata.

Alt. 0,006; lat. 0,018.

Hab. — Rufisque; Iles de la Madeleine; Dakar.

8. GALERUS ARIETINUS, Rochbr.

G. — *Testa orbiculari, convexa, spirali, carnea, apice luteola; spira subelevata, anfractibus 5, disjunctis, contortis, tenuiter concentrice striatolatis; intus concava, nitida; lamella ampla, recta, vix reflexa.*

Alt. 0,006; lat. 0,009.

Hab. — Embouchure de la Gambie.

9. CRYPTA TEGULICIA Rochbr.

C. — *Testa subovata, crassiuscula, irregulari, oblique curvata, extus albida, concentrice striata, et squamis minutis teguliformibus, subdistantibus ornata; intus nitide castaneo violacea; lamella opalina, ad medio et ad latus subemarginata.*

Long. 0,019; lat 0,014.

Hab. — Dakar; Joalles; Pointe du Cap Vert.

10. CORBULA LUDOVICIANA, Rochbr.

C. — *Testa solidissima, tumida, retuso ovata, inequilaterali, antice rotundata, postice subelongata, depressa; valvis valde disparibus; dextra ferruginea concentrice costata, costis crassis; sinistra sulcata, epidermide olivacea induta; umbonibus inæqualibus, rectis, suberosis; intus calcareo alba.*

Long. 0,025; lat. 0,018; crass. 0,015.

Hab. — Embouchure de la Gambie.

11. CORBULA PODORIENSIS, Rochbr.

C. — *Testa crassa, subovata, inequilaterali, lævi, fulvido*

lactea, nitida; antice ovata, postice vix producta; umbonibus errosis; intus violacea.

Long. 0,007; lat. 0,005; crass. 0,004.

Hab. — Lac de N'Guer; Marigots de Podor, Dagana, Bakel.

12. LEDA EURABDOTA, Rochbr.

L. — *Testa oblique elliptica, solidula albido lutea, antice rotundata, postice breviter arcuata, subrostrata, triangulata, oblique costata, costis lamellosis subimbricatis; latus anticum costa tumida cinctum; posticum striis minutis, scabrosis, vestitum.*

Long. 0,015; lat. 0,008; crass. 0,005.

Hab. — Embouchure de la Gambie.

13. PRAXIS ETHERICOLA, Rochbr.

P. — *Testa mytiliformi, araneosa, solida, lævi, pallide fusca, albo maculata, epidermide cinerascete, lamellose exfoliata, induta; umbonibus incurvatis, subacutis, tenuiter errosis; septo parvo; intus cærulea.*

Long. 0,024; lat. 0,010; crass. 0,007.

Hab. — Tous les marigots du haut Sénégal, Podor, Dagana, Saldé, etc., où l'espèce, très abondante, vit fixée, à l'aide de son byssus, sur les coquilles des *Etheria*.

14. PINNA PAULUCCIÆ, Rochbr.

P. — *Testa elongato angustata, tenui, fragili, subpellucida, pallide salmonæa, passim violascente; concentricè obscure lamellosa; apice incurvato vel subrecto; infirme oblique ovata, costata, costis parum prominulis, squamatis, squamis subtubulosis æque distantibus; intus, intense fusco rubescente, ad basin superne cupreo margaritæa.*

Long. 0,540; lat. 0,110; crass. 0,045.

Hab. — Embouchure de la Casamence.

Nous sommes heureux de dédier cette espèce remarquable, bien distincte de toutes ses congénères, à M^{me} la Marquise Paulucci, en souvenir du bienveillant intérêt qu'elle a souvent témoigné au Laboratoire de Malacologie du Muséum.

Sur une espèce nouvelle du genre Mylabris,

par le D^r A. T. DE ROCHEBRUNE,

Aide-naturaliste au Muséum.

Pl. III.

L'étude des Insectes de la Sénégambie, venant de plus en plus confirmer nos premières données sur la dispersion considérable à travers le continent Africain des animaux de tous les ordres, nous étions fondé à supposer qu'une espèce du genre *Mylabris*, nouvelle pour la région, devait être très voisine sinon identique à un autre *Mylabris* Abyssinien, également nouveau pour la science, et sur lequel notre confrère M. le D^r Tison avait publié en 1881 un intéresssant travail (1).

Notre jeune ami M. Jean Franchet, Entomologiste d'avenir, ayant bien voulu nous communiquer quelques-uns des types du D^r Tison, dont ce dernier avait enrichi ses collections, nous n'avons pas tardé à voir nos suppositions se changer en certitude.

Les spécimens Sénégambiens et Abyssiniens, ne différant sous aucuns rapports, sont caractérisés de la manière suivante :

MYLABRIS HACOLYSSA Rochbr.

M. — *Corpus nigrum, intense sericeum, elitris nigris, minute impresso punctatis; fasciis duabus rubro aurantiacis, reticulato foveolatis, cinctis; fascia antica superne undata, inferne recta; postica utrinque undulata; antennarum 1. 2. 3. articulis nigris; 5. 6. 7. 8, fulvis; ceteribus fulvo luteis;*

(1) *Revue du monde Catholique*, n° 64; 31 mai 1881.