

nr. II, 1

200: 1, 1, 2

Band 1 Teil 6

S. 3021-3910

6 MELIP 1788

104 055A

# CAROLI A LINNÉ,

*Equitis aurati de stella polari,*

ARCHIATRI REGII, MED. ET BOTAN. PROFESS. UPSAL. ACAD. PARIS.

UPSAL. HOLM. PETROPOL. BEROLIN. IMPER. LONDIN. ANGL.

MONSP. TOLOS. FLORENT. EDINB. BERN. SOC.

# SYSTEMA NATURAE

PER

## REGNA TRIA NATURAE,

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES,  
GENERA, SPECIES,

ET IUS NOMICUM

CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS, SYNONYMIS,

LOCIS.

TOMUS I.

MORGENSTERN

104 055A

EDITIO DECIMA TERTIA, AUCTA, REFORMATA.

CURA

### JO. FRID. GMELIN,

PHILOS. ET MED. DOCTOR, HUIUS ET CHEM. IN GEORGIA AUGUSTA PROF.

P. O. ACAD. CAESAR. NATURAE CURIOSORUM ET ELECTORAL. MOGUNTIN.

ERFORDENSIS, NEC NON SOCIET. REG. SCIENT. GOETTINGENSIS,

PHYSICAE TIGURIN., ET METALLICAE MEMBERI.

LIPSIAE, 1788.


IMPENSIS GEORG. EMANUEL. BEER.

EX BIBLIOTHECA  
OLDENBURGENSI

O JEHOVA,

*Quam ampla sunt Tua Opera!  
Quam sapienter Ea fecisti!  
Quam plena est Terra possessione Tua!*

DAVID Psalm. CIII. 24.



S.AE R.AE M.TIS SUMMAE FIDEI VIRO,  
CELSISSIMO ILLUSTRISSIMOQUE  
COMITI  
D.NO CAR. G. TESSIN,

REGIS REGNIQUE SUIOGOTHICI SENATORI, RE-  
GIAE CANCELLARIAE PRAESIDI,

AD AULAM REGIARUM CELSITUDINUM SUPREMO  
MARESCHALLO,

EDUCATIONI SEREN. PRINC. GUSTAVI PRAEFECTO, CANCEL-  
LARIO ACADEMIAE ABOENSIS,

ORDINIS S.AE R.AE MAJ. SERAPH. EQUITI AURATO ET COMMENDA-  
TORI, EQUITI AURATO DE AQUILA NIGRA, NEC NON OMNIUM

S.AE R.AE MAJ. SUECICAE ORDINUM CANCELLARIO,

SACRUM.

Cum quisvis auctor speret se apud posteros gratiam  
habere, et posse secum duratura nomina educere,  
AUCTORI meae fortunae Libellum ultimo nunc offero.  
ILLE me, peregrinum in patria, reducem excepit;  
ILLE mihi stipendium ab ordinibus Regni expetiit;  
ILLE mihi spartam Medici classici procuravit,  
ILLE mihi Munus, quo fungor, conciliavit;  
ILLE mihi Titulum, quo distinguor, paravit;  
ILLE me ad Serenissimos Reges introduxit;  
ILLE me cuso Numismate posteritati commendavit;  
ILLE meas errare boves, ut cernis, et ipsum  
ludere quae vellem calamo permisit agresti;

quare

*cana prius gelido desint absinthia ponto,  
quam nostro illius labatur pectore vultus.*

TANTI MAECENATIS

Upsaliae 1766,  
d. 24. Maj.

Cultor devotissimus

C. a LINNÉ.

*sum ciliatorum paribus sex, posterioribus tribus cheliferis ad basin tentaculorum os; inter extrema proboscis. Figura similis v. aët. angl. 50. v. 2. p. 847. t. 34. f. A. Leeuwenh. arcan. 465. f. 7.*

293. LERNAEA. Corpus oblongum teretiuseulum nudum, tentaculis 2-3 teretibus brachia aemulantibus se affigens.

Ovaria bina, tanquam totidem caudae.

branchia- 1. L. corpore tereti flexuoso, ore laterali inter cornua tri-  
lis. subramosa.

Müll. zool. dan. 3. p. 65. t. 118. f. 4. prodr. 2743. O. Fabr. En. groenl. p. 336. n. 325. Lernaea gadina.

Stroem. foudm. 1. p. 209. t. 1. f. 18. Toki thold.

β) Lernaea minor. Koelreuter comm. ac. Theod. Palat. 3. p. 57.

Habitat in Oceani septentrionalis gadorum branchiis, Groenlandis esculenta, digiti minimi longitudine, cava, membranacea, antierius et posterius eminent, sordide alba, v. obscure rubra, cauda sulco perpendiculari terminata, collo longo tubulari filiformi, ovarii ex cirris 2 longis contortuplicatis.

cyprina- 2. L. corpore obclavato, thorace cylindrico bifurco, tenta-  
cca. lis apice lunatis. En. suec. 2100. t. 2. f. 2100.\*

En. suec. 1. n. 1282. f. 1282. Lernaea tentaculis quatuor, duobus apice lunatis.

Habitat in piscinis frequens supra corpus cyprini carassii, quod maculis rubris vulnerat.

salmonca. 3. L. corpore obovato, thorace obcordato, brachiis duobus  
linearibus approximatis. En. suec. 2102.\*

Müll. zool. dan. prodr. 2744. O. Fabr. En. groenl. p. 337. n. 327. Lernaea corpore obovato, thorace obcordato, brachiis duobus in orbiculum cartilagineum connatis.

Brander pisc. cumoëns. 25. t. 1. f. 1.

Gisler aët. Stockh. 1751. p. 185. t. 16. f. 1-5. Pediculus salmonis.

Habitat

Habitat in salmonum, rarius in gadi barbati branchiis, congeneribus vividior, 6 lineas longa, pallida, mollis, capite parvo, oblongo convexiusculo, labiis 2 horizontalibus; superiori uncinis 2 mobilibus rigidis armato, inferiori breviori bifido, abdomine obovato latiori, ovarii candidioribus, teretibus, intus granulatis, magnitudine totius animalis.

cellina. 4. L. corpore lunato, thorace cordato. En. suec. 2101. It. wgoth. 171. t. 3. f. 4. Lernaea, cauda duplici tereti. Habitat in Oceani septentrionalis gadi branchiis.

huchonis. 5. L. corpore nodoso, tentaculis duobus, ovario duplici posteriorius adnato. Schranck it. bavar. p. 99. t. 2. f. A-D. Habitat in salmonis huchonis branchiis frequens, salmoncae affinis, candidissima, subcartilaginea.

clavata. 6. L. corpore cylindrico sublinuato triplicato infra apicem rostri. Müll. zool. dan. 1. p. 119. n. 54. t. 33. f. 1. prodr. 2853. rar. 1. p. 75.

Habitat in percae norvegicae pinnis, branchiis, ore, oculis, candida, pellucida, lineis rubris picta, collo angusto, flavescente, apice acuminato, incurvo, nodoso, ovarii tubulosis: ovis extrinsecus adhaerentibus.

macinata. 7. L. corpore subcordato, rostro simplici curvo, ore terminali. Müll. zool. dan. 1. p. 120. n. 55. t. 33. f. 2. prodr. 2745. rar. 1. p. 76. O. Fabr. En. groenl. p. 338. n. 328.

Habitat in maris Groenlandiam alluentis gadorum variorum pinnis et branchiis, mollis, pallida, dorso medii sulco longitudinali, ovarii rotundis, apicem versus incrassatis.

gobina. 8. L. corpore rhomboidali, brachiis duobus anterioribus totidemque posterioribus nodosis, cornubus duobus arietinis. Müll. zool. dan. 1. p. 121. t. 33. f. 3. prodr. 2747. rar. 1. p. 77. O. Fabr. En. groenl. p. 339. n. 329.

Habitat in cotti gobionis branchiis, 7 lineas longa, ex albo caeruleascens, intestino superne translucente obscuro, depressa, subtus subconcaeva, oris inter cornua 2 curvata intermedii labiis 3, ano bifido, ovarii spiralibus, tereti subulatis.

9. L.

Lernaeae, oculis carentes piscibus infestae, quorum sanguinem sugunt, in pinnis potissimum et branchiis fixae, oreque suo, corpore perpendiculari erecto, ovarii rigidis protensis immobiliter et tenacissime adhaerentes.

**radiata.** 9. L. corpore quadrato depresso; brachiis utrinque tribus, cornibus quatuor rectis. Müll. zool. dan. 1. p. 122. n. 57. t. 33. f. 4. prodr. 2748. rar. 1. p. 78. O. Fabr. Fu. groenl. p. 340. n. 330.

Habitat in coryphaenae rupes tris oris angulis, rarior, lernaeae ab Aristotele et Rondeletio in thynno observatae proxima, II lineas longa, sordide alba vel cinerea, tuberibus solioribus lacteis inaequalis, ad latera crenata, capite depressiusculo rotundato, subtus convexiori, papillis crebris minutis inaequali.

**nodosa.** 10. L. corpore quadrato tuberculato, brachiis subtus brevissimis utrinque duobus. Müll. zool. dan. 1. p. 123. n. 58. t. 33. f. 5. prodr. 2749. rar. 1. p. 79. O. Fabr. Fu. groenl. p. 341. n. 331.

Habitat in percae norwegicae rictu, radiata minor, mollis, dilute cinerea, supra convexa, subtus concava, medio dorso tuberculis 4 duris lacteis inaequali, dentibus utrinque 5 pariter lacteis, capite rotundato, per striam mediam candidam bipartito.

**cornuta.** 11. L. corpore oblongo, brachiis quatuor rectis emarginatis, capite subovato. Müll. zool. dan. 1. p. 124. n. 59. t. 33. f. 6. prodr. 2750. rar. 1. p. 80.

Habitat in pleuronectis Platea et Linguatula, cute pellucida circumdata, verticis mucronibus, frontis cornibus 2, bidente solitario armatis, oris palpis 2, ovarii fuscis: ovis spadiceis. Zoega.

**pectoralis.** 12. L. capite orbiculato hemisphaerico, abdominis obcordati papilla terminali truncata. Müll. zool. dan. 1. p. 125. n. 60. t. 33. f. 7. prodr. 2751. rar. 1. p. 81.

Habitat in pleuronectarum et aeglesini pinnis, potissimum pectoralibus, monoculo piscino similis, alba, diaphana, punctis pullis adspersa, verticis mucronibus 2 falciformibus, rostro conico truncato: cornibus 4 minutis, mucronibus 2 brevissimis, et prope mucronem 3 conicum palpis 2, brachiis 2 non curvatis, ovarii angustioribus subannulatis diametri aequalis.

**lotae.** 13. L. ovarii quaternis inaequalibus. Hermann Naturf. 19. p. 44. t. 2. f. 6.

Habitat in gadi lotae branchiis, oris uncinulis 2, appendicibus cruciatis 4. Zujef.

14. L.

**cyclopteryna.** 14. L. corpore tereti flexuoso, orificio duplici in medio rostri cornibus tribus tripartitis terminati. Müll. zool. dan. prodr. 2745. O. Fabr. Fu. groenl. p. 337. n. 326.

β) Lernaea minor, ovarii virecentibus. O. Fabr. Fu. groenl. p. 337.

Habitat in cyclopteri spinosi, β) in liparis branchiis, branchiali affinis, cornu tamen tenui suorum verso, apice integro, cauda angustiori: lobis utrinque 2 convexis, ovarii simplicibus spiralis, in longitudinem 5 pollicum extensibus.

**pinnarum.** 15. L. rufa capite cylindrico arterius rostrato, tentaculis duobus lunatis apice bifidis, brachio unico. F. Chr. Fabr. it. norw. p. 282. n. 3.

Habitat in gadi barbati pinnis dorsalibus, depressa, carnosae, dorso canaliculato, brachio cylindrico dorso antrosum infecto in canali recondendo, ovarii elongatis cylindricis.

**294. SCYLLAEA.** Corpus compressum: dorso canaliculato.

Os foramine edentulo terminali.

Tentacula f. Brachia subtus trium parium.

**pelagica.** 1. Sc. fixa, tentaculis extremis filiformibus, mediis papillofis. Syst. nar. XII. 2. p. 1094. Scyllaea.

Mus. Ad. Fr. 1. p. 56. Lepus pelagicus.

Orb. it. 306. Zooterygius.

Seb. mus. 1. t. 74. f. 1.

Habitat in pelagi fuso natante, cui fossula dorso crenata assignatur, quiescens, oblonga, dorso retrosum latiore obtuso, tentaculis extremis minoribus rotundioribus, mediis foliaceis oblongis repandis, obtusioribus.

**ghomfo-** 2. Sc. vaga, tentaculis primis nudis apice cavis, reliquis intror-

sum vittis ramosis. Forsk. Fn. aegypt. arab. p. 103. n. 13. Habitat parcius in mari rubro inter Ghomfodam et Djelan, pollicaris, pellucida, flavescens: punctis ex fusco ferrugineis, dorso plano, ad margines fusco punctato, serie media longitudinali punctorum caeruleorum, cauda compressa, dorso in carinam rotundatam repandam margine fuscescentem anterius utrinque vittis ramosis parvis con-

Ree Ree Ree

spicu-