

# **Zeitschrift**

für

# **Malakozoologie.**

Herausgegeben

von

**Dr. Karl Theodor Menke**

in Pyrmont

und

**Dr. Louis Pfeiffer**

in Cassel.

**Neunter Jahrgang.**

**1852.**

Mit Beiträgen von *J. Ch. Albers, W. Assmann, W. Dunker, Dr. Kurr, R. A. Philippi, A. Schmidt, Dr. Scholz* und den Herausgebern.

Nebst einer lithogr. Tafel.

---

**Cassel.**

Druck und Verlag von Theodor Fischer.

**1853.**

## Diagnoses Helicorum novorum

scripsit

Dr. J. Chr. Albers, Berolinensis.

### 1. *Helix azorica*.

Testa imperforata, depresso-globosa, tenuis, nitida, pellucida, levissime striatula, brunneo-virens, punctis et flammulis flavis ornata; anfractus convexiusculi, sutura distincta iuncti, ultimus magnus, antice descendens; apertura lunato-rotundata; peristoma simplex, intus filiforme albo-labiatum, marginibus conniventibus, columellari intrante, vix dilatato. — Diam. maj. 13, min. 11, altit. 8 mill.

Habitat in insula „San Miguel“ Azoricarum, ubi detegitur in pago dicto „Sete citados.“

Obs. *Hel. azorica* accedit ad *H. erubescens* Lowe, Maderae et insulae „San Miguel“ incolam.

### 2. *Helix Hartungi*.

Testa umbilicata, depressa, striatula, alba, nitidula, spira subelevata; anfractus  $5\frac{1}{2}$  convexi, ultimus magnus, rotundus, basi convexus, antice parum descendens; umbilicus mediocris, pervius; apertura depresso-rotunda; perist. simplex, intuslabiatum, marginibus conniventibus, callo junctis, supero recto, basali dilatato-patente. — Diam. maj. 10, min. 8, alt. 5 mill.

Habitat in insula Portosancto.

*Hel. Hartungi* steht zwischen *Hel. dealbata* und *Hel. consors*; unterscheidet sich aber unverkennbar von beiden durch den weiteren, durchgehenden Nabel, durch die feingestreifte, nicht granulirte Sculptur, durch die gedrückt runde Mundöffnung und den verbreiterten, abstehenden Columellar-Rand.

3. *Clausilia Lowei*.

Testa non rimata, subulato-fusiformis, tenuiuscula, lutescenti-pellucida, longitudinaliter crasse et spatiose costata; spira gracilis, apice acuta; anfractus 11, convexi, ultimus basi bicristatus; apertura rotunda; lamellae validae, infera prominens; lunella nulla, plicae palatales 3, superae 2 profundae, infera callosa, subcolumellaris inconspicua; peristoma continuum, solutum, album, expansiusculum. — Long. 11, diam. 3 mill. Apert. in utraque diametro 2 mill. (Specim. maximum ex 4.)

Habitat in Insula Portosancto.

*Clausilia deltostoma*, welche durch die obigen Kennzeichen mit dieser neuen Art gar nicht verwechselt werden kann, ist, so viel ich weiss, noch nicht auf Porto Sancto gefunden worden; wohl aber eine *Clausilia* unter den daselbst vorkommenden subfossilen Arten, die als „*Clausilia deltostoma subfossilis*“ galt. — Neuerdings erhielt ich vier frische Exemplare dieser neuen Art, welche der subfossilen vollkommen entsprechen und die von einem zum Schneckensammeln abgerichteten Mann, welcher zu dem Zwecke von Madeira nach Porto Santo geschickt wurde, mitgebracht worden sind.

4. *Bulimus cyaneus*.

Testa rimata, conico-oblonga, solidula, oblique striatula, saturate cyanea vel, pruina quasi oblecta, e caeruleo-candicans; anfractus 8 ad suturam crispulam albescentes, ultimus  $\frac{1}{3}$  longitudinis aequans; apertura ovalis; columella recta; peristoma intus albo-labiatum, breviter expansum, marginibus callo tenui iunctis, columellari dilatato-patente.

Longit. 17, diam.  $6\frac{1}{2}$  mill. Apertura 5 mill. longa,  $3\frac{1}{2}$  lata.

Habitat in insula „San Miguel“ Azoricarum, ubi detegi prope urbem „Ponta delgada.“

Obs. Bul. cyaneus sectioni „Napaeus“ adnumerandus.

#### 5. *Bulimus glaucostomus.*

Testa perforata, ovato-pyramidata, nitida, sub lente subtilissime decussata, alba, fasciis tribus nigricanti-castaneis, albo punctulatis et strigis fuscis longitudinalibus iunctis, ornata, fascia media latissima, suprema angusta; anfractus 6, ultimus spiram paulo superans, basi subangulato-constrictus; columella plicato-contorta; apertura lata, verticalis, ovato-rotundata, intus violacea, fasciis perlucentibus; peristoma simplex, undique late expansum.

Longit. 33, diam. 18 mill. Apert. intus 15 mill. longa, 8 lata.

Hab. in montibus Venezuelae.

Obs. Species pulcherrima sectioni „Otostomus“ adnumeranda.

#### 6. *Bulimus Midas.*

Testa perforata, oblongo-conica, pellucida, regulariter oblique dense striata, flava, strigis et maculis castaneis fulgurata; anfr. 5, ultimus subinflatus, ad suturam marginatus, spiram brevem, conicam, apiculatam  $\frac{3}{5}$  longitudinis superans; columella alba, callosa, laxa torta, ad apicem spirae conspicue ascendens; apertura ovali-oblonga, auriformis, intus concolor; peristoma haud incrassatum, albo-marginatum, basi late effusum, reflexiusculum, margine dextro subarcuato, expansiusculo, columellari expanso, patente.

Longit. 50, diam. 21 mill. Apert. intus 25 mill. longa, 11 lata.

Hab. in Venezuela.

Obs. Bul. Midas sectioni „Gonyostomus“ adnumerandus.

(Ausgegeben am 25. März 1852.)