


Division of Mollusks  
Sectional Library

# Jahrbücher

der Deutschen


## Malakozoologischen Gesellschaft.



R e d i g i r t

von

**Dr. W. Kobelt.**



Siebenter Jahrgang 1880.



FRANKFURT AM MAIN.

Verlag von MORITZ DIESTERWEG.

Diagnoses molluscorum novorum ab ill. Hans Leder  
in regione caspia Talyesch dicta lectorum.

Auctore Dr. O. Boettger.

*Vitrina (Trochovitrina) subcarinata n. sp.*

Testa peraffinis Vitr. Lederi Bttg. (= Lampadia), sed major, non rinnata, loco umbilici parum impressa, fuliginosa-olivacea vel viridula. Anfr.  $3\frac{1}{2}$ , supra magis convexiusculi, ad carinam non imbricati, superne densius et subtilius striati, ultimus minus acute carinatus. Apertura major, margine columellari non reflexa. — Alt. 4, lat.  $5\frac{3}{4}$ , prof.  $4\frac{3}{4}$  mm.

Sicut Vitr. Lederi Bttg. sectioni Trochovitrinae G. Schackoi, qui nuper apparatum lingualeri inspexit, attribuenda.

*Hyalinia (Polita) caspia n. sp.*

Testa mediocris, aperte et pervio-umbilicata, umbilico  $\frac{1}{5}$  basis testae lato, convexo-depressa, solidula, vix pellucida nitidaque, obscure corneo-fuscescens, basi parum pallidior; spira humilis, convexo-conica. Anfr.  $4\frac{1}{2}$ —5 convexiusculi, regulariter lenteque accrescentes, sutura impressa, subcrenulata disjuncti, pro altitudine lati, distinete dense striati, striis ad suturam magis impressis, ad basin distinete sigmoideis, ultimus penultimum latitudine sescuplo superans, subdepressus, basi parum planatus, ad umbilicum infundibuliformi-declivis. Apertura parum obliqua, modice lata, transverse lunato-ovata, marginibus convergentibus, columellari ascendentē, subincrassato, basali leviter protracto. — Alt.  $3\frac{1}{2}$ , lat. 7, prof. 6 mm.

Peraffinis Hyal. Lederi Bttg., sed duplo minor, colore obscuriore, anfractibus solum 5, ultimo basi minus planato et apertura distinete magis rotundata.

*Hyalinia (Vitreia) angystropha n. sp.*

Testa minima, imperforata, calculiformis, vitrea, nitida; spira conico-eminula; apex parvulus, simplex. Anfr. 6 $\frac{1}{2}$ —7 perlente accrescentes, latitudine omnes fere aequales, supra complanati suturaque impressa disjuncti, infra perconvexi, striatuli, ultimus penultimo vix latior, supra distincte obtuse carinatus. Apertura perangusta, quadruplo circiter altior quam latior, elongato-lunar, ubique fere aequa latitudine, marginibus simplicibus, acutis, supero angulato, basali rotundato. — Alt. 1 $\frac{5}{8}$ , lat. 3, prof. 2 $\frac{3}{4}$  mm.

Differt ab *Hyal. contortula* Kryn. et ab *H. diaphana* Stud. testa minore, anfractibus lentius accrescentibus, obtuse carinatis, spira conica, apertura multo angustiore etc., ab *H. Erjaveci* Brus., cui proxima, testa minore spiraque elatiore, magis conica.

Hab. in montibus Suram dictis Transcaucasiae.

*Patula Lederi n. sp.*

Testa minima, late pervio-umbilicata, cornea; spira obtuso-convexa, apice parum prominulo. Anfr. 4, sat celeriter accrescentes, convexiusculi, sutura impressa disjuncti, densissime striati et praeterea tenuiter lamel-lato-costati, costulis perobliquis, distantibus, filiformibus, ultimus vix subangulatus, antice non descendens. Aper-tura obliqua, parum latior quam altior, transverse ovato-rotundata, margine columellari subreflexo. — Alt. 1 $\frac{1}{4}$ , lat. 2 $\frac{1}{4}$  mm.

Statura coloreque Pat. pygmaeae Drap., sed major, anfractibus celerius accrescentibus, sculptura valde diversa.

*Buliminus (Chondrula) didymodus n. sp.*

Testa dextrorsa, perforato-rimata, aut cylindrato-oblonga aut oblonga, solida, corneo-fusca, nitens; apex conicus,

acutiusculus. Anfr. 6— $6\frac{1}{2}$  convexiusculi, sutura impressa, anguste marginata disjuncti, striatuli, striis perobliquis, ultimus basi compressiusculus,  $\frac{2}{7}$ — $\frac{1}{3}$  altitudinis testae aequans, antice parum ascendens, ad aperturam subcompressus et flavidо-cinctus. Apertura truncato-ovalis, 7 dentata: dente angulari minore, punctiformi, dentibus parietalibus 2 geminis, exteriore minore, interiore hamiformi, dente columellari unico valido, transverso, dentibus marginalibus callo inter se junctis 3, quorum infimus basalis minus altus, illi Bul. microtragus Parr. similis, interdum evanescit. Peristoma simplex, expansum et subreflexum, albo-labiatum, ad sinulum subretractum, marginibus aut disjunctis aut callo tenuissimo junctis, columellari substricto. — Alt.  $7\frac{1}{2}$ , lat. 3; alt. apert. 3, lat. apert.  $2\frac{1}{4}$  mm.

Affinis Bul. septendentato Roth, sed multo minor, magis cylindratus, peristomate magis expanso, dentibus geminis parietalibus magis inter se approximatis, dente tertio marginali saepius evanescente, margine columellari magis stricto et rima distincte profundiore.

*Buliminus (Napaeus) talyschanus n. sp.*

Testa maxime affinis Bul. obscuro Drap., sed elongato-fusiformis neque ovato-oblonga, sordide olivacea strigis hic illie pallidioribus obliquis ornata, spira acutiore, anfr.  $7\frac{1}{2}$  nec  $6\frac{1}{2}$ , penultimo latiore quam ultimus, ultimo vix  $\frac{3}{10}$  altitudinis omnis testae aequante. Apertura minor, angustior. Caeterum Bul. obscuro similimus. — Alt. 9, lat. 3; alt. apert.  $2\frac{3}{4}$ , lat. apert. 2 mm.

*Clausilia (Oligptychia) Gustavi n. sp.*

Testa brevissime arcuato-rimata, gracilis, turrito-fusiformis, anfractibus juvenilibus 6—7 et regione aperturali corneo-

fulvis, caeteris, mediis 8—12 violascenti-castaneis, nitida; spira elongato-turrita; apex subcylindricus, acutiusculus. Aufr.  $11\frac{1}{2}$ — $12\frac{1}{2}$  parum convexi, suturis impressiusculis, tenuissime albido-filosis disjuncti, densissime striati et praeterea distincte spiraliter lineolati, secundus tertio fere aequalis, caeteri lentissime accrescentes, penultimus latissimus, ad sinistram convexior, ultimus a latere compressus, penultimo parum altior, striis non validioribus ornatus, basi latesulcatus et crista brevi compressa, a periomphalo satis magno impressione profunda separata, armatus. Apertura parva, obliqua, lata, rhombico-piriformis, basi profunde canaliculata; sinulus amplus, non retractus; peristoma continuum, breviter solutum protractumque, modice expansum reflexumque, albo-sublabiatum. Lamellae minimae; supera marginalis, tenuis, humilis; infera appressa, sigmoidea, a basi intuenti valde spiraliter torta recedens; spiralis deficiens; subcolumellaris et oblique intuenti haud conspicua; lam. parallela subobsoleta, antice modo eonspicua. Loco lunella distinete lateralis pliculae palatales 7—8 minimae striolaeformes, longitudine fere aequales, secunda solum principali paululum longiore. Interdum lunella obsoleta, principalis parva duaeque suturales adsunt. — Claustrum latissimum, curvatum, apice canaliculato, recurvo, subacuminato, et oblique intuenti vix conspicuum. — Alt.  $15\frac{1}{2}$ — $17\frac{1}{2}$ , lat.  $3\frac{1}{4}$ — $3\frac{1}{2}$ ; alt. apert.  $3\frac{1}{4}$ , lat. apert.  $2\frac{3}{4}$  mm.

Ab ill. Dr. Gustav Radde, cui speciem claram notabilemque dedico, prope fines Persicos reperta.

Ad subsect. Armeniacam Bttg. prope accedens, sed ab omnibus speciebus notis hujus gregis lunella profundissima valde diversa.

*Carychium Lederi n. sp.*

Testa affinis Car. minimi Müll., sed multo minus lata et magis attenuata, turrita, non inflata; spira attenuata; apice fere acutiuscula; anfr.  $5\frac{1}{2}$  regulariter lentiusque accrescentibus, *obsoletissime* striatis, fere laevibus, ultimo penultimo vix altiore,  $\frac{1}{3}$  altitudinis aequante. Aertura coarctata, tridentata, dente marginali validiore, callose intrante, extus perspicuo, peristomate valde labiato. — Alt.  $1\frac{3}{4}$ , lat.  $\frac{3}{5}$  mm.

A Car. tridentato Risso et Car. Boysiano Bens. defectu fere absoluto sculpturae, a Car. indice Bens. spira multo magis attenuata et ad summam ab omnibus speciebus affinibus statura gracillima distinguendum.

---