

11,695

BOLLETTINO

DEI
Musei di Zoologia ed Anatomia comparata
della R. Università di Torino

N. 538 pubblicato il 22 Ottobre 1906

VOL. XXI

SPEDIZIONE AL RUWENZORI

DI

S. A. R. LUIGI AMEDEO DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI

II.

CARLO POLLONERA

Nuove specie di Molluschi terrestri

(DIAGNOSI PREVENTIVE)

1. *Helicarton Aloysii Sabaudiae*.

Testa depresso auriformis, tenuis, translucida; subtus convexiuscula, glabra; supra convexior, scabriuscula, apice prominulo; corneo-rufescens, concentricè plicato striata, ad peripheriam obtuse angulata. Anfr. 3 1/2, rapide evoluti, sutura profunda separati. Apertura obliqua, irregulariter subovata, margine membranaceo basali angustissimo.

Long. mill. 25, lat. 18 1/2, alt. 12 1/2. Apert. long. 15 1/2, alt. 11.

Hab. Bujongolo (Uganda). Un solo esemplare.

2. *Vitrina Cagnii*.

Testa depressa, subsolidula, nitida, laevigata, transverse subplicata, colore fusco-corneo; spira brevissima, apice subprominulo, albido. Anfr. fere 3, celeriter crescentes, sutura filomarginata separati; ultimus depressus, basi compressus, margine membranaceo angustissimo, elongato. Apertura oblique oblongo-ovata, margine supero arcuato, infero rectiusculo.

Long. mill. 9 1/2, lat. 7 1/4, alt. 4 1/2. Apert. long. 5 1/2.

A

Differt a proxima V. oleosa Mart. Testa paululum maiore, supra et subtus compressiore, solidiuscula, colore minus succineo.

Hab. Ruwenzori, ghiacciaio Mobuku, a quasi 4500 metri. Un solo esemplare.

3. **Buliminus (Petraeus) Aloysii Sabaudiae.**

Testa ovato-conica, tenuiuscula, pallide cornea, angustissime et subobtecte umbilicata, plicato-subcostulata et minutissime malleata; spira conica, apice obtusiusculo; anfr. 6 convexiusculi, rapide evoluti, sutura lineari separati, ultimus magnus, turgidus. Aperiura irregulariter subovata, intus cornea, peristomate albo, reflexo, marginibus remotis; margine externo arcuato, supra medium scrobiculato; columellare subverticali, supra umbilicum in triangulum oblongum dilatato, atque antrorsum producto et angulato.

Alt. mill. 23; lat. 14; apert. alt. 11 $\frac{1}{2}$.

Hab. Versante Est del Ruwenzori; Valle Mobuku, fino a 2000 metri. Un solo esemplare.

4. **Subulina Roccatii.**

Testa subulata, tenuis, albida, longitudinaliter tenui-costulata, costulis basi evanescentibus; anfr. 9 convexiusculi, sutura impressa divisi; ultimus basi attenuatus. Apertura angustae ovalis, superne acutangula, labro simplice; margine externo et basali simplicibus; columellare recto, late reflexo-adhaerente, rimam angustissimam formante, basi levissime oblique subtruncato.

Alt. mill. 12 $\frac{1}{2}$; lat. 4; apert. alt. 3 $\frac{1}{2}$.

Hab. Versante Est del Ruwenzori; Valle Mobuku, fino a 2000 metri. Un solo esemplare.

5. **Glessula De-Albertisi.**

Testa oblonge-subsubulata, lucidissima, translucida, succineo-virescens, subtilissime longitudinaliter striatula; spira turrata, apice obtusa; anfr. 7 convexiusculi, sutura impressa separati. Apertura obliqua pyriformis, superne acutangula, intus non dissimiliter colorata; peristomate simplice, tenue; margine columellari arcuato, oblique truncato.

Alt. mill. 18; lat. 5 $\frac{1}{2}$; apert. alt. 6 $\frac{1}{2}$.

Hab. Bihunga, Ruwenzori; Valle Mobuku a circa 2500 metri. Un solo esemplare.

6. **Streptaxis Cavallii.**

Testa albida, valde obliqua; anguste umbilicata; regulariter, crebre, subtiliter et acute costulata; apice obtusa, compressa. Anfr. 5; primi 3 convexiusculi, normaliter spirati; ultimi subplanulati, perobliqui.

Apertura edentula, valde obliqua, irregulariter subovata, peristomate reflexo, marginibus callo tenuissimo junctis.

Alt. mill. 9, lat. $7 \frac{1}{2}$; apert. alt. $4 \frac{1}{4}$.

Hab. Versante Est del Ruwenzori; Valle Mobuku, fino a 2000 metri. Esempl. 9.

7. **Ennea Roccatii.**

Testa ovata, turgide dolioliformis, superne obtusa, inferne attenuata, albido-cinerea, tenuissime striatula. Anfr. 8, planiusculi, sutura lineari incisa divisi, superne saepius ad suturam acute carinati. Apertura ringens, obliqua, irregulariter ovato-oblonga; peristomate crasso, late reflexo, marginibus callo junctis. Lamellae parietales 2, in unam validissimam, emersam, distortam et cum margine externo conglutinatae; margine externo arcuato, 4-dentato: 1° (supremo) Tuberculiforme sat crasso; 2° valido, lamelliforme; 3° et 4° lamelliformibus, minoribus; margine columellari oblique subrecto, 4-dentato: primi 3 lamelliformes progrediendo crescentes, scilicet: 1° (superius) minutus, 2° maior, 3° maximus, transverse positi, 4° profundus, minutissimus, tuberculiformis.

Alt. mill. $12 \frac{1}{2}$, lat. $6 \frac{1}{2}$; apert. alt. $4 \frac{1}{2}$.

Hab. Versante Est del Ruwenzori; Valle Mobuku, fino a 2000 metri. Esempl. 10.

8. **Ennea Sellae.**

Testa ovata, dolioliformis, superne obtusa, inferne leviter attenuata, albida, tenuissime striatula, fere laevigata. Anfr. 7, supremi convexiusculi, coeteri planiusculi, sutura profunde incisa divisi. Apertura recta, subquadrangularis, tamen superne latior; peristomate crasso, late reflexo, marginibus callo junctis. Lamella parietalis unica, validissima, flexuosa, emersa, superne longe producta et cum marginem externum peristomatis juncta; margine externo subarcuato, crasso, intus 4-dentato, dente 1° (supremo) tuberculiforme, angusto, 2° validissimo, sublamelliforme, 3° profundiore, tuberculiforme, minimo; 4° (basali) lamelliforme, sat valido; columellari unico, crasso, transverse posito.

Alt. mill. $12 \frac{1}{2}$, lat. $6 \frac{1}{2}$; apert. alt. $4 \frac{1}{2}$.

Variat forma turgidior, alt. 11, lat. $6 \frac{1}{2}$; apert. alt. $4 \frac{1}{2}$.

Hab. Versante Est del Ruwenzori; Valle Mobuku, fino a 2000 metri. Esempl. 5.

9. **Ennea Camerani.**

Testa tenuiuscula, ovata, turgide dolioliformis; superne obtusa, apice levissime prominulo; inferne attenuata; albida, subtranslucida, regulariter et confertim striata. Anfr. 8, supremi convexiusculi,

coeteri planiusculi, sutura profunde incisa divisi. Apertura recta, subtriangularis, peristomate reflexo, non incrassato, marginibus remotis. Lamella porietalis unica, subquadrata, sat elevata, oblique posita et cum lamellam angularem, angustiozem juncta; margine externo arcuato, intus dente mediano unico, conico, sat valido, munito; columella intus lata, margine columellari subrecto, obliquo superne subtuberculoso, inferne tuberculo valido subla nelliforme munito.

Alt. mill. 7 $\frac{1}{2}$; lat. 4; apert. alt. 2 $\frac{1}{2}$.

Hab. Versante Est del Ruwenzori; Valle Mobuku, fino a 2000 metri.
Esempl. 2.

