

BOLLETTINO

DEI

Musei di Zoologia ed Anatomia comparata

della R. Università di Torino

VOL. XXII — 1907

N. 546-575



TORINO
TIPOGRAFIA PIETRO GERBONE

Via Gaudenzio Ferrari, 3

BOLLETTINO

DEI

Musei di Zoologia ed Anatomia comparata

della R. Università di Torino

N. 561 pubblicato il 5 Luglio 1907

Vol. XXII

SPELIZIONE AL RUWENZORI

DI

S. A. R. LUIGI AMEDEO DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI

XX.

CARLO POLLONERA

Nuove specie di Molluschi.

(DIAGNOSI PREVENTIVE)

Vitrina ibandensis, n. sp.

Testa subglobosa, tenuis, lucidissima, succineo-virescens, laevigata, striis evanescentibus; supra depressa, apice vix prominulo, subtus convexa; anfr. 2 $\frac{1}{2}$ rapide evoluti, sutura lineari separati. Apertura subovato-rotundata, parum obliqua, margine supero arcuato-descendente, infero regulariter arcuato.

Long. mill. 7 $\frac{1}{4}$, alt. 4. Apert. long. 4 $\frac{1}{4}$.

Hab. Ibanda.

Martensia entebbana, n. sp.

Testa depressa conoidalis, acute albo-carinata, anguste umbilicata, pallide cornea, supra carinam subtiliter fusco-zonata; anfr. 6 lente crescentes, primi convexi, sutura profunda divisi; coeteri convexiusculi, ad suturam albo-carinati, supra ublique confertim et subtilissime costulato-striati, subtus transverse irregulariter subplicato striati et spiraliter minutissime striati; ultimus ad aperturam non descendens. Apertura transverse lunata, margine acuto, tantum supra umbilicum in triangulum reflexo.

Lat. mill. 14, alt. 9.

Hab. Tra Entebbe e Madudu.

Fruticicola bujungolensis, n. sp.

Testa utrinque compressa, tenuissima, translucida, succinea, transverse plicata, anguste umbilicata; spira depressa, vix prominula; anfr. 5 convexiusculi, sutura impressa separati, ultimus non descendens. Apertura transverse lunata, margine supero breviter ascendente, coeteri regulariter arcuati et acuti.

Long. mill. 6 $\frac{1}{2}$, lat. 11; apert. long. 5, lat. 5 $\frac{1}{2}$.

Hab. Bujungolo: un solo es.

Fruticicola bihungae, n. sp.

Testa tenuis, subpellucida, cornea, mediocriter umbilicata, umbilico pervio; supra planiuscula, transverse plicata, suptus convexa, striata; anfr. 4 convexi, ultimus amplus, non descendens, ad peripheriam obtuse subangulatus. Apertura sublunata, basi obtuse angulata; marginibus supero, externo et basale acutis, columellare reflexiusculo.

Long. mill. 3 $\frac{1}{4}$; lat. 6.

Hab. Bihunga.

Limicolaria Roccatil, n. sp.

Testa conico-turriformis, solidula, apice obtuso, tenuiter striata, strigis brunneis subrectis, numerosis, in medium ultimi anfractus tantum angulatis; anfr. 8 sat rapide evoluti, convexiusculi, sutura simplice separati. Apertura parum ampla, oblique lunata, intus coerulea, columella pallidiore, distorta vel subrecta.

Long. mill. 57, lat. 22; apert. long. 21, lat. 11.

Hab. Fort Portal, e alta valle di Mobuku.

Nabita, 1 esempl. a fascie brune riunite inferiormente, cosicchè le parti chiare restano limitatissime.

var. *pallida*.

Differt a typo. strigis pallide fulvis, evanescentibus.

Hab. Fort Portal.

Limicolaria pura, n. sp.

Testa regulariter ovata, tenuiter striata; anfr. 7 convexiusculi, suturo simplice separati: superi carneo-rosei, ultimi albidi vel citrini, strigis transversis nullis; infra circa columellam zona basalis fusco-castanea lata, et superne iuxta suturam zonula macularum eiusdem coloris. Apertura recte lunata, oblonga; columella coerulea, recta vel tenuiter flexuosa.

Long. mill. 34-37; lat. 15-17; apert. long. 13 $\frac{1}{2}$ -15; lat. 7 $\frac{1}{2}$ -8 $\frac{1}{2}$.

Hab. Uganda, 6 esempl.; fra Entebbe e Madudu, 2 esempl.

var. n. *diluta*.

Differt a typo maculis suturalibus pallide fulvis, in strigis transversis nebulosis dilutis.

Hab. Uganda.

Limicolaria Cavallii, n. sp.

Testa oblongo-ovata, sat grosse sed dilute striata et subgranulosa; anfr. 7 valde convexi, sutura impressa separati; supremi carnei non flammulati, ultimi albidii, irregulariter et interrupte brunneo-flammulati. Apertura parvula, lunato-ovata, intus albescente, columella fusca leviter distorta.

Long. mill. 34-38, lat. 15-16; apert. long. 13, lat. 7-7 $\frac{1}{2}$.

Hab. Versante Est del Ruwenzori. Valle Mobuku 2000 m.

Glessula ferussacoides, n. sp.

Testa subcylindrico-oblongo-ovata, lucida, pallide corneo flavescens tenuiter striata; spira attenuata, apice obtuso; anfr. 7 convexiusculi sutura parum impressa et tenuiter marginata separati. Apertura oblongo-lunata, superne acuta, labro simplice, tenue; margine columellare subrecto, oblique truncato.

Long. mill. 18 $\frac{1}{2}$; lat. 6 $\frac{1}{2}$; Apert. long. 7, lat. 3 $\frac{1}{2}$.

Hab. Versante Est del Ruwenzori; Valle Mobuku fino a 2000 m.

